BOSTON
MEDICAL LIBRARY
8 THE FENWAY.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Allgemeine Zeitschrift
für

Psychiatrie

psychisch-gerichtliche Medicin,

herausgegeben von

Deutschlands Irrenärzten,

unter der Redaction von

Flemming und Roller

durch

Heinrich Laehr.

Sechsundzwanzigster Band.

Mit 2 Tafeln und 27 Holzschnitten.

Berlin.

Verlag von August Hirschwald.

1869.

BOSTON MEDICAL
MAY 24 1911
LIBRARY.

CATALOGUED
MAY 23 1911
J. F. B.

Digitized by Google

Inhalt des Sechsundzwanzigsten Bandes.

Erstes und zweites Heft.

Seite

Gedanken über den Sitz des Gemüths oder die Functionen des kleinen Gehirns. Von Prof. Dr. *P. Jessen* 1

Untersuchungen über das specifische Hirngewicht bei Geisteskranken. Von Geh. Rath Dr. *Nasse* 76

Ueber Papaverinwirkung bei Geisteskranken. Von Director Dr. *C. Stark* 120

Casuistik.

Epilepsie m. schwerer Seelenstörung. Genesung. Von Dr. *Kirn* 146

Zur therapeutischen Casuistik. 1. Willenslähmung d. unteren Extrem. u. dav. abhäng. Psychose. Von Dr. *v.Krafft-Ebing* 151

Literatur.

Archivio italiano (1868) — von Dr. *Pelman* 154

Ninth Ann. rep. of the Gen. Board of Commiss. in Lun. for Scotland 1867 — von Dr. *Lorent* 166

Anstaltsberichte.

Pflege-Anstalt Rheinau im Canton Zürich. Mit 1 Holzschn. 196

Versammlungen psychiatrischer Vereine.

5. Sitzung des psychiatr. Vereins zu Berlin 224

Boettger, Irres. n. Bleiintoxicat. 224

Noetel, Mittheil. üb. Temperaturverhältn. bei Epilept. . . 227

Boettger, Fall v. gr. Schädeldef. etc. bei Epilept. M. 1 Taf. 229

Der Verein schweizerischer Irrenärzte 231

Cramer, über No-restraint. 231

Wille, über Irrenpflege und Irrenanstalten. 237

Henne, Schädel eines Melancholikers. 243

Kleinere Mittheilungen.

Forense Psychologie in Italien. — Ueber Gheel. — Aus Posen. — Aus Sachsen. — Aus Ungarn. — Aus Kasan. — Aus New-York. — Psych. u. phys. Degenerationen. — Ein spontanes Othämatom. — Psychiatr. Section der Naturf. Versamml. in Dresden. — Dr. *Kern*, Nekrolog. — Drei Nekrologe und einige Anschuldigungen 245

Preis-Aufgaben 270

Digitized by Google

Seite

Personal-Nachrichten 271
Berichtigung 271
Erklärung der Tafel 271

Drittes Heft.

Beobachtungen über den Puls bei Geisteskranken. V. Mit Holzschn. Von Dr. *O. J. B. Wolff* 273
Beschreibung einer interessanten Hemmungsbildung des Gehirns. Mit 3 Abbildungen. Von Dr. *H. Schüle* 300
Casuistik.
Carcinomat. Hirngeschwulst. Mit 1 Tafel. Von Dr. *Stark* . 321
Zur therap. Casuistik. 2. Sexuelle Verrücktheit. Traitement moral nach *Leuret*. Dauernde an Genesung grenzende Besserung. Von Dr. *v. Krafft-Ebing* 326
Literatur.
Charles Mittermaier. Ses études sur la peine de mort, la responsabilité etc. Par *A. Brierre de Boismont*. — von *Fl.* 329
Verhandlungen psychiatrischer Vereine.
3. ordentl. Sitzung des psychiatr. Vereins der Rheinprovinz 331
Finkelnburg, Aufnahme Gemüthskr. in geschloss. Anstalten 331
Herz, Zur Prognose der Recidive (Fortsetz.) 337
Besser, Mittheilungen üb. d. histol. Verhältnisse d. Cerebell. 343
7. ordentl. Sitzung des Berliner psychiatr. Vereins . . . 353
Laehr, Ueber die Wirkung der Senfbäder gegen Psychosen 353
Kahlbaum, Beitr. z. klin. Erweiterg. der psych. Symptomat. 357
Schroeter, Fälle von intermitt. und akuter Melancholie . 359
Laehr, Irrthümer der Diagnose in Psychosen 368
2. Südwestdeutsche Lokalversammlung von Irrenärzten in Heidelberg 372
Schüle, Ueber eine Hemmungsbildung des Gehirns . . . 373
Stark, Ueber Speichelfluss bei Geisteskr. ohne Localaffect. 373
Kirn, Ueber periodische Psychosen 373
Dick, Ueber internationale Irrenstatistik 374
Kleinere Mittheilungen.
Gesetzliche Bestimmungen in Frankr. und England. — Ueber die Beziehg. u. Stellg. d. Mondes u. seiner Phasen — zur Geisteskrankheit und Epilepsie. — Ländliche Colonie Zschadras bei Colditz im Königr. Sachsen. — Wechselfieber im Wochenbette. — Ueber Irrenpflege in Frankreich. — Aus Brake. — Aus Hamburg. — Aerztl. Bericht üb. d. Irrenanstalt Lübeck. — In Graz. — Allerh. Hospital in Breslau, Abth. f. Geisteskr. — Aus d. Bericht. üb. d. Irrenanstalten Dänemarks. — Aus England. — Nekrolog *Löwenhardt's* . 378
Einladung 399
Personal-Nachrichten 399

Digitized by Google

Seite

Viertes und fünftes Heft.

Ein Beitrag zur Casuistik der Enostosen des Clivus bei Geisteskranken. Mit 5 Abbildungen Von Director Dr. *Stahl* . . 401
Ueber die prognostische Bedeutung der erblichen Anlage im Irresein. Von Dr. *v. Krafft-Ebing* 438
Klinische Bedeutung der Dysphagieen gestörter und gelähmter Kranken. Von Dr. *Zenker* 457
Doppelwahrnehmung und Doppeldenken. Von Dr. *Huppert* . 529
Casuistik.
Wahnsinn oder Verbrechen. Von Dr. *Fraenkel* 551
Zur therapeutischen Casuistik. 3. Mehrjähr. Onanie durch Oxyur. vermicul. m. folg. Psych. Von Dr. *v. Krafft-Ebing* 556
Fälle von Psychosen nach Ileo-Typhus. Von *Fl.* 557
Literatur.
v. Luschka, Die Anatomie d. menschl. Kopfes. Von Dr. *Meschede* 560
Bibliographie.
1 Selbständige Werke 563
2. Psychiatrisches in nicht-psychiatrischen Zeitschriften . . 571
Anstaltsberichte.
Herzogl. Altenburg. Irren-Heil- und Pflegeanstalt. Von Med.-Rath Dr. *Maeder* 561
Jahresbericht über die beiden Warschauer Irren-Heil und Pflege-Anstalten 1867. Von Hofrath Dr. *Rothe* 593
Verhandlungen psychiatrischer Vereine.
2. Versammlung des Vereins der Irrenärzte Niedersachsens und Westphalens 602
Ripping, Mikroskop. Befunde in der Hirnrinde von Geisteskranken, die an Melanch. verstorben. Mit 6 Abb. 602
Diskussion über Doppel-Wahrnehmungen. Ueber Narcotica. Ueber Kal. bromatum 615
Kleinere Mittheilungen.
Die schriftlichen Aeusserungen Geisteskranker. — Nocturnal Insanity. — Aus der Schweiz. — Aus Dänemark. — New Hampshire Asylum. — In Wittingham. — Aus Warschau. — Aus Westphalen 617
Personal-Nachrichten 627
Druckfehler 627

Sechstes Heft.

Beobachtungen über den Puls bei Geisteskranken. VI. Mit Holzschnitten. Von Dr. *O. J. B. Wolff* 629
Sitzung des deutschen Vereins der Irrenärzte zu Innsbruck 662
Norddeutscher Strafgesetz-Entwurf 662
Deutsche Lebensversicherungs-Institute 663

Digitized by Google

Seite

Internationale Irrenstatistik 664
Koster, Gutachten in gerichtlichen Fällen 665
Tigges, Vorlage zu *Lunier*'s Vorschlägen für die Statistik 667
Neue Mitglieder des Vereins 706
Psychiatrische Section der Versammlung zu Innsbruck . . 707
Lombroso, Ueber Pellagra 709
Solbrig, Ueber Morb. Based. in psychischen Erkrankungen 713
Nasse, Ueber Typhus und Irresein 713
Meschede, Ueber Helmintheneier im Gehirn 715
Brosius, Ueber Sichentkleiden der Geisteskranken . . . 717
Kahlbaum, Klinische Mittheilung 719
Keesbacher, Zur Casuistik 719
Leidesdorf, Ueber Geisteskrankheiten 720
Funke, Zur Nervenchemie 721
Golz, Ueber das Organ für Erhaltung des Gleichgewichts 721
Bernstein, Einfluss des Stromes auf das Herz 722
Hermann, Ueber Krämpfe durch nervöse Stauung . . . 723
Haidenhain, Ueber Körpertemperatur 723
Aubert, Einfluss der Athmung auf Pulsfrequenz 725
Ebert, Ueber *Chorea magna* 726
Virchow, Ueber Schädelmessungen 727
Seeligmann, Exostosen im Gehörgange 730
Vogt, Ueber einen Microcephalen 731
Leyden, Ueber Bulbär-Paralyse 732
Stolz, Statistik Hall's 734
Verhandlungen psychiatrischer Vereine.
4. Sitzung des psychiatrischen Vereins der Rheinprovinz 736
Herz, Ueber d. Prognose in psych. Krankheiten, 3. Theil 736
Meyer, Ueber die Irrenwartung im Hinblick auf d. s. vollziehenden Reformen des Irrenwesens überhaupt und des rheinischen im Besonderen 749
7. ordentl. Sitzung des psychiatrischen Vereins zu Berlin 760
Ulrich, Ueber subnormale Körperwärme 761
Ideler, Ueber die Krankenbewegung an der städtischen Irrenverpflegungsanstalt zu Berlin, im Jahre 1868 . 770
Schroeter, Fortschreitende Paralyse bei einer Frau nebst Sectionsbefund 770
Kleinere Mittheilungen.
Irrenanstalt zu Frankfurt a. M. — Aus Langenhagen. — Etat der Heil- und Pflege-Anstalt zu Brake für 1870. — Aus Wien. — In Frankreich. — Aus Berlin. — Aus England. — Aus Bamberg. — Aus Schlesien 776
Benachrichtigung für die Mitglieder des Vereins deutscher Irrenärzte 778

Digitized by Google

BOSTON MEDICAL
MAY 24 1911
LIBRARY

Gedanken über den Sitz des Gemüthes oder die Functionen des kleinen Gehirns.

Von

Professor Dr. **P. Jessen.**

12025

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass in allen Organismen für jede besondere Function ein besonderes Organ existirt. Die Physiologie setzt dies wenigstens stets voraus und sucht einerseits aus der Structur jedes Organes und seinen Verbindungen mit anderen Organen seine Function abzuleiten, andererseits für jede besondere, von den übrigen verschiedene Function das entsprechende Organ ausfindig zu machen. Auf dieselbe Weise hat man sich auch vielfach bemüht, die Functionen der besonderen Organe oder der verschiedenen Theile des Gehirnes und Rückenmarkes zu erforschen, indem man diese Centralorgane des Nervensystemes schon längst als die Träger des Seelenlebens erkannt hat. Trotz der eifrigen Bemühungen so vieler ausgezeichneter Forscher sind wir aber in der Erkenntniss dieser Functionen und ihrer Beziehungen zu den verschiedenen Theilen der Centralorgane noch weit zurück. Am auffallendsten tritt dies hervor in Beziehung auf das kleine Gehirn. Viele Physiologen nehmen mit *Flourens* an, dass dasselbe die Coordination der Muskelbewegungen vermittle, Andere

suchen in ihm mit *Gall* den Sitz des Geschlechtstriebes, Einzelne halten es für das Centralorgan des sogenannten Muskelsinnes, Manche für das Organ des Willens; es giebt aber auch ausgezeichnete Physiologen, wie z. B. *Schiff*, welche die Functionen des kleinen Gehirns gradezu für noch ganz unbekannt erklären. Und doch werden wir durch die Grösse dieses Organes, durch seine eigenthümliche Structur, seine Lage und seine Verbindungen mit den übrigen Centralorganen zu der Voraussetzung genöthigt, dass es sehr bedeutende und wichtige Functionen in dem Gebiete des Seelenlebens zu vollziehen haben müsse.

Die Ursache dieser Mangelhaftigkeit unserer Erkenntniss liegt hauptsächlich in der ungemeinen Schwierigkeit, welche Gehirn und Rückenmark den anatomischen Untersuchungen darbieten. Besässen wir eine genaue Kenntniss von der Structur und dem Zusammenhange ihrer verschiedenen Theile oder der in ihnen enthaltenen Organe, so würden wir gewiss im Stande sein, die besonderen Functionen derselben wenigstens hypothetisch daraus abzuleiten und alsdann würden sich auch wohl Mittel und Wege finden, diese Hypothesen durch physiologische Experimente zu prüfen, zu widerlegen oder zu bestätigen, und sie schliesslich zu dem Werthe physiologisch festgestellter Thatsachen zu erheben. Zu dieser aus der Beschaffenheit der nervösen Centralorgane hervorgehenden Schwierigkeit gesellt sich noch eine andere von nicht geringer Bedeutung in dem Mangel einer wissenschaftlich festgestellten Unterscheidung derjenigen Functionen, welche psychologisch als besondere, d. h. als relativ selbständige, für sich bestehende, mehr oder weniger von einander unabhängige Functionen angesehen werden müssen. Dass man die besonderen Functionen und ihre Begränzung genau kennen muss, wenn man ihre Beziehungen zu besonderen Organen ermitteln will, leuchtet von

Digitized by

selbst ein und zu welchen Verirrungen der Mangel an psychologischer Erkenntniss und Unterscheidung der Functionen führen kann, davon giebt uns die von *Gall* und seinen Nachtretern erfundene Phrenologie ein auffallendes und merkwürdiges Beispiel.

Die Phrenologen glauben für eine Menge besonderer Functionen entsprechende Organe gefunden zu haben, ohne über die Selbständigkeit der Functionen oder das wirkliche Vorhandensein der Organe Untersuchungen anzustellen. Wollte man für jede Eigenschaft der menschlichen Seele, für jede in den einzelnen Individuen hervorstechende Fähigkeit oder Neigung ein besonderes Organ aufsuchen, so würden die von den Phrenologen aufgestellten Organe bei weitem nicht genügen, ihre Anzahl vielmehr fast bis ins Unendliche vermehrt werden müssen. Das Organ der Dichtkunst müsste z. B. untergeordnete Organe für die verschiedenen Zweige derselben, für dramatische, epische, lyrische Dichtkunst enthalten, das Organ der Musik besondere Organe für den Virtuosen und den Componisten, das Organ der Mathematik besondere Organe für practisches Rechnen, Arithmetik, Geometrie und höhere Mathematik u. s. w. Als das einzige fruchtbringende Resultat, welches aus der Phrenologie indirect hervorgegangen ist, erscheint mir die von *Bouillaud* aufgestellte und eifrig vertheidigte, durch zahlreiche pathologische Untersuchungen wahrscheinlich gemachte theoretische Ansicht, dass die Sprache, oder vielmehr die innere Wortbildung, in dem vorderen Theile des grossen Gehirns, in den Stirnlappen zu Stande komme. Die innere Wortbildung ist in der That eine relativ selbständige Function und unser eigenes Bewusstsein sagt uns, dass die beim Denken zum Vorschein kommenden Worte nicht im Hinterkopfe, sondern in dem vorderen Theile des Kopfes ihren Ursprung nehmen. Die relative Selbständigkeit der inneren Wortbildung

Digitized by Google

wird insbesondere bewiesen durch die in neuester Zeit so viel besprochenen Fälle von sogenannter Aphasie, in welchen die Fähigkeit verloren gegangen war, die eignen Gedanken in entsprechende Worte zu übertragen, so dass eine richtige Gedankenentwicklung stattfand, aber bei jedem Versuch, den innerlich vorhandenen Gedanken in Worte zu fassen, nur ganz verworrene Worte und unverständliche Sätze zum Vorschein kamen. In manchen Krankheitszuständen dieser Art ist augenscheinlich ein mehr oder weniger ungestörtes Denken mit einer gänzlichen Störung der inneren Wortbildung verbunden.

Die Phrenologie ist nicht das einzige Beispiel von dem störenden und hemmenden Einfluss, welchen die Unbestimmtheit und Unklarheit unsererer Kenntniss der besonderen psychologischen Functionen auf die Erkenntniss der Functionen der verschiedenen Theile des Gehirnes und Rückenmarkes ausübt. Den schlagendsten Beweis dafür giebt das fortwährende Suchen nach einem besonderen Organe des Willens, indem es psychologisch leicht zu constatiren ist, dass der Wille nicht als eine für sich bestehende Function angesehen werden kann, folglich ein besonderes Organ für denselben schwerlich existiren wird. Ein von Gedanken und Gefühlen unabhängiges Wollen kommt gar nicht vor, vielmehr gehört das Wollen im eigentlichen Sinne des Wortes zu den Functionen des Denkens, im weiteren Sinne des Wortes kann es auch aus den Gefühlen und Trieben des Gemüthes hervorgehen, ja sogar jede spontane und jede centrifugale Thätigkeit der Seele ein Wollen genannt werden. Dieselben Unterschiede einer nach innen oder nach aussen gerichteten centripetalen oder centrifugalen Thätigkeit, welche wir überall im Nervensysteme antreffen, wiederholen sich auch im Gebiete des Seelenlebens. Erkennen und Wollen repräsentiren die cen-

tripetale und centrifugale Seite der Geistesthätigkeit, oder sind vielmehr die in centripetaler oder centrifugaler Richtung fortwirkenden Resultate des Denkens; Empfindungen sind die centripetalen, Triebe die centrifugalen Thätigkeitsäusserungen des Gemüthes oder des Fühlens, ein von Beiden unabhängiges Wollen kommt niemals zum Vorschein.

Wenn ich es demnach versuchen will, meine theoretische Ansicht zu begründen, dass das kleine Gehirn der Sitz des Gemüthes sei, oder, um mich bestimmter auszudrücken, dass wir in ihm wahrscheinlich die Ursprungsstätte des Selbstgefühls, des Muthes, der inneren Gemüthsbewegungen, der Affecte und Leidenschaften zu suchen haben: so folgt aus dem Vorhergehenden, dass dies nicht geschehen kann, ohne eine Untersuchung darüber vorauszuschicken, welche Erscheinungen des Seelenlebens als relativ selbständige und für sich bestehende Functionen betrachtet werden müssen. Eine vollständige und ausführliche Erörterung dieses Gegenstandes kann hier freilich nicht gegeben werden, jedoch will ich es versuchen, wenigstens in Beziehung auf einige Hauptpunkte meine Ansichten so kurz wie möglich und so deutlich wie möglich auseinander zu setzen.

Die ursprüngliche Quelle und das Fundament alles psychologischen Wissens ist der Inhalt unseres eigenen Bewusstseins. Wenn sich die Vorgänge in unserem Seelenleben nicht mehr oder weniger in unserem Bewusstsein abspiegelten oder in einer für unseren Geist sichtbaren Gestalt darstellten, so würden wir nicht einmal erfahren, dass wir eine Seele haben, ihre Thätigkeit zu beobachten, die Gesetze ihres Wirkens zu erforschen wäre unmöglich. Auch die an Anderen beobachteten Aeusserungen des Seelenlebens würden uns unverständlich bleiben; denn was in Anderen vorgeht, verstehen wir nur durch Vergleichung mit dem, was wir an und

Digitized by Google

in uns selber erfahren haben. Ueber Gefühle, die in uns niemals, selbst nicht in leisen Anklängen entstanden sind, können wir nicht urtheilen, Handlungen, die unserer Natur ganz fremd sind, bleiben uns unbegreiflich. Wer von jeder Anwandlung von Hypochondrie frei geblieben ist, kann den Zustand eines Hypochondristen nicht verstehen, und wer niemals vor Zorn ausser sich gerathen ist, kann sich von diesem Zustand keine Vorstellung machen.*) Wir bemühen uns vergebens, uns eine deutliche Vorstellung zu machen von der Art und Weise, wie die Thiere denken und fühlen, und selbst die Eigenthümlichkeiten wilder oder nur fremder Volksstämme bleiben für uns oft schwer verständlich. Nur die grosse Uebereinstimmung der menschlichen Natur in allen Individuen setzt uns in den Stand, anderer Menschen Denkweise zu erkennen: das Studium der eignen Seele ist der Schlüssel zu aller psychologischen Erkenntniss.

Unterwerfen wir den Inhalt unseres Bewusstseins einer genauen Prüfung, so finden wir darin nur zwei (gleichsam histologische) Elemente: Gedanken, die sich in innerlichen Bildern (Ideen) und Worten darstellen und Gefühle, welche mit und neben ihnen hervortreten. Alles, was im Bewusstsein zum Vorschein kommt, lässt sich auf Gedanken und Gefühle zurückführen. Die Gedanken, namentlich die durch unsere eigene Seelenthätigkeit hervorgerufenen, stellen sich vorzugsweise in Worten dar, aber die durch die Sinne dem Bewusstsein zugeführten Bilder oder Ideen sind von ihnen nicht wesentlich verschieden. Sie werden durch Worte bezeich-

*) Ich kann dies aus eigener Erfahrung behaupten. Nur einmal in meinem Leben bin ich nach einer schweren Reizung vor Zorn ausser mir gerathen und musste mir nachher zugestehen, dass ich bis dahin von einem solchen Zustande gar keine Vorstellung gehabt hatte. Wie oft mag es wohl vorkommen, dass man über Seelenzustände urtheilt, die man gar nicht kennt!

Digitized by

net, welche den ganzen Inhalt der Sinneswahrnehmungen in sich schliessen und bilden die Grundlage für alle weitere Gedankenentwickelung. Sie entstehen auch in derselben Weise, wie alle anderen Gedanken; denn wenn ich einen äusseren Gegenstand aufmerksam betrachte, oder innerlich über eine Sache nachdenke, so thue ich in beiden Fällen ganz dasselbe. Das Nachdenken ist nichts anderes, als ein innerliches Betrachten und das eigne Bewusstsein lehrt uns, dass es eine und dieselbe Geistesthätigkeit ist, welche sich bald in der Form von Aufmerksamkeit äusseren Dingen zuwendet, bald als Nachdenken mit inneren Vorstellungen beschäftiget. Deshalb wird auch das Nachdenken oft ein inneres Anschauen genannt, indem die Sprache die Identität beider Acte anerkennt.

Während wir also keine wesentliche und durchgreifende Verschiedenheit zwischen den durch die Sinne dem Bewusstsein zugeführten Bildern oder Ideen und den durch Nachdenken in ihm erzeugten Gedanken erkennen können, zeigen sich dagegen Gedanken und Gefühle durchaus von einander verschieden. Die Gedanken haben immer (selbst wenn sie uns selber betreffen) einen objectiven Inhalt, den wir jedem Anderen vollständig mittheilen können, indem wir ihn aussprechen: der Inhalt unserer Gefühle ist immer subjectiver Natur und nur in unvollkommener Weise in Worten darstellbar. Derselbe Gedanke erscheint bei allen Menschen in vollkommen gleicher Weise, dasselbe Gefühl erhält in jedem Einzelnen ein besonderes Gepräge: wie Jemand denkt, können wir vollständig erfahren, wie er empfindet, nur sehr unvollkommen. Gedanken und Gefühle treten gleichzeitig und mehr oder weniger unabhängig von einander im Bewusstsein auf, so dass derselbe Gedanke mit verschiedenen Gefühlen coexistiren kann und dasselbe Gefühl mit verschiedenen Gedanken. Letztere sind einem

Digitized by Google

raschen Wechsel unterworfen und verschwinden ebenso schnell, wie sie entstehen, um anderen Platz zu machen (Association der Ideen); die Gefühle haben immer eine Neigung, zu beharren und verschwinden nie plötzlich, sondern verklingen gleichsam allmälig. Jeder Gedanke, den wir einmal gehabt haben, kann zu jeder Zeit unverändert in uns reproducirt werden und von der Kindheit bis zum Greisenalter unverändert in uns bleiben; die Gefühle verändern sich stets mit den Jahren und es gelingt fast niemals, ein einmal gehabtes Gefühl in ganz gleicher Gestalt wieder hervorzurufen. Ueber unsere Gedanken besitzen wir eine fast unbegrenzte Macht und können sie nach Belieben hervorrufen oder mit anderen vertauschen; unsere Gefühle können wir nur in sehr geringem Maasse beherrschen und weder nach Belieben hervorrufen noch verschwinden lassen, vielmehr, wenn sie einen gewissen Grad von Stärke erreichen, ihrer Herrschaft kaum widerstehen.

Endlich lehrt uns unser eigenes Bewusstsein, dass die Gefühle einen anderen Ursprung haben, als die Gedanken. Wenn wir Letztere durch Nachdenken in uns hervorrufen, so treten sie direct und unmittelbar in unserem Bewusstsein hervor; von den ohne unser eigenes Zuthun in uns entstehenden Gefühlen bemerken wir, dass sie (in ähnlicher Weise wie die Sinneswahrnehmungen) von einem anderen Orte her dem Bewusstsein zugeführt werden. Dabei drängen sie sich uns nicht selten mit solcher Gewalt auf, dass wir uns vergebens bemühen, ihren Andrang abzuwehren. Hierdurch und durch die gänzliche Verschiedenheit der Gedanken und Gefühle werden wir dazu genöthigt, ihnen nicht nur verschiedene Ursprungsstätten zuzuschreiben, sondern sie auch als Wirkungen verschiedener, relativ selbständiger Seelenkräfte zu betrachten. Wir bezeichnen diese Kräfte als Geist (Intelligenz) und als Gemüth (in weiterem Sinne die-

Digitized by

ses Wortes), indem wir das Denken und die Erzeugung von Gedanken als die Function des Geistes, das Fühlen und die Erzeugung von Gefühlen als die Function des Gemüthes betrachten. Die Analyse unseres Bewusstseins und seines Inhaltes führt uns also zunächst dahin, nur diese beiden Kräfte als wirklich existirende, ungeachtet ihrer Wechselwirkung relativ selbständige und von einander verschiedene Grundkräfte der Seele anzunehmen. Ihre Selbständigkeit und relative Unabhängigkeit von einander machen es wahrscheinlich, dass ihre Functionen durch verschiedene Organe vermittelt werden, welche in den nervösen Centralorganen zu suchen sind.

Die Psychologen pflegen durchgehends noch eine dritte Seelenkraft, den Willen, dem Geiste und Gemüthe zu coordiniren und das Wollen dem Denken und Fühlen gleich zu setzen. Dies rührt ohne Zweifel daher, dass die Aeusserungen des Seelenlebens anscheinend in drei Hauptgruppen zerfallen: Sprache, Geberden und Handlungen. Man hatte nun schon längst das Denken als die Ursache der inneren Wortbildung und des Sprechens erkannt, sowie die Gefühle als die innere Ursache der Geberden oder des Ausdruckes in Blick und Mienen, Gang und Körperhaltung, in dem Benehmen, der Declamation und Gesticulation u. s. w. Die Handlungen hielt man für ganz verschieden von der Sprache und den Geberden und dachte deshalb, dass auch ihnen eine besondere innere Ursache zu Grunde liegen müsse und als solche betrachtete man den Willen. Dass aber eine selbstständige, von dem Denken und Fühlen unabhängige Willenskraft in der Wirklichkeit nicht existirt, ist unschwer nachzuweisen. Vorerst sind die Handlungen von der Sprache und den Geberden nicht so verschieden, wie es diese von einander sind. Jede absichtlich hervorgerufene Geberde, wodurch man etwas erreichen will, z. B. ein flehender Blick, eine drohende Erhebung der

Digitized by Google

Hand, ist eine Handlung, und dasselbe gilt für jedes zu einem bestimmten Zwecke gesprochene Wort: die grössten Thaten bestehen manchmal nur in gesprochenen Worten. Untersuchen wir ferner in unserem Bewusstsein, welche innere Vorgänge unseren Handlungen zu Grunde liegen, so finden wir, dass sie entweder aus einem bestimmten Gedanken (einer Absicht, einem Vorsatze oder Entschlusse) hervorgehen, oder aus einem bestimmten Gefühle (einem Verlangen, einer Begierde, einem Pflichtgefühl). In sehr vielen Fällen erscheint uns das Wollen als das Resultat einer vorhergehenden Wechselwirkung zwischen Gedanken und Gefühlen. Endlich genügt es zur Erklärung einer Handlung niemals, dass uns gesagt wird, der Handelnde habe so handeln wollen, wir wollen vielmehr erklärt wissen, warum er so gewollt hat. Sobald wir erfahren, dass er gedacht habe, diesen oder jenen Zweck dadurch zu erreichen, oder dass er durch ein bestimmtes Gefühl, etwa eine Leidenschaft, dazu getrieben sei, finden wir die Handlung befriedigend erklärt und vollkommen begreiflich. Eine besondere, für sich bestehende, von dem Denken und Fühlen mehr oder weniger unabhängige Willenskraft ist demnach in der menschlichen Seele nicht anzunehmen und ein besonderes Organ dafür nicht zu suchen.

In dem Processe des Denkens lernen wir durch Selbstbeobachtung zwei alternirende Momente unterscheiden: das Nachdenken und die Gedankenentwicklung oder Darstellung derselben in geordneten Worten und Sätzen. Je ernster das Nachdenken ist, desto deutlicher werden wir gewahr, dass in dem Momente des Nachdenkens alle innerlichen Worte oder Gedanken aus unserem Bewusstsein verschwinden und wir nur dessen bewusst bleiben, dass die geistige Thätigkeit unserer Seele oder unseres Ichs fest auf einen Punkt geheftet bleibt, ohne dass wir etwas darüber erfahren, was in

Digitized by Google

diesem Moment in unserer Seele vorgeht. Dies Nachdenken kann bisweilen eine merklich längere Zeit dauern, endiget aber in der Regel fast augenblicklich mit dem Fassen eines, noch nicht in Worte gekleideten Gedankens, eines Begriffes, einer Folgerung, eines Schlusses. Sogleich folgt darauf eine in centrifugaler Richtung von dem Ich ausgehende Bewegung, wodurch das Gehirn oder ein bestimmter Theil desselben dazu angeregt wird, den schon vorher innerlich gefassten Gedanken in der Form von innerlichen Worten darzustellen, gleichsam ihn in Worte zu übersetzen. Diese Function vollzieht das Gehirn selbständig, von der Selbstthätigkeit des Ichs unabhängig, denn nicht immer entsprechen die Worte dem vorhandenen Gedanken; bisweilen gelingt es erst nach wiederholten Versuchen, den richtigen Ausdruck desselben zu finden und in krankhaften Zuständen entsteht die oben näher bezeichnete Form von Aphasie bei ungestörtem Nachdenken. Die centrifugale, vom Ich ausgehende Bewegung ruft also im Bewusstsein die geordnete Reihenfolge von Worten hervor, welche wir die Gedankenentwickelung nennen, allein in demselben Augenblicke, in welchem die Worte innerlich entstehen, kehren sie in centripetaler Richtung zu dem Ich zurück, gehen aus dem Bewusstsein in das Selbstbewusstsein über und regen das Ich so lange zu neuer Thätigkeit an, bis ein befriedigendes Resultat gewonnen ist. Der Process des eigentlichen, nur dem Menschen eigenthümlichen Denkens besteht also in kreisförmig zusammenschliessenden centrifugalen und centripetalen Bewegungen, an deren Verbindungspunkten (in den dazu bestimmten Nervenzellen) einerseits die Gedankenbildung, andererseits die Gedankenentwicklung, d. h. ihre Uebertragung in Worte zu Stande kommt. Dadurch wird ein doppelter Zweck erreicht: erstlich werden wir dadurch in den Stand gesetzt, unsere Gedanken mitzutheilen, sie auszu-

Digitized by Google

sprechen oder durch Handlungen auszuführen, zweitens werden wir selbst erst dadurch des Inhaltes unserer Gedanken uns deutlich bewusst. So lange der Gedanke nicht in Worten entwickelt ist, wissen wir freilich wohl, dass wir ihn haben, auch sein Inhalt schwebt wohl in dunklen Umrissen vor unserer Seele, aber die Bedeutung und Tragweite desselben lernen wir erst durch seine Entwicklung in Worten kennen, und nicht selten werden wir eben so sehr überrascht, als in Verwunderung gesetzt durch die ungeahnete Fülle des Inhaltes, welche aus ihm entwickelt werden kann.

Die entgegengesetzten Bewegungsrichtungen, welche in allen Acten des Denkens stattfinden, wiederholen sich in den Resultaten derselben. Sie bestehen entweder in einem nach innen gerichteten, centripetalen Wissen und Erkennen, oder in einem nach aussen gerichteten, centrifugalen Wollen und Thun; und je nachdem das Ziel der Geistesthätigkeit dieses oder jenes Resultat zu erstreben sucht, unterscheiden wir in der Gesammtthätigkeit des Denkens ein Erkennen und Wollen. Letzteres kommt jedoch, wenigstens in Beziehung auf alle bedeutendere Handlungen, nicht zu Stande, ohne eine Einwirkung von Seiten des Gemüthes zu erfahren, und wir finden in ihm den Gedanken mit einem Gefühle verbunden und gleichsam verschmolzen. Wenn wir beobachten, was in dem Momente in uns vorgeht, wo wir einen Entschluss fassen, so nehmen wir deutlich wahr, dass sich dabei ein bestimmter Gedanke mit einem bestimmten Gefühle zu gemeinsamem Zwecke vereiniget. Wir können auch sowohl durch Selbstbeobachtung, als durch Beobachtung Anderer leicht entdecken, ob der Gedanke oder das Gefühl bei dem Fassen des Entschlusses und beim Ausführen der entsprechenden Handlung das Vorherrschende ist. Der Gedanke ist in dem Wollen und Thun das leitende, das Gefühl das treibende Princip,

Digitized by Google

der Gedanke gleichsam das qualitative, das Gefühl das quantitative Moment. Je mehr der Gedanke in dem Wollen vorherrscht, desto ruhiger und regelmässiger geschehen alle zur Ausführung erforderlichen Bewegungen, aber desto eher fehlt es ihnen an der nöthigen Energie, desto schwerer wird oft die Ausführung, desto leichter lassen wir uns davon zurückhalten, desto weniger ist uns daran gelegen, ob die beabsichtigte Handlung vollzogen wird oder nicht. Je mehr hingegen das Gefühl das Vorherrschende ist, mit desto grösserer Leichtigkeit, Hastigkeit und Energie geschieht die Ausführung, desto mehr fühlen wir uns dazu getrieben, desto schwerer wird es uns, sie zu unterlassen, desto eher geschehen aber auch die Bewegungen unregelmässig, übereilt und mit unnöthigem Kraftaufwande. Will man z. B. bei ruhigem Gemüthe und bloss, weil man ihn gerade gebraucht, einen etwas entfernt liegenden Gegenstand zu sich nehmen, so bewegt man die Hand ruhig und genau so weit, wie nöthig, zu dem Gegenstande hin, fasst ihn, wie es am bequemsten ist und bringt bei der ganzen Handlung nur die erforderliche Kraft in Anwendung. Wird man dagegen durch eine heftige Begierde zu demselben Act getrieben, so bleibt zwar der leitende Gedanke derselbe, aber man greift hastig zu, oft über das Ziel hinaus, man packt den Gegenstand ohne Rücksicht darauf, wie es am bequemsten ist, manchmal sogar, ohne eine Selbstverletzung zu vermeiden, und man vollzieht den ganzen Act mit unnöthigem und übertriebenem Kraftaufwand. Was in einer so unbedeutenden Handlung zum Vorschein kommt, offenbart sich in allen Handlungen, in einer jeden kann man an der Art der Ausführung unterscheiden, ob Gedanken oder Gefühle vorzugsweise den Entschluss und dessen Ausführung bestimmt und veranlasst haben.

Aus diesen Erörterungen folgt, wie mir scheint, un-

Digitized by Google

widerleglich, dass der Wille wohl als eine besondere Thätigkeitsäusserung, aber nicht als eine besondere Kraft der Seele gelten kann, dass vielmehr nur Geist und Gemüth als Grundkräfte derselben angenommen werden dürfen. Ist man zu dieser Ueberzeugung gekommen, so entsteht wieder die Frage, ob diese beiden Kräfte stets in gleicher Weise wirken, oder bedeutende Unterschiede in den Aeusserungen ihrer Thätigkeit an den Tag legen, mit anderen Worten, ob sie einfach sind, oder vielleicht aus mehreren untergeordneten Kräften zusammengesetzt, denen eine relative Selbständigkeit zukäme, so dass besondere Organe für sie gesucht werden müssten. Auch hierüber giebt uns theils unser eigenes Bewusstsein, theils die Beobachtung Anderer nähere Auskunft.

Fassen wir zunächst die Geistesthätigkeit ins Auge, so findet sich, dass man schon längst drei verschiedene Formen derselben unterschieden hat: Sinn, Verstand und Vernunft. Diese Unterschiede sind naturgemäss und werden durch Selbstbeobachtung bestätiget, indem sie uns lehrt, dass die Thätigkeit des Geistes zwar stets dieselbe bleibt, dass sie aber in drei verschiedenen Sphären sich bewegt, und dass sie in jeder Sphäre mit relativer Selbständigkeit wirkend andere Resultate hervorbringt. Sie lehrt uns ferner, dass der Geist sich in derselben Zeit oft vorzugsweise einer Sphäre zuwendet und mit der grössten Schnelligkeit von einer Sphäre in die andere übergeht, dass er aber auch seine ganze Kraft ebenso wohl auf eine Sphäre concentriren, als auf alle Sphären vertheilen kann. Wir können uns im Nachdenken so vertiefen, dass sowohl die Sinneswahrnehmungen, als die durch den Verstand erzeugten Ideen-Associationen aufhören; wir können uns (in Zuständen der Träumerei) diesen Ideen-Associationen so hingeben, dass zu derselben Zeit weder sinnliche Wahrnehmungen noch Nachdenken stattfinden; wir können aber endlich auch in

Digitized by Google

sinnliche Anschauungen uns so ganz verlieren, dass in denselben Augenblicken eine innere, verständige oder vernünftige Gedankenentwicklung gar nicht zu Stande kommt, so dass sogar das Selbstbewusstsein momentan verloren geht und wir erst beim Verschwinden der den Geist gleichsam fesselnden sinnlichen Erscheinungen wie aus einem Traum erwachen. Letzteres kommt namentlich bei Kindern häufig vor, die gänzliche Vertiefung in die eigenen Gedanken besonders bei den grössten Denkern, wie sie z. B. in ungewöhnlich hohem Grade bei *Newton* stattgefunden hat. Gewöhnlich vertheilt sich die Geistesthätigkeit gleichzeitig auf mehrere Sphären und sie kann in allen dreien zugleich wirken. Wenn man z. B. über irgend eine Sache einen Vortrag hält und die dabei stattfindenden Vorgänge beachtet, so kann man bemerken, dass man bisweilen gleichzeitig alles den Sinnen sich Darbietende wahrnimmt, eine Reihenfolge von Gedanken in sich entwickelt und die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Gedanken einer Prüfung unterwirft. Man kann freilich auch bemerken, dass der Redefluss und die Gedankenentwicklung in Stocken gerathen, wenn man zu sehr darauf achtet, ob die ausgesprochenen Gedanken richtig sind und ebenso, wenn die Sinne zu sehr in Anspruch genommen werden, allein die gleichzeitige Thätigkeit des Geistes in allen Sphären ist dabei unverkennbar.

In jeder Sphäre wirkt der Geist mit einem gewissen Grade von Selbständigkeit und erzeugt Resultate von eigenthümlicher Form; so dass wahrscheinlich verschiedene Organe zur Vollziehung dieser verschiedenen Functionen dienen. Die Geistesthätigkeit kann nach Belieben, ihren augenblicklichen Zwecken gemäss, aus einer Sphäre in die andere übergehen, bald hier, bald dort längere Zeit verweilen, sie bleibt aber überall dieselbe. In jeder Sphäre werden die Resultate vermittelt durch

Digitized by Google

Vereinigung centrifugaler und centripetaler Bewegungen, die sich gegenseitig bedingen und anregen; in dem sinnlichen Anschauen durch Aufmerksamkeit und Wahrnehmen, in den verständigen Urtheilen durch Ueberlegen und Vorstellen, in dem vernünftigen Folgern und Schliessen durch Nachdenken und Begreifen. Wahrnehmen, Vorstellen und Begreifen, Aufmerken, Ueberlegen und Nachdenken, Anschauen, Urtheilen und Schliessen sind verschiedene Formen derselben Thätigkeit, einerseits von einander verschieden, andererseits identisch. Daher unterscheidet der Sprachgebrauch diese Wörter auch nicht genau, er gestattet vielmehr, dieselben Wörter bald in diesem, bald in jenem Sinne, bald in engerer, bald in weiterer Bedeutung zu gebrauchen. Dasselbe findet bei sehr vielen in der Psychologie gebräuchlichen und unentbehrlichen Wörtern statt, ist aus dem eben angeführten Grunde leicht erklärlich, erschwert aber alle psychologischen Erörterungen ungemein.

Jede geistige Thätigkeit hat ein Wissen zum Resultate und das Wissen erscheint ebenfalls in drei verschiedenen, den verschiedenen Sphären der Geistesthätigkeit entsprechenden Formen, als ein unmittelbares Wissen, als Bewusstsein und als Selbstbewusstsein. Der Unterschied zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein, zwischen Verstand und Vernunft braucht hier nicht erörtert zu werden, wohl aber bedarf der Unterschied zwischen dem blossen Wissen und dem innerlichen Wissen von diesem Wissen, d. h. dem Bewusstsein, einer etwas näheren Auseinandersetzung. Man hat bisher durchgehends angenommen, dass die Sinneswahrnehmungen stets und sogleich zum Bewusstsein kämen, und dass es gar keine bewusstlose Wahrnehmungen gebe. Unter den neueren Physiologen scheint sich jedoch die richtige Einsicht mehr und mehr zu verbreiten, dass dies nicht der Fall ist, dass vielmehr jede Wahrnehmung

Digitized by Google

zuerst unbewusst zu Stande kommt und alsdann zwar in der Regel, aber nicht immer und manchmal erst nach einer merklichen Zwischenzeit dem Bewusstsein zugeführt wird. Letzteres können wir fast alle Tage an uns selber beobachten. Sind wir z. B. bei einem Spaziergange in unsere eigenen Gedanken vertieft, so können wir einem im Wege liegenden Stein oder uns begegnenden Personen ausweichen, ohne es zu bemerken. Dass wir einem Bekannten begegnet sind, fällt uns zuweilen erst später ein; den Gruss eines Vorübergehenden erwiedern wir vielleicht erst, nachdem wir eine Strecke weiter gegangen sind, zum Beweis, dass wir den Gruss wohl wahrgenommen haben, dieser Wahrnehmung aber erst später bewusst geworden sind. Wenn wir in Gedanken vertieft vorlesen oder ein Musikstück spielen, so kommt es vor, dass wir eine kürzere oder längere Zeit richtig fortlesen oder fortspielen, ohne etwas davon zu erfahren, was wir gelesen oder gespielt haben. Dennoch haben wir während dieser Zeit die richtig gelesenen Wörter oder die richtig gespielten Noten auch gewiss richtig gesehen, die Wahrnehmungen sind nur nicht zum Bewusstsein gekommen.

Es liessen sich viele Beispiele ähnlicher Art anführen; die erwähnten werden indess hinreichend beweisen, dass neben dem bewussten auch ein bewusstloses Wahrnehmen und Denken stattfindet, dessen Bedeutung für das Seelenleben des Menschen bei weitem nicht genügend erforscht und erörtert worden ist.

Wenden wir uns zu einer kurzen Betrachtung des Gemüthes, so finden wir in ihm eine Wiederholung derselben Verhältnisse. Die Gefühle bewegen sich ebenfalls in drei verschiedenen Sphären, welche wir als die Sphäre des Gemeingefühles, des Selbstgefühles und des moralischen Gefühles oder Gewissens von einander unterscheiden. Der Sphäre des Gemeingefühles

Digitized by Google

gehören alle sinnlichen und leiblichen Gefühle an, deren Complex unser Befinden ausmacht. Zu der Sphäre des Selbstgefühles gehören alle inneren Gemüthsbewegungen, der Muth, die Affecte und Leidenschaften und aus ihnen resultirt unsere Stimmung, so wie aus den höheren, religiösen und moralischen Gefühlen unsere Gesinnung. In jeder Sphäre finden wir eine Vereinigung einander wechselseitig anregender centripetaler und centrifugaler Bewegungen, erstere erscheinen als Reizung, Erregung (Affect) und Rührung, letztere als Neigung, Interesse (Leidenschaft) und Liebe. Alle Gemüthseindrücke wirken entweder anziehend oder abstossend und je nachdem das Eine oder das Andere der Fall ist, erscheinen sie uns angenehm oder unangenehm und zwar in den verschiedenen Sphären der Gemüthsthätigkeit als Genuss und Schmerz, als Freude und Leid oder als Zufriedenheit und Unzufriedenheit (Reue). Selbstbeobachtung dieser Gefühle lehrt uns einerseits die Verschiedenheit kennen, mit welcher dieselben Gefühle in den verschiedenen Sphären der Gemüthsthätigkeit auftreten, andererseits die relative Selbständigkeit und Unabhängigkeit von einander, womit sie in der Sphäre entstehen, welcher sie angehören. Sie gehen jedoch auch, wie die Gedanken, aus einerSphäre in die andere über; die mannigfaltigsten leiblichen Gefühle können andauernd vorhanden sein, ohne eine innere Gemüthsbewegung zu veranlassen, können aber auch in diese übergehen; religiöse Gefühle sind in der Regel mit Gemüthsbewegungen verbunden und diese können sowohl moralische als leibliche Gefühle hervorrufen.

Da das Wissen und das Bewusstsein der Geistesthätigkeit angehören, so ist es sehr begreiflich, dass die Gefühle nicht immer zum Bewusstsein kommen. Dies gilt namentlich von den leiblichen Gefühlen, deren Vorhandensein sich der eigenen Wahrnehmung entzieht,

Digitized by Google

sobald das Bewusstsein von anderen Gefühlen oder Gedanken erfüllt ist: Verwundungen werden während eines hitzigen Kampfes oft nicht wahrgenommen; geistige Thätigkeit lässt uns vorhandene Schmerzen und Leiden wenigstens momentan vergessen. Auch innerer Gemüthsbewegungen werden wir uns nicht immer bewusst, vielmehr unterliegt der Mensch in dieser Hinsicht nicht selten einer grossen Selbsttäuschung. Vieles, was in unserem Gemüth vorgeht, bleibt uns verborgen und das unbewusste Wirken des Gemüthes hat gewiss einen viel bedeutenderen Einfluss auf die ganze Seelenthätigkeit, als man sich gewöhnlich denkt und als insbesondere Diejenigen sich vorstellen, welche fast nur bewusste Seelenthätigkeit als solche anzuerkennen geneigt sind.

Auch hier wiederholt sich die bereits angedeutete Schwierigkeit, welche bei psychologischen Erörterungen aus der Vieldeutigkeit der Wörter hervorgeht. Genuss und Freude, Schmerz und Leiden, Neigung und Liebe sind zugleich identische nnd verschiedene Gefühle, der Sprachgebrauch verstattet daher die Verwechselung der sie bezeichnenden Wörter. Man kann die Empfindungen als bewusste Gefühle oder die Gefühle als bewusste Empfindungen definiren, je nachdem man das Eine oder das Andere vorzieht. Man kann sogar die Empfindungen für eine besondere Art von Wahrnehmungen erklären, oder auch die Wahrnehmungen für eine besondere Art von Empfindungen u. s. w. Der ganze Streit darüber, ob das Rückenmark empfindet, beruht auf dem verschiedenen Begriff, den man mit dem Worte Empfinden verbindet. Hält man nur bewusste Gefühle für Empfindungen, so fehlen diese dem Rückenmark ebenso gewiss, wie sich bewusstlose Empfindungen in ihm entwickeln.

Gedanken und Gefühle stehen in fortwährender Wechselwirkung mit einander und verhalten sich in

Digitized by Google

manchen Beziehungen zu einander, wie Licht und Wärme oder wie positive und negative Electricität. Sowie Letztere stets einander gegenüber sich entwickeln, ebenso scheint jede äussere Einwirkung entweder gleichzeitig oder in rascher Aufeinanderfolge einerseits einen Gedanken, andererseits ein Gefühl hervorzurufen. Ist der Gedanke das Ursprüngliche, so folgt das Gefühl fast auf der Stelle und umgekehrt erfolgt dasselbe, wenn das Gefühl vorangeht. In dieser Wechselwirkung ist ein Streben nach Uebereinstimmung nicht zu verkennen: der Geist bemüht sich stets, seinen Gedanken entsprechende Gefühle, das Gemüth, seinen Gefühlen entsprechende Gedanken zu erwecken. Dabei ist aber der Einfluss, welchen die Gefühle auf die Gedanken ausüben, weit mächtiger und bei stärkeren Gefühlen unwiderstehlich, während der Geist eine viel geringere Herrschaft über die Gefühle besitzt. Die Gedanken üben nur dann eine besondere Wirkung auf das Gemüth, wenn sie zu uns selbst, zu unseren eigenen Interessen, zu uns verwandten oder befreundeten Personen in näherer Beziehung stehen. Viele gleichgültige Gedanken äussern oft keine merkliche Wirkung auf das Gemüth, jedoch ruft jede Geistesthätigkeit ein angenehmes, beruhigendes Gefühl hervor, welches bei ernstem und tiefem Denken zu dem angenehmsten und befriedigendsten Gefühle gesteigert werden kann, dessen der Mensch fähig ist. Stimmen die Gedanken mit den vorhandenen Gefühlen nicht überein, so entsteht eine innere (einer electrischen analoge) Spannung, eine gegenseitige Steigerung derselben, welche als ein innerer Kampf erscheint und, wenn keine Ableitung durch äussere Einwirkung stattfindet, schliesslich durch einen plötzlichen Entschluss oder durch eine rasche, manchmal gewaltsame That (gleich einem electrischen Funken) ausgeglichen und aufgehoben wird.

Da der Wille, wenigstens in der Regel, aus einer

Digitized by Google

Verbindung und Verschmelzung eines Gedankens und eines Gefühles hervorgeht, so muss er die Charaktere seines Ursprunges an sich tragen und dieselben Unterschiede zeigen, welche sich in der Thätigkeit des Geistes und des Gemüthes der Beobachtung darbieten. Ohne Mitwirkung des Denkens kommt kein Wollen zu Stande; denn wenn es auch durch Gefühle hervorgebracht wird, wenn diese auch in ihm ganz vorherrschen, so wird der Verstand doch auch in solchen Fällen zu passiver Mitwirkung und zur Leitung der entsprechenden Handlung genöthiget, indem das Gefühl den Verstand überwältiget. Wird der Wille nicht gleich ausgeführt, so bleibt er in der Form eines Gedankens im Gedächtniss aufbewahrt. Nur in Beziehung auf ganz gleichgültige Handlungen ist es fraglich, ob das Wollen derselben ohne alle Theilnahme des Gemüthes aus dem Denken hervorgeht, oder ob die begleitenden Gefühle nur ihrer Schwäche halber unbemerkt bleiben. Jedenfalls bewegt sich das Wollen mehr oder weniger selbstständig in drei verschiedenen Sphären, die wir als bewusstlosen Instinct, als bewusste Willkühr und als selbstbewussten freien Willen unterscheiden. In jeder Sphäre wiederholt sich, je nachdem das Wollen vorzugsweise aus Gefühlen oder aus Gedanken hervorgegangen ist, eine centripetale und centrifugale Seite der Thätigkeit, welche sich hier als ein passives und actives Wollen darstellen. Das passive Wollen erscheint als ein leibliches Verlangen, als innerliche Begierde oder als moralische Pflicht; das active Wollen als eine sinnliche Absicht, als verständiger Vorsatz, oder als vernünftiger Entschluss. Auch diese Wörter können in Folge der in allen Sphären einerseits identischen, andererseits verschiedenen Seelenthätigkeit bald in engerem, bald in weiterem Sinne gebraucht werden und kann man ihnen bald eine verschiedene, bald eine gleiche Bedeutung beilegen.

Digitized by Google

Man kann z. B. einen Entschluss oder einen Vorsatz sprachrichtig eine Absicht nennen u. s. w.

Dass nicht nur die Thiere, sondern auch der Mensch eine Menge von Handlungen bewusstlos und instinctartig vollziehen, lehrt sowohl die Selbstbeobachtung, als die Beobachtung Anderer. Das ganze Thun der Kinder kommt in den ersten Lebensjahren in solcher Weise zu Stande, aber auch bei Erwachsenen findet dasselbe tagtäglich statt, und werden oft dieselben Handlungen bald mit Bewusstsein und Vorsatz, bald bewusstlos und instinctartig ausgeführt. Das Zurückziehen der Hand beim Berühren eines heissen oder stechenden Gegenstandes, das Schliessen der Augen bei zu hellem Lichte, die Drehung des Kopfes und das Aufhorchen bei wahrgenommenem Geräusch, das Kratzen einer juckenden Stelle, das Verjagen eines lästigen Insectes, die selbst im Schlafe zuweilen geschehende Veränderung einer unbequemen Stellung, das Eintauchen der Feder in die Dinte beim Schreiben, das Leeren eines Glases bei vorhandenem Durst, das Aus- und Ankleiden, die Bejahung oder Verneinung einer Frage, lautes Vorlesen oder Spielen nach Noten — dies alles und unzählige andere Handlungen können ebensowohl bewusstlos und instinctartig, als in Folge eines bewussten Vorsatzes vollzogen werden und nicht selten werden sie besser ausgeführt, wenn ihre Ausführung der bewusstlosen Seelenthätigkeit überlassen bleibt. Es kommt auch vor, dass wir zu eigner Verwunderung eine beabsichtigte Handlung schon ausgeführt haben, ohne es zu wissen, weil die Ausführung bewusstlos geschehen ist.

In manchen Fällen von sogenannter Aphasie ist es vorgekommen, dass die Kranken aus eignem Antriebe und durch eigne Willensanstrengung kein Wort auszusprechen vermochten, wohl aber alle vorgesagten Wörter nachsprechen konnten, obgleich sie nicht im Stande

Digitized by Google

waren, ein soeben von ihnen ausgesprochenes Wort eigenmächtig zu wiederholen: die Sprachwerkzeuge gehorchten dem Ohre, waren aber dem Einflusse des Gehirnes entzogen. Einige dieser Kranken konnten sogar laut und richtig vorlesen, wenn sie das Auge auf die gedruckten Wörter richteten und diese zugleich mit dem Finger verfolgten. Sobald sie aber das Auge abwandten, konnten sie kein einziges der so eben ausgesprochenen Wörter selbstständig wiederholen. Das bewusstlose Wirken des Auges ist überhaupt bei weitem nicht genug beachtet und untersucht worden; es zeigt sich überall als der Haupt-Regulator unserer Körperbewegungen, wenngleich die übrigen Sinne, namentlich der Tastsinn, Aehnliches leisten und der Tastsinn bei Erblindeten sogar das Auge einigermaassen zu ersetzen im Stande ist.

Bei der letzten Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Dresden zeigte der Professor *Goltz* aus Königsberg sehr interessante und lehrreiche Versuche an einem Frosche vor, welcher mehrere Monate vorher seines grossen Gehirnes beraubt, aber lebendig und kräftig erhalten war. Zu Sprüngen gereizt vermied er mit Sicherheit jeden ihm in den Weg gestellten Gegenstand und wurde offenbar in der Richtung des Sprunges durch das Auge geleitet. Auf schräge Flächen gesetzt zeigte er durch Auf- und Abklettern und Veränderung der Körperhaltung, dass der Tastsinn ihn in den Stand setzte, das Gleichgewicht zu erhalten und ein Herabfallen zu verhüten. Diese Versuche erregten Aufsehen und sie liefern allerdings den Beweis, dass das grosse Gehirn nicht das einzige wahrnehmende und denkende Organ ist, allein was diese Experimente zeigen, kann Jeder an Thieren und an sich selber leicht beobachten, wenn er nur sein Augenmerk darauf richtet. Alle Sinne denken in ihrer Weise ebenso gut, wie das Gehirn in seiner Weise es thut, sie allé, und besonders das Auge, können

Digitized by Google

ohne Mitwirkung des Verstandes zweckmässige und gedachte Bewegungen erzeugen; ja sie thun es besser und mit grösserer Sicherheit, als das bewusste Wollen, welches nicht selten nur störend und hindernd in die Bewegungen eingreift. Jede gewollte Bewegung geschieht am regelmässigsten und sichersten, wenn das bewusste Wollen nur den Impuls dazu giebt, aber die Ausführung ganz und gar den dazu bestimmten Organen überlässt.

Wenn wir versuchen, auf der Kante eines Brettes entlang zu gehen, so können wir nur dadurch das Gleichgewicht erhalten, dass wir diese Kante mit dem Auge fixiren; wer es durch vorsätzliche Körperbewegungen erhalten will, fällt gewiss bei den ersten Schritten herunter. Auf dieselbe Weise reguliren Seiltänzer und Equilibristen alle ihre Bewegungen. Das Auge lässt uns beim Gehen und Laufen alle Hindernisse vermeiden, es erhält uns im Gleichgewicht, wenn wir schwierige, abschüssige Stellen passiren. Bei angehender Lähmung der unteren Extremitäten, kann der Kranke oft bei Tage noch recht gut und sicher gehen, sobald er aber seine Bewegungen nicht durch das Auge reguliren kann, stolpert und fällt er jeden Augenblick. Er thut dies auch leicht, wenn er den Einfluss seines Willens geltend machen und durch vorsätzliches Eingreifen seine Schwäche vor Anderen verbergen will. Beim Springen über eine Schnur oder über einen Graben berechnet das Auge genau die Höhe oder Weite des Sprunges, bestimmt mit Sicherheit den erforderlichen Kraftaufwand und gestattet keine übermässige Anstrengung der Muskeln. Können und wollen wir höher oder weiter springen, so muss die Schnur höher gehalten oder ein breiterer Graben aufgesucht werden. Nicht durch den bewussten Willen allein können wir das Maximum der vorhandenen Sprungkräfte in Thätigkeit setzen, sondern nur dadurch, dass wir die Merkmale,

Digitized by

wonach das Auge beim Sprunge sich richtet, mehr und mehr von einander entfernen. Dasselbe können wir an Hunden und Pferden beobachten, wenn wir sie über einen Stock oder eine Barrière springen lassen. Sie springen niemals höher, wie nöthig, Pferde berühren oft mit dem Huf den oberen Rand der Barrière und sollen sie höher springen, so muss die Barrière erhöht werden.

Am Bewundernswürdigsten erscheint das Wirken und die Leitungsfähigkeit des Auges beim Lesen und beim Spielen nach Noten. Wir erwerben diese Fertigkeiten nur vermittelst des Verstandes, aber durch den Verstand allein würden wir nie über das Buchstabiren und über die kläglichste musikalische Stümperei hinaus kommen. Wie weit würden wir es in musikalischen Leistungen bringen, wenn wir uns immer sagen müssten: die erste Note ist d, da muss ich diese Taste anschlagen, die folgende ist fis, da muss ich den Finger nach jener Taste hinbewegen u. s. f.? Beobachten wir nun, mit welcher Schnelligkeit und Sicherheit die Finger eines Virtuosen die Tasten berühren oder bei einem Cellisten die Saiten entlang gleiten, erwägen wir, dass das geübte Auge nicht die einzelnen Buchstaben oder Noten nach einander erfasst, sondern die ganzen Wörter und Sätze und ganze Reihen von Noten auf einmal überschaut, wie weit wird dabei auch die rascheste Gedankenentwicklung von den Leistungen der bewusstlosen Sinnesthätigkeit überflügelt!

Aus den bisherigen Untersuchungen ergiebt sich, dass wir in dem Menschen ein dreifaches Seelenleben unterscheiden müssen, nämlich:

1) Ein bewusstloses Seelenleben, welches sich äussert durch unmittelbares Wissen, Sinnesthätigkeit, Gemeingefühl und Instinct.
2) Ein bewusstes Seelenleben, welches sich cha-

Digitized by Google

rakterisirt durch Bewusstsein, Verstand, Selbstgefühl und Willkühr.

3) Ein selbstbewusstes Seelenleben, sich offenbarend durch Selbstbewusstsein, Vernunft, Gewissen und freien Willen.

Dieses dreifache Seelenleben finden wir nur bei dem Menschen, in der Thierreihe zeigt sich bei den wirbellosen Thieren ausschliesslich ein bewusstloses Seelenleben, welches sich bei den Wirbelthieren mit einem bewussten Seelenleben verbindet; das, hauptsächlich durch die Sprache vermittelte selbstbewusste Seelenleben fehlt auch ihnen. Von den inneren Vorgängen bei den wirbellosen Thieren können wir uns freilich kaum irgend eine Vorstellung machen, was wir indess an ihnen beobachten, lässt ein bewusstes Ueberlegen und Wählen bei ihnen nicht voraussetzen. In ihrem ganzen Verhalten sind alle Individuen derselben Art vollkommen gleich und was Eines thut, das thun Alle in derselben Weise. Dass sie durch Sinneswahrnehmungen in ihren Bewegungen geleitet werden, unterliegt keinem Zweifel, aber den Verstand der höheren Thiere besitzen sie nicht. Dies zeigt sich am deutlichsten dadurch, dass sie nicht gezähmt und abgerichtet werden können; denn dies beruht darauf, dass sie bei dahin zielenden Versuchen nicht verstehen, was man mit ihnen vorhat. Dass sie dessen ungeachtet in ihrem Thun und Treiben durch Gedanken oder Ideen geleitet werden, bekunden sie vielfach, ja sie scheinen zum Theil, wie z. B. die Bienen und Ameisen in ihren Staatseinrichtungen, einen hohen Grad von Intelligenz an den Tag zu legen. Sie können aber nicht vorher überlegen, wie etwas am besten einzurichten sei. Ihr Denken ist ein bewusstloses und unentwickeltes; ihre Ideen bewegen sich bei jeder Species in einem bestimmten und sehr engen Kreise und beschränken sich auf die Mittel zur Selbsterhaltung und

Digitized by

Fortpflanzung. Ueber diese von der Natur gezogenen Schranken geht ihr Denken nicht hinaus; sie machen deshalb auch keine Erfahrungen und verhalten sich in der Jugend ebenso, wie in reiferem Alter. Sie kennen dagegen mehr oder weniger die umgebenden Dinge, sie wissen ihre Nahrung zu suchen und zu finden, ihre Beute zu ergreifen, Verfolgungen auszuweichen; es fehlt ihnen auch nicht an Gedächtniss, aber ihr Wissen und Behalten geht über die Grenzen eines unmittelbar durch die Thätigkeit der Sinne erworbenen nicht hinaus.

So weit wir die Gefühle der wirbellosen Thiere beurtheilen können, beschränken sich dieselben auf bewusstlose, sinnliche und leibliche Empfindungen und fehlen ihnen die bei den höheren Thieren zum Vorschein kommenden Erregungen des Gemüthes, die sogenannten Gemüthsbewegungen, Affecte und Leidenschaften ebensowohl, wie die dem Menschen eigenthümlichen religiösen und moralischen Gefühle: ihre Gefühle gehen nicht über die Grenzen des Gemeingefühles hinaus. Am auffallendsten wird dies dadurch, dass sie keine Furcht kennen, dass man sich z. B. vergebens bemüht, einer lästigen Fliege Furcht einzuflössen und sie dadurch zu verscheuchen und von der Wiederkehr abzuhalten. Es ist freilich wohl davon die Rede, dass Insecten zornig werden können, dass z. B. Bienen, Wespen oder Ameisen zornig oder wüthend über den Zerstörer ihres Nestes herfallen; aber Veränderungen des Blickes, der Mienen und Körperhaltung, woran wir bei höheren Thieren das Vorhandensein von Zorn oder Wuth erkennen, beobachten wir an ihnen nicht: sie thun in solchen Fällen instinctartig ohne ein Gefühl von Zorn dasselbe, was die höheren Thiere mehr oder weniger in Folge dieses Gefühles thun. Die Handlungen der wirbellosen Thiere (wenn man ihr Thun überhaupt ein Handeln nennen will) geschehen ebenfalls bewusstlos und instinctartig, von allen

Digitized by Google

Individuen derselben Species in derselben unabänderlichen Weise. Wenn auch manche wirbellose Thiere, z. B. Spinnen bei Anfertigung ihrer Netze, Bienen bei Anlegung ihrer Nester ihr Verfahren nach den Umständen modificiren, so geschieht dies ebenfalls bei derselben Art in derselben bestimmten Weise. Nichts verräth bei ihnen eine durch Ueberlegung bestimmte Wahl; sie thun nur, was sie müssen, wozu sie mit eiserner Nothwendigkeit durch ihre Organisation und angeborenen Triebe gezwungen werden.

Die Wirbelthiere haben das bewusstlose Seelenleben mit den wirbellosen Thieren gemein, aber aus der denkenden Sinnesthätigkeit der Letzteren entwickelt sich bei ihnen der vergleichende und beurtheilende Verstand. Zu den sinnlichen Wahrnehmungen gesellen sich innerliche Vorstellungen, welche mit einander verglichen werden und das Urtheil des Verstandes begründen. Die Operationen des Verstandes sind von der Sinnesthätigkeit nicht absolut verschieden; man kann auch von den Sinnen behaupten, dass sie abstrahiren und combiniren, urtheilen und denken, aber diese Operationen fliessen bei ihnen in einander, sie thun gleichsam mit einem Schlage und bewusstlos, was bei der bewussten Verstandesthätigkeit in verschiedene auf einander folgende Momente zerfällt: sie bedürfen keiner Ueberlegung, um ihr Urtheil zu bilden. Allgemein kündiget sich das Dasein des Verstandes an durch ein Auffassen der Beziehungen zweier verschiedener Dinge oder Vorgänge zu einander, durch ein Verstehen dessen, was eine Sache bedeutet. Dass die Wirbelthiere überlegen, ehe sie etwas thun, haben wir oft genug Gelegenheit, an unseren Hausthieren zu beobachten, und dass sie verstehen, was eine Sache bedeutet, zeigt sich besonders dadurch, dass sie mehr oder weniger gezähmt und abgerichtet werden können. Dies gelingt leichter bei warmblütigen, als bei

Digitized by Google

kaltblütigen Thieren, welche überhaupt viel weniger geistig entwickelt zu sein scheinen, allein bis zu einem gewissen Grade können selbst Fische, Schlangen und Schildkröten abgerichtet werden. Bei Hunden und insbesondere bei Pudeln scheint diese Fähigkeit am meisten entwickelt zu sein, sie können bekanntlich sogar viele Wörter und Sätze der menschlichen Sprache verstehen lernen. Vermöge ihres Verstandes sind die Wirbelthiere auch dazu befähigt, Erfahrungen zu machen: sie vermeiden Gefahren, denen sie einmal glücklich entronnen sind und handeln im Alter mit viel grösserer Umsicht und Vorsicht, als in der Jugend. Alle Jäger und Jagdliebhaber wissen davon zu erzählen.

In ähnlicher Weise entwickeln sich bei den Wirbelthieren aus den sinnlichen und leiblichen Gefühlen innerliche Gefühle und Gemüthsbewegungen und verbindet sich mit dem Gemeingefühle ein Selbstgefühl. Sie zeigen verschiedene Gemüthsstimmungen, sind bald fröhlich und vergnügt, bald traurig und verdriesslich, bald muthig, bald furchtsam und können mehr oder weniger leicht in Zorn oder in Furcht versetzt werden. Leidenschaftliche Aufregungen, z. B. Eifersucht, kommen besonders zur Paarungszeit zum Vorschein. Wenn bei Hausthieren, namentlich bei Hunden, bisweilen moralische Gefühle, Scham, Dankbarkeit, Reue anscheinend beobachtet werden, so darf man nicht vergessen, dass eine absolute Verschiedenheit zwischen moralischen Gefühlen und Gemüthsbewegungen nicht existirt. Im Allgemeinen findet man bei den Wirbelthieren weder moralische noch religiöse Gefühle.

Diesen Unterschieden gemäss geschehen auch die Handlungen der Wirbelthiere nicht immer instinctartig, sondern mehr oder weniger willkürlich. Sie müssen nicht unbedingt ihren angeborenen Trieben folgen, sondern können diesen Trieben mehr oder weniger wider-

Digitized by Google

stehen und anders handeln. Wir können oft genug beobachten, dass sie überlegen, ehe sie etwas thun und dass sie sich durch ein Urtheil zu dieser oder jener Handlung bestimmen lassen. Raubthiere z. B. beurtheilen oft die mit dem Ergreifen einer Beute verbundene Gefahr und verzichten darauf, wenn die Gefahr ihnen zu gross erscheint; sie greifen nicht leicht Thiere an, welche sie nicht überwältigen können. Den Wirbelthieren ist innerhalb gewisser Grenzen eine Wahl zwischen verschiedenen Handlungsweisen gestattet, eine Willkühr, welche den wirbellosen Thieren gänzlich mangelt.

Aus dem bewussten thierischen Seelenleben entwickelt sich in dem Menschen endlich ein selbstbewusstes Denken, aus dem thierischen Verstande die menschliche Vernunft. So wie die Sinneswahrnehmungen die nothwendige Bedingung und Grundlage für die Entwicklung des Verstandes ausmachen, ebenso ist dieser die nothwendige Grundlage für die Entwicklung der Vernunft. Ueber äussere, sinnlich wahrgenommene Gegenstände können wir gar nicht nachdenken, es sind immer nur die innerlich gebildeten und vorhandenen Vorstellungen, welche die Gegenstände unseres Nachdenkens ausmachen, und aus denen durch den Process des Nachdenkens Begriffe, Folgerungen und Schlüsse entwickelt werden. Der Mensch allein kann seine eigenen Gedanken und Gefühle einer weiteren Prüfung unterwerfen, bestimmte Gedanken verfolgen und entwickeln, den Zusammenhang der Dinge erkennen und sich selbst zum Gegenstande seines Denkens machen. Er allein besitzt Selbstbewusstsein und ist ein eigentliches Ich, eine bestimmte, von allen Anderen verschiedene Person. Seine höhere geistige Entwicklung offenbart sich ebenfalls in seinem Gewissen, in den ihm ausschliesslich eigenthümlichen moralischen und religiösen Gefühlen, so wie in dem freien Willen, dessen er allein mehr oder

Digitized by

weniger theilhaftig ist, oder wenigstens theilhaftig werden kann.

Die höhere geistige Entwicklung des Menschen wird hauptsächlich vermittelt durch die Sprache, und sie ist es, wodurch sich der Mensch am Augenscheinlichsten und Wesentlichsten von den Thieren unterscheidet. Das menschliche Denken ist schon von *Plato* nicht ganz mit Unrecht als ein innerliches Sprechen mit sich selber bezeichnet worden. Unserer eigenen Gedanken werden wir uns nur dadurch deutlich bewusst, dass wir sie innerlich in Worten gleichsam vor uns hinstellen, damit unser Ich sie mit geistigem Auge betrachten, in sein Selbstbewusstsein aufnehmen und darin aufbewahren kann. Der Inhalt unseres Selbstbewusstseins ist zum grössten und wesentlichsten Theile ein Product unseres Nachdenkens, was ohne dasselbe von aussen hinein kommt, ist theils unwesentlich, theils vergänglich und was uns von den Sinnen oder durch Gefühle zugeführt wird, bezeichnen wir durch Worte, sobald wir es uns anzueignen suchen. Die Sprache ist gewiss nicht ohne Nachdenken zu Stande gekommen, wenn man sie auch nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes eine Erfindung nennen kann; zur Erlernung der schon vorhandenen Muttersprache reicht aber der Verstand des Kindes aus, und Kinder erlernen sie zum grossen Theile schon in einem Lebensalter, in welchem sie zu eigentlichem Nachdenken noch nicht befähigt sind. Die Thätigkeit des Verstandes ist wesentlich eine vergleichende und wir gewinnen durch sie eine Einsicht in die Beziehungen und Verhältnisse der Dinge. Die Beziehung zwischen einem Gegenstande und dem ihn bezeichnenden Worte fasst das Kind vermittelst seines Verstandes sehr leicht auf und lernt dadurch die Elemente der Sprache kennen und die Bedeutung der Wörter verstehen.

Digitized by Google

Sowie aber der Verstand seine Urtheile, d. h. seine Einsicht in die Beziehungen und Verhältnisse stets in Sätzen ausspricht, so lernt das Kind auch sehr bald, seine Meinung in bestimmten Sätzen auszudrücken. Es reiht aber längere Zeit hindurch seine Sätze nicht in gehörigem Zusammenhange, nicht in logischer Aufeinanderfolge an einander, sondern in analoger Weise, wie es bei der sogenannten Association der Ideen geschieht, die ebenfalls ein Product der Verstandesthätigkeit ist, welche, sich selbst überlassen, vom Aehnlichen zum Aehnlichen oder Contrastirenden fortschreitet und an einander reiht, was in Beziehung zu einander steht. Zum vollen Gebrauch und zu vollständiger Kenntniss der Sprache gelangt der Mensch erst in dem Maasse, in welchem er zu vernünftigem Nachdenken erwachsen ist. Die Vernunft hat die Macht, den Verstand dazu zu zwingen, dass er Gedanken und Worte nicht nach äusserlichen und unwesentlichen Beziehungen, sondern nach ihrem inneren und wesentlichen Zusammenhange auf einander folgen lässt, und obgleich er stets geneigt ist, nach einer oder der anderen Seite abzuschweifen, weiss sie ihn doch im Zaume zu halten und ihn zum Fortschreiten auf geradem Wege, zur Entwickelung eines und desselben Gedankens in logischer Wortfolge zu nöthigen. Zur Mittheilung sinnlicher Wahrnehmungen genügen einzelne Wörter, zum Aussprechen eines Urtheils, einer Meinung einzelne Sätze, die Resultate des vernünftigen Nachdenkens, seine Folgerungen und Schlüsse lassen sich nur in der Form von Perioden ausdrücken und durch Rede und Schrift verbreiten.

Wenn die bisher vorgetragenen psychologischen Ansichten richtig sind, so würde man daraus schliessen müssen, dass wahrscheinlich in den nervösen Centraltheilen besondere Organe existiren sowohl für das bewusstlose, als für das bewusste und selbstbewusste See-

Digitized by

lenleben, dass in allen drei Sphären die Functionen des Denkens und Fühlens verschiedenen Theilen übertragen und dass alle diese Theile aufs innigste mit einander verbunden sein werden. Von den Beziehungen der verschiedenen Theile des Gehirnes und Rückenmarkes zu den psychischen Functionen wissen wir bis jetzt nur wenig mit Sicherheit. Ihre Erforschung ist insbesondere ungemein erschwert und verzögert worden durch drei allgemein verbreitete und tief eingewurzelte Vorurtheile, die um so mehr besonders erwähnt zu werden verdienen, weil sie noch immer auf das Fortschreiten der Physiologie dieser Organe störend und hemmend einwirken.

Das erste Vorurtheil besteht in der allgemein verbreiteten Meinung, dass das Rückenmark gleichsam nur ein Anhängsel des Gehirnes sei. Diesem Irrthume zufolge wurde alle selbständige Thätigkeit in das Gehirn verlegt und dem Rückenmark abgesprochen, welches nur als ein leitendes Organ die Verbindung des Gehirnes mit den Nerven vermitteln sollte. Dieses Vorurtheil ist die Ursache, weshalb noch gegenwärtig so manche Physiologen sich dagegen sträuben, dem Rückenmark irgend eine selbständige Thätigkeit einzuräumen; Empfindungen werden ihm abgesprochen und dass es gar selbständig denken soll, erscheint als eine unerhörte Behauptung. Aus diesem Grunde machten auch die erwähnten Experimente, welche Professor *Goltz* an Fröschen vorzeigte, so viel Aufsehen; denn dass das Thier ungeachtet der Wegnahme des grossen Gehirnes doch noch eine gewisse Intelligenz an den Tag legte, war nicht in Abrede zu stellen. Seltsam genug ist es, dass die bekannte Uebereinstimmung der Structur nicht zu der Vermuthung einer ähnlichen Function führte, da doch kein Grund vorhanden ist, weshalb die Nervenzellen des Rückenmarkes nicht ebenso wohl, wenn auch in anderer Weise, sollten

Digitized by Google

denken können, wie die Nervenzellen des grossen Gehirnes.

Das Rückenmark incl. seiner Fortsetzung bis zu den grossen Hirnganglien kann zwar keine in Worte gefasste Gedanken erzeugen, wohl aber solche Gedanken in sich aufnehmen und selbständig ausführen. Wenn ich z. B. nach einem bekannten Hause hinzugehen beschliesse, so entsteht der bestimmte Vorsatz zuerst in bestimmten Worten in meinem Gehirn und das denkende Wollen giebt den Impuls zu dem Anfange der Bewegung. Dann braucht es sich nicht mehr um die Ausführung der Bewegung zu kümmern und das Denken kann sich ganz und gar anderen Dingen zuwenden; dennoch nimmt das Gehen seinen ruhigen Fortgang, bis das Ziel erreicht ist, und sobald das Auge es erblickt hat, hört die Bewegung auf, ohne durch ein Wollen gehemmt zu werden. Dies wäre unmöglich, wenn die Gedanken nicht vom Gehirn aus durch Nervenfasern bis zu den entsprechenden Bewegungscentren des Rückenmarkes (*corpora striata*, Vierhügel, Oliven, Hals- und Lendenanschwellung?) fortgeleitet, von diesen aufgenommen, verstanden und ausgeführt würden. Dasselbe geschieht bei allen durch Uebung erworbenen Fertigkeiten und bei vielen complicirten Bewegungen, beim Erklettern eines Baumes, beim Ersteigen einer Leiter oder Treppe, beim Abschreiben eines Satzes, beim Nachsingen einer Melodie, beim Stricken und Spinnen, wobei Frauen sich oft zugleich der Lectüre ergeben. Haben wir uns vorgenommen, bis zu einer gewissen Stunde eine complicirte Arbeit fortzusetzen, so hören wir von selbst auf, sobald der Schlag der Uhr unser Ohr erreicht. Beim Sprechen werden die complicirten Muskelbewegungen mit der grössten Regelmässigkeit und Ordnung ausgeführt, obgleich wir nichts von ihnen erfahren, folglich durch unser Denken und Wollen sie nicht zu leiten im Stande sind. Es

Digitized by Google

muss irgendwo ein besonderes Organ zu ihrer Regulirung existiren und ich halte es mit *Schröder van der Kolk* für wahrscheinlich, dass das *Corpus olivare* dies Organ ist. Wird die Fortleitung der Worte vom Gehirn zu diesem Organ gestört oder unterbrochen, so entsteht eine Form von Aphasie, bei welcher die innere Wortbildung ungehindert von Statten geht und auch alle vorgesagten Wörter richtig ausgesprochen werden können, obgleich ein willkürliches Aussprechen gedachter Wörter unmöglich ist.

Das zweite Vorurtheil beruht auf der vorgefassten Meinung, dass die Fasern des Rückenmarks sich ununterbrochen bis ins Gehirn fortsetzen, so dass die Gehirnfasern continuirlich in Rückenmarksfasern übergingen. Erst in der neusten Zeit fängt eine richtigere Ansicht über den Zusammenhang zwischen Gehirn und Rückenmark an, sich zu verbreiten. In Beziehung auf das grosse Gehirn sagt *Kölliker* (Gewebelehre 5te Auflage, 1867, S. 302): „Ich halte den Nachweis, dass die Fasern der Hirnstiele in den Ganglien des Gehirnes enden, und dass die Masse der Hemisphären aus selbständigen Röhren besteht, die von den Windungen aus bis in die Ganglien und vielleicht bis zur *Medulla oblongata* sich erstrecken, ohne mit denen der Hirnstiele zusammenzuhängen, für eine der wichtigsten Ergebnisse, zu denen ich bei meinen Untersuchungen über das centrale Nervensystem gelangt bin, indem hierdurch die schon lange vermuthete Trennung der animalischen und psychischen Sphäre des centralen Nervensystemes zum ersten Male anatomisch nachgewiesen und erklärt worden ist, warum die weisse Masse der Hemisphären gereizt weder Schmerzen noch Bewegungen veranlasst. Ich freue mich, dass *R. Wagner* diese meine Ansicht bestätigt gefunden hat.“

Wahrscheinlich dienen die verschiedenen Anhäufungen von grauer Substanz, welche sich in der *Medulla*

Digitized by Google

oblongata, der Brücke, den Hirnschenkeln, den Vierhügeln und insbesondere in den *corp. striatis* (incl. der sogenannten Linsenkerne), *thalamis* und *corpor. rhomboideis* des kleinen Gehirns vorfinden, als Ursprungs- oder Endpunkte einerseits für Rückenmarksfasern, andererseits für Fasern des grossen und kleinen Gehirnes. Namentlich sind die grossen Hirnganglien, *corp. striata, thalami* und *corpora rhomboidea* aller Wahrscheinlichkeit nach centrale Endorgane des Rückenmarkes, welche zugleich die Verbindung desselben mit dem grossen und kleinen Gehirn vermitteln. Dieser Ansicht nach würde das ganze eigentliche Gehirn, d. h. die Hemisphären des grossen und kleinen Gehirnes in den oberen Partieen des Rückenmarkes gleichsam seine Wurzeln haben und als ein neu hinzukommendes Organ aus dem Rückenmark hervorwachsen.

Das dritte Vorurtheil besteht darin, dass man ganz allgemein die Ganglien, welche bei Insecten, Spinnen und Crustaceen den sogenannten Schlundring bilden und aus denen die Sinnesnerven hervortreten, als Analoga des Gehirnes betrachtete. Diese der Structur der Organe durchaus nicht entsprechende Ansicht scheint nur darauf zu beruhen, dass man alles Gehirn nannte, was von den nervösen Centralorganen bei den höheren Thieren und beim Menschen innerhalb der Schädelhöhle belegen ist. Diese falsche Ansicht wird noch heutigen Tages von manchen vergleichenden Anatomen festgehalten, obgleich schon *Burdach* den Hirnstamm und den Hirnmantel richtig unterschieden hat und die gedachten Ganglien der wirbellosen Thiere mit dem eigentlichen Gehirn nicht die mindeste Aehnlichkeit haben, sondern offenbar den sogenannten Hirnganglien der höheren Thiere analog sind. Sie sind ohne Zweifel bei den wirbellosen Thieren die eigentlichen Centralorgane des Rückenmarkes, die Hauptleiter aller complicirten, durch die Sinne an-

Digitized by

geregten Bewegungen und werden bei den Wirbelthieren und beim Menschen dieselbe Bedeutung haben, obgleich sie bei diesen zugleich die Verbindung zwischen dem Gehirn und Rückenmark vermitteln.

Wenn man sich von diesen Vorurtheilen frei gemacht und wenn man durch Vergleichung des Verhaltens der niedern mit den höhern Thieren erkannt hat, dass die wirbellosen Thiere nur ein bewusstloses Seelenleben führen, dessen Träger das Rückenmark ist: so kommt man sogleich zu der Ueberzeugung, dass auch bei den höheren Thieren und beim Menschen das bewusstlose Seelenleben an die Thätigkeit des Rückenmarkes (incl. der oberen Ganglien) geknüpft sein werde. Das Rückenmark vollzieht demnach selbständig und von anderen Functionen mehr oder weniger unabhängig die Functionen der Sinnesthätigkeit, des Gemeingefühls, des unmittelbaren Wissens und des instinctartigen Wollens. Es enthält eine grössere Anzahl untergeordneter, zur Regulirung specieller Functionen bestimmter Organe, welche theilweise bereits physiologisch festgestellt sind, namentlich für das Athmen, die Herzbewegung, die Stimme und Sprache, die Speichelsecretion, das Schlukken, die Digestion, die Muskelthätigkeit der oberen und unteren Extremitäten u. a. m. Die hauptsächlichsten oder Centralorgane des ganzen Rückenmarkes, welche die Gesammtthätigkeit reguliren, sind wahrscheinlich die oberen Ganglien, *thalami*, *corp. striata*, *corp. quadrigemina* und *rhomboidea*.

Es folgt von selbst, dass alle Functionen des bewussten Seelenlebens dem Gehirn, d. h. den Hemisphären des grossen und kleinen Gehirnes zugeschrieben werden müssen, und dass man das bewusstlose Seelenleben auch Rückenmarksleben, das bewusste Seelenleben Gehirnleben nennen könnte. Besondere Organe für das bewusste und selbstbewusste Seelenleben hat man

aber bis jetzt weder in dem grossen noch im kleinen Gehirn unterscheiden können. Das grosse Gehirn betrachtet man jetzt ziemlich allgemein als bestehend aus 4 longitudinalen Windungen, welche durch 2 transversale Windungen unterbrochen werden. Ob aber diese Windungen besondere Functionen zu vollziehen haben, und welche dies sein sollten, ist noch ganz problematisch. *Parchappe* hält es wegen der gleichförmigen Structur aller Windungen für wahrscheinlich, dass das ganze grosse Gehirn nur eine und dieselbe Function zu vollziehen habe, und dass eine anscheinende Verschiedenheit nur dadurch entstehen könne, dass die unmittelbare Verbindung des Gehirnes mit den verschiedenen Strängen oder Faserzügen des Rückenmarkes an verschiedenen Orten stattfände. *Bouillaud* behauptet, wie ich glaube, mit vieler Wahrscheinlichkeit, dass die innerliche Wortbildung in den Vorderlappen des grossen Gehirnes vor sich gehe; *Broca* glaubt, den Sitz der Sprache in der hinteren Hälfte der 3ten und 4ten Stirnwindung der linken Hemisphäre gefunden zu haben, und hat unter den zahlreichen Schriftstellern, welche über Aphasie geschrieben haben, viele Anhänger gefunden. Die Phrenologen suchen ihre vermeintlichen Organe in Fragmenten einzelner Windungen. Trotz der Uebereinstimmung der Structur liesse sich wohl denken, dass die Functionen des bewussten und des selbstbewussten Seelenlebens verschiedenen Theilen des Gehirnes übertragen wären und liessen sich darüber verschiedene Hypothesen aufstellen, ich will mich aber dessen enthalten, da es ganz nutzlos ist, Hypothesen aufzustellen, die man nicht zu begründen im Stande ist.

Wenn ich dagegen die Hypothese aufstelle, dass das kleine Gehirn der Sitz oder die Ursprungsstätte derjenigen Gefühle sei, welche der Sphäre des Selbstgefühls angehören, und welche im engeren Sinne des

Digitized by Google

Wortes als dem Gemüthe angehörig betrachtet werden, so glaube ich, diese Hypothese näher begründen zu können und trage kein Bedenken, es zu versuchen. Die hierzu erforderlichen Erörterungen über die Anatomie und Physiologie des kleinen Gehirnes will ich anknüpfen an eine Uebersicht der Ansichten von *H. Luys* (recherches sur le système nerveux cérébro-spinal. Paris 1865). Dieses Werk enthält neben manchen Uebereilungen und Irrthümern einen anerkennenswerthen Versuch, die Anatomie, Physiologie und Pathologie der nervösen Centralorgane mit einander in Uebereinstimmung zu bringen, die physiologischen und psychologischen Vorgänge aus den anatomischen Verhältnissen abzuleiten. Seine eigenthümlichen Ansichten über die Functionen des kleinen Gehirnes sind für mich von besonderem Interesse.

Nach *Luys* haben die Fasern des kleinen Gehirnes einen doppelten Ursprung. Aus den grossen, birnförmigen, Purkinjeschen Zellen entspringen die Achsencylinder; aus den kleinen, zahlreich in der Corticalsubstanz zerstreuten Zellen andere Fasern, welche sich an die Achsencylinder anlegen und namentlich die Nervenscheiden bilden. Von den so gebildeten Fasern geht ein Theil bogenförmig von einer Windung zur anderen, der grössere Theil läuft von allen Seiten convergirend gegen die im Inneren des kleinen Gehirnes belegene Anhäufung von grauer Substanz, welche unter dem Namen des *corpus rhomboideum* oder *dentatum* bekannt ist. In den Nervenzellen dieser grauen Substanz endigen alle aus der Peripherie stammenden convergirenden Fasern und andererseits entpringen aus ihnen andere Fasern, welche sich zu drei Gruppen mit einander vereinigen und in ihrer Vereinigung die drei Schenkel oder Stiele des kleinen Gehirnes bilden.

Die unteren Kleinhirnschenkel (*crura cerebelli ad medullam oblongatam*, auch im engeren Sinne

Digitized by Google

des Wortes Kleinhirnschenkel genannt) steigen schräg nach unten hinab, kreuzen sich mit einander und endigen in den Nervenzellen der *corpora olivaria* an der entgegengesetzten Seite. Die mittleren Kleinhirnschenkel (Brückenarme, *crura cerebelli ad pontem)* verlaufen transversal und endigen in den Nervenzellen der grauen Substanz der Brücke, zum Theil an derselben Seite, grösstentheils aber nach vorhergegangener Kreuzung an der entgegengesetzten Seite. Die oberen Kleinhirnschenkel (Bindearme, *crura cerebelli ad corpora quadrigemina*) verlaufen nach vorne und oben, kreuzen sich ebenfalls und endigen successive in verschiedenen auf einander folgenden Anhäufungen von grauer Substanz; zuerst in den Zellen der von *Luys* sogenannten oberen Oliven (Stillings rothen Kernen), dann, indem die aus diesen hervortretenden Fasern weiter verlaufen, in den Zellen des *locus niger* Sömmerings und zuletzt in den gelben Kernen der *corpora striata.*

Aus den Nervenzellen aller dieser Anhäufungen grauer Substanz, in welchen die Fasern aller 3 Kleinhirnschenkel enden, geht nun auf der anderen Seite eine grössere, die Anzahl der eintretenden Fasern überwiegende Zahl von ausführenden Fasern hervor, welche die aufsteigenden Fasern der vorderen Rückenmarksstränge im Bulbus, in der Brücke und den Grosshirnschenkeln in verschiedenen Richtungen durchsetzen, die Fasern derselben in netzförmigen Geflechten und zum Theil scheidenartig umgeben, sich an sie anlegen und schliesslich mit ihnen verschmelzen. Diese ausführenden Fasern bilden ein continuirliches netzförmiges Geflecht, welches sich vom Bulbus des Rückenmarkes an durch die *Medulla oblongata*, die Brücke und die *crura cerebri* bis in die *corpora striata* erstreckt, namentlich in die extraventriculairen Theile derselben, die so-

Digitized by Google

genannten Linsenkerne. Die motorischen Fasern der vorderen Rückenmarksstränge sind demnach, wenn sie in die grossen Zellen der *corpora striata* eintreten, mit Fasern, die vom kleinen Gehirn herstammen, innig verbunden. Letztere sollen hier in derselben Weise wie in ihrem Ursprunge in der Corticalsubstanz des kleinen Gehirnes, in einer Reihe ganz kleiner Zellen erscheinen, welche den Spinalfasern anliegen und auch die Oberfläche der grossen Zellen der *corpora striata* überziehen. In diese grossen Zellen treten zugleich von der anderen Seite her Fasern ein, welche von der Peripherie des grossen Gehirnes kommen (fibres cortico-striées), so dass dadurch eine Trilogie zu Stande kommt, eine innige Verbindung der motorischen Fasern der Spinalachse sowohl mit Fasern, die vom kleinen Gehirn herstammen, als mit solchen, die im grossen Gehirn ihren Ursprung haben. Alle Fasern des kleinen Gehirnes treten folglich in ihrer peripherischen Ausbreitung nur mit motorischen und nirgends mit sensiblen Fasern in Verbindung. Sie verbreiten sich nach unten, nach dem Rückenmark zu, nicht über den Bulbus oder die untere Gränze der Pyramidenkreuzung hinaus und keine einzige Faser des Rückenmarkes steigt zu dem kleinen Gehirn hinauf.

Diese Beschreibung der Structur des kleinen Gehirnes enthält, wie ich glaube, sehr wesentliche Mängel und Irrthümer, welche hauptsächlich dadurch entstanden sind, dass *Luys* sich bei seinen Untersuchungen auf die Verfolgung horizontaler und verticaler Schnitte beschränkt hat. Hätte er zugleich die von *Reil*, *Foville*, *Arnold* und Anderen befolgte Methode der Untersuchung des Faserverlaufes angewandt, so würde er gewiss zu anderen Resultaten gekommen sein. Ich habe mich in früheren Zeiten Jahre lang mit Gehirnuntersuchungen nach dieser Methode beschäftiget und sie ungerne aus Mangel an Zeit aufgegeben. Von den Resultaten, wozu

Digitized by Google

ich durch diese Untersuchungen gelangt bin, will ich hier Einiges mittheilen.

Wenn *Luys* behauptet, dass keine einzige Faser des Rückenmarkes direct zum kleinen Gehirn aufsteige, so hat er darin gewiss Recht und die Untersuchungen von *Deiters* bestätigen diese Ansicht. Ebenso hat er ohne Zweifel Recht, wenn er mit *Kölliker* annimmt, dass die Endigungen und Anfänge aller Fasern, welche das Gehirn mit dem Rückenmark verbinden, in den Anhäufungen von grauer Substanz zu suchen sind, die in den oberen Theilen der Spinalachse liegen, von der *Medulla oblongata* an bis hinauf zu den Seh- und Streifenhügeln und dem *Corpus rhomboideum* des kleinen Gehirnes. Es ist sehr anzuerkennen, dass *Luys* demzufolge den Unterschied in den Functionen der Spinalachse und des grossen Gehirnes, den Unterschied des bewusstlosen und bewussten Seelenlebens sehr bestimmt und scharf hervorhebt. Er unterscheidet ein oberes, dem grossen Gehirn angehörendes, und ein unteres System convergirender Fasern, welche in den Seh- und Streifenhügeln ihren centralen Vereinigungspunkt haben. Nur darin irrt er gewiss, dass er die Fasern des kleinen Gehirnes zu dem System der unteren convergirenden Fasern rechnet und es ganz verkennt, dass die *Corpora rhomboidea* für das kleine Gehirn dieselbe Bedeutung haben, wie die *Thalami optici* und die *Corpora striata* für das grosse Gehirn.

Dagegen scheint mir die ausschliessliche Verbindung der peripherischen Fasern des kleinen Gehirnes mit den motorischen Spinalfasern weder durch die Beschreibung, noch durch die darauf Bezug habenden Zeichnungen hinreichend nachgewiesen zu sein. Es ist auch schon a priori im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass das kleine Gehirn nur mit motorischen und nirgends mit sensiblen Fasern in Verbindung stehen sollte. Das kleine

Digitized by Google

Gehirn würde alsdann von den übrigen Theilen des Nervensystemes ganz isolirt und jeder Einwirkung von anderen Punkten desselben entzogen sein: weder das grosse Gehirn noch das Rückenmark würde auf das kleine Gehirn einwirken können.

Als eine Folge der Untersuchungsmethode ist es anzusehen, dass *Luys* die schon von *Burdach* genau beschriebenen Längsbündel des grossen Gehirnes gar nicht gesehen hat, welche die vorderen und hinteren Windungen mit einander verbinden. Ebenso hat er nicht gesehen, dass die untersten Schichten der transversalen Brückenfasern von einer Hemisphäre zur anderen hinübergehen, ohne in graue Substanz einzutreten und ohne mit den durch die Brücke hindurch gehenden Fortsetzungen der Pyramiden in Berührung zu kommen. In Folge dessen meint er, dass eine eigentliche Commissur beider Hälften des kleinen Gehirnes gar nicht existire und verkennt die augenfällige Analogie zwischen der Brücke und dem *Corpus callosum*.

Noch auffallender ist freilich der Widerspruch zwischen seiner Zeichnung der Brückenarme und ihrer Beschreibung. Letzterer zufolge sollen die mittleren Kleinhirnschenkel oder Brückenarme ebenso, wie die oberen und unteren nicht von den Windungen, sondern von dem *Corpus rhomboideum* entspringen und aus dessen *hilus* hervortreten. Auf der 2ten Figur der 35sten Tafel sieht man dagegen die Fasern der Brücke fast gar nicht aus dem *Corpus rhomboideum*, sondern grösstentheils direct aus den Windungen hervorgehen. So verhält es sich auch in der That, die Queerfasern der Brücke scheinen mit dem *Corpus rhomboideum* in keiner directen Verbindung zu stehen, sie lassen sich vielmehr direct bis in die peripherischen Windungen verfolgen. Nur die unteren und oberen Kleinhirnschenkel treten, nachdem sie sich vorher mit einander gekreuzt haben, der

Digitized by Google

untere aufsteigend in die obere Hälfte des *Corpus rhomboideum*, der obere absteigend in die untere Hälfte desselben. Höchst auffallend ist es ferner, dass man in derselben Figur die grosse Wurzel des *Trigeminus* sich in zwei Hälften spalten sieht, von denen die eine quer bis zur Mittellinie verläuft, die andere sich direct in das Innere des *Corpus rhomboideum* begiebt. Von einem solchen Verlaufe der Wurzeln des *Trigeminus*, welche der Theorie von *Luys* in Beziehung auf die Isolirung des kleinen Gehirnes geradezu widersprechen würde, ist in seiner Beschreibung, sowohl des kleinen Gehirnes, als des Verlaufes der Wurzeln des *Trigeminus*, nirgends die Rede. Ein Uebergang dieser Wurzeln in das kleine Gehirn findet auch wohl nicht statt, obgleich *Foville* ihn gefunden zu haben glaubte.

Wenn *Luys* ferner jede directe Verbindung zwischen dem kleinen und grossen Gehirn in Abrede stellt, so halte ich dies ebenfalls für einen Irrthum. Die Fasern der oberen Kleinhirnschenkel oder Bindearme gehen nämlich nicht, wie er es will, alle in die von ihm sogenannten oberen Oliven über, sondern lassen sich, vermischt mit darüber liegenden, von den Vierhügeln kommenden Fasern in der oberen Hälfte der *Crura cerebri* (der sogenannten Haube) bis in den *Reil*'schen Stabkranz verfolgen, gehen also direct in das grosse Gehirn über. Da, wo die Bindearme in der Gegend der Vierhügel in die Haube der *Crura cerebri* eintreten, glaube ich ein ähnliches Verhalten der Fasern gefunden zu haben, wie in dem *Chiasma* der Sehnerven, d. h. zunächst Fasern, welche bogenförmig von einer Seite zur anderen gehen und darauf Fasern, die sich grösstentheils kreuzen, zum Theil aber auch an derselben Seite weiter ziehen. Deshalb, und weil die Haube überhaupt keine motorischen, sondern nur sensible Fasern zu enthalten scheint, habe ich den Bindearm schon lange als ein inneres Auge be-

Digitized by

trachtet und seinen Ursprung in der unteren Hälfte des *Corpus rhomboideum* mit der *Retina* verglichen. Dieser Ansicht gemäss würde alles, was im kleinen Gehirne vorgeht, durch die Bindearme zum grossen Gehirne fortgeleitet, zum Bewusstsein gebracht und gleichsam geistig angeschaut werden. Der Sehnerv enthält wahrscheinlich neben den vorwaltenden centripetal leitenden Fasern auch centrifugal leitende, was angenommen werden muss, wenn die bogenförmigen Fasern, welche nach vorne beide Netzhäute, nach hinten beide *Tractus optici* mit einander verbinden, eine Bedeutung haben sollen. Die Schärfung des Sehens bestimmter Gegenstände durch die Aufmerksamkeit macht es wahrscheinlich, dass auch eine centrifugale Einwirkung vom Gehirn aus auf die *Retina* stattfindet, indem dies geschärfte Wahrnehmen nicht allein aus der Richtung und Accomodation des Auges abgeleitet werden kann. Ist dies richtig, so würde auch eine Einwirkung des grossen Gehirnes auf das kleine Gehirn durch die oberen Kleinhirnschenkel vermittelt werden können.

Auf der anderen Seite steht das grosse Gehirn mit dem kleinen in Verbindung durch die *Corpora striata*, die *Crura cerebri* und *pons Varolii*. Untersucht man an gehärteten Gehirnen die Brücke von der Basis her, so trifft man zuerst eine Schicht von Queerfasern, welche von einer Seite des kleinen Gehirnes zur anderen hinübergehen, ohne mit Fasern der Hirnschenkel in Berührung zu kommen. Darauf folgt eine Schicht von Queerfasern, welche von Längsfasern der Hirnschenkel durchsetzt werden, die noch nicht in die Pyramiden übergehen, sondern in der Brücke endigen. Sie verlaufen zum Theil gegen die Mittellinie und tragen zur Bildung der *Raphe* bei, zum Theil biegen sie aber nach aussen um und scheinen direct in Queerfasern der Brücke und weiter in das kleine Gehirn überzugehen. Dann

Digitized by Google

erst folgen die Queerfasern, welche von den Fortsetzungen der Hirnschenkel in die Pyramiden durchsetzt werden und grösstentheils in der grauen Substanz der Brücke zu endigen scheinen. Da nun die untere Hälfte der *Crura cerebri*, wie allgemein angenommen wird, nur centrifugale oder motorische Fasern enthält, so ist vorauszusetzen, dass die Brücke nicht bloss zur Verbindung beider Hemisphären des kleinen Gehirnes bestimmt ist, sondern auch zur Fortleitung centrifugaler Bewegungen von dem grossen zum kleinen Gehirne. Wenn hier auch vielleicht keine directe Faserverbindung existiren sollte, so ist doch die Verbindung der Längs- und Queerfasern der Brücke eine so innige, dass jeder vom grossen Gehirne ausgehende Willensact, indem er durch die *Corp. striata* und *Crura cerebri* auf die motorischen Spinalfasern übergeht, bei seinem Durchgange durch die Brücke nothwendig zugleich auf das kleine Gehirn einwirken muss.

Zu bemerken ist hier noch, dass die in die Pyramiden sich fortsetzenden Fasern der *Crura cerebri* in der Pyramidenkreuzung nicht, wie *Luys* will, in die Vorderstränge, sondern in die Seitenstränge des Rückenmarkes übergehen, wie dies von *Arnold* und Anderen nachgewiesen ist. Die Vorderstränge weichen in der *Medulla oblongata*, wie *Luys* selbst an einem anderen Orte anführt, nach aussen ab und fassen die Pyramiden zwischen sich. Ihre Fasern scheinen, wie man schon bei *Burdach* angegeben findet, wenigstens grösstentheils die Brücke nicht zu durchsetzen, sondern oberhalb der Querfasern derselben zu verlaufen. Sie kreuzen sich auch nicht in der *Medulla oblongata*, sondern in der ganzen Länge des Rückenmarkes in der vorderen weissen Commissur. Die Seitenstränge, welche übrigens in ihrem ganzen Verlaufe von den Vordersträngen nicht scharf geschieden sind, kreuzen sich, wie es scheint, im Rücken-

Digitized by Google

mark gar nicht, sondern gehen erst in der Pyramiden-Kreuzung auf die andere Seite über.

Durch die unteren Kleinhirnschenkel, die *Crura cerebelli ad medullam oblongatam* tritt das kleine Gehirn mit dem Rückenmark und wahrscheinlich sowohl mit den sensiblen, als mit den motorischen Partien desselben in Verbindung, so dass eine Wechselwirkung zwischen beiden durch die Kleinhirnschenkel vermittelt wird. Ein unmittelbarer Uebergang von Rückenmarksfasern in das kleine Gehirn braucht dabei nicht angenommen zu werden, es ist vielmehr wahrscheinlich, dass ein solcher nicht existirt. Nach *Luys* sollen die unteren Kleinhirnschenkel nicht aus den Windungen des kleinen Gehirnes, sondern aus den Zellen des *Corp. rhomboideum* entspringen, aus dessen *hilus* hervortreten und in dem *Corp. olivare* endigen. Auf der 12ten Tafel, Fig. 2 und 3 sind sie aber so gezeichnet, als ob sie fast alle nicht aus dem *hilus*, sondern direct aus den Windungen hervorgehen und auf der 13ten Tafel Fig. 1 sieht man eine Anzahl Rückenmarksfasern in das *Corp. olivare* eintreten, was mit dem Texte ebenfalls in Widerspruch steht.

Dem vermeintlichen anatomischen Befunde gemäss betrachtet *Luys* das kleine Gehirn als ein rein motorisches Organ, dessen Function wesentlich darin besteht, dass es durch eine continuirliche Innervation alle motorischen Nerven in den Stand setzt, und in dem Stande erhält, jede Bewegung gehörig zu vollziehen, zu der sie durch den Willen oder durch excito-motorische Reizung angeregt werden. Insbesondere wird die Energie der Muskelthätigkeit durch diese beständig von dem kleinen Gehirn ausgehende Strömung oder Innervation bedingt, so dass jede Störung oder Hemmung derselben eine mehr oder weniger bedeutende, allgemeine oder partielle Schwäche der Bewegungen, Mangel an gehöriger Coor-

Digitized by Google

dination derselben, manchmal auch krampfhafte Zuckungen und Convulsionen zur Folge hat.

Diese Theorie wird, wie *Luys* meint, durch die physiologischen und pathologischen Untersuchungen vollkommen bestätiget. Physiologisch bezieht er sich insbesondere auf die übereinstimmenden Resultate der von *Flourens*, *Magendie*, *Longet*, *Wagner* und von ihm selbst angestellten Vivisectionen. Wegnahme des kleinen Gehirnes oder beträchtlicher Theile desselben bewirkt darnach eine mehr oder weniger grosse Schwäche, Störungen des Gleichgewichtes in der Körperhaltung, Unregelmässigkeit und Mangel an gehöriger Coordination der Muskelthätigkeit; so dass die Thiere in ihrer schwankenden Haltung und der Unsicherheit ihrer Bewegungen eine auffallende Aehnlichkeit mit Betrunkenen an den Tag legen. Verletzungen der Kleinhirnschenkel, besonders des Brückenarmes und der *Crura cerebri* bewirken die bekannten Rotations- und Reitbahnbewegungen; Verletzungen der Brücke rufen Convulsionen hervor und die meisten Verletzungen des kleinen Gehirnes werden von Störungen in den inneren und äusseren Bewegungen der Augen, von Strabismus und Erweiterung der Pupillen begleitet. *Luys* ist auch geneigt, das charakteristische Zittern der Zunge bei der allgemeinen Paralyse, den plötzlichen Tod nach Durchschneidung der oberen Region des *Bulbus*, sowie die Lähmung der Eingeweide des Beckens bei Degenerationen des kleinen Gehirnes dem gehemmten Einflusse desselben zuzuschreiben. Dagegen zeigt dasselbe keine Sensibilität und verhält sich bei Reizungen und Verletzungen unempfindlich.

Alle diese Erscheinungen erklärt *Luys* aus einer mehr oder weniger allgemeinen oder partiellen Hemmung und unregelmässigen Vertheilung der vom kleinen Gehirn ausgehenden Innervation. Die von *Flourens* aufgestellte Ansicht, dass das kleine Gehirn ein die Muskel-

Digitized by Google

bewegungen coordinirendes Organ sei, erklärt er für eine unlogische Folgerung aus seinen Beobachtungen, indem der Mangel an Coordination nicht das Ursprüngliche sei, sondern nur eine Folge der durch Aufhebung und ungleiche Vertheilung der sthenisirenden Innervation entstandenen Asthenie. Das Entstehen der Convulsionen leitet er ab von den Hindernissen, welche sich den von dem kleinen Gehirne ausgehenden Strömungen entgegenstellen und welche nur stossweise überwunden werden. Die Rotationen vergleicht er mit den Erscheinungen, die das hydraulische Tourniquet darbietet.

In den pathologischen Untersuchungen findet *Luys* ebenfalls eine Bestätigung seiner Ansichten. Es stellt die in 100 Fällen von krankhafter Veränderung des kleinen Gehirnes beobachteten Krankheitssymptome tabellarisch zusammen und giebt von 57 Fällen einen kurzen Krankenbericht. Die beobachteten krankhaften Veränderungen waren: Atrophie, Sclerose, Erweichung (selten), 22 Mal Tuberkeln, 20 Mal solide Geschwülste, 2 Mal Cysten, 14 Mal hämorrhagische Heerde. Der Sitz der krankhaften Veränderung war 56 Mal in der rechten, 30 Mal in der linken Hemisphäre, 2 Mal in der Mediangegend.

In diesen 100 Fällen wurde beobachtet:

Progressive allgemeine Muskelschwäche ohne Paralyse	45 Mal.
Unsicherheit und Unmöglichkeit des Gehens	28 -
Hindernisse beim Sprechen	20 -
Störungen in den inneren und äusseren Bewegungen der Augen	59 -
Hemiplegie	16 -
Unvollständige Paraplegie	7 -
Zittern	7 -
Convulsionen	12 -

Digitized by Google

Ueberwiegende Muskelthätigkeit einer Körperhälfte (entrainement)	5 -

Ausser diesen Erscheinungen gestörter Bewegung wurden noch folgende Symptome beobachtet:

Aeusserst heftiger Kopfschmerz, am häufigsten in der Occipitalregion	58 Mal.
Erbrechen	35 -
Amaurose beider Augen	17 -
Amaurose nur eines Auges	1 -
Taubheit	9 -
Sehr rascher Tod	11 -
Ganz plötzlicher Tod	14 - *)

Luys hebt besonders hervor, dass bei krankhaften Zuständen des kleinen Gehirnes oft eine allgemeine progressive Schwäche sich einstellt, ein allmähliges Erlöschen der Muskelthätigkeit, von einfacher Mattigkeit bis zu völliger Erschöpfung fortschreitend. Die Kranken fühlen ihre Muskelkräfte von einem Tage zum andern abnehmen, alle Bewegungen werden langsamer und kraftloser, bisweilen disharmonisch, aber wenn die Asthenie auch den höchsten Grad erreicht, so ist dennoch fast niemals eine eigentliche Paralyse vorhanden. Ehe es so weit kommt, dass die Kranken liegen bleiben müssen,

BOSTON MEDICAL LIBRARY MAY 24 1911

*) In den Untersuchungen über die Physiologie und Pathologie des kleinen Gehirnes von *M. Leven* und *A. Ollivier* (Archives génér. de Médec. 1862. Nov. und Déc. und 1863 Janvier) findet sich eine ähnliche tabellarische Uebersicht der in 76 Fällen von krankhafter Veränderung des kleinen Gehirnes beobachteten Symptome. Da man voraussetzen muss, dass *Luys* sie gekannt und benutzt haben wird, ist der Mangel an Uebereinstimmung in manchen Angaben sehr auffallend. Convulsivische Bewegungnn wurden nach dieser Tabelle 24 Mal beobachtet, unvollständige Manegebewegung, bestehend in Neigung des Kopfes gegen den Körper und bogenförmiger Krümmung des Körpers 18 Mal, wirkliche Manegebewegung 3 Mal, unwiderstehliche Neigung, nach einer Seite gezogen zu werden 6 Mal, völlige Blindheit 25 Mal u. s. w.

Digitized by Google

stehen sie oft unsicher auf den Beinen, können nur mit Hülfe eines Stockes gehen, müssen dabei oft stille stehen, stolpern und fallen häufig. Ihre Bewegungen sind dissociirt und sie zeigen dieselben Erscheinungen, welche man bei der allgemeinen Paralyse antrifft. Sie erscheinen manchmal ganz wie Betrunkene und *Luys* führt zwei Fälle an, in denen man die Aufnahme der Kranken in ein Hospital verweigerte, weil man sie für betrunken hielt.

Obgleich *Luys* die Thätigkeit des kleinen Gehirnes als eine mehr oder weniger isolirte darstellt und ihm nur einen directen Einfluss auf die Muskelthätigkeit und die Körperbewegungen zuschreibt, wirft er doch die Frage auf, ob das kleine Gehirn nicht dennoch einen Einfluss auf das psychische Leben und auf die moralischen Acte der Cerebral-Thätigkeit haben könne? Er bejaht diese Frage und meint, der durch das kleine Gehirn vermittelte Grad der Innervation und Sthenisirung der Zellen der *corp. striata* könne zum Bewusstsein gebracht werden durch eine rückläufige Bewegung in den von der Peripherie des grossen Gehirnes zu den Streifenhügeln gehenden Fasern (fibres corticostriées), so dass das kleine Gehirn auf diesem Wege seinen Einfluss auf das psychische Leben geltend machen könne. Eine übermässige Innervation könne auf diesem Wege Hypersthenie z. B. Wuthanfälle bei Epileptischen hervorrufen; Muth, Kühnheit, Verwegenheit, Unternehmungsgeist könnten dadurch bedingt werden, so wie andererseits eine zu geringe Innervation Kleinmuth, Furchtsamkeit und bei höherem Grade Melancholie zur Folge haben müsse. *Luys* beruft sich dabei auf einige (wenig beweisende) Beobachtungen von *Calmeil*, in denen man bei exaltirten, heftigen und gewaltthätigen Geisteskranken eine intensive Injection der Gefässe des kleinen Gehirnes und der *corp. striata* gefunden; so wie andererseits auf

Digitized by Google

einige wenige Fälle, in denen bei krankhaften Veränderungen des kleinen Gehirnes eine grosse Furchtsamkeit oder Schreckhaftigkeit sich zeigte. Interessant ist eine von ihm mitgetheilte Beobachtung *Andrals*, wo bei einer 45jährigen Frau die linke Hemisphäre des kleinen Gehirnes gänzlich fehlte. Sie war im Leben äusserst furchtsam und ängstlich und fing bei der geringsten Veranlassung an zu zittern. Ausserdem hatte sie die Eigenthümlichkeit, dass sie von allen Gegenständen, die sie nicht selbst hingestellt hatte, glaubte, dass sie nicht an ihrem rechten Ort ständen, und unwiderstehlich dazu getrieben wurde, alle Dinge umzustellen.

Man sieht hieraus, wie nahe *Luys* daran war, dieselbe Ansicht von den Functionen des kleinen Gehirnes zu fassen, welche ich seit 40 Jahren gehabt habe, dass es nämlich der Sitz des Gemüthes (im engeren Sinne dieses Wortes) sei, d. h. dass alle der Sphäre des Selbstgefühles angehörenden und wahrscheinlich auch die moralischen und religiösen Gefühle in ihm entspringen und von ihm aus einerseits zum grossen Gehirn und Bewusstsein, andererseits zum Rückenmark und den Bewegungsorganen sich fortpflanzen, und auf diese Weise ihren mächtigen Einfluss auf das Denken und Handeln des Menschen ausüben. Dass *Luys* zu dieser Ansicht nicht gelangen konnte, lag einerseits in seiner irrthümlichen Ansicht von der Structur des kleinen Gehirnes und seiner ausschliesslichen Verbindung mit den motorischen Spinalsträngen; andererseits in dem Mangel einer deutlichen Vorstellung von den Functionen des Gemüthes. Dass das Gemüth in dem ganzen menschlichen Thun und Treiben das hauptsächlichste *agens* und *movens* sei, dass die Energie, die Raschheit, Leichtigkeit, Sicherheit und Ausdauer in der Ausführung aller Körperbewegungen und Handlungen wesentlich durch die verschiedenen

Digitized by Google

Zustände des Gemüthes bedingt werden, ist ihm gar nicht eingefallen.

Ueberhaupt fehlt es gegenwärtig noch gar sehr an gründlichen Untersuchungen über das Gemüth. Weder die Physiologie noch die Pathologie, weder die Psychologie noch die Philosophie hat sich bisher eingehend genug damit beschäftiget. Bei den zur Ermittelung der Functionen des Gehirnes angestellten Vivisectionen haben die Experimentatoren nur die Störungen der Intelligenz und der leiblichen Functionen im Auge gehabt. Veränderungen in dem Gemüthszustande zu berücksichtigen ist ihnen kaum in den Sinn gekommen. Es mag allerdings seine Schwierigkeit haben, die inneren Gefühle und Gemüthsbewegungen eines Frosches, eines Huhnes oder einer Ente zu ermitteln, unmöglich dürfte es aber doch nicht sein. Man könnte z. B. wohl untersuchen, ob ein solches Thier in Furcht oder Zorn zu versetzen sei, ob es mehr oder weniger in Apathie versinke und dergl. mehr. Ebenso wird in Krankengeschichten der Zustand der Intelligenz gewöhnlich berücksichtiget, aber von veränderter Gemüthsstimmung ist nur dann die Rede, wenn sie besonders auffallend hervortritt. Unter den 57 Fällen von krankhafter Veränderung des kleinen Gehirnes und seiner peripherischen Ausbreitungen, deren Symptome *Luys* kurz resümirt, ist nur 3 Mal von Gemüthsaffection die Rede. In 2 Fällen (obs. 6. und 11.) wurde sie von grosser Schreckhaftigkeit und häufigen Angstanfällen begleitet; im 3ten Falle war bei einem 42jährigen Manne, wo eine starke Compression und Abplattung des rechten *corpus striatum* durch einen Tumor statt fand, ein Zustand von Melancholie und eine solche moralische Schwäche vorhanden, dass er seiner Frau stets gehorchte und sich sogar von ihr schlagen liess (obs. 57.).

Fehlt es doch sogar den Franzosen, wie den Englän-

Digitized by Google

dern, in ihrer Sprache an einem bestimmten eignen Worte zur Bezeichnung unseres deutschen Begriffes Gemüth. Sie haben dafür nur die Ausdrücke facultés affectives, facultés morales, passions und ähnliche. *Luys* bezeichnet die hierhergehörenden Erscheinungen als manifestations passionnelles und erklärt, dass er auf ihre Untersuchung nicht eingehen könne, weil die Physiologie sich bisher zu wenig mit ihnen beschäftiget habe und weil es unmöglich sei, zu sagen, ob und in welchen Theilen des Gehirnes sie ihren besonderen Sitz haben dürften.

Indem ich zu einer näheren Auseinandersetzung der Gründe übergehe, welche mich zu der Annahme bewogen haben, dass der Sitz des Gemüthes im kleinen Gehirn zu suchen sei, muss ich nochmals ausdrücklich hervorheben, dass ich dabei das Wort Gemüth in dem gewöhnlichen beschränkteren Sinne nehme, so dass nur die der Sphäre des Selbstgefühles angehörenden Gefühle darin begriffen, alle dem Rückenmark und der Sphäre des Gemeingefühles angehörenden sinnlichen und leiblichen Gefühle aber davon ausgeschlossen sind.*) Alle der Sphäre des Selbstgefühles angehörenden Gefühle (Empfindungen und Triebe) sind, wie alle Gefühle, an-

*) Dass es bei psychologischen Erörterungen oft unvermeidlich ist, ein und dasselbe Wort in verschiedenen, bald engerem, bald weiterem Sinne zu gebrauchen, kann leicht zu Missverständnissen führen, obgleich man aus dem ganzen Zusammenhange immer erkennen kann, in welchem Sinne das Wort gebraucht worden ist. Das Wort Gemüth bezieht sich dem Sprachgebrauche nach eigentlich nur auf den Inbegriff der innerlichen und höheren Gefühle, mit Ausschluss der sinnlichen und leiblichen. Ich habe mich aber vergebens bemüht, in unserer Sprache ein anderes passendes Wort zu finden, wodurch man das allen Gefühlen (mit Einschluss der sinnlichen und leiblichen) zum Grunde liegende Princip bezeichnen könnte. Von dem Worte Geist gilt im Grunde dasselbe, indem darunter gewöhnlich nur das Princip des bewussten Denkens mit Ausschluss der Sinnesthätigkeit verstanden wird.

Digitized by Google

genehm oder unangenehm und wirken fördernd oder störend, anregend oder hemmend auf jede Thätigkeit. Es gehören alle inneren Gefühle oder Gemüthsbewegungen hierher, namentlich die Gefühle von Freude und Leid, alle heiteren und trüben, exaltirten oder deprimirten Gemüthsstimmungen, das Interesse für etwas und der Widerwille gegen etwas, Muth und Selbstvertrauen, so wie deren Steigerung zu Zorn und Wuth, oder Herabstimmung zu Furcht und Angst, so wie endlich alle Affecte, Leidenschaften und Begierden, während das blosse Verlangen nach etwas der Sphäre des Gemeingefühles angehört. Ob auch die moralischen und religiösen Gefühle im kleinen Gehirn entspringen, kann hier unerörtert bleiben.

Die Gründe, welche mich dazu veranlasst haben, das kleine Gehirn als das Organ des Selbstgefühles hypothetisch zu betrachten, will ich in einzelnen Punkten aus einander zu setzen versuchen

1. Wenn man sich davon überzeugt, dass im Allgemeinen nur zwei Seelenkräfte, Geist und Gemüth, als relativ selbständige Kräfte wirklich existiren, wenn man eingesehen hat, dass das Rückenmark das Organ des bewusstlosen Seelenlebens ist; wenn man endlich es für hinreichend constatirt hält, dass das grosse Gehirn das Organ der Intelligenz oder des bewussten Denkens und des Bewusstseins ist, so wird man von selbst darauf geführt, den Sitz des Gemüthes in der angegebenen Bedeutung in dem kleinen Gehirn zu suchen. Dieser Gedanke wird durch das Zeugniss unseres Bewusstseins insoweit bestätiget, als dasselbe uns deutlich sagt, dass die Gedanken unmittelbar im Bewusstsein entstehen, die Gefühle aber gleich den Sinneswahrnehmungen von einem anderen Orte her demselben zugeführt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dem so sei, ist ohne weitere Untersuchung so gross, dass man, wenn man den

Digitized by Google

Gedanken einmal gefasst hat, ihn fast unwillkührlich festhält, so lange nicht das Gegentheil bestimmt nachgewiesen wird. Einigermaassen wird diese Ansicht auch unterstützt durch Vergleichung des Verhältnisses der Gedanken und Gefühle mit dem Bau des kleinen und grossen Gehirnes.

Gedanken und Gefühle sind einerseits identisch, andererseits einander wie Positives und Negatives entgegengesetzt. Identisch sind sie durch die Uebereinstimmung und Gleichheit ihres Inhaltes, wodurch die Darlegung der Gefühle in Worten ermöglicht wird und in der beiden zukommenden zwiefachen, centripetalen und centrifugalen Bewegung. Entgegengesetzt sind sie, insoferne sie denselben Inhalt in verschiedener Form darstellen, so dass der Gedanke als ein entwickeltes Gefühl und das Gefühl als ein unentwickelter Gedanke erscheint, und insoferne in der Bewegung der Gedanken die centripetale, in der Bewegung der Gefühle die centrifugale Richtung die vorherrschende ist. Jeder im Bewusstsein auftretende Gedanke bewegt sich sogleich und unaufhaltsam nach innen zum Selbstbewusstsein, seine Bewegung nach aussen, seine Aeusserung durch Wort oder That ist keine nothwendige, sondern der Willkühr unterworfen. Das Erkennen ist für den Geist die Hauptsache, ob die Gedanken ausgesprochen, die Vorsätze ausgeführt werden, ist ihm gleichgültig, sobald er nicht durch Gefühle dazu getrieben wird. Jedes Gefühl dagegen äussert sich, auch wenn es nicht zum Bewusstsein kommt, auf der Stelle und fast unvermeidlich durch entsprechende Geberden und erzeugt Triebe, welchen der Mensch bei stärkeren Gefühlen nur schwer widersteht. Durch ihre treibende, anregende oder hemmende Macht haben die Gefühle einen weit bedeutenderen Einfluss auf das ganze Seelenleben, als durch die Empfindungen, die sie in uns erwecken.

Digitized by Google

Vergleichen wir nun das grosse und kleine Gehirn mit einander, so finden wir einerseits eine grosse Uebereinstimmung der inneren Structur, andererseits Verschiedenheiten, welche wenigstens in einigen Punkten den Unterschieden zwischen den Gedanken und Gefühlen entsprechen. Namentlich erscheint uns das grosse Gehirn mehr entwickelt, als das kleine; seine beiden Hemisphären sind bestimmt gesondert, während sie bei dem kleinen Gehirn zu einer Masse zusammen fliessen. Die grossen Hirnganglien, welche die Verbindung mit dem Rükkenmark vermitteln, *thalami* und *corp. striata*, liegen ausserhalb der Hemisphären und sind in zwei verschiedene Theile gesondert; das analoge *corp. rhomboideum* des kleinen Gehirns zeigt keine solche Sonderung, obgleich es bei Untersuchungen gehärteter Gehirne aus einer oberen und unteren Hälfte zusammengesetzt erscheint, und es liegt nicht frei, sondern in der Hemisphäre versteckt und von deren Masse ringsumgeben. Nicht ohne Interesse ist es auch, dass in den Windungen des grossen Gehirnes die longitudinale, in denen des kleinen Gehirnes die transversale Richtung die vorherrschende ist. Dieser Verschiedenheit entspricht die Stellung und Lage des *corpus callosum* und der *pons Varolii*, gleichbedeutender Organe, deren bogenförmig verlaufende Fasern ihre Convexität in verschiedenen Richtungen zeigen. Auf diese Dinge ist freilich kein grosser Werth zu legen, aber wenn wir zwei verschiedene Organe für zwei Functionen bestimmt sehen und wissen, dass das eine Organ zur Vollziehung der einen Function dient, so müssen wir nothwendig daraus folgern, dass die Vollziehung der zweiten Function dem anderen Organe übertragen sei.

2. Durch neuere Untersuchungen, besonders von *Leven* und *Ollivier*, ist es constatirt, dass das kleine Gehirn einen grossen Einfluss auf das Auge, namentlich auf die inneren und äusseren Bewegungen desselben aus-

Digitized by Google

übt, und diese Thatsache scheint auch durch pathologische Beobachtungen bestätigt zu werden. Das Auge dient aber so sehr zum Ausdruck der verschiedenen Gemüthsstimmungen und Gemüthsbewegungen, dass man den verschiedenen Ausdruck desselben allgemein als Augensprache bezeichnet. Der Einfluss des kleinen Gehirnes auf das Auge wird wahrscheinlich vermittelt durch eine Verbindung der Bindearme *(crura cerebelli ad corpora quadrigémina)* mit den Vierhügeln, in denen zugleich eine Vereinigung von Wurzeln des Sehnerven mit den Wurzeln der motorischen Augennerven stattfindet. Wahrscheinlich steht das kleine Gehirn auch in näherer Beziehung zu dem *facialis* und wird auf diesem Wege die Aeusserung der Gemüthszustände durch den Gesichtsausdruck vermittelt.

3. Es ist eine bekannte Thatsache, dass die äusseren Theile des Körpers, die Haut, die willkürlichen Muskeln und die Extremitäten zu dem Geist und Gemüth in einem ganz anderen Verhältnisse stehen, als die Eingeweide. Was in den Ersteren vorgeht, kommt deutlich zum Bewusstsein, afficirt aber das Gemüth verhältnissmässig wenig, bei heftigen Schmerzen in den Extremitäten bleibt das Gemüth oft ruhig, die Gemüthsstimmung unverändert. Zugleich sind die willkürlichen Muskeln der Glieder in fast unbeschränktem Maasse der Herrschaft des Geistes, dem denkenden Willen oder der Willkür unterworfen. Mit den Eingeweiden verhält es sich gerade umgekehrt, sie sind der Herrschaft des bewussten Wollens fast ganz entzogen, während das Gemüth einen bedeutenden und mächtigen Einfluss auf ihre Thätigkeit äussert. Was in ihnen vorgeht, gelangt nur undeutlich zum Bewusstsein, wird nur unvollständig wahrgenommen, wirkt aber auf das Gemüth so stark ein, dass z. B. ein als unbedeutend wahrgenommener Schmerz von einer bedeutenden Gemüthsverstimmung begleitet

Digitized by Google

werden kann. Jeder Hypochondrist kann dies an sich selber erfahren, ein Zustand der Unterleibseingeweide, welcher nur als ein unbedeutender Druck oder als ein Gefühl von Spannung wahrgenommen wird, kann die tiefste Depression des Gemüthes hervorrufen. Ebenso allgemein bekannt ist der mächtige Einfluss, welchen das Gemüth und die Geschlechtsorgane gegenseitig auf einander ausüben. Diese Thatsachen lassen sich durch die Annahme erklären, dass die Nerven der äusseren Körpertheile vorzugsweise mit dem grossen, die Nerven der Eingeweide vorzugsweise mit dem kleinen Gehirn in Verbindung treten. Letzteres müsste insbesondere auch bei dem Vagus der Fall sein, durch den das Herz und der Magen mit dem Gehirn in Verbindung und Wechselwirkung treten. Auch von dem Sympathicus müsste man dasselbe annehmen.

4 Wenngleich die Wortbildung unzweifelhaft in dem grossen Gehirn zu Stande kommt und der denkenden Geistesthätigkeit angehört, so hat doch das Gemüth einen bedeutenden Einfluss auf die Sprache, indem die Betonung der Worte, die Stimme, die Declamation, der Ausdruck bei dem Sprechen und Singen hauptsächlich von ihm abhängig sind. Der Vortrag des Sängers, die Declamation des Schauspielers werden nur dann richtig und befriedigend, wenn das Vorzutragende in dem Vortragenden Empfindungen erweckt, welche mit dem Inhalte desselben harmoniren. Wird das Gemüth nicht davon erwärmt, wird der Ausdruck nur durch den berechnenden Verstand geleitet, so erscheint der Vortrag kalt, gesucht, manierirt oder affectirt. Das Sprechen wird, wie alle complicirten Körperbewegungen und Handlungen, durch Zusammenwirken von 2 Factoren vermittelt. Der Inhalt des Sprechens und die Form desselben sind verschiedene, mehr oder weniger von einander unabhängige Dinge, den Inhalt bilden die in Worte ge-

Digitized by Google

fassten Gedanken, die Form oder die Art der Ausführung ist hauptsächlich von der Art der Einwirkung des Gemüthes abhängig.

Die frühere Meinung, dass die complicirten Muskelbewegungen beim Sprechen direct durch die Gehirnfasern geleitet und geregelt würden, wird durch die bereits angeführten Fälle von Aphasie vollständig widerlegt, in denen bei ungestörter innerer Wortbildung ein gänzliches Unvermögen stattfindet, die gedachten Wörter auszusprechen, während das Aussprechen vorgesagter oder gelesener Worte ungehindert von statten geht. Die Communication zwischen dem Gehirn und den Sprachwerkzeugen ist in solchen Fällen ganz aufgehoben und dennoch können Auge und Ohr ein völlig correctes Aussprechen von Worten vermitteln. Es muss daher ausserhalb des grossen Gehirns irgendwo ein besonderes Organ existiren, welches die Sprechbewegungen leitet und regelt, oder wie man zu sagen pflegt, coordinirt und dieses Organ muss im normalen Zustande nicht blos durch das grosse Gehirn, sondern auch durch das Ohr und durch das Auge zur Thätigkeit angeregt werden können. Die Verbindung dieses, die Sprechbewegungen coordinirenden Organes mit dem Auge und Ohre wird ohnehin durch das gedankenlose laute Vorlesen und durch das Sprechenlernen der Kinder zur Genüge dargethan. Ich glaube nun mit *Schröder van der Kolk*, dass die *Corpora olivaria* die Centralorgane sind, welche die Sprechbewegungen reguliren, und ich habe dies schon seit 30—40 Jahren deshalb vermuthet, weil die Wurzeln aller bei der Bildung der Stimme und Sprache in Betracht kommenden Nerven, *hypoglossi*, *accessorii*, *vagi*, *faciales*, *acustici* rings um die *corp. olivaria* gelagert sind. Sie stehen mit dem kleinen Gehirn durch die unteren Kleinhirnschenkel in Verbindung, mit dem grossen Gehirn, wie ich glaube durch den von *Burdach* beschrie-

Digitized by

benen sogenannten Olivenkernstrang. Dieser Strang schien mir damals, als ich mich mit Gehirnuntersuchungen beschäftigte, oberhalb der Querfasern der Brücke nach vorne zu verlaufen, mit der von *Luys* als obere Olive bezeichneten Anhäufung von grauer Substanz zu communiciren, aber nicht, wie er es will, in dem *corp. striatum* zu endigen, sondern in dem *Reil*'schen Stabkranze und mit diesem in das grosse Gehirn fortzugehen. Eine Verbindung des *corp. olivare* mit dem Nervenkerne des *acusticus* findet wohl ohne Zweifel statt und die Verbindung mit dem Sehnerven dürfte vielleicht durch die Vierhügel und die *Reil*'sche Schleife vermittelt werden, wenn nicht in dem *tractus opticus* Fasern liegen, welche in das *corp. olivare* übergehen.

5. Die bisherigen Untersuchungen, sowohl physiologische, als pathologische, haben zu dem Resultate geführt, dass die meisten Physiologen dem kleinen Gehirn einen bedeutenden Einfluss auf die Muskelthätigkeit, besonders auf deren Energie und Coordination zuschreiben, obgleich sie in der Deutung dieses Einflusses von einander abweichen. Wenn *Luys* das kleine Gehirn als ein Organ betrachtet, welches durch continuirliche Innervation die motorischen Nerven in dem Stande erhält, jeden Impuls des Willens in gehöriger Weise auszuführen, so halte ich diese Deutung freilich nicht für ganz richtig, indem die Nerven, wie alle Organe des Körpers, wahrscheinlich durch Aufnahme von Stoffen aus dem Blute und Ausscheidung der verbrauchten sich in normalem Zustande erhalten; ich halte aber mit ihm die Mitwirkung des kleinen Gehirns für nothwendig, wenn eine Handlung mit gehöriger Energie vollzogen werden soll. Eben deshalb ist es aber als das Organ des Gemüthes anzusehen, denn die Erzeugung von Empfindungen ist nicht die wichtigste Function des Gemüthes, diese besteht vielmehr in der Erzeugung von Trieben

Digitized by Google

und seinem mächtigen Einfluss auf die Muskelthätigkeit, wodurch es die eigentliche Triebfeder alles menschlichen Thuns und Treibens wird.

In allen menschlichen Handlungen können wir, wie bereits erwähnt, ein Zusammenwirken von zwei Factoren unterscheiden, wovon einer den Inhalt, der andere die Form der Handlung bestimmt. Den Inhalt bildet ein denkend vorausgesetzter Zweck, ein gedachter Vorsatz, die Form, d. h. die Art der Ausführung, wird vorzugsweise bedingt durch die gleichzeitigen Gefühle oder Gemüthszustände. Je mehr das Gemüth sich bei einer beschlossenen Handlung betheiligt, desto mehr fühlen wir uns zu ihrer Ausführung getrieben oder davon zurückgehalten; je mehr wir uns für eine Sache interessiren, desto rascher und lebhafter geschehen alle Bewegungen, je mehr wir einen Widerwillen dagegen empfinden, desto langsamer und träger kommen sie zu Stande. Der Gedanke bewirkt, dass die Bewegungen dem Zwecke entsprechen und in der dazu nöthigen Ordnung auf einander folgen; die Energie und Ausdauer, womit dies geschieht, die Raschheit, Lebhaftigkeit, Leichtigkeit, Gewandtheit und Sicherheit der Bewegungen, die sogenannte Coordination derselben ist wesentlich von der Theilnahme des Gemüthes abhängig. Der Geist ist in den Handlungen der Ordinator, das Gemüth der Coordinator (Coefficient), jener ist das leitende, dieses das treibende Princip, der Gedanke, wie ich es vorher ausgedrückt habe, das qualitative, das Gefühl das quantitative Moment in dem Vollziehen der Handlungen.

Ich habe diese Verhältnisse schon vorher besprochen und will hier nur an den Unterschied erinnern, welcher in der Ausführung unserer Handlungen zum Vorschein kommt, je nachdem sie mit Lust oder Unlust, in heiterer oder trüber Stimmung, mit Interesse oder Widerwillen vollzogen werden, an die Wirkungen von Freude

Digitized by Google

und Leid, Zorn und Furcht, an die Beharrlichkeit und Ausdauer, mit welcher der Enthusiasmus für irgend etwas zu energischem Handeln befähigt. Am stärksten tritt dieser Unterschied hervor in den Zuständen von Exaltation oder Depression des Gemüthes, namentlich in den beiden einander entgegengesetzten Hauptformen von Gemüthskrankheit, der Manie und Melancholie. In der Manie geschehen alle Bewegungen rasch, lebhaft, energisch, ungestüm und in den höheren Graden derselben (Tobsucht) bringt der Kranke Tage und Nächte in rastloser, ungestümer und gewaltsamer Thätigkeit zu: in der Melancholie geschehen alle Bewegungen langsam und ohne Energie und in den höchsten Graden (Starrsucht) steigert sich dies zu völliger Unbeweglichkeit.

In der Tobsucht findet keine eigentliche Vermehrung der Muskelkräfte statt, wie man wohl geglaubt hat, sondern nur eine stärkere Anspannung der verschiedenen Kräfte, eine stärkere, als der Wille allein sie hervorzurufen vermag, obgleich er innerhalb gewisser Grenzen die Muskeln schwächer oder stärker in Thätigkeit setzen kann. Das denkende Wollen ist nur ein Factor der Muskelthätigkeit, sollen die Muskeln ihre volle Kraft entfalten, so muss der zweite Factor mitwirken und der Wille den Beistand des Gemüthes in Anspruch nehmen. Dies geschieht auch jedesmal, sobald sich der Ausführung des Willens ein Widerstand entgegenstellt, den er allein nicht überwältigen kann. Es entsteht alsdann in uns ein Gefühl des Unwillens, welches sich bis zum Zorne steigern kann und uns in den Stand setzt, den Widerstand zu überwinden. Jeder Versuch, einen grossen Stein fortzuwälzen, ein schweres Gewicht zu heben, kann uns von dieser Thatsache überzeugen und oft genug haben wir Gelegenheit, zu beobachten, in welchem Grade jede Exaltation des Gemüthes Zorn, Wuth, Verzweiflung eine scheinbare Erhöhung der Muskelkräfte

Digitized by Google

im Gefolge hat. Aehnliches findet auch statt im Gebiete der Moral, wenn wir z. B. durch den Vorsatz nicht dazu gelangen können, einen Fehler abzulegen, so kommt uns der Unwille über die eigene Schwäche zu Hülfe und setzt uns in den Stand, ein Ziel zu erreichen, dessen Erreichung durch den blossen Willen uns unmöglich war.

Die Einwirkung des kleinen Gehirns auf die motorischen Nerven könnte möglicher Weise durch die unteren Kleinhirnschenkel vermittelt werden; wahrscheinlich geschieht dies aber hauptsächlich durch die merkwürdige Verflechtung der Querfasern der Brücke mit den longitudinalen, von dem Linsenkerne und den Grosshirnschenkeln zu den Pyramiden hinabsteigenden Fasern. Die Pyramidenfasern gehen nach ihrer Kreuzung in die Seitenstränge über, von denen ein Theil, wie es scheint, in der Basis des vierten Ventrikels nach vorne und oben verläuft. Die Seitenstränge sind wahrscheinlich ebenso, wie die nur unvollständig von ihnen gesonderten Vorderstränge, wenigstens der Hauptsache nach motorisch (Kinesodisch. *Schiff*). Ob ihre Functionen von denen der Vorderstränge verschieden sind, wird sich erst beurtheilen lassen, wenn man mit Sicherheit weiss, wo und wie beide endigen und wie sie mit dem grossen Gehirne in Verbindung treten. Die Vorderstränge treten, wie ich mit *Burdach* glaube, nicht in die eigentliche Brücke ein, sondern verlaufen als von ihm sogenannte Hülsenstränge oberhalb der Querfasern der Brücke nach dem *corp. striatum* und dem grossen Gehirn zu. Sie scheinen also in keiner Beziehung zu dem kleinen Gehirne zu stehen und es wäre möglich, dass sie zur Ausführung der sogenannten gleichgültigen Handlungen dienten, deren wir tagtäglich eine Menge vollziehen und die durch bewusstes Wollen veranlasst werden, ohne dass eine Theilnahme und Mitwirkung des Gemüthes sich dabei bemerklich macht.

Digitized by Google

6. Aehnlich, wie zu der Muskelthätigkeit, verhält sich das Gemüth zu dem Denken. Die Energie und Ausdauer, die Raschheit und Leichtigkeit des Denkens die Coordination der Gedanken, d. h. die logische Aufeinanderfolge, die richtige und naturgemässe Association der Ideen wird mehr oder weniger durch die vorhandene Gemüthsstimmung bedingt. Interesse für den Gegenstand des Denkens, eine heitere, mässig exaltirte Gemüthsstimmung fördern die Gedankenentwickelung eben so sehr, wie Gleichgültigkeit, Abneigung und Widerwille, eine trübe und deprimirte Gemüthsstimmung sie erschweren und verhindern. In Zuständen der Begeisterung und des Enthusiasmus fliessen die Gedanken dem Redner in ununterbrochenem Strome zu; in krankhafter Exaltation geschieht dies so schnell und in so raschem Wechsel, dass sie sich überstürzen, dass der nachfolgende Gedanke seinen Vorgänger verdrängt, ehe er innerlich in Worte gefasst oder ausgesprochen worden ist. Die Folge davon ist die sogenannte Incohärenz der Gedanken und Worte, welche das Delirium charakterisirt und in ihren höchsten Graden als Ideenjagd oder Ideenflucht auftritt. Andrerseits sind langsame und träge Entwicklung und momentane Stockungen der Gedanken die gewöhnlichen Begleiter deprimirender Gemüthsaffecte, der Verlegenheit, der Traurigkeit, der Schwermuth, in deren höheren Graden (Starrsucht) mit der Unbeweglichkeit des Körpers ein völliger Stillstand der Gedanken sich verbindet. Auch der oft unwiderstehliche Trieb zum lauten Aussprechen der Gedanken, so wie umgekehrt das Verschliessen der Gedanken in sich bis zu völligem Verstummen treten als Folgen und Wirkungen entgegengesetzter Gemüthszustände auf.

Ausserdem geben die verschiedenen Gemüthsstimmungen den Gedanken eine besondere Richtung und Färbung. Wie es in dem bekannten Liede heisst: „gries-

Digitized by Google

gram sieht Alles grau", so verhält es sich wirklich. Dem Heiteren, Fröhlichen, Exaltirten erscheint Alles leicht, heiter, wie in rosenfarbenem Lichte und in seiner Erinnerung reihen sich freundliche und angenehme Bilder an einander. Der Traurige, Betrübte und Deprimirte erblickt dagegen Alles in einem trüben und düsteren Lichte und die schmerzlichen Erinnerungen seines Lebens machen sich vorzugsweise in seiner Erinnerung geltend. Melancholische behaupten nicht selten, niemals einen frohen Augenblick gehabt zu haben, ihr ganzes Leben erscheint ihnen manchmal nur als eine ununterbrochene Kette von Unglück und Elend. Oft werden auch durch besondere Gefühle einzelne bestimmte Gedanken angeregt und bei stärkeren Gemüthsaffecten drängen sich diese mit unwiderstehlicher Gewalt dem Bewusstsein auf, so dass sie selbst dann sich nicht verscheuchen lassen, wenn sie als verkehrt, unbegründet und thöricht erkannt werden. Die fixen Ideen von Verarmung und bevorstehendem Verhungern, von eigener Schlechtigkeit und Sündhaftigkeit wurzeln in deprimirter Gemüthsstimmung, und aus begleitendem Misstrauen erwächst manchmal ein Verfolgungswahn, welcher jedoch häufiger in Sinnestäuschungen (Hallucinationen) begründet ist.

Ihrerseits wirken die Gedanken auch auf das Gemüth ein, aber mit geringerer Macht. Durch Vorstellungen können entsprechende Gefühle angeregt werden, aber dies geschieht besonders nur dann, wenn sie sich auf unser Ich oder auf Gegenstände beziehen, die für uns ein specielles Interesse haben. Wir können viel Trauriges hören oder lesen, ohne dass es uns sonderlich betrübt, viel Erfreuliches, ohne dass wir dadurch besonders erfreut werden und alle Bemühungen, eine trübe Stimmung durch Hervorrufen heiterer Vorstellungen und Bilder zu beseitigen, bleiben in der Regel fruchtlos.

Digitized by Google

Wohl können Mitleid und Mitfreude durch Worte und Vorstellungen erweckt werden, aber in bedeutendem Grade geschieht dies selten und wenn ein Redner das Mitgefühl stärker zu erregen, wenn ein Prediger die ganze Gemeinde zu rühren vermag, so wird dies weit mehr durch den Ton und Ausdruck seiner Stimme bewirkt, als durch die mitgetheilten Worte und die im Bewusstsein der Zuhörer erweckten Gedanken.

Die Wechselwirkung zwischen Gefühlen und Gedanken wird wahrscheinlich vermittelt durch die oberen Kleinhirnschenkel oder Bindearme, welche ich schon vorher mit einem inneren Auge verglichen habe. Alles, was in dem kleinen Gehirne vorgeht, wird dadurch zum grossen Gehirne fortgeleitet, zum Bewusstsein gebracht, gleichsam geistig angeschaut und in Gedanken umgewandelt. In den Bindearmen werden, wie in den Sehnerven, die centrepital zum Bewusstsein leitenden Fasern überwiegen und die Gefühle dadurch einen überwiegenden Einfluss auf die Gedanken ausüben; allein ebenso wie in den Sehnerven werden wohl auch in den Bindearmen centrifugal leitende Fasern existiren. Vermittelst dieser Fasern steigert die Aufmerksamkeit die Empfänglichkeit der *Retina* für sichtbare Eindrücke, durch sie ist das Gehirn im Stande, sichtbare Bilder (Visionen) zu erzeugen. In derselben Weise vermitteln, wie ich glaube, die centrifugalen Fasern des Bindearmes die Steigerung der Gemüthseindrücke durch Aufmerksamkeit und auf demselben Wege werden durch Vorstellungen bestimmte Gefühle und Gemüthsbewegungen in uns hervorgerufen.

7. Vermöge seines mächtigen Einflusses auf das Denken muss das Gemüth auch auf das Wollen in nicht unbedeutendem Maasse einwirken. In der That sehen wir auch sehr oft Entschlossenheit oder Unentschlossenheit aus entgegengesetzten Gemüthszuständen hervorgehen. Verzagtheit und eine, bisweilen bis auf die ge-

Digitized by Google

ringfügigsten Handlungen sich ausdehnende Unschlüssigkeit gehören zu den charakteristischen Symptomen der Melancholie, während exaltirte Zustände mit rücksichtsloser Dreistigkeit, Unternehmungsgeist und Projectmacherei verbunden zu sein pflegen. Auch hier erscheint der directe Einfluss des Gemüthes auf das Wollen mächtiger, als das Umgekehrte. Auf directem Wege vermag das bewusste Wollen in der Regel nur in sehr geringem Maasse die Gefühle zu beherrschen, sie hervorzurufen, zu verändern oder zu beseitigen, wenn gleich verschiedene Menschen in verschiedenem Grade dazu befähigt sind. Auf indirectem Wege kann dagegen das Denken und Wollen eine Herrschaft über die Gefühle sich aneignen und behaupten. Während nämlich die Gefühle und Gemüthsbewegungen die Muskelthätigkeit in höherem Grade anregen können, als das bewusste Wollen es vermag, hat dieses eine überwiegende hemmende Macht über die Muskelthätigkeit und die Handlungen. Jede Handlung, wozu das Gemüth uns antreibt, können wir unterlassen, sobald wir sie als thöricht, unzweckmässig oder unrecht erkennen, und selbst im Momente der Ausführung können wir den stärksten Trieben widerstehen und die schon begonnenen Bewegungen plötzlich hemmen und unterdrücken. Auf diesem Wege können wir uns sogar von vorherrschenden Stimmungen und Leidenschaften befreien; denn jedes vorherrschende Gefühl erstirbt früher oder später, gleichsam aus Mangel an Nahrung, wenn jede Aeusserung desselben beherrscht, unterdrückt und verhindert wird.

Allen irgend bedeutenden Handlungen geht in der Regel eine Wechselwirkung zwischen Gedanken und Gefühlen vorher, welcher oft als ein Widerstreit oder als ein innerer Kampf zwischen beiden erscheint, und wobei bald der gedachte Vorsatz, bald der aus dem Gemüthe hervorgehende Trieb den Sieg davonträgt, der

Digitized by Google

Sieger aber schliesslich den Besiegten zur Mitwirkung bei der Ausführung der Handlung nöthiget. Wenn wir nach einem solchen inneren Kampfe einen Entschluss fassen, so entsteht in demselben Augenblicke, in welchem wir zu uns selber sagen: „ich will es“, ein eigenthümliches Gefühl in uns, welches die Ausführung der Handlung wesentlich fördert. In demselben Augenblicke wird es uns leicht, die beschlossene Handlung zu vollziehen, soll sie aber erst später ausgeführt werden, so wird dies uns oft schwer, weil wir wohl denselben Gedanken nach Belieben in uns reproduciren können, aber nicht dasselbe Gefühl, welches den Entschluss bei seinem ersten Entstehen begleitete. Unsere besten Vorsätze bleiben aus diesem Grunde oft unausgeführt.

Versuchen wir, die Wege nachzuweisen, auf welchen diese Wirkungen und Gegenwirkungen zu Stande kommen, so muss ich zunächst daran erinnern, dass ich Faserzüge gefunden zu haben glaube, welche von den Hirnschenkeln oder von den Linsenkernen aus zwar in die Brücke eintreten, aber sie nicht durchsetzen, sondern innerhalb der Brücke sich nach aussen umbiegen und mit den Querfasern sich in das kleine Gehirn fortsetzen. Die Stärke dieser Faserzüge fand ich in verschiedenen Gehirnen sehr verschieden und es wäre möglich, dass die directe Einwirkung des Wollens auf die Gefühle, welche ebenfalls bei verschiedenen Individuen bald stärker, bald schwächer ist, an diese Fasern gebunden und von ihnen abhängig wäre. Die Einwirkung der Gefühle auf den Willen möchte ich den Bindearmen zuschreiben, da sie durch sich aufdrängende, aus Gefühlen entspringende Gedanken vermittelt wird. Wenn endlich jeder Entschluss bei seinem Entstehen von einem bestimmten Gefühle begleitet wird, so möchte ich dies aus der innigen Verbindung der Querfasern der Brücke mit den von den Linsenkernen und den Grosshirnschenkeln zu den Pyra-

Digitized by Google

miden herabsteigenden longitudinalen Fasern ableiten. Diese innige Verbindung der Längs- und Queerfasern innerhalb der Brücke scheint es auch unmöglich zu machen, dass ein Willensact zur Ausführung gebracht werden könne (abgesehen von ganz gleichgültigen und instinktartigen Handlungen) ohne zugleich das kleine Gehirn zu afficiren und das Gemüth zur Mitwirkung bei der Vollziehung der Handlung aufzufordern.

Welchen Werth die verschiedenen hier ausgesprochenen Ideen haben dürften, will ich der Beurtheilung Anderer überlassen, mögen weitere Untersuchungen sie bestätigen oder widerlegen. Manches mag wohl darin irrthümlich sein; die Hypothese jedoch, dass das kleine Gehirn in dem angegebenen Sinne des Wortes das Organ des Gemüthes sei, glaube ich hinreichend begründet und gerechtfertiget zu haben. Von manchen Physiologen, namentlich auch von *R. Wagner* ist das kleine Gehirn als das Organ des Willens angesprochen, und man hat sich dabei auf das Zeugniss von *E. Huschke* berufen, demzufolge das kleine Gehirn bei Männern im Verhältniss zum grossen Gehirn schwerer sein soll, als bei Frauen. Ich will es dahin gestellt sein lassen, ob die Männer wirklich einen stärkeren Willen haben, als die Frauen, ich will auch nicht darauf zurückkommen, dass ein selbstständiger, von dem Denken und Fühlen unabhängiger Wille meiner Meinung nach gar nicht existirt, aber ich kann mich nicht enthalten, über das Werk von *Huschke* (Schädel, Hirn und Seele des Menschen und der Thiere nach Geschlecht und Raçe. Jena 1854), welches ich bei seinem Erscheinen sorgfältig studirt habe, einige Bemerkungen dieser Abhandlung hinzuzufügen.

Das Werk enthält eine Menge tabellarisch zusammengestellter Messungen und Wägungen von Schädeln und Gehirnen, so wie von einzelnen Theilen derselben, welche an Menschen von verschiedenem Geschlecht,

Digitized by Google

Alter und Raçe und an Thieren vorgenommen sind; allein die daraus abgeleiteten Resultate stimmen mit dem Beobachteten so wenig überein, dass man sich nie darauf verlassen kann. Ueberdies finden sich in den überall angegebenen procentischen Verhältnissen eine Menge von Rechnungsfehlern, welche grösstentheils in den Decimalen, aber auch in ganzen Zahlen vorkommen und gegen die Zuverlässigkeit aller Zahlen misstrauisch machen.

Das Gewichtsverhältniss des kleinen Gehirns habe ich nach den von *Huschke* darüber mitgetheilten Tabellen unter vorgängiger Berichtigung der Rechnungsfehler einer genauen Berechnung unterworfen. Auf einer Tabelle (S. 69) ist das procentische Verhältniss des grossen und kleinen Gehirnes von 172 Männern und 124 Weibern, also zusammen 296 Individuen (206 ist ein Druckfehler) nach *Parchappe*, *Reid*, *Peacock* und *Huschke* zusammengestellt. Das nach dieser Tabelle berechnete Durchschnittsgewicht ergab ein procentisches Gewichtsverhältniss des kleinen zum grossen Gehirn:

bei den Männern = 12,43 : 87,57,
bei den Weibern = 12,62 : 87,38.

In einer 2ten Tabelle (S. 70) hat *Huschke* die procentischen Verhältnisse seiner eigenen Wägungen angegeben. Die Berechnung giebt ein durchschnittliches Verhältniss des kleinen zum grossen Hirn:

bei den Männern = 12,54 : 87,46,
bei den Weibern = 12,64 : 87,36.

In den Tabellen worin die einzelnen Wägungen von *Huschke* speciell verzeichnet sind (S. 113—118) finden sich in den angegebenen procentischen Verhältnissen 4 Rechnungsfehler in den ganzen Zahlen und 21 in den Decimalen. Lässt man 9 Fälle unberücksichtiget, in denen die *Pia mater* vorher abgezogen war, so findet man bei genauer Berechnung bei einer Anzahl von 33

Digitized by Google

männlichen und 20 weiblichen Gehirnen das Verhältniss des kleinen zum grossen Gehirn im Durchschnitt:

bei den Männern = 12,61 : 87,39,
bei den Weibern = 12,60 : 87,40.

Der ganze Unterschied reducirt sich also auf 0,01 pCt.

In den bisherigen Angaben war das kleine Gehirn dicht oberhalb der Brücke abgetrennt, die Medulla oblongata aber mit gewogen. Huschke giebt auch noch eine Zusammenstellung der von ihm selbst und Reid vorgenommenen Wägungen, wobei die *Medulla oblongata* entfernt war, und welche er auf Procente berechnet hat (S. 75). Die Wägungen geschahen im Ganzen an 128 männlichen und 96 weiblichen Gehirnen, die procentischen Verhältnisse sind in der Tabelle nach 10jährigen Altersstufen angegeben. Als Resultat der speciellen Angaben ergiebt sich im Durchschnitt ein Verhältniss des kleinen zum grossen Gehirne:

bei den Männern = 10,53 : 89,47,
bei den Weibern = 10,48 : 89,52.

Lässt man alle Individuen unter 20 Jahren unberücksichtigt, so findet man bei 94 Männern und 65 Weibern das procentische Verhältniss:

bei den Männern = 10,94 : 89,06,
bei den Weibern = 10,91 : 89,09.

Aus allen diesen Berechnungen lässt sich nur schliessen, dass in dem Gewichtsverhältniss des kleinen und grossen Gehirns bei beiden Geschlechtern kein allgemeiner und wesentlicher Unterschied existirt. Nach den ersten Tabellen würde das weibliche Gehirn sogar noch um 0,19 und 0,10 pCt. prävaliren und dies könnte ich für meine Ansicht geltend machen, denn dass das Gemüth bei den Frauen vorherrschender entwickelt ist, als bei den Männern, ist wohl nicht zu bezweifeln.

Bei physiologischen Untersuchungen über die Wirkungen des Gemüthes müsste der mächtige Einfluss des-

Digitized by Google

selben auf die Bewegungen des Herzens und den Kreislauf des Blutes noch besonders in Betracht gezogen werden. Jede Gemüthsbewegung reflectirt sich bekanntlich auf das Herz und erweckt die täuschende Empfindung, als ob das Herz ihr Sitz und Ausgangspunkt sei. Ebenso bekannt ist es, dass der sogenannte *Turgor vitalis* und die Energie der Blutbewegung in den äusseren Körpertheilen durch freudige und erhebende Gemüthsaffecte vermehrt, durch betrübende und deprimirende Affecte vermindert werden. Exaltirte Gemüthszustände pflegen mit Congestionen zum Kopfe verbunden zu sein, deprimirte mit Anhäufung des Blutes in der Brust und im Unterleibe und Kälte der Extremitäten. Gemüthsaffecte können folglich sowohl Hyperämie als Anämie des Gehirns erzeugen und es ist fraglich, ob die in Folge einer Exaltation des Gemüthes eintretende rasche Gedankenentwicklung directe Folge eines Nerveneinflusses ist oder die indirecte Folge einer unmittelbaren Einwirkung des Gemüthes auf die Circulation des Blutes. Da die Nerven sehr bald ihre Lebensfähigkeit verlieren, wenn sie der Zufuhr des arteriellen Blutes beraubt werden, so müssen wir annehmen, dass nicht bloss Hyperämie und Anämie, sondern auch die Beschaffenheit des Blutes auf die Functionen des kleinen und grossen Gehirnes einen bedeutenden Einfluss ausüben werde, und es könnte z. B. der Unterschied in der Stimmung bei Lungenschwindsüchtigen und Unterleibskranken vielleicht aus dieser Quelle abgeleitet werden. Die nähere Untersuchung und Erörterung dieser Verhältnisse müssen jedoch den Physiologen vom Fach überlassen werden.

Dagegen will ich noch eines Umstandes erwähnen, der mir bei Versuchen, die Functionen des kleinen Gehirnes durch Vivisectionen zu erforschen, sehr beachtungswerth erscheint. Wer blind geboren ist, in dessen Bewusstsein entstehen keine Bilder sichtbarer Dinge; wer

Digitized by Google

aber erst in späteren Jahren erblindet, der behält die früher durch das Auge ihm zugeführten Bilder in sich, und sie können trotz des mangelnden Gesichtes in der Erinnerung wieder hervortreten. Mit den Gemüthseindrücken dürfte es sich ebenso verhalten. Die meiner Ansicht nach im kleinen Gehirn entspringenden Gemüthsbewegungen werden eben so, wie die von dem Auge aufgenommenen sichtbaren Bilder dem grossen Gehirne zugeführt, kommen zum Bewusstsein und bleiben mehr oder weniger in demselben haften, so dass sie ohne Mitwirkung des kleinen Gehirnes in der Erinnerung reproducirt werden können. Ist dies richtig, so würde es nicht absolut gegen die vorgetragene Ansicht sprechen, wenn man bei Thieren nach Wegnahme des kleinen Gehirns noch Erscheinungen hervorrufen könnte, welche auf Gemüthsbewegungen hindeuteten.

Die Deutung der bei Vivisectionen beobachteten Erscheinungen ist überhaupt schwierig und erfordert grosse Umsicht und Berücksichtigung aller Umstände. Weit eher, glaube ich, dürfte man durch anatomische Untersuchungen zum Ziele kommen und es ist sehr zu beklagen, dass man in neuerer Zeit fast nur mikroskopische Forschungen anstellt und es ganz unterlassen hat, den Verlauf der Gehirn- und Rückenmarkfasern nach der sogenannten *Reil*'schen Methode weiter zu untersuchen. Nach früheren Erfahrungen bin ich davon überzeugt, dass man durch Beharrlichkeit und Ausdauer auf diesem Wege zu befriedigenden Ansichten über den Verlauf der verschiedenen Faserzüge, Bündel und Schichten der nervösen Centralorgane gelangen könnte. Bei der Verfolgung der Faserzüge kann man allerdings sich leicht irren, namentlich durch die häufigen Kreuzungen auf falsche Bahnen geleitet werden; wenn man aber sorgfältig präparirt und in einer hinreichenden Anzahl von Gehirnen dieselben Faserzüge verfolgt, so wird man den

Digitized by Google

Irrthum in der Regel entdecken. Mikroskopische Untersuchungen würden alsdann zur Bestätigung oder Widerlegung jeder gewonnenen Ansicht führen können. Durch zweckmässige Verbindung beider Methoden wäre gewiss Manches zu erreichen, was auf einem oder dem anderen Wege allein unerreichbar ist, und bei einer genügenden Kenntniss des Verlaufes und der Verbinduugen der besonderen Faserzüge dürfte die Ermittelung ihrer physiologischen Bedeutung keine unüberwindliche Schwierigkeiten darbieten.

Digitized by Google

Untersuchungen über das specifische Hirngewicht bei Geisteskranken.

Von

Dr. **W. Nasse.**

Das specifische Hirngewicht bei Irren hat während einer Reihe von Jahren den Gegenstand meiner Untersuchung gebildet, und ich habe bereits in der psychiatrischen Section der Naturforscher-Versammlung zu Speyer (1861) das theilweise Resultat derselben (s. davon einen Auszug in dieser Zeitschrift, Band XVIII., S. 863) mitgetheilt.

Seitdem habe ich diese Untersuchungen zwar noch einige Jahre fortgesetzt, bin aber in den letzten Jahren durch vermehrte anderweitige Berufsarbeit zu meinem Bedauern genöthigt gewesen, die zeitraubenden Wägungen einstweilen aufzugeben. Wenn es mir darum auch nicht gelungen ist, die angefangenen Untersuchungen über ein so grosses Material, wie ich es mir vorgenommen, auszudehnen, so bestimmt mich zu deren jetziger Veröffentlichung doch der Umstand, dass in den letzten Jahren auch deutsche Forscher diesen Gegenstand, und zwar nach derselben Methode, welche ich eingeschlagen hatte, zu bearbeiten begonnen haben, während im vorigen Decennium nur von englischen Aerzten, die sich eines verschiedenen und unzuverlässigen Verfahrens be-

Digitized by

dienten, umfassendere Mittheilungen über das specifische Hirngewicht gebracht worden waren.

Die frühere Kenntniss von dem specifischen Hirngewicht beschränkt sich auf vereinzelte Angaben, die in der Literatur zerstreut gefunden werden*); erst im Jahre 1852 trat *Bucknill* (Lancet 1852, II. S. 26) mit einer Reihe von Untersuchungen des specifischen Hirngewichts an Geisteskranken auf, welche er 1855 (British Review, Januar 1855) durch weitere vergleichende Beobachtungen an Gesunden und Irren vervollständigte. Sein Verfahren bestand darin, dass er Gehirnstücke in eine Lösung von schwefelsauren Salzen von genügender Dichtigkeit brachte, um jene darin schwimmend zu erhalten, und aus der Messung der Dichtigkeit dieser Lösung durch den Araeometer das specifische Gewicht des Gehirns bestimmte. Es hat schon *Erlenmeyer* auf der Göttinger Naturforscher-Versammlung 1854 (s. dessen psych. Correspondenzblatt 1854, Nr. 8) auf die grosse, wesentlich auf der raschen Resorptionsfähigkeit des Gehirns beruhende Unzuverlässigkeit dieses Verfahrens aufmerksam gemacht, und eigene Versuche haben mich gelehrt, dass die auf diese Weise ermittelten Gewichte gar keinen absoluten, sondern höchstens, wenn sie von einer und derselben Hand bestimmt waren, einen relativen Werth beanspruchen können.

Nach der *Bucknill*'schen Methode hat auch *Aitken* (Glasgow med. Journal 1853. I.) einige Untersuchungen an Geistesgesunden engestellt. In demselben Jahre veröffentlichte *Sankey* (Brit. med. chir. Review, Jan. 1853) eine grössere Reihe von Untersuchungen des specifischen

*) *Burdach* z. B. (vom Baue und Leben des Gehirns II. 6.) gibt das normale specifische Hirngewicht auf 1,031 an; *Claus* (med. Correspondenzblatt rhein. Aerzte, 1842. S. 19) auf 1,036—1,040, bei Gehirntyphus auf 1,047—1,050.

Digitized by Google

Hirngewichts in verschiedenen Krankheiten. Auch er bediente sich einer ganz ähnlichen Methode der Dichtigkeitsbestimmung, nur dass er statt des schwefelsauren gewöhnliches Salz anwendete, und den interessanten Resultaten seiner zahlreichen Beobachtungen (73 Fälle) wird aus gleichem Grunde nur eine relative Bedeutung zuzuerkennen sein. Dasselbe gilt von den Mittheilungen von *Skae* (Psycholog. Journal 1854, Jan.), der das *Sankey*'sche Verfahren anwandte. *Peacock* war unter seinen Landsleuten der erste, der eine andere Methode gebrauchte, indem er das Gehirn zuerst frei und dann in destillirtem Wasser wog und aus dem Gewichtsverlust des Gehirns im Wasser seine specifische Dichtigkeit berechnete. Seine Untersuchungen (mitgetheilt in Patholog. Transactions, Vol. XII. 1860—61) erstrecken sich hauptsächlich auf nicht gehirnkranke Individuen. Im Jahre 1861 habe ich selbst die mittelst Anwendung des Pyknometers gewonnenen Ergebnisse meiner seit mehreren Jahren angestellten Wägungen von Irren mitgetheilt. Seitdem erschien Anfang 1866 eine ausführliche Arbeit (11 Fälle von Irren, 29 von Geistesgesunden) von *Bastian* (Journ. of ment. science. Jan. 1866) über das specifische Gewicht verschiedener Hirntheile, der wieder die Wägung in Salzwasserlösung nach *Bucknill* anwandte. *Krause* und *Fischer* haben in demselben Jahre (Zeitschrift f. ration. Med. 1866. XXVI. Heft 3) neue specifische Gewichtsbestimmungen, die sie unter Anwendung des Pyknometers vorgenommen, veröffentlicht und die physikalischen Vortheile dieser Methode genau auseinander gesetzt. Während sich ihre Untersuchungen nur auf eine geringe Zahl von Kranken, vorwiegend mit gesundem Gehirn, erstreckten, hat *Engel* nach ihrer Methode eine grössere Zahl von Wägungen mit besonderer Rücksicht auf Lebensalter und Krankheitsdauer in ver-

Digitized by Google

schiedenen Krankheiten im Jahre 1867 veröffentlicht (Med. Jahrb. XIII. p. 101—108).

Es ergibt sich schon aus dieser kurzen historischen Darstellung, dass wesentlich zwei Methoden (Dichtigkeitsbestimmung durch den Araeometer in Salzwasserlösungen und Wägung durch den Pyknometer, die erstere hauptsächlich von englischen, die letztere von deutschen Forschern) zur Bestimmung des specifischen Hirngewichts in Anwendung gezogen worden sind. Ausserdem haben zwar *Erlenmeyer* und *Vix* noch andere Verfahrungsweisen zu gleichem Zwecke angegeben, ohne dass jedoch über deren practische Verwerthung weitere Mittheilungen erfolgt sind. Der erstere hat einen Apparat beschrieben, mittelst dessen es gelingen soll, die Menge des durch das Gehirn verdrängten Wassers an einer Scala abzulesen und so den Process des Wägens durch die einfachere Volumensbestimmung zu ersetzen (Psych. Correspondenzblatt 1856, S. 20). *Vix* hat ein ähnliches Verfahren in der Naturforscher-Versammlung zu Speyer im Jahre 1861 unter Demonstrirung eines Apparats vorgeschlagen (s. diese Zeitschrift, Bd. XVIII. S. 870), sich aber weitere Veröffentlichung der Methode und der gewonnenen Ergebnisse damals vorbehalten (was meines Wissens bisher nicht geschehen).

Der Mangel eigener Erfahrung erlaubt mir kein vollständiges Urtheil über diese letzteren Verfahrungsweisen; es scheint mir indessen zweifelhaft, ob dadurch die gewöhnlichen Fehlerquellen (rasches Einsaugen von Wasser*)

*) Nach *Marcé* (Journ. de physiol. III. 9. 1860, Auszug in *Schmidt's* Jahrbüch. 107, 153) vermag die Gehirnsubstanz bis zu 50 pCt. ihres Gewichtes an Wasser zu absorbiren, und von ihrer grossen Einsaugungsfähigkeit kann man sich durch Versuche leicht überzeugen, so dass die Angabe von *Bastian* (a. a. O. p. 477), der auch nach einem Aufenthalt der Gehirnsubstanz von 30 Minuten im Wasser keine Gewichtsveränderungen beobachtet haben will, höchst auffallend erscheinen muss.

Digitized by Google

und Anhängen von Luftbläschen an die zu wägenden Gehirntheile) besser vermieden werden, als durch die von mir angewandte Methode. Wenn nun auch die physikalischen Vortheile dieser Methode durch *Krause* und *Fischer* eingehend dargelegt worden sind, so glaube ich doch, da ich unabhängig von ihnen schon seit der Mitte der 50ger Jahre darnach gearbeitet habe, das Verfahren, durch welches ich zu den mitzutheilenden Resultaten gekommen bin, um so mehr mit kurzen Worten beschreiben zu müssen, als sich nur darnach die Zuverlässigkeit der Ergebnisse beurtheilen lässt und etwaige einzelne kleine Abweichungen dadurch zu Tage treten werden.

Ich habe mich eines Glasgefässes mit weiter Oeffnung und geschliffenen Rändern bedient, welches durch eine darauf passende Glasplatte sich dicht schliessen lässt und ungefähr 37 Gramm destillirtes Wasser fassen kann und dessen Gewicht, so wohl leer als mit destillirtem Wasser gefüllt, genau bestimmt ist. Auf einer *Liebich*schen Standwage (die bei 100 Gramm Belastung noch ein Milligramm anzeigte) wurde in dem leeren, aber geschlossenen Glase zunächst das absolute Gewicht des zu untersuchenden Hirnstückes festgestellt, dann das Gefäss mit destillirtem Wasser von 15° R. gefüllt, mit der Glasplatte sofort geschlossen und das Hirnstück mit dem destillirten Wasser wiederum gewogen. Die Berechnung geschieht in üblicher Weise so, dass die gefundene Gewichtszunahme des Glases (mit Wasser und Gehirn) von dem absoluten Gewicht des zu wägenden Hirnstückes abgezogen wird, und durch die Proportion, dass sich der so gefundene Werth zu dem absoluten Gewicht des Gehirns, wie das specifische Gewicht des destillirten Wassers zu dem zu suchenden des Gehirns verhalte, das specifische Hirngewicht ermittelt. Der Vortheil dieses Verfahrens scheint mir darin zu bestehen, dass erstens

Digitized by Google

durch das Wiegen des zur Wägung bestimmten Gehirnstückes in einem geschlossenen Gefässe die durch die rasche Verdunstung entstehende Fehlerquelle vermieden und zweitens von dem Augenblicke an, wo das Gefäss nach dem Zugiessen des destillirten Wassers luftdicht geschlossen wird, jede weitere Gewichtsveränderung des Gehirns unmöglich gemacht wird. Das Gehirn verändert nämlich, auf einer offenen Schale gewogen, sein Gewicht ungemein rasch (schon innerhalb 30 Secunden ist diese Aenderung sehr merklich), und es kommt weiter sehr viel darauf an, da die Einsaugung von Wasser bekanntlich sehr schnell vor sich geht, die Füllung des Gefässes mit Wasser und die Entfernung der bei derselben sich an die Hirnsubstanz ansetzenden oder auch zwischen derselben gelagerten kleinen Luftbläschen durch Schütteln möglichst rasch zu bewirken. Dieses Ansetzen geschieht besonders bei dem Abwägen der Rindensubstanz, welche sich nur in feinen Scheiben vom Gehirn abschaben lässt, zwischen denen sich gerne Luftbläschen einlagern. Als weitere nothwendige Cautelen haben sich mir folgende Regeln ergeben:

1. Nur stets möglichst gleiche Volumina des Gehirns zum Wägen zu wählen (bei meinen Wägungen nahm ich bei einem Gesammtgewichte des mit Wasser gefüllten Glases von circa 90 Gramm. nicht unter 4 bis 5 Gramm.).

2. Für den Zweck vergleichender Wägungen stets die zu untersuchenden Stücke aus den gleichen Hirntheilen zu entnehmen (ich habe für das Grosshirn den vorderen Lappen, für das Rückenmark den Brusttheil gewählt, natürlich stets mit Entfernung der Häute).

3. Zwischen Section und Wägung stets eine möglichst gleiche Zeitfrist einzuhalten und das Gehirn in dieser Zwischenzeit unter stets gleichen äusseren Bedingungen, namentlich gleicher Temperatur aufzubewah-

Digitized by Google

ren*) (wegen der raschen Aenderung seines Feuchtigkeitsgrades durch Verdunstung). Ich habe die Wägungen stets 3 Stunden nach der Herausnahme des Gehirns angestellt und bis dahin die zur Untersuchung bestimmten Hirntheile in einem im Souterrain gelegenen kühlen Locale aufbewahrt**).

4. Wenn verschiedene Hirntheile gewogen werden, dabei stets dieselbe Reihenfolge zu beachten.

Ich glaube diese Details erwähnen zu dürfen, weil die nicht gehörige Beachtung derselben die Genauigkeit und Zuverlässigkeit meiner Wägungen in den ersten Jahren merklich beeinträchtigt hat, so dass ich die damals gewonnenen grösseren Zahlenreihen als unsicher verloren zu geben mich veranlasst sah und erst unter Befolgung jener Cautelen und mit Hülfe einer feineren Wage zu einer gleichmässigen und sicheren Praxis gelangte.

Aus diesem Grunde sowohl als, weil ich als Anstaltsarzt bei weitem nicht im Stande war, alles vorkommende Material zu verwerthen, da die Zeit erfordernde und immer zu gleicher Zeit nach der Obduction vorzunehmende Untersuchung nicht unterbrochen werden darf, ist die Beobachtungsreihe, die ich als Beitrag zu der Kenntniss vom specifischen Hirngewicht bieten kann, auch eine verhältnissmässig nur geringe geblieben; ich habe nur in 51 Fällen, die sämmtlich Geistesgestörte

*) Es lässt sich zwar nicht erreichen, dass das Gehirn selbst, namentlich in Wintszeit, stets denselben Wärmegrad wie das destillirte Wasser (15°) besitzt; der durch diese Ungleichheit hervorgebrachte Einfluss kann aber nur ein höchst geringer sein, und es ist mir nicht gelungen, denselben auf der Wage nachweisen zu können.

**) Eine Correspondenz der Abnahme der Dichtigkeit der grauen Substanz mit der längeren Zeitdauer, die zwischen Tod und Section gelegen (*Sankey*), habe ich übrigens bei meinen Untersuchungen nicht feststellen können.

Digitized by Google

betrafen, vollständige Untersuchungen anstellen können, bemerke jedoch, in so fern die Sicherheit solcher Untersuchungen nur gewinnen kann, wenn sie von Einer Hand geschehen, dass dieselben sämmtlich von mir allein ausgeführt worden sind.

Ich lasse nun die Tabellen über die untersuchten 51 Fälle aus den Jahren 1858—63 folgen und werde dann deren Ergebnisse im Einzelnen unter Berücksichtigung der von anderen Forschern gefundenen Resultate besprechen.

Digitized by Google

A. Männer.

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter. Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd.	Schädelumfang. Cm.	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Unz.	Kleines Hirn. Unz	Med. obl. mit Pons. Unz.	Specifisches Grosshirn. vorderer Lappen	Klein-Hirn.	Rückenmark.	Gr Ma sta
1.	30	45	65¼	129	56½	50⅛	4⅛	—	1046,0	1050,36	1037,26	104
2.	28	45	64	106	56	43⅜	5½	—	1035,05	1045,19	1029,62	103
3.	36	42	65½	130	58	42⅛	5 1/16	—	1045,36	1045,48	1033,50	104
4.	36	50	67⅛	110	55	49¼	5½	—	1039,39	1043,43	1032,67	105

Digitized by Google

A. Männer.

…icht. …irn. …inden-sub-stanz.	Krankheitsdauer. Jahre	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychische Krankheitsform und Bemerkungen.
…041,48	23	Verdickung der Hirnhäute, Hyperämie der Marksubstanz.	In Lungen zum Theil alte, z. Th. frische Hepatisation, Herzhypertrophie mit *stenosis valv. mitralis*; Fettleber mit beginnender Granulation, im Dünndarm diphtheritisches Exsudat.	Verrücktheit.
…29,61	2½	An *Basis cranii* kleine Exostosen und diesen entsprechend erweichte Hirnstellen; Verdickung der Häute, Atrophie der Rinden-, Oedem der Marksubstanz, *Hydrocephalus externus* und *internus* (120 Ccm.); eine haselnussgrosse apoplectische Cyste im vordern linken Hirnlappen.	Rückenmark atrophisch; — tuberculöse Infiltration der Lungen in Erweichung, in einem Lappen frische Hepatisation. Im Dünndarm tuberculöse Geschwüre; Muskatnussleber.	Paralytischer Blödsinn.
…,71	7	Häute verdickt, starker *Hydrocephalus ext.* und *intern.*, Rindensubstanz atrophisch, erweicht, aneurysmatische Gefässerweiterung in beiden Substanzen; Hirnarterien atheromatös, im mittleren Lappen der linken Hemisphäre eine Cyste, bis zum äussern Theile des *Corp. striat.* an die Oberfläche des Gehirns reichend; eine kleine Cyste in linker Seite des *Pons*.	Frische lobuläre Hepatisationen in den Lungen; Atherom der *Aorta*.	Blödsinn mit Epilepsie.
…,50	¾	Erweichung der Rinden-, Oedem der Marksubstanz, mässiger Serumgehalt.	Rückenmark atrophisch, auf weichen Häuten fasserstoffiges Exsudat; Durchlöcherung des Magens am *Pylorus* durch ein rundes Ge-	Paralytischer Blödsinn.

Digitized by Google

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter. Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd.	Schädelumfang. Cm.	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Unz.	Kleines Hirn. Unz	Med. obl. mit Pons. Unz.	Specifisches Ge- Grosshirn. vorderer Lappen.	Klein-Hirn.	Rückenmark.	Gross- Mark-substanz.
5.	24	75	61	83	—	42⅝	4½	—	1037,69	1040,43	1029,88	1041,6
6.	30	35	67¼	99	56½	47⅛	5 1/16	—	1043,57	1048,38	1028,43	1048,2
7.	21	41	65	96	58	34⅞	5⅛	—	1051,06	1050,66	1042,48	1050,5
8.	33	63	65½	84	57	47¾	5	—	1041,51	1040,32	1028,21	1038,3
9.	14	78	64¼	153	—	36¼	4⅜	—	1037,09	1048,89	1030,60	1038,7
10.	21	52	61½	73	52½	38⅜	4 9/16	—	1041,26	1047,19	1038,41	1039,3

Digitized by Google

wicht. Hirn. Rinden-substanz.	Krankheits-dauer. Jahre	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychische Krankheitsform und Bemerkungen.
			schwür, eitrige Peritonitis; Mesenterialdrüsen verhärtet.	
1030,25	20	Verdickung der Häute; mässiger Serumerguss.	In Lungen frische Hepatisation; geschwürige Krebsentartung an Zunge und weichen Gaumen.	Wahnsinn.
1034,94	2	Häute verdickt; Rindensubstanz atrophisch und erweicht, Marksubstanz hyperämisch und ödematös.	In Lungen rohe Tuberkelablagerung, im unteren Lappen graue Hepatisation; im Dünndarm tuberculöse Geschwüre, im Dickdarm Catarrh.	Secundär. Blödsinn
1041,38	3½	Häute verdickt, starke Serumanhäufung (400 Ccm.); vorderer Hirnlappen atrophisch, Rindensubstanz atrophisch, Marksubstanz verhärtet.	Rückenmark atrophisch, viel Serum in den Häuten. Lungen: frische und alte Tuberkelablagerung und frische Hepatisationen. Dünndarm: tuberculöse Geschwüre; Dickdarm: Catarrh.	Paralyt. Blödsinn.
1028,42	1½	Mässige Serumanhäufung (65 Ccm.); Atrophie der Rinden-, Hyperämie beider Substanzen.	Auf den weichen Rückenmarkshäuten knorpelige Ablagerungen; lobäre rothe Hepatisation einer Lunge; retroperitonealer Faserkrebs, kindskopfgross; Leber und *Pancreas* ergriffen; beginnende fettige Entartung der Nieren.	Wahnsinn.
1030,39	2	Häute verdickt; Serum 90 Ccm., Atrophie der Rindensubstanz, beide Substanzen hyperämisch; im rechten *Corp. striat.* u. im linken Vorderlappen zwei kleine Erweichungsheerde.	In Lungen lobäre rothe He-Hepatisation, Leber hypertrophisch, fettig.	Seniler Blödsinn.
1027,92	4	Häute verdickt, Arterien atheromatös, Serum 30 Ccm., Rindensubstanz atrophisch, Marksubstanz ödematös.	Herz: *Mitralis* verdickt; im Dünndarm catarrhalische Geschwüre, in Dickdarm granulirter Catarrh.	Secund. Blödsinn.

Digitized by Google

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter. Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd.	Schädelumfang. Cm.	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Unz.	Kleines Hirn. Unz	Med. obl. mit Pons. Unz.	Specifisches Ge- Grosshirn vorderer Lappen	Klein-Hirn	Rückenmark.	Gross- Mark-substanz.
11.	22	56	65½	187	60	50¾	5¼	—	1037,59	1040,59	1016,23	1037,85
12.	33	71	66½	183	56	40⅜	4⅞	—	1040,69	1042,53	1027,90	1030,56
13.	32	48	67½	106	56	45¾	5 1/16	—	1037,30	1039,44	1028,45	1037,46
14.	23	30	62¾	77	55	39⅛	4⅛	—	1031,61	1040,83	1024,59	1023,16
15.	38	56	65¾	88	—	47⅛	5	—	1033,76	1037,72	1023,85	1040,28
16.	31	27	63½	94	57	47	4⅞	—	1036,54	1043,02	1021,22	1037,70

Digitized by Google

vicht. Hirn. Rinden-sub-stanz.	Krankheits-dauer. Jahre	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychi-sche Krank-heitsform und Be-merkun-gen.
1029,42	6	Starke Verwachsung der *Dura* mit *Cranium*; Häute sehnenartig verdickt; Gehirn hyperämisch; Serum 75 Ccm.	In Pleurahöhle seröses Exsudat; *Bronchitis capillaris* und lobuläre Hepatisation mit einem Blutinfarct in der Lunge; starke Herzhypertrophie, *Stenosis valv. semilunaris aortae*; Leber und Nieren fettig entartet; ungemein starke Fettbildung im Unterhautzellgewebe und Gekröse.	Secundärer Blödsinn.
1027,90	47	Häute verdickt; Arterien atheromatös; die Hirnhälften assymmetrisch, Rindensubstanz atrophisch, eine haselnussgrosse Cyste auf rechtem hinteren Lappen, mehrere linsen- bis erbsengrosse Blutergüsse auf der Oberfläche des Gross- und Kleinhirns.	In Brust- und Bauchhöhle seröser Erguss; *Anasarca*. Hypertrophie des Herzens; Verdickung der *V. tricuspidalis* und *semilunaris aortae*; im Dünndarm Catarrh, im Dickdarm catarrhalische Geschwüre; an den Nieren mehrere Cysten, *Cortic.* geschrumpft.	Secundärer Blödsinn.
1026,44	1¼	Häute verdickt; Serum 50 Ccm., Rindensubstanz erweicht, beide Substanzen sehr hyperämisch; aneurysmatische Erweiterung der Capillaren.	Rückenmark stark hyperämisch; in beiden Lungen frische Hepatisationen, im Uebergang zum eitrigen Zerfall.	Paralytischer Blödsinn.
1025,16	3	Starke Serumanhäufung (200 Ccm.); Rindensubstanz atrophisch und erweicht; Marksubstanz ödematös u. sehr weich.	Auf weichen Rückenmarkshäuten frisches Exsudat, in beiden Lungen rothe Hepatisation.	Paralytischer Blödsinn.
1029,95	21	Häute verdickt; Rindensubstanz atrophisch; Marksubstanz ödematös und hyperämisch.	Beide Lungen tuberculös infiltrirt; Cavernenbildung; Herz: *V. mitralis* verdickt, Fettleber.	Verrücktheit.
1027,88	3	Mässiger Serumerguss; (50 Ccm.); beide Substanzen ödematös und erweicht.	Beide Lungen tuberculös infiltrirt; Cavernenbildung; im Dünndarm und *Coecum* tuberculöse Geschwüre.	Wahnsinn.

Digitized by Google

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter. Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd.	Schädelumfang. Cm.	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Uns.	Kleines Hirn. Uns	*Med. obl.* mit *Pons*. Unz.	Specifisches Ge- Grosshirn vorderer Lappen	Klein-Hirn.	Rückenmark.	Gross- *Mark-sub-stanz.*
17.	26	32	65½	100	58	40½	5¼	—	1039,42	1044,23	1029,07	1043,0
18.	26	22	64½	92	56	47⅜	5⅛	—	1026,24	1033,11	1017,86	1030,73
19.	34	44	63	129	—	48	5 7/16	—	1035,89	1039,23	1027,89	1038,12
20.	28	66	59	101	56	47 15/16	5	—	1035,21	1034,55	1023,00	1037,06
21.	18	58	67¾	126	56	46¾	5⅜	—	1038,97	1040,73	1032,86	1040,17
22.	12	48	63¾	103	56	45	4⅞	—	1035,97	1040,42	1029,12	1038,33

Digitized by Google

vicht. Hirn. Rinden-sub-stanz.	Krankheits-dauer. Jahr-	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychi-sche Krank-heitsform und Be-merkun-gen.
1029,07	2	Häute verdickt; Serum 140 Ccm.; Rindensub-stanz hyperaemisch, atrophisch, erweicht; Marksubstanz zähe; Ver-klebung der Furchen.	Rückenmark stark hyper-ämisch. Lungen: rothe He-patisation eines Lappens; im Magen und *Coecum* Ca-tarrh; an Aortaklappen atheromatöse Ablagerun-gen.	Paralyti-scher Blödsinn.
1022,36	1¼	Gehirn anaemisch, im rechten Hinterlappen des Grosshirns eine erbsengrosse Cyste.	Rückenmark in Brust- und Halstheil auffallend weich; beide Lungen tuberculös infiltrirt; Cavernenbildung; im Darmcanal tuberculöse Geschwüre.	Melancho-lie.
1030,38	¼	Marksubstanz anaemisch; in beiden *Plexus cho-roid. lateral.* je eine haselnussgrosse Cyste.	In Lungen mehrere hämor-rhagische Infarcte.	Melancho-lie; (Tod durch Er-hängen).
1026,0	34	Häute verdickt; Serum 50 Ccm.; Rindensub-stanz atrophisch.	Auf der hinteren Fläche der *Dura mater spin.* im Brust-theil ein Blutextravasat; Rückenmark dort erweicht; eitrige *Bronchitis* und Bron-chiectasien; lobuläre He-patisationen; Herzklappen mässig verdickt.	Secundär-er Blöd-sinn.
1030,06	35	Häute verdickt; Serum 75 Ccm.; Rindensubstanz atrophisch und er-weicht; Marksubstanz zäh und ödematös.	Brandige Eiterung am linken Unterschenkel bis zum Knie mit Durchbruch in die Kniehöhle; brandige Absced-irung des linken Hodens, durch den Inguinalcanal bis in die Bauchhöhle; Nieren mit Abcessen durch-setzt; Fettleber.	Secundär-er Blöd-sinn.
1029,05	5	*Cranium* stark verdickt, Rindensubstanz atro-phisch, Marksubstanz ödematös, weich.	Rückenmark derb, atrophisch im Lumbaltheil; *Anasarca*, Wasser in Brust- und Bauchhöhle; Rindensub-stanz der Nieren geschwellt; in Dickdarm hämorrha-gische Geschwürsnarben, (vorher Dysenterie).	Tobsucht.

Digitized by Google

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter. Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd.	Schädelumfang. Cm.	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Unz.	Kleines Hirn. Unz	Med. obl. mit Pons. Unz.	Specifisches G. Grosshirn. vorderer Lappen.	Klein-Hirn.	Rückenmark.	Gro... Mark... sub... stanz...
23.	32	38	60½	85	56	47⅓	5⅔	1⅛	1038,18	1048,81	1030,52	1038,
24.	30	38	65	87	55½	34	5	1⅛	1035,35	1043,36	1029,80	1033,2
25.	27	43	65¾	118	—	44½	6	1¼	1034,0	1039,88	1023,41	1033,5
26.	36	34	67¼	131	56	44¼	5⅞	1⅛	1035,19	1037,29	1016,37	1031,35
27.	24	47	68¾	148	59	40½	5	1⅛	1032,21	1043,46	1029,72	1032,03

wicht. Hirn. Rinden-substanz.	Krankheits-dauer. Jahre	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychische Krankheitsform und Bemerkungen.
1028,11	1	Starke Verdickung der Häute, Serum 65 Ccm., Furchen verklebt; Rindensubstanz atrophisch und erweicht, Marksubstanz hyperämisch.	Rückenmarkshäute verdickt, mit Knorpelplättchen; in Lungen frische lobuläre Hepatisationen; im Dickdarm catarrhalische Geschwüre; auf dem Rücken brandiger *Decubitus*.	Paralytischer Blödsinn.
1028,87	4	Häute verdickt; Serum 280 Ccm; Rindensubstanz atrophisch und erweicht, Marksubstanz ödematös.	Rückenmark im Lumbartheil atrophisch, derb und hyperämisch, Häute verdickt, mit Knorpelplättchen; in Lungen tuberculöse Infiltration und Höhlenbildung; Fettleber; *Valv. mitralis* und *Aorta* atheromatös; brandiger *Decubitus* an Rücken und Füssen.	Paralytischer Blödsinn.
1023,41	2½	Häute verdickt; Serum 80 Ccm., Rindensubstanz atrophisch und erweicht; Marksubstanz hyperämisch und ödematös; Gefässe atheromatös; bohnengrosse Cyste in dem hinteren, eine gleiche auf dem rechten vorderen Lappen.	Rückenmarkshäute verdickt, Rückenmark erweicht; verkreidete Tuberkeln und frisches Oedem in den Lungen; Fettherz.	do. (Tod durch Erstick. durch ein Stück Fleisch.)
1023,03	1¾	*Cranium* und Häute verdickt; Rindensubstanz atrophisch, erweicht; Marksubstanz weich, ödematös, hyperämisch; Hirncapillaren atheromatös.	Rückenmark weich, Häute verdickt mit Kalkablagerungen; in Lungen rothe lobäre Hepatisation.	Paralytischer Blödsinn,
1030,15	2	Häute verdickt; Rindensubstanz atrophisch, erweicht; Serum 90 Ccm.; Marksubstanz verhärtet, *état criblé*, anaemisch, ödematös; Gefässe atheromatös.	Rückenmarkshäute verdickt; in Lungen rothe Hepatisation, in Erweichung übergehend; Fettherz und Atherom der *Aorta*; Fettleber; brandiger *Decubitus*.	do.

Digitized by Google

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter. Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd.	Schädelumfang. Cm.	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Unz.	Kleines Hirn. Unz	*Med. obl.* mit *Pons.* Unz.	Specifisches Gewicht. Grosshirn. vorderer Lappen.	Klein-Hirn.	Rückenmark.	Grosshirn-Marksubstanz.
28.*	28	53	66	117	56	45⅛	5⅛	1	1037,99	1040,06	1029,59	1041,69
29.**	29	22	61¼	76	50½	31¼	3⅛	¼	1034,91	1043,24	1033,19	1041,92
30.***	36	44	61	82	55	37½	5¼	1¼	1028,08	1036,99	1027,59	1038,19
	Mittel	—	—	—	—	—	—	—	1037,44	1042,33	1028,44	1038,77

*) Spec. Gew. des hinteren Lappens vom Grosshirn 1038,60, des *Corp. striat.* 1035,25, des *Thal. opticus* 1040,29.

**) Spec. Gew. des hinteren Lappens vom Grosshirn 1037,55.

***) Spec. Gew. des hinteren Lappens vom Grosshirn 1027,73, des *Corp. striat.* 1037,19, des *Thal. opticus* 1034,98.

vicht. Hirn. Rinden-sub-stanz.	Krankheits-dauer. Jahre	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychi-sche Krank-heitsform und Be-merkun-gen.
1031,31	2½	Häute verdickt; Serum 60 Ccm.; Rindensub-stanz atrophisch und erweicht; Marksubstanz ödematös und hyper-ämisch; Gefässe athe-romatös.	Rückenmarkshäute verdickt; Rückenmark weich; lobäre rothe Hepatisation einer Lunge; Hypertrophie des Herzens; Verdickung der *V. mitralis* und *aortae*; Leber hypertrophisch.	Paralyti-scher Blödsinn. (Tod d. Erstick. d. eine Brod-kruste.)
1023,77	1¼	*Cranium* sehr dünn; Häute gering verdickt; Serum 90 Ccm.; Rindensub-stanz atrophisch und erweicht; Marksubstanz ödematös; Hirncapilla-ren atheromatös.	Rückenmark derb, Lungen tuberculös infiltrirt und Höhlenbildung; im Kehlkopf und Därmen tuberculöse Geschwüre; Mesenterial- und Bronchialdrüsen ge-schwellt; Leber vergrös-sert, muscatnuss.	Angebore-ner Blöd-sinn mit Melan-cholie.
1023,92	5½	Serum 180 Ccm ; starkes pachymeningitisches Ex-sudat; Rindensubstanz atrophisch und erweicht; im rechten *Corp. striat.* eine erbsengrosse bräunliche Erweichung.	Rückenmarkshäute verdickt; in Lungen rothe lobäre Hepatisation, im Uebergang in Eiterung; *V. mitralis* und *aorta* atheromatös; brandiger *Decubitus* an den Hüften.	Paralyti-scher Blödsinn.
1029,22				

Digitized by Google

B. Frauen.

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter. Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd.	Schädelumfang. Cm.	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Unz.	Kleines Hirn. Unz	Med. obl. mit Pons. Unz.	Specifisches Ge- Grosshirn. vorderer Lappen.	Klein-Hirn.	Rückenmark.	Gross- Mark-substanz.
1.	47	58	58¾	68	54½	41⅛	5⅛	—	1032,69	1040,58	1033,15	1042,57
2.	30	50	48	127	—	41 1⅛	5⅛	—	1041,23	1043,45	1021,28	1045,38
3.	39	50	47	76	53	40¾	4½	—	1049,84	1052,89	1039,20	1049,81
4.	28	30	49	69	54	43	4½	—	1036,22	1041,28	1018,76	1039,02
5.	40	59	47¼	109	56	32⅛	4¾	—	1039,63	1045,15	1033,09	1032,33
6.	17	66	48	97	55	47	4⅛	—	1038,0	1043,27	1030,76	1043,73

Digitized by Google

B. Frauen.

vicht. Hirn. Rinden-sub-stanz.	Krankheits-dauer. Jahre	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychi-sche Krank-heitsform und Be-merkun-gen.
1034,11	½	Rindensubstanz erweicht; Gehirn anaemisch.	Lobäre rothe Hepatisation der Lungen.	Melancho-lie (Nah-rungsver-weige-rung.)
1038,29	13	Häute verdickt; Gehirn hyperämisch; im vor-deren linken Lappen erbsengrosse Cyste.	*Anasarca* und serōser Er-guss in Brust- u. Bauch-höhle; Hypertrophie des rechten Herzens und Ver-dickung der *V. tricuspi-dalis.*	Secundär-rer Blöd-sinn.
1031,40	1	Marksubstanz ödematōs, sehr weich.	Rückenmark stellenweise erweicht; in Lungen lobu-läre frische Hepatisationen	do. (nach acuter Tobsucht.)
1023,55	8	Beträchtlicher *Hydroce phalus ext.* und *int.*; Marksubstanz ödematōs und weich.	In Lungen tuberculōse In-filtration und Erweichung; im Darm tuberculōse Ge-schwüre; Nieren granulirt; Speckmilz; Mesenterial-drüsen verhärtet und ge-schwellt.	Wahnsinn.
1034,68	2 resp 16	*Hydrocephalus extern.* und *intern.* (130 Ccm.); frisches Exsudat an den Häuten der *Basis*; Rin-densubstanz atrophisch; Gehirnwindungen com-primirt; eine erbsen-grosse Erweichung im rechten *Corp. striat.*; im rechten Ventrikel ein nussgrosser *Cysti-cercus.*	Rückenmark atrophisch; brandiger *Decubitus* an einer Hüfte; Eiterheerde in verschiedenen Bauch- und Nackenmuskeln und in rechter Niere; lobulāre frische Hepatisationen in den Lungen.	Secundair-rer Blöd-sinn mit Epilepsie (seit 16 Jahren.)
1038,11	9	Häute verdickt; Gehirn hyperämisch, Mark-sub-stanz ödematōs; Capil-laren atheromatōs; im rechten Vorderlappen eine erbsengrosse Cyste.	Capillairer Bronchialcatarrh, rothe Hepatisation einer Lunge; Herzklappen athe-romatōs; Fettleber; Eiter-infarct in einer Niere.	Wahnsinn.

Digitized by Google

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter. Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd.	Schadelumfang. Cm	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Unz.	Kleines Hirn. Unz	Med. obl. mit Pons. Unz.	Specifisches G. Grosshirn. vorderer Lappen	Klein-Hirn.	Rückenmark.	Gro Mar sub stan
7.	36	43	60	120	—	45⅞	4½	—	1038,22	1040,06	1026,19	1042
8.	37	61	48½	70	55	37	4⅝	—	1044,05	1043,60	1026,77	1033,
9.	37	61	61½	123	—	45⅛	4⅛	—	1035,18	1044,89	1021,35	1033,
10.	18	65	47¾	97	53	36¾	4½	—	1039,96	1043,08	1032,27	1038,9
11.	12	58	60	80	57	44	5	—	1033,76	1037,72	1023,85	1040,3
12.	20	56	55¾	80	54	40¾	4⅛	—	1036,57	1041,71	1030,16	1034,4
13.	10	31	48½	98	51½	37¾	5¼	—	1031,71	1042,01	1027,63	1034,7

Digitized by Google

wicht. Hirn. Rinden-sub-stanz.	Krankheits-dauer. Jahre.	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychi-sche Krank-heitsform und Be-merkun-gen.
1030,90	1½	Hirnhäute verdickt, Serum 120 Ccm.; Atrophie der Vorderlappen, Oedem der Marksubstanz; Gefässe atheromatös; in den Kernkörpern beider Seiten verschiedene Erweichungsheerde.	Bronchialcatarrh und zerstreute lobuläre Hepatisationen in den Lungen.	Secundairer Blödsinn.
1035,82	4	Serum 40 Ccm; Gefässe atheromatös; Rindensubstanz atrophisch, Marksubstanz sehr weich; in beiden Hinterlappen, *Corp. striat.* u. *Thal. opticus* frische und alte apoplectische Heerde.	Hypertrophie und Fettentartung des Herzens; fettige Entartung der Nieren-Rindensubstanz.	do.
1023,77	20	Gefässe atheromatös; Blutextravasat von 100 Ccm. im rechten Arachnoidalsack; in beiden Hinterlappen Erweichungsheerde; Gehirn comprimirt.	In Lungen lobuläre frische Hepatisationen; Herz fettig entartet.	Secundairer Blödsinn mit Epilepsie.
1032,33	1	Häute verdickt; Rindensubstanz atrophisch; Marksubstanz ödematös und hyperämisch.	Krebsige Entartung der Mesenterialdrüsen, zum Theil Erweichung; eitrige Peritonitis.	Secundairer Blödsinn.
1029,95	4	Serum 75 Ccm.; Rindensubstanz erweicht; Marksubstanz ödematös.	In Lungen tuberculöse Infiltration und Erweichung; im Darm tuberculöse Geschwüre.	Wahnsinn.
1033,39	4½	Gehirn anaemisch; Gefässe atheromatös; Bluterguss von 75 Ccm. in allen Höhlen, ausgehend von Erweichung der rechten Kernkörper.	Hypertrophie des Herzens, *V. mitralis* atheromatös; Fibroid in *Fundus uteri*.	Melancholie (Tod durch Schlagfluss.)
1027,48	2	Serum 135 Ccm.; auf beiden Vorderlappen eine haselnussgrosse	Rückenmarkshäute verdickt; von einem ungeheilten Rippenbruch ausgehend ver-	Paralytischer Blödsinn.

Digitized by Google

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter. Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd	Schadelumfang. Cm.	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Unz.	Kleines Hirn. Unz	*Med obl.* mit *Pons*. Unz.	Specifisches Ge- Grosshirn vorderer Lappen.	Klein-Hirn.	Rückenmark.	Gross- *Mark*substanz.
14.	35	67	56¾	68	54	37¼	4⅝	—	1036,10	1043,19	1032,37	1041,73
15.	25	68	60	70	57	43¾	4⅝	—	1038,33	1038,01	1024,50	1040,45
16.	26	53	49½	69	56	41¼	4¾	—	1032,56	1038,03	1021 52	1029,49
17.	16	48	59¾	164	56	41	4½	—	1039,73	1042,93	1032,84	1035,54
18.	24	63	60	125	54	38⅜	4⅜	1⅛	1037,82	1040,91	1029,96	1039,00
19.	23	39	64	71	52	42¼	4⅞	⅞	1042,71	1042,14	1033,21	1044,73

Digitized by Google

wicht. Hirn. Rinden-sub-stanz.	Krankheits-dauer. Jahre	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychische Krankheitsform und Bemerkungen.
		Cyste; Rindensubstanz atrophisch.	schiedene Abcesse in den Brustmuskeln; ebenso von *Caries* eines Oberschenkelgelenkes aus Eiterung im *M. psoas* und Oberschenkel.	
1032,90	1½	Serum 50 Ccm.; Atrophie und Hyperämie der Rinden-, Oedem der Marksubstanz.	Catarrh der Bronchien; eitrige Hepatisation in beiden Lungen; Verknöcherung der *Arteria coronaria cordis.*	Wahnsinn.
1027,89	¾	*Cranium* verdickt; Häute verdickt, Marksubstanz ödematös und hyperämisch.	Rückenmarkshäute im unteren Brusttheile verdickt; rothe lobuläre Hepatisation in Lungen; Eiterung in einer Niere; brandiger *Decubitus* am Rücken.	Seniler Blödsinn.
1023,56	2½	Gefässe atheromatös; Gehirn anaemisch; Rindensubstanz atrophisch, Marksubstanz ödematös.	Tuberculöse Infiltration und Erweichung der Lungen; tuberculöse Darmgeschwüre; an Leber 2 grosse Echinococcusblasen.	Melancholie.
1031,54	7	*Cranium* dünn; Serum in und ausser den Ventrikeln 350 Ccm.; Windungen abgeflacht; Hirnhäute verdickt; Marksubstanz ödematös; im linken *Corp. striat.* und rechten Vorderlappen zwei kleine Erweichungsheerde.	Rückenmark sehr derb; Serum in allen Höhlen; starke Fettablagerung im Zellgewebe; Fettleber.	Secundairer Blödsinn.
1031,22	17	Häute verdickt, Furchen verklebt; Serum 50 Ccm., Rindensubstanz atrophisch und anaemisch; Marksubstanz ödematös und partiell hyperämisch.	In Lungen lobuläre frische Hepatisationen; Herz fettig entartet und erweitert; Fettleber; fibröser Retroperitonealkrebs, der das *Pancreas* durchsetzt, den *Fundus* des Magens und die Milz perforirt hat.	do.
1035,00	17	Vorderlappen atrophisch; ebenso *Pons* mit *Me-*	Rückenmark atrophisch, sehr derb; in Lungen graue	do.

Digitized by Google

Nummer.	Zeit der Untersuchung. p. M. Stdn.	Lebens-Alter Jahre	Körperlänge. Zoll	Körpergew. Pfd.	Schadelumfang. Cm.	Absolutes Gewicht. Ganzes Hirn. Unz.	Kleines Hirn. Unz.	Med. obl. mit Pons. Unz.	Specifisches Ge- Grosshirn vorderer Lappen	Klein-Hirn.	Rückenmark.	Gross- Mark-substanz.
20.	20	33	57	66	54	36½	4⅞	⅞	1028,63	1036,07	1019,30	1028,02
21.*	30	58	62	74	54½	41⅜	4⅝	⅞	1036,85	1038,49	1028,64	1037,47
	Mittel	—	—	—	—	—	—	—	1037,61	1041,88	1027,95	1038,41

*) Spec. Gew. des hinteren Lappens vom Grosshirn 1036,62, des *Corp. striat.* 1038,50, des *Thal. opticus* 1040,55.

Digitized by Google

wicht. Hirn. Rinden-substanz.	Krankheits-dauer. Jahre	Hirnbefund.	Befund in anderen Organen.	Psychische Krankheitsform und Bemerkungen.
		dulla oblongata; Capillaren atheromatös; Rindensubstanz atrophisch; Marksubstanz ödematös und anaemisch; Serum 55 Ccm.	Infiltration mit Höhlenbildung; Aortaklappen atheromatös; rundes Magengeschwür, in das *Pancreas* perforirend; in Milz oberflächliche keilförmige Faserstoffinfiltration; beginnende Fettentartung der Nieren.	
1021,31	2	Häute verdickt, Serum 80 Ccm., Capillaren atheromatös; Rindensubstanz atrophisch und erweicht, Marksubstanz ödematös.	Rückenmarkshäute verdickt; in Lungen infiltrirte und erweichte Tuberkeln und rothe Hepatisation; tuberculöse Darmgeschwüre; in Nieren und im ganzen Unterhautzellgewebe zahlreiche kleine Abscesse; brandiger *Decubitus*.	Paralytischer Blödsinn.
1027,18	36	Gefässe atheromatös; Serum 60 Ccm.; Rindensubstanz atrophisch, Marksubstanz ödematös.	In Lungen tuberculöse Infiltration und Höhlenbildung; Fettherz; Aortaklappen atheromatös; Fettleber, linker Leberlappen verlängert und mit Milz verwachsen; tuberculöse Darmgeschwüre.	Secundairer Blödsinn.
1030,69				

Bevor ich zur Besprechung der nach diesen Tabellen gefundenen Werthe übergehe, muss ich noch auf einen Umstand aufmerksam machen, welcher für die Untersuchung grosse Schwierigkeiten bietet. Die vergleichende Messung zwischen Gross- und Kleinhirn kann, indem man nicht das ganze Gehirn wägen kann, nur so ausgeführt werden, dass man aus beiden Theilen Stücke ausschneidet, welche möglichst gleiche Mengen der Rinden- und Marksubstanz enthalten. Da dieses nur dem Augenmaass nach geschehen kann, so bleibt dieses Verfahren immer höchst unsicher. Scheint nun auch diese Unsicherheit den fast constanten Unterschied in der specifischen Schwere des Gross- und Kleinhirns nicht wesentlich zu beeinträchtigen, und bleibt den Bestimmungen derselben wenigstens ein relativer Werth gesichert, so gilt dies nicht für die Bestimmung des Verhältnisses des gesammten grossen Gehirns zu der Schwere seiner Rinden- und Marksubstanz. Es ist kaum möglich, aus dem grossen Gehirn stets ein Stück auszuschneiden, welches jedesmal die gleichen Volumina an Mark und Rinde enthält, wie dies doch eine *conditio sine qua non* zur Gewinnnung richtiger Ergebnisse sein würde, sondern es wird bald die eine, bald die andere der beiden Substanzen vorwiegen. Die Folge davon ist, dass man nicht berechtigt ist, die gefundenen Eigengewichte der einzelnen Substanzen mit der des gesammten Grosshirns zu vergleichen, sondern diese nur unter einander vergleichen darf. In den Tabellen finden sich aber sogar einzelne Beispiele, in denen das Eigengewicht des gesammten Grosshirns nicht etwa das ungefähre Mittel aus den Eigengewichten beider Substanzen darstellt, sondern die Gewichte dieser beiden einzeln übersteigt. Diese Auffälligkeit zu erklären und den Fehler, der doch wahrscheinlich der Untersuchung selbst angehören muss, zu entdecken, ist mir trotz aller Mühe nicht gelungen; bei

Digitized by

gleichen absoluten Gewichtsmengen der untersuchten Stücke und bei unmittelbarer Folge der Untersuchung, die stets in der tabellarischen Reihe vorgenommen wurde, blieb es mir nur auffallend, dass nie das umgekehrte Verhältniss (geringeres specifisches Gewicht des Gesammt - Grosshirns) beobachtet wurde, und scheint mir diese Regelmässigkeit doch auf ein besonderes Verhältniss hinzudeuten, das nicht blos in den Fehlerquellen des Verfahrens seinen Grund hat. Jedenfalls ist aber deshalb die Vergleichung nur auf die Einzelwerthe der für die beiden Substanzen gefundenen Gewichte unter einander zu beschränken.

Ich fasse nun die Ergebnisse aus den vorstehenden Tabellen in dem Folgenden zusammen:

1. Das specifische Gewicht des Kleinhirns übertrifft dasjenige des Grosshirns.

Das Mittel betrug:

	kleines Gehirn.	grosses Gehirn.
bei 30 Männern . .	1042,33.	1037,44.
- 21 Frauen . .	1041,88.	1037,61.
Mittel . .	1042,10.	1037,52.

Die Ausnahmen, wo das Grosshirn specifisch schwerer erschien, betreffen 6 Fälle; der Unterschied der beiden Gewichte bewegt sich aber in so engen Grenzen, dass man versucht werden könnte, denselben ebenfalls auf die Schwierigkeit, stets Stücke mit gleichen Mengen von Mark- und Rindensubstanz zu gewinnen, zurückzuführen. Für die beiden Geschlechter scheint kein Unterschied zu bestehen. *Bucknill*, *Aitken* und *Peacock*, welche allein Gross- und Kleinhirn in ihrer Gesammtheit verglichen haben, stimmen in diesen beiden Punkten mit dem Gesagten überein; *Bucknill* giebt das specifische Gewicht (bei Irren) für Grosshirn auf 1040,9, für Kleinhirn auf 1043, *Aitken* (bei Geistesgesunden 6 Fälle) für Grosshirn auf 1037, für Kleinhirn auf 1043, *Peacock* (bei

Digitized by Google

Geistesgesunden 12 Fälle) für das Grosshirn bei Männern auf 1034,88, bei Frauen 1035,1, — für das Kleinhirn bei Männern auf 1041,62, bei Frauen 1039,52 an. — Die wenigen (4) Wägungen, welche ich zur Vergleichung verschiedener Lappen des Grosshirns (beide Substanzen zusammengenommen) angestellt habe, lassen keine wesentliche Abweichung erkennen.*)

2. Das specifische Gewicht der Rindensubstanz des Grosshirns ist ein beträchtlich geringeres als das der Marksubstanz.

Das Verhältniss stellt sich wie folgt:

	Rindensubstanz.	Marksubstanz.
bei 30 Männern . .	1029,22.	1038,77.
bei 21 Frauen . .	1030,69.	1038 41.
Mittel . .	1029,95.	1038,59.

Das Maximum betrug für die Rindensubstanz bei den Männern 1041,48, bei den Frauen 1038,29; für die Marksubstanz bei Männern 1050,50, bei Frauen 1049,81; das Minimum für die Rindensubstanz bei den Männern 1022,36, bei Frauen 1021,31; für die Marksubstanz bei Männern 1023,16, bei Frauen 1028,02.

Es finden sich in den obigen Tabellen nur 3 Fälle, in denen die Rindensubstanz mit einer grösseren Dichtigkeit notirt ist, als die Marksubstanz (Männer Nr. 14, Frauen Nr. 5 und 8); der Unterschied war indessen jedesmal nur ein geringer, und es wäre möglich, dass der anatomische Befund der auffallend weichen Consistenz der Marksubstanz sowohl als der durch starken Hydrocephalus bewirkten Compression der Hirnrinde einen Einfluss darauf ausgeübt hätten. Ob auch anderen Beobachtern solche Ausnahmefälle vorgekommen sind, darüber fehlt es an genügender Kunde, da gewöhnlich

*) Nach *Buhl* sollen jedoch die Vorderlappen um 3 pCt. reicher an Wasser sein, als die Hinterlappen.

Digitized by

die Tabellen nicht in extenso, sondern nur die Mittelzahlen mitgetheilt worden sind. Doch erwähnt *Bastian* (a. a. O., S. 500) ausdrücklich, dass er nie das specifische Gewicht der grauen höher als das der weissen Substanz und nur in Einem Falle beide gleich hoch gefunden habe; und auch in den *Engel*'schen Tabellen finden sich ausser der von ihm beobachteten grösseren Dichtigkeit der grauen Substanz in akuten Krankheiten junger Leute (s. unten) mehrere Fälle, wo ein sehr beträchtliches Uebergewicht der grauen über die weisse Substanz sich ergeben hat. In der Bestätigung der grösseren Dichtigkeit der Marksubstanz stimmen sonst alle Beobachter überein; *Bucknill* giebt als das Mittel aus 63 Fällen (von Irren) für die graue Substanz 1037, für die weisse $1039\frac{2}{6}\frac{3}{3}$, *Sankey* aus 73 Fällen (an Geistesgesunden) für die graue 1034,6, aus 75 Fällen für die weisse 1041,2, *Skae* aus 62 Fällen (Irre) für die graue 1039,1, für die weisse 1042,4, *Bastian* aus 25 Fällen von Geistesgesunden für die graue 1030, für die weisse 1040,4, aus 11 Fällen an Irren für die graue auf 1032,5, für die weisse 1040,5 an. *Peacock* hat keine vergleichenden Wägungen angestellt; das Mittel aus den 4 von *Krause* und *Fischer* (an Geistesgesunden) vorgenommenen Untersuchungen beträgt für die Rindensubstanz 1031,4, für die Marksubstanz 1037,3; *Engel*, der seine Wägungen (an Geistesgesunden) wesentlich je nach der Dauer der Krankheiten in verschiedene Reihen geordnet hat, kommt für die Mehrzahl (34 Fälle) zu gleichen Resultaten: graue Substanz 1025,15, weisse 1030,18, während er für acute Krankheiten im jugendlichen Lebensalter (13 Fälle) ein beträchtlich höheres specifisches Gewicht der Rindensubstanz (1041,01) vor der Marksubstanz (1031,18) vindicirt.

Den hier berührten Punkt des Einflusses der Krankheiten weiterer Besprechung vorbehaltend bemerke ich

noch, dass meine Ergebnisse den von *Krause* und *Fischer* gewonnenen hinsichtlich der Höhe und des Verhältnisses der Dichtigkeit beider Substanzen am nächsten kommen.*) Der für die Geschlechter gefundene Unterschied ist ein äusserst geringer; *Sankey* fand ihn, wie ich, für die Marksubstanz fast gleich Null (1041 Männer, 1041,4 Frauen), ebenso für die Rindensubstanz (Männer 1035,3, Frauen 1034,9), während ich ihn für die letztere etwas grösser constatirte. — *Bastian* hat die Rindensubstanz des Grosshirns an verschiedenen Stellen auf ihre Dichtigkeit geprüft und will gefunden haben, dass die Rindensubstanz der Frontal-, Parietal- und Occipital-Windungen eine verschiedene Dichtigkeit besitzt und die Rindensubstanz der linken Hemisphäre specifisch schwerer als die der rechten ist (Frontal-Windungen links 1029,1, rechts 1027,6, Parietalwindungen l. 1030,0, r. 1029,6, Occipitalwindungen l. 1032, r. 1031,6). Dieses an Geistesgesunden constatirte Verhältniss ist er geneigt mehr auf innere Structurverschiedenheiten als auf zufällige Verschiedenheit des Blutgehaltes in der Rindensubstanz zurückzuführen. — Ueber das Verhältniss der beiden Substanzen im Kleinhirn haben *Skae* und *Bastian* Untersuchungen angestellt; ersterer fand in 5 Fällen von Geistesgesunden das specifische Gewicht der grauen Substanz 1042, der weissen 1043,3, in 27 Fällen von Irren graue Substanz 1040, weisse 1043,8, letzterer in 25 Fällen von Geistesgesunden graue Substanz 1039,5, weisse 1039,9, in 11 Fällen von Irren graue Substanz 1039,6. Auch *Krause* und *Fischer* haben einige Angaben gemacht; nach denselben war in den zwei untersuchten Fällen die Verschiedenheit des specifischen Gewichts zu

*) Bekanntlich ergeben auch die chemischen Untersuchungen von *Hauff* und *Walter*, *Bibra* und *Buhl* einen um 10—14 pCt. grösseren Wassergehalt der grauen Substanz vor der weissen und einen entsprechend grösseren Fettreichthum der letzteren.

Digitized by Google

Gunsten der weissen Substanz eine weit geringere (graue Substanz 1030,17 resp. 1031,0, weisse Substanz 1031,6 resp. 1033,2) als beim grossen Gehirn, womit auch die anderen Beobachtungen übereinstimmen.

3. Das spezifische Gewicht des Rückenmarks (Brusttheil) habe ich für die Männer 1028,44, für die Frauen 1027,95, im Mittel für beide also zu 1028,19 gefunden, somit geringer als das des Grosshirns und auch der Rindensubstanz (1029,95). Die Maxima betrugen bei Männern 1042,48, bei den Frauen 1039,20, die Minima bei Männern 1016,23, bei Frauen 1018,76. —

Ueber das Rückenmark sind keine weiteren Untersuchungen bekannt geworden, als dass *Krause* und *Fischer* in einem Falle das Gewicht der grauen und weissen Substanz getrennt bestimmt haben und dafür die Werthe von 1038,9 und 1024,4 resp. 1021,9 fanden. *Bastian* hat sowohl *pons Varoli* als *medulla oblongata* auf ihre Dichtigkeit untersucht; nach ihm betrug das specifische Gewicht des *pons Varoli* (25 Fälle von Geistesgesunden) 1042,4, (9 Fälle von Irren) 1044,4, der *medulla oblongata* (24 Fälle von Geistesgesunden) 1036, (3 Fälle von Irren) 1039,3. Auch *Engel* hat das specifische Gewicht des *pons Varoli* und der *medulla oblongata* in 45 Fällen bestimmt; das durchschnittliche Mittel für beide (die Verschiedenheiten in Lebensalter und Krankheitsdauer scheinen nur sehr geringe Schwankungen zu begleiten) betrug für *pons Varoli* 1033,51, für *medulla oblongata* 1031,04, für letztere also eine Annäherung an das Gewicht des Rückenmarkes. Auch *Peacock* hat (in 12 Fällen von Geistesgesunden) *pons Varoli* und *medulla oblongata* zusammen gewogen, gibt aber deren specifisches Gewicht bedeutend höher, auf 1040,06—60 an. Ein constantes Verhältniss der specifischen Schwere des Rückenmarkes zu derjenigen des grossen Gehirns lässt sich aus der Tabelle nicht entnehmen; eher scheinen die Schwankungen des

Digitized by Google

Gewichts denen des kleinen Gehirns ziemlich parallel zu laufen, wofür sich die Erklärung vielleicht in der bekanntlich geringeren Theilnahme des kleinen Gehirns an den Krankheitsprocessen des Nervensystems bei den Irren suchen liesse.

4. Ueber das Eigengewicht der Kernkörper sind meine Untersuchungen zu wenig zahlreich, als dass sich daraus ein bestimmtes Verhältniss desselben zu anderen Hirntheilen ableiten liesse. Der *thalamus opticus* scheint darnach ein höheres Eigengewicht als das übrige grosse Gehirn zu besitzen. *Engel* hat den Linsenkern in seinen Wägungen berücksichtigt und ihn nach 55 Fällen ebenfalls schwerer (1034), als die übrigen Hirntheile gefunden. *Bastian* allein hat die Kernkörper und den *fornix* in den Bereich seiner Untersuchungen gezogen; nach ihm hat der *fornix* ein specifisches Gewicht von 1032 bei Geistesgesunden, 1030,2 bei Irren, das *corpus striatum* von 1035 in seinem intraventricularen, 1041,6 in seinem extraventricularem (tieferen) Theilen (bei Geistesgesunden), der *thalamus opticus* von 1042,2 bei Geistesgesunden, 1044 bei Irren.

5. So nahe die Vermuthung liegt, dass das absolute Gewicht des Gehirns und seiner Theile in einem gewissen etwa ergänzenden Verhältnisse zu dem specifischen stehen möchte, so wenig haben die von mir u. A. (*Sankey*) in dieser Hinsicht vorgenommenen Zusammenstellungen auf Grund des mir vorliegenden Materials diese Vermuthung bestätigt, und ich unterlasse es deshalb die zur Ermittelung dieses Verhältnisses angestellten Berechnungen mitzutheilen.

6. Die Frage, ob das Lebensalter auf das spezifische Gewicht einen Einfluss ausübe, ist von mehreren Beobachtern besprochen worden, und ich gebe deshalb zur Vergleichung eine Uebersicht auch meiner Fälle nach dem Lebensalter geordnet.

Digitized by

Lebens-Alter. Jahre.	Männer.			Frauen.			Total.		
	Zahl der Fälle.	graue Substanz.	weisse Substanz.	Zahl der Fälle.	graue Substanz.	weisse Substanz.	Zahl der Fälle.	graue Substanz.	weisse Substanz.
20—30	4	1025	1033	1	1024	1039	5	1024,5	1036
30—40	5	1029	1038	3	1028	1036	8	1028,5	1037,5
40—50	11	1031	1041	4	1033	1043	15	1032	1042
50—60	5	1029,5	1034	6	1030,5	1032	11	1030	1033
60—70	2	1027	1037,5	7	1032	1038,7	9	1029,5	1038
70—80	3	1029	1037	—	—	—	3	1029	1037

Nach dieser Tabelle scheinen beide Substanzen des grossen Gehirns ihre höchste specifische Dichtigkeit im Alter zwischen 40 u. 50 Jahren zu besitzen; dieses Resultat und ebenso das gleichmässige Steigen der Dichtigkeit bis zu diesem Lebensalter ist für beide Geschlechter dasselbe, während die Abnahme von da an nicht dieselben gleichmäsigen Verhältnisse zeigt. *Sankey* hat (bei Geistesgesunden) für die Rindensubstanz das höchste specifische Gewicht zwischen 20 und 30 (von 1033 bis 1037 steigend), für die Marksubstanz dagegen ebenfalls im Alter zwischen 40 und 50 Jahren (von 1040 auf 1042 steigend) gefunden. *Engel* scheint die Rindensubstanz in diesem Alter nicht untersucht zu haben; für die Marksubstanz gibt er ebenfalls im Alter von 40—50 Jahren ein höheres Gewicht (1033,7) als im jugendlicheren (1032,5 im Mittel seiner Fälle) und höheren (1028,4) Lebensalter an.

Ich lasse die Gewichte des Gross- und Kleinhirns wie des Rückenmarkes in verschiedenen Lebensaltern folgen:

Digitized by Google

Lebens-Alter. Jahre.	Männer.			Frauen.			Total.			Rückenmark.		
	Zahl der Fälle.	Gross-Hirn.	Klein-Hirn.	Zahl der Fälle.	Gross-Hirn.	Klein-Hirn.	Zahl der Fälle.	Gross-Hirn.	Klein-Hirn.	Zahl der Fälle.	Männer.	Frauen.	Total.
20—30	4	1032	1040	1	1036	1041	5	1034	1040,5	5	1024	1019	1021,5
30—40	5	1038	1044	3	1034	1040	8	1036	1042	8	1027	1027	1027
40—50	11	1038	1043	4	1042	1045	15	1040	1044	15	1031	1030	1030,5
50—60	5	1038	1041	6	1035,5	1043	11	1037	1042	11	1028	1028	1028
60—70	2	1038,5	1037,5	7	1038	1042,5	9	1038	1040	9	1026	1028	1027
70—80	3	1039	1040	—	—	—	3	1039	1043	3	1027	—	1027

Digitized by Google

Auffallender Weise finden wir auch nach vorstehender Zusammenstellung die höchsten Gewichtsangaben für Gross- und Kleinhirn und Rückenmark constant in dem gleichen Lebensalter zwischen 40—50 Jahren und nehmen ebenfalls bei allen das allmälige Steigen der spezifischen Dichtigkeit bis dahin wahr. Die *Engel*'schen Untersuchungen des Kleinhirns stimmen damit überein; er gibt für das jugendliche Alter das Mittel für das Kleinhirn zu 1031,3, für das Alter von 40—50 Jahren zu 1034,3 an. Diese Uebereinstimmung dürfte um so beachtenswerther sein, als *Sankey* und *Engel* an Nichtirren ihre Wägungen angestellt haben und fodern jedenfalls zu weiterer Erforschung der Thatsache, ob wirklich das Gehirn zwischen 40—50 Jahren seine höchste specifische Dichtigkeit erreicht, auf. — Ich mache noch auf den Umstand aufmerksam, dass das kleine Gehirn unter allen untersuchten Hirntheilen die geringsten Schwankungen der Dichtigkeit wahrnehmen lässt.

7. Die Krankheitsdauer angehend glaube ich bemerken zu müssen, dass das Material meiner Beobachtungen, welches nur aus Fällen von zum Theil sehr langjähriger psychischer Hirnerkrankung besteht, sich nicht zur Vergleichung mit den von Anderen in dieser Beziehung mitgetheilten Beobachtungsreihen, die nur geistesgesunde Individuen betreffen, welche an acuten oder anderen chronischen Krankheiten verstorben sind, eignet, und füge nur hinzu, dass sich durchaus kein constanter Einfluss jahrelanger Psychosen auf die specifische Dichtigkeit des Gehirns, *in specie* der Rindensubstanz, aus meinen Fällen entnehmen lässt, sondern deren höheres oder niedrigeres Gewicht durchaus unabhängig von der Dauer der Psychose scheint. Ist also hier keine Vergleichung möglich, so wird diese dagegen eher thunlich sein, insofern es sich

8. um den Charakter und die Dauer derjenigen

Digitized by Google

Krankheit handelt, welche die eigentliche Todesursache bildet. Mit Rücksicht auf diesen Punkt haben besonders *Sankey*, *Peacock* und *Engel* ihre Wägungen zu verwerthen gesucht. Der erstere ist zu folgenden Resultaten gelangt: Die Dichtigkeit der Rindensubstanz nimmt ab mit der Länge der Krankheitsdauer, welche dagegen auf die Marksubstanz nur von sehr geringer Einwirkung ist; eine höhere Dichtigkeit der Rindensubstanz ist stets mit irgend welcher Hirnerkrankung verbunden, während ihre unter dem Mittel befindliche Dichtigkeit nicht von Hirnsymptomen begleitet zu sein braucht und ein Abweichen vom Mittel der Dichtigkeit bei der Marksubstanz stets eine Hirnerkrankung voraussetzt. Das specifische Gewicht beider Substanzen wird endlich erhöht gefunden in allen Zuständen des Gehirns, welche mit Hyperämie und Entzündung verbunden sind, vermindert dagegen in den entgegengesetzten Zuständen *). *Peacock* zieht aus seinen Beobachtungen nur den allgemein gehaltenen Schluss, dass das specifische Gewicht des Gehirns bei an entzündlichen Hirnkrankheiten oder an solchen Krankheiten, die den freien Blutlauf durch die Lungen hemmen und welche Blutanhäufung im Gehirn bewirken, gestorbenen Personen ein höheres als bei an-

---

*) Zu den ersteren rechnet *Sankey* in mit der Reihenfolge abnehmendem Einfluss der pathologischen Veränderungen vor Allem: Trockenheit der *Arachnoidea*, Lymphe in den Kammern und an der Gehirnbasis, Gefässreichthum des Kleinhirns, Erweichung des *Fornix*, Verklebung der Hirnwindungen, Eiter in den Kammern, vermehrter Gefässreichthum der *Dura mater*, Erweichnng der grauen Substanz; zu den letzteren: Erweichung des *septum lucidum*, geringer Gefässreichthum des ganzen Gehirns, Erweichung des *Fornix*, des *corpus striatum*, Anämie der Rinden-, Erweichung der Marksubstanz.

Es lässt sich nicht verkennen, dass die Scheidung der Hirnveränderungen in entzündliche und nicht entzündliche hier weder genau durchgeführt ist, noch sich nach dem *Sankey*'schen Originale überhaupt durchführen lässt.

Digitized by Google

dern Todesursachen sei. *Engel* hat gefunden, dass nach acuten Krankheiten die Dichtigkeit der Rindensubstanz eine (besonders bei jungen Leuten beträchtlich) höhere ist, in chronischen Krankheiten aber unter das Mittel sinkt, während die Marksubstanz sich gerade umgekehrt verhalten soll.

Aus meinen Untersuchungen bin ich nicht im Stande, gleich zahlreiche und positive Folgerungen zu ziehen, wie die genannten Beobachter; in einzelnen Punkten bin ich sogar zu abweichenden Resultaten gekommen.

Um zunächst bei den krankhaften Veränderungen des Gehirns stehen zu bleiben, so habe ich bei Hyperämie, die sich noch bei der Obduction constatiren liess, das specifische Gewicht beider Substanzen des Grosshirns etwas über das Mittel erhöht gefunden.

	Zahl der Fälle.	Männer.	Zahl der Fälle.	Frauen.	Zahl der Fälle.	Total.
Rindensubstanz	6	1028,8	3	1036,4	9	1031,3
Marksubstanz .	12	1039	4	1042,12	16	1039,7

Bei Anämie fand sich das Gegentheil:

	Zahl der Fälle	Männer.	Zahl der Fälle.	Frauen.	Zahl der Fälle.	Total.
Rindensubstanz	1	1022,36	4	1030,5	5	1028,9
Marksubstanz .	3	1033,6	5	1038,0	8	1036,4

Für die Erweichung ergibt sich eher eine Ab- als Zunahme des specifischen Gewichts, wie auch *Bucknil* das Gewicht erweichter Stellen als unter dem Mittel stehend angegeben hat.

Digitized by Google

	Zahl der Fälle.	Männer.	Zahl der Fälle.	Frauen.	Zahl der Fälle.	Total.
Rindensubstanz	17	1028,5	3	1028,4	20	1028,5
Marksubstanz .	4	1032,6	3	1040,8	7	1036,1

Für die wenigen (2) Fälle der grösseren Derbheit der Marksubstanz ist eine Erhöhung (1041,4) bemerkt worden. Beträchtlichere Ansammlungen von Serum (über 6 *ccm.*) um und im Gehirn begleitet kein erhöhtes specifisches Gewicht, wie aus folgender Tabelle ersichtlich:

	Zahl der Fälle.	Männer.	Zahl der Fälle.	Frauen.	Zahl der Fälle.	Total.
Rindensubstanz	13	1029,5	7	1028,4	20	1029,1
Marksubstanz .	13	1040,0	7	1036,0	20	1038,7

Wohl aber scheint grosser und lange dauernder Druck durch die seröse Flüssigkeit die Dichtigkeit des Gehirns zu steigern, indem die höchsten spezifischen Gewichte, die ich gefunden, in solchen Fällen vorkommen (Tabelle der Männer Fall 3 und 7). Die häufig vorkommende oedematöse Beschaffenheit ist bald mit einem hohen, bald mit einem niedrigen specifischen Gewicht verbunden, ebenso die Atrophie der Rindensubstanz; die übrigen in den Tabellen aufgeführten Hirnveränderungen scheinen ohne constanten Einfluss auf die Dichtigkeit zu sein. Beim Rückenmark findet sich sowohl für den Zustand der Atrophie als der besonderen Derbheit ein erhöhtes specifisches Gewicht:

Digitized by Google

	Zahl der Fälle.	Männer.	Zahl der Fälle.	Frauen.	Zahl der Fälle.	Total.
Atrophie	5	1032,7	3	1031,3	8	1032,2
Verhärtung . . .	3	1030,7	2	1033,0	5	1031,6

Die erweichten Stellen sind ebenfalls im Gewichte vermindert (in 5 Fällen Mittel 1022); das höchste spezifische Gewicht kommt wie beim Gehirn bei starker freier Serumanhäufung vor. — Bei den übrigen Krankheiten wird man zwischen acuten und chronischen zu unterscheiden haben; von den ersteren habe ich an meinen Kranken fast nur Pneumonie oder Bronchitis beobachtet, welche die nächste Todesursache darstellten. Wo die Lungenentzündung ohne weitere Complication bestand (Tab. A.), hat sich ein über das Mittel erhöhtes spezifisches Gewicht des Gehirns gefunden: eine wahrscheinliche Folge der durch den gestörten Blutumlauf in den Athmungsorganen bewirkten Stauung in den Hirngefässen; (es erreicht jedoch die Vermehrung des Gewichtes bei weitem nicht die von *Engel* angegebene Höhe); verändert wurde das Resultat in den Fällen (Tab. B), wo vor und neben der Pneumonie eine Erschöpfung durch brandige Entzündungen, Zellgewebseiterungen etc. stattgefunden hatte, insofern das spezifische Gewicht der Rindensubstanz sich auf dem Mittel erhielt, das der Marksubstanz aber unter dasselbe herabsank.

Tab. A.

	Zahl der Fälle.	Männer.	Zahl der Fälle.	Frauen.	Zahl der Fälle.	Total.
Rindensubstanz	14	1030,9	5	1033,4	19	1031,6
Marksubstanz .	14	1040,5	5	1043,9	19	1041,4

Digitized by Google

Tab. B.

	Zahl der Fälle.	Männer.	Zahl der Fälle.	Frauen.	Zahl der Fälle.	Total.
Rindensubstanz	3	1027,4	2	1031,3	5	1029,9
Marksubstanz .	3	1036,4	2	1036,4	5	1036,4

Von den chronischen Abnehmungskrankheiten ist es die Tuberculose, welche ich allein in zahlreicheren Fällen als nächste Todesursache beobachtet habe (die 4 Fälle von Krebs, die in der Tabelle aufgeführt sind, eignen sich ihrer Complication mit Lungen- und Bauchfell-Entzündung wegen nicht als Beispiele für chronische Krankheiten). Die folgende Tabelle bestätigt nun zwar die Erfahrungen von *Engel* für die geringere Dichtigkeit der Rindensubstanz in chronischen Krankheiten, nimmt dieselbe aber abweichend von dieser auch für die Marksubstanz in Anspruch.

	Zahl der Fälle.	Männer.	Zahl der Fälle.	Frauen.	Zahl der Fälle.	Total.
Rindensubstanz	6	1027,1	6	1026,7	12	1026,8
Marksubstanz . .	6	1037,3	6	1036	12	1036,7

Die Behauptung von *Skae*, dass in der allgemeinen Paralyse das spezifische Hirngewicht sowohl der grauen als der weissen Substanz erhöht sei, hat mich veranlasst, die 15 Fälle von Paralyse, in welchen ich Wägungen angestellt habe, auf die Dichtigkeit der verschiedenen Hirntheile zu prüfen. Das Resultat ist, dass sowohl Rinden- als Marksubstanz eine geringere Dichtigkeit als die Gesammtzahl aller untersuchten Fälle

Digitized by Google

zeigen (erstere 1027,9, letztere 1036,4) und dass auch Kleinhirn und Rückenmark von dem Mittel nicht abweichen (1042,1 resp. 1028,1).

Auch für die zahlreichen Fälle von veraltetem Blödsinn (20), welche sich unter dem von mir untersuchten Material befinden, ergibt sich kaum eine Abweichung in der Dichtigkeit der Rinden- und Marksubstanz (erstere 1039,2, letztere 1030,8 im Mittel).

Ich glaube nach dem Mitgetheilten zu dem Ausspruche berechtigt zu sein, dass die bisherigen Untersuchungen über das specifische Gewicht des Gehirns, zumal die Verschiedenheit der angewendeten Untersuchungsmethoden eine nutzbare Vergleichung der gefundenen Werthe kaum zulässt, uns noch kaum wesentliche Ausbeute für dessen Bedeutung im Irresein gewähren, sondern auch die wenigen gefundenen Resultate noch der Bestätigung bedürfen; dass der Unterschied der Dichtigkeit des Gehirns in dessen gesundem und pathologischem Zustande noch keineswegs genügend festgestellt ist, und dass noch ausgedehnte weitere und nach der allein sicheren Methode der directen Wägung im Wasser angestellte Untersuchungen über das Verhältniss einzelner Hirntheile im gesunden und kranken Zustande erforderlich sein werden, um zu entscheiden, ob wir überhaupt hoffen dürfen, auf diesem Wege irgend neue Anhaltspunkte für die Aufhellung der den psychischen Störungen zu Grunde liegenden Gehirnbeschaffenheit zu gewinnen.

Digitized by Google

Ueber Papaverinwirkung bei Geisteskranken.

Von

Dr. **C. Stark,**

Director der Privat-Heilanstalt Kennenburg bei Esslingen.

Der Aufsatz der Herren Prof. *Leidesdorf* und Dr. *Bresslauer* „Ueber die beruhigende und schlafmachende Wirkung des Papaverin bei Geisteskranken„ (Vierteljahrschrift f. Psych. etc., von Prof. *Leidesdorf* und Dr. *Meynert*, Jahrg. I. Heft 3—4) gab mir Veranlassung, das Mittel bei verschiedenen Fällen von Geisteskrankheit anzuwenden. Die gewonnenen Resultate scheinen mir alle Beachtung zu verdienen und um so mehr einer Mittheilung werth, als die Beobachtungen über die Wirkung des Papaverin beim Menschen zur Zeit noch sehr spärlich fliessen. Dieselben beschränken sich meines Wissens auf die Eingangs angeführte Arbeit und die Angabe *Reissner*'s (Zeitschr. f. Psych. Bd. XXIV. Heft 1 und 2, 1867), dass die Wirkung des Papaverin der des Narcotin gleiche, dass dasselbe auf Puls, Temperatur, Unruhe keinen Einfluss habe, dass aber die eintretende Myose eine Wirkung auf das Centralorgan vermuthen lasse. Versuche an Thieren ergaben nach *Albers*, dass das Papaverin im Blute schwer löslich sei, daher langsam wirke, dass es anfangs erhöhte Empfindlichkeit verursache, die in

Krampf und dann in Muskelschwäche übergehe. *Claude Bernard* spricht dem Papaverin jede schlafmachende Wirkung ab.

Eine Arbeit von Dr. *Baxt* „Ueber die physiologische Wirkung einzelner Opium-Alcaloide" war es, welche *Leidesdorf* und *Bresslauer* zu Versuchen mit Papaverin anregte. Dasselbe ist nach den Versuchen von Dr. *Baxt* ein vorzugsweise schlafmachendes Mittel. Prof. *L.* und Dr. *Br.* haben sich durch Controlversuche an Thieren von der Richtigkeit der von Dr. *Baxt* angegebenen Thatsachen überzeugt und in Uebereinstimmung mit demselben gefunden, dass das Papaverin bei Frõschen, Kaninchen, Meerschweinchen schlafmachend wirke und eine exquisit relaxirende Wirkung auf das Muskelsystem ausübe. Die letztere Wirkung war so auffällig, dass bei durch Strychnin und Thebain tetanisirten Frõschen nach Papaverin-Injection der Tetanus alsbald nachliess und in kurzer Zeit verschwand. Als weitere Wirkung des Papaverin traten regelmässig Verlangsamung des Pulses und Verengerung der Pupille ein. Ferner zeigte sich, dass eine grosse Toleranz gegen das Mittel bestand; während alle mit Morph.-Injectionen behandelten Frõsche zu Grunde gingen, erholten sich die mit Papaverin behandelten bald wieder, und nur hohe Dosen hatten den Tod zur Folge. Die von *Albers* angegebene gesteigerte Empfindlichkeit wurde nur nach Injectionen grosser Dosen beobachtet.

Nach diesen Ergebnissen wandten *L.* und *Br.* das Papaverin bei 7 Geisteskranken (secundären Formen von Verrücktheit mit Aufregung) an, bei denen allen die üblichen Beruhigungsmittel: Opium, Morph., Bromkali, Bäder, ohne Erfolg versucht worden waren. In allen Fällen trat die gewünschte Wirkung ein, und fassen *L.* und *Br.* die durch Krankengeschichten belegten, aus-

Digitized by Google

serordentlich günstigen Resultate in folgenden Sätzen zusammen:

„1) Das Papaverin hat auf den Menschen eine schlafmachende Wirkung.

2) Es setzt die Muskelthätigkeit herab und ist bei Tobsüchtigen auch in dieser Beziehung von Nutzen.

3) Es vermindert mit Sicherheit die Zahl der Pulsschläge, nicht nur in Fällen, wo diese mit der heftigen Muskelaction steigen, sondern auch bei den sich ruhig verhaltenden melancholischen Kranken.

4) Die beruhigende Wirkung wird von keinem Aufregungszustand eingeleitet.

5) Es erzeugt, innerlich oder subcutan angewendet, weder Uebelkeit noch Erbrechen, weder Schwindel noch Eingenommenheit des Kopfes, bewirkt keine Verstopfung, sondern pflegt sie in manchen Fällen zu heben.

6) Die subcutane Anwendung des Papaverin muriatic. bringt durchaus keine nachtheilige Wirkung an der Einstichstelle oder in der Umgebung hervor.

7) Die Wirkung des Papaverin tritt in der Regel langsam, gewöhnlich 4 bis selbst 7 Stunden nach der Darreichung ein und pflegt nach 24—48 Stunden sich noch nicht gänzlich verloren zu haben.

8) Das Papaverin erweist sich in Fällen wirksam, wo Opium und Morphium selbst in grossen Dosen wirkungslos geblieben waren.

9) Eine Gewöhnung an das Mittel tritt zum wenigsten nicht bald ein, und ist eine Steigerung der Dosis daher selbst bei längerem Gebrauch nicht nöthig.

10) Das Papaverin bekämpft Aufregung, Tobsucht und Schlaflosigkeit nur pallativ, auf die Geistesstörung oder vielmehr auf den ihr zu Grunde liegenden Process übt es keinen directen merklichen Einfluss.

11) Die bei längerer Anwendung des Papaverin in vielen Fällen auftretende bessere Ernährung der Kranken

Digitized by

ist von der grösseren Beruhigung und dem wiedergekehrten Schlaf abhängig."

In den von *L.* und *Br.* angeführten Fällen trat die gewünschte Papaverin-Wirkung jedesmal ein. Das gleiche Resultat kann ich nicht von meinen Versuchen rühmen, und ich halte es deswegen für nöthig, die in Nachfolgendem mitzutheilenden Krankengeschichten nicht gar zu aphoristisch wiederzugeben, um so womöglich einen Beitrag zur Gewinnung bestimmterer Indicationen für das Mittel zu liefern.

Das Präparat, dessen ich mich bediente, war salzsaures Papaverin, von Herrn *Merk* in Darmstadt direct bezogen. Zur subcutanen Injection empfiehlt es sich nicht, grössere Mengen in Lösung vorräthig zu halten, was auch *L.* und *Br.* fanden, da das Papaverin nur in warmem Wasser gelöst bleibt und nach dem Erkalten sich rasch in Krystallform ausscheidet. Ich habe deshalb nach der Angabe von *L.* und *Br.* die jedesmalige Dosis (1 Gran in der Regel) erst vor der Anwendung in einem Probirglas gelöst, indem ich bis zum Schwinden der Krystalle erwärmte.

Die Fälle, in welchen Papaverin in Anwendung kam, waren folgende:

1) *v. R.*, 48 Jahr alter Militair, aufgenommen am 26. März 1868.

Leidet seit mehreren Jahren an *Tabes saturnina*, gegen welche alle mögliche Mittel erfolglos gebraucht wurden. Wegen heftiger täglicher neuralgischer Schmerzen, hauptsächlich in den fast völlig gelähmten unteren Extremitäten, machte Pat. täglich subcut. Injectionen von *Morph. acetic.* In Folge derselben bildete sich ein melancholischer Zustand aus, mit Neigung zu Selbstmord, weswegen die Aufnahme erfolgte. Mittelgrosser Mann, zum Skelet abgemagert. Lähmung der oberen Augenlider, blaugraues Zahnfleisch, Brust- und Unterleibsorgane ohne nachweisbare Erkrankung. Sehr träger Stuhlgang, Puls schwankt zwischen 108 bis 120, klein und leer. Untere Extremitäten gelähmt, werden beim Gehen an 2 Stöcken, was nur sehr beschränkt möglich ist,

unbeholfen geschleudert, biegen sich beim Stehen sprenkelartig nach hinten. Sensibilität erhalten. Grosse Schwäche, häufige Anwandlungen von Ohnmacht machen den fortwährenden Gebrauch von Reizmitteln nöthig. Am Tage häufig lancinirende Schmerzen in den Beinen, die sich Abends steigern. Jeden Abend um 8 Uhr wird $_1{}^1{}_0$ Gr. *Extr. Opii* injicirt; danach lassen die Schmerzen nach, Pat. kann ruhig liegen und auch einige Stunden schlafen. Morgens stets ziemlich starke Nachwirkung der Injection (Katzenjammer), Uebelkeiten, Schwächegefühl, grosses Unbehagen. Wird die Injection einmal des Abends einige Minuten später gemacht, so geräth Pat. in einen unerträglichen Zustand, höchste allgemeine Unruhe, Zittern in allen Gliedern, Ameisenkriechen in den Beinen, Taubheit der Hände. Nach der Injection verliert sich dieser Zustand sofort. Das morgendliche Unbehagen wurde längere Zeit durch Coca-Thee, den Pat. statt Kaffee trank, sehr gebessert. Die stärkere Wiederkehr desselben gab Veranlassung statt des Op. Extractes das Papaverin zu versuchen.

Am 28. Mai, Abends 6 Uhr, wurde 1 Gr. Papav. muriat. innerlich gegeben. Um 8 Uhr, zur Zeit der Injection, grosse nervöse Aufregung. In der Nacht fast kein Schlaf, erst früh von 6—9 Uhr tiefer und fester Schlaf. Der Puls von 108 auf 92 gesunken. Keine Myosis.

Am 29. Mai, Nachmittags 4 Uhr, 1 Gr. Pap. Puls 108. Danach das Gefühl vermehrter Wärme und Schwere in den Gliedern. Nach 2 Stunden grosses Unbehagen, Uebelkeit und Erbrechen. Um 8 Uhr wieder grosse Aufregung, Schmerzen in den Gliedern. Der Kranke bittet flehentlichst um eine Injection. Man injicirt $_1{}^1{}_2$ Gr. *Extr. Opii*. Sehr unruhiger Schlaf in der Nacht, angstvolle Träume. Puls früh 92. Stuhlgang durch Clystier.

Am 30. Mai, Nachmittags 3 Uhr subcutane Injection von $\frac{1}{2}$ Gr. Papav. Puls 92. Nach 1 Stunde Gefühl von Betäubung, Schwere in den Gliedern, Uebelkeit. Um 8 Uhr muss wegen grosser allgemeiner Unruhe und heftigen Schmerzen in den Beinen eine Injection von Op. Extr. gemacht werden. Nacht sehr unruhig, Schlaf nur Viertelstunden lang, von angstvollen Träumen unterbrochen. Puls früh 88. Am 31. Mai, Nachmittags, 24 Stunden nach der Injection, mehrstündiger tiefer Schlaf. Keine Myose. Pat. verweigert die weitere Anwendung des Mittels. Am 2. Juni war der Puls wieder auf 108 gestiegen. Am 7. Juni konnte Pat. nochmals zu einer Injection überredet werden. Man injicirte früh 9 Uhr 1 Gr. Papaver. Puls 110. Abends musste eine kleine Dosis Extr. Op. injicirt werden. Nacht fast ganz schlaflos, erst nach 24 Stunden trat

Digitized by Google

ein 2 Stunden langer, tiefer Schlaf ein. Puls 88. Auf die Verstopfung hatte das Papaver. keinen Einfluss. Von da an war Pat. nicht mehr zu einer Injection zu bewegen.

2) *v. X.*, Oekonom, 29 Jahr alt, aufgenommen am 13. Mai 1868.

Fehlerhafte Erziehung, Flatterhaftigkeit und mangelhafte Bildung, in Folge deren bedeutende Vermögensverluste, werden bei vorhandener erblicher Disposition als ursächliche Momente angegeben. Kam nach einem längeren Aufenthalt im Ausland krank nach Haus zurück. Grosser, blühend und gesund aussehender Mann, kräftig gebaut. Rechte Pupille erweitert, linke eng, beide träg reagirend, Sprache nicht auffallend verändert, Zunge zittert beim Herausstrecken, weicht nicht von der Mittellinie ab. Zittern der Hände, schleppender Gang. Ausgeprägtes Grössenwahndelirium; hat grosse Besitzungen, will grosse Reisen machen, ungeheure Etablissements errichten. Höchste Euphorie, grosse und unausgesetzte körperliche Agitation, läuft überall umher, spricht beständig. Schläft die Nächte fast gar nicht und stört häufig durch anhaltendes lautes Sprechen des Nachts. Stuhlgang regelmässig, Puls schwankt zwischen 112—120, selten unter 100.

Vom 28. Mai an wurde täglich, Nachmittags 4 Uhr, 1 Gran *Papav. muriat.* gegeben und am 1. Juni wurde, um womöglich eine schläfernde Wirkung auch für den Tag herbeizuführen, auf 1½ Gr. gestiegen. Gleich nach der ersten Gabe schlief Pat. ruhiger, der Puls sank von 92 auf 80. Das Papaverin wurde den ganzen Juni hindurch fortgegeben. Nächtliche Störungen kamen nie mehr vor, der Kranke schlief anhaltend gut. Er wurde auch am Tage ruhiger, war weniger agitirt, betrug sich geordneter. Der täglich notirte Puls sank einige Mal auf 60, war in der Regel 70—76, nur einmal 104 und 108. Stuhlgang immer regelmässig. Die erweiterte rechte Pupille wurde enger, so dass beide Pupillen fast gleich weit waren. Anfang Juli musste das Mittel ausgesetzt werden, weil es nach der jedesmaligen Darreichung wieder ausgebrochen wurde. Der Schlaf blieb seither auch ohne dasselbe gut, der Puls wurde aber wieder frequenter und hält sich auf 96 bis 112. Während des Papaveringebrauchs wurde eine Zunahme des Körpergewichts constatirt.

3) *R.*, 24 J. alt, Kaufmann, aufgenommen am 12. März 1868.

Anfang des Jahres in New-York an Melancholie erkrankt. Genauere Mittheilungen fehlen. Körperlich, ausser einer ziemlich ausgeprägten Anämie, gesund. Obstipation. Frequenter Puls. Spricht fast gar nichts, beantwortet selten eine Frage. Steht Stun-

Digitized by Google

den lang im Zimmer, den Hut auf dem Kopf, und starrt auf den Boden. Schläft die Nächte sehr wenig und unruhig. Onanirt. Bekommt Schwalbacher Wasser, kalte Sitzbäder, wegen trägem Stuhl häufig Bitterwasser.

April. Mehrere Fluchtversuche. Einmal plötzlich sehr aufgeregt, spricht geläufig, er wolle fort, versinkt ebenso rasch wieder in die vorige Lethargie. Puls immer über 100, bisweilen 120. Schlaf anhaltend schlecht.

Mai. Dasselbe dumpfe Brüten. Antwortet auf alle Fragen mit einem zweifelnden Lächeln oder indem er die Frage wiederholt. Häufig plötzlich eintretende und rasch vorübergehende Congestionen nach dem Kopf, bisweilen mit, bisweilen ohne psych. Aufregung, rothes Gesicht, verschwommene Augen, heisser Kopf, rascher, starker Herzschlag. Schlaf immer unruhig, ruft häufig den Wärter des Nachts, kommt an sein Bett. Immer träger Stuhlgang. Vom 30. Mai bis 24. Juni täglich Nachmittags 4 Uhr ein Gran Papaverin. In dieser Zeit schlief Pat. anhaltend ruhig, auch wenn er, was öfter vorkam, am Tag aufgeregt war. Nur einmal sprach er fast die ganze Nacht. Während des Papaveringebrauchs anhaltend enge Pupillen, die sich beim Beschatten des Auges nur wenig erweitern. Der Puls, der am 30. Mai 126 war, sank am 31. auf 116, am 1. Juni auf 84, am 2. Juni auf 70 und blieb von da an zwischen 70 und 76. Nur 2 Mal stieg er über 80. Stuhlgang blieb träg. Wegen öfter wiederkehrender Aufregung am Tag setzte man vom 24. Juni an das Papaverin aus und gab 3 Mal täglich 1 Gran Opium. Hierbei traten die Aufregungen seltener und in geringerem Grade ein, der Schlaf war aber weniger regelmässig, der Puls stieg wieder über 100. Die Beobachtung wurde durch den Austritt des Kranken unterbrochen.

4) *J. W.*, Kaufmann, 60 J. alt, aufgenomm. den 26. August 1867.

Erbliche Anlage. Vor 20 Jahren ein Tobsuchtsanfall, der nach einem Jahr mit Genesung endete. Seither immer gesund. Lebhafter Mann, in seinen Kreisen (mittlerer Bürgerstand) als Spassmacher und jovialer Gesellschafter beliebt. An den täglichen Genuss von Bier und Wein in mehr als mässigen Dosen gewöhnt. Im Sommer 1867 wurde Pat. wegen geistiger Aufregung nach Kissingen ins Bad geschickt. Durch unmässigen Genuss von Ragotzi und Wein steigerte sich die Aufregung, und verschiedene von dem Kranken begangene Excesse machten die Unterbringung in die Anstalt nöthig. Kleiner, sehr dicker Mann, der ausser übermässiger allgemeiner Fettentwicklung, leichtem Lungenemphysem, beschleunigtem Puls und einem Nabelbruch keine körperlichen

Digitized by Google

Krankheitssymptome bietet. Stuhlgang regelmässig. Vom August 1867 bis Mai 1868 fast anhaltende Aufregung, die sich mehrmals bis zu furibunder Manie steigert. Grosse Schwatzlust und Begehrlichkeit. Bemalt die Wände des Zimmers mit Koth, kratzt mit Scherben und dergl. obscöne Figuren an dieselben. Klebt mit Speichel und Schnupftaback allerhand Papiere zusammen. Zerstört die Nachthäfen und sucht sich daraus Schlüssel zum Oeffnen der Thüren zu machen. Versucht die Thür anzubrennen. Lässt absichtlich den Urin ins Zimmer oder in sein Trinkgefäss. Lügt frech, schiebt alle diese Unfertigkeiten auf den Wärter, verketzert denselben auf alle mögliche Art und Weise, schimpft auf die Anstalt, hält sich für ganz gesund. Häufige Fluchtversuche. Bei Spaziergängen schreit er alle Leute an. Gedächtniss gut, erzählt viel aus seinem Leben, wobei sich die Vorstellungen (resp. Erinnerungen) beständig überstürzen. Nächte sehr unruhig, schläft wenig, benutzt meist die Nacht zur Ausführung von allerhand Unfertigkeiten, zerreisst das Bett, legt die Matrazen über einander, um an das Fenster zu gelangen und das Drathgitter zu zerstören. Puls immer 90 bis 100, bisweilen mehr. Stuhlgang regelmässig. Wiederholte Versuche, den Kranken an der allgemeinen Geselligkeit Theil nehmen zu lassen, scheitern an der Unfähigkeit und dem obscönen Betragen desselben und haben immer grössere Aufregung zur Folge.

Vom 19. Mai an gab man täglich 3 Mal 1 Gr. Op. und ging dann am 28. zu subcut. Morph.-Injectionen über. Es wurde mit 2 Mal tägl. ¼ Gr. begonnen und allmälig auf 2 Mal täglich ½ Gr. gestiegen. Der Kranke wurde dabei ruhiger und etwas gesammelter, schlief meistens des Nachts und trieb nur ausnahmsweis seine früheren Unfertigkeiten, war auch unter Tags häufig zu Schlaf geneigt. Es fiel auf, dass Pat. bei theilnehmender Zusprache oder bei dem Hinweis auf seine Angehörigen leicht in eine gerührte, weinerliche Stimmung verfiel, wie man dies bei Gewohnheitstrinkern häufig beobachtet. Constant blieb die Neigung, Papier mit Speichel oder Urin zusammen und an die Wand zu kleben. Der Puls sank bis auf 54. Anfang Juni, obgleich man auf 2 Mal täglich 1 Gran Morph. stieg, wieder grössere Aufregung. Wird sehr gereizt und maliziös, absichtlich unreinlich, bemalt die Wände und die Schlüssellöcher mit Koth, singt viel. Nachts sehr unruhig, versucht jede Nacht in seiner Zelle etwas zu demoliren. Puls zwischen 90 und 112. Stuhl regelmässig.

Vom 8. Juni an wurde täglich früh 10 Uhr 1 Gr. Papaverin gegeben und am 12. auf täglich 1½ Gr. gestiegen, wieder in der

Digitized by Google

Absicht, die beruhigende Wirkung auch auf den Tag auszudehnen. Der Kranke schlief gleich nach der ersten Dosis ruhig und der Schlaf blieb auch in der Folge gut. Die gereizte Stimmung verlor sich, Pat. wurde reinlicher und konnte täglich mehrere Stunden an der allgemeinen Geselligkeit Theil nehmen. Ein lautes, auffälliges, hanswurstartiges, oft kindisches Benehmen blieb immer. Der Puls sank auf 70 und hielt sich fortan zwischen 70—80. Pupillen anhaltend eng, bei Beschattung des Auges sich wenig erweiternd.

Am 1. Juli Besuch der Frau. Danach grössere Aufregung, die am 10. in einen wirklichen Tobsuchtsanfall überging, Pat. schreit, schimpft, flucht, greift den Wärter an. Der Puls stieg auf 90, die Nächte blieb Patient ruhig, schlief. Wegen der grösseren Aufregung gab man vom 10. Juli an bis 18. August 2mal täglich 1½ Gr. Papaver. In dieser Zeit blieb Pat immer in einer sehr gereizten Stimmung, war maliziös, unfläthig, grob, dazwischen plötzlich höchst gutmüthig, sang viel. Der Schlaf blieb trotzdem immer gut, nur einigemal trieb der Kranke gegen Morgen bei anbrechendem Tage die früheren Unfertigkeiten. Puls immer 70—76, bei stärkerer Aufregung einmal 90. Anhaltend enge Pupillen.

Am 18. Aug. trat ein Darmkatarrh ein, gegen den bis zum 22. 4mal tägl. 1 Gr. Op. gegeben wurde. Der Kranke war in dieser Zeit unter Tags auffallend ruhig, gutmüthig, weinerlich und schlief auch Nachts gut. Man gab desshalb das Opium auch nach Beseitigung des Durchfalls fort und stieg im Laufe des Sept. auf 4mal tägl. 2 Gr. Die gereizte Stimmung verlor sich auf die Dauer, Pat. wurde gesammelter, fügsamer, reinlicher, für Zusprache zugänglicher, schlief anhaltend gut, er wurde ferner verträglicher und kann sich gegenwärtig (Ende Oct.) ziemlich ohne Anstoss in der Geselligkeit bewegen. Ein auffallendes lautes Benehmen scheint im Naturell zu liegen. 2mal trat seit Anfang Sept. auf äussere Veranlassung eine rasch vorübergehende tobsüchtige Aufregung ein. Verstopfung wurde während des Opiumgebrauches nicht bemerkt, der Puls hielt sich zwischen 70 u. 80.

5) Frau *D.* 49 J. alt. Leidet seit vielen Jahren an period. Tobsucht der heftigsten Art. Genauere Angaben über Entwicklung der Krankheit und den früheren Verlauf fehlen. Patientin ist eine kleine, zartgebaute Frau, die keine körperlichen Krankheitssymptome darbietet. Beginnende *Cessatio mensium*, Menstruation unregelmässig. Pat. verbringt in der Regel die Zeit vom Novemb. oder December bis Juni oder Juli in der furibundesten und anhaltendsten Tobsucht, die zeitweis so heftig war, dass

Digitized by Google

man befürchtete, sie werde den Anfällen erliegen. Die lebhaftesten Täuschungen des Gesichts, Gehörs, Allgemeingefühls rufen die grässlichsten Wuthausbrüche hervor oder steigern die Kranke in dieselben hinein. Sie kann Wochen lang Tag und Nacht hindurch schreien, toben und wüthen, befindet sich während der tobsüchtigen Periode auch in den relativ ruhigeren Zeiten in beständiger körperlicher Agitation, fortwährendem Affect und geistiger Aufregung. In der Regel tritt Anfang Sommers im Laufe von 2—3 Wochen rasch Beruhigung ein, die Kranke bekommt das Bewusstsein, dass und wie heftig sie getobt hat, erzählt die Sinnestäuschungen,die sie hatte, und die sie jetzt als solche erkennt, arbeitet fleissig und bietet 6—8 Wochen lang, ausser leichten hypochondrischen Vorstellungen, einem etwas affectirten Wesen und angstvollen Träumen keine weiteren psych. Abnormitäten. Dann steigern sich die hypochondrischen Vorstellungen allmählig bis zu tiefer Melancholie. Pat. fürchtet den Wiederausbruch der Tobsucht, fühlt grosse Willenlosigkeit und Unschlüssigkeit, eine beständige innere Angst treibt sie ruhelos umher, sie seufzt immer laut und tief, arbeitet nichts, „weil sie alles verkehrt mache," will nicht essen, „weil sie nicht verdaue." Dieser Zustand, in welchem die Kranke ein höchst bejammernswerthes Bild darbietet, dauert 2—3 Monate, dann fängt Pat. häufig an, widerlich zu lachen, Nachts zu singen und wenige Tage nach Eintritt dieser Symptome bricht die Tobsucht wieder aus.

Am 7. Juni, während der Tobsuchtsperiode, wurde, weil Pat. mehrere Tage und Nächte in einem Zug sehr heftig getobt hatte, früh 9 Uhr eine subcutane Inject. von 1 Gr. Papaver. gemacht. Puls sehr frequent, wegen grosser Unruhe der Kranken nicht zu zählen. Am Nachmittag war Pat. ruhiger, wenn auch sehr gereizt, schlief die ganze darauffolgende Nacht. Am 8. früh Wiederholung der Inject. Die Kranke, die vordem den ganzen Tag auf- und abging, beständig schwatzte, laut schrie und sang, verhielt sich ganz ruhig, sass viel und schlief die ganze Nacht, Puls am 9. früh 88. Keine Verstopfung. Veränderung an der Pupille wurde vergessen zu notiren. Die Injection konnte nicht wiederholt werden, weil Pat. sich auf das Heftigste dagegen sträubte, in der Idee, man wolle sie electrisiren. Vom 9. bis 10. schlief sie noch die ganze Nacht, am 10. grössere Aufregung, am 11. wieder die heftigste Tobsucht.

Im Juli trat Beruhigung ein, im September fing das melancholische Stadium an. Gegen Ende September Klagen über unruhigen, häufig unterbrochenen Schlaf. Desshalb gab man bis

Digitized by Google

Ende Oktober täglich 1 Gr. Papaverin, ohne wesentlichen Erfolg. Pat. wachte trotzdem jede Nacht 4—5mal auf, schlief aber leicht wieder ein. Der Puls, der vordem 90—100 war, blieb auf dieser Höhe. Myose nicht bemerkbar. Von Mitte October an Klagen über trägen Stuhl, die melancholische Stimmung wird immer mächtiger.

6. Fräul. *W.*, 59 Jahre alt, aufgenommen den 15. Juli 1868.

Verzogene, von Jugend auf verwöhnte Dame, nie an eine ernste Beschäftigung gewöhnt. Bei vorhandener erblicher Anlage entwickelte sich im Winter 1867/1868 in Verbindung mit einem Herzleiden ein Zustand nervöser Aufregung mit verkehrten Handlungen und Benehmen, grosser Steigerung schon vorhandener unangenehmer Charaktereigenschaften, in Folge dessen die Unterbringung in einer Anstalt nothwendig wurde. Kleine magere Person, Kyphose der mittleren Brustwirbel. *Struma cystica*, besonders stark rechts. Beide Carotiden als harte Stränge zu fühlen, linke pulsirt stärker als die rechte, was auf Rechnung der rechts stärker entwickelten Struma gesetzt wird, die in die obere Brustapertur hinabgeht. Spitzenstoss des Herzens im 5. und 6. Intercostalraum bis 2 Querfinger breit ausserhalb der Mammillarlinie zu fühlen. Percussion ergiebt Hypertrophie des linken Ventrikels. Beide Herztöne klappend, beim 1. Ton ein deutliches Geräusch, 2. Ton unrein. Beide Brachial-Arterien hart, aber nicht geschlängelt. An beiden Ober- und Unterschenkeln zahlreiche Varices. Puls 108. Klagen über grosse Unruhe, gänzliche Schlaflosigkeit, Herzklopfen, „Wuseln" in den Füssen, Einschlafen der Hände. Bedürfniss, immer zu laufen. Eine triebartige Unruhe treibt die Kranke von einem Ort zum andern, sie läuft fast beständig im ganzen Hause umher von Zimmer zu Zimmer. Höchste Unschlüssigkeit, fragt fortwährend, was sie thun solle, ob sie stehen oder sich setzen solle, ob sie sich auf den Stuhl oder auf das Sopha setzen solle etc. Fortwährendes Denken an ihre körperlichen Leiden, klagt Jedermann ihre Beschwerden, lässt sich von Jedermann an den Puls fühlen. Glaubt, sie werde nicht gesund, sterbe bald, sie sehe es den Leuten an, sie müsse noch in die Zelle. Gegen die beschleunigte Herzthätigkeit war schon früher Digitalis ohne Erfolg gebraucht worden. Am 20. Juli Nachmittags, gab man 1 Gr. Papaverin. Danach kein Schlaf, Puls 108. Am 21., Nachmittags, Injection von 1 Gr. Papaverin, am 22. von 1½ Gr. Auch danach trat kein Schlaf, nicht einmal grössere Ruhe ein, der Puls blieb 100 bis 112. Pupillen nicht verändert. Patientin wurde später unter Gebrauch von Bromkali mit kleinen Dosen Morphium ruhiger, der Puls sank bis 84.

Digitized by Google

7. Fräul. *P.*, 17 J., aufgenommen den 27. April 1868.

Als Ursachen der Krankheit werden späte sexuelle Entwicklung, Ueberbildung, nachtheiliger Einfluss des Vaters, angegeben. Seit Herbst 1867 leicht melancholischer Zustand. Am 25. April 1868 plötzlicher Ausbruch von Tobsucht nach einer heftigen Alteration. Gesundes kräftiges Mädchen, noch nicht menstruirt. Sehr aufgeregt, spricht und schreit fortwährend, ist in beständiger Agitation, zerreisst ihre Kleider. Grosse Ideenflucht, schläft fast keine Nacht. Immer sehr rascher Puls, 112—120, der durch Digitalis nicht herabgesetzt wird. Stuhlgang regelmässig. Von Mitte Mai an wurden *Blaud*'sche Pillen in der *Niemeyer*'schen Modification gegeben. Tobt den ganzen Mai und kommt in Folge dessen sehr herunter.

Am 2. Juni Nachmittag 1 Gr. Papaver. innerlich. Puls 108. Schlief danach die ganze Nacht. Am 3. viel Neigung zu Schlaf. Puls 100. Nachmittags wieder 1 Gr. Papaver. Danach wieder ruhige Nacht, Puls 88. Am 6. Papaver. wegen Eintritt der Periode ausgesetzt. Bei fortbestehender Verwirrtheit war Pat. ruhiger, weniger agitirt, blieb im Bett. Am 7. Nachts ohne Papaver. ruhig, Puls 72. Leichte Pupillenverengerung, Stuhl immer regelmässig. Am 9. war die Periode vorüber, Pat. wurde wieder unruhiger. Man gab von da an jeden Nachmittag 4 Uhr 1 Gr. Papaver. Die Kranke schlief seitdem Nachts immer gut, war auch am Tage weniger unruhig und laut, wenn auch fortwährend erregt und heiter verwirrt. Zu keiner Beschäftigung fähig. Sehr starker Appetit. Puls stets 80—88. Stuhlgang regelmässig, Pupillen eng. Von Ende Juni an grössere Ruhe und mehr Klarheit, Pat. bekommt ein Verständniss ihrer Umgebung, fängt an zu arbeiten. Puls bleibt 80–88. Am 2. Juli Wiederkehr der Periode, ohne grössere Aufregung zu bewirken. Im Lauf des Juli bei Fortgebrauch des Papav. immer grössere Beruhigung, zunehmende geistige Klarheit, anhaltend ruhige Nächte, selbst wenn einmal Abends eine grössere Erregung vohanden war. Zunahme des Körpergewichts, blühendes Aussehen. Puls 80—84. Anhaltend enge Pupillen. Vom 1. Aug. an auch ohne Papaverin dauernd ruhig, fortschreitende Reconvalescenz bis zur Entlassung am 1. Oct.

8. *C. D.* 19 Jahr alte Weingärtners Tochter. Aufgen. den 3. Sept. 68. Familienzerwürfnisse, Rohheit des Vaters werden als Ursachen angegeben. Mittelgrosses, abgemagertes Mädchen, *Herpes labialis*, leichte Lordose der Rückenwirbel. Die weitere Untersuchung, die wegen heftigen Sträubens und fortwährender Agitation nur flüchtig vorgenommen werden konnte, ergab keine wesentlichen

Digitized by Google

Abnormitäten. Tieftrauriger Gesichtsausdruck, matte, meist halb geschlossene Augen, schlaffe, schläfrige Bewegungen, oft wie im Traum. Puls klein, frequent 112. Jammert in Einem fort, fast Tag und Nacht, sie sei dumm, es gehe ihr wie ein Rad im Kopf herum, sie wolle nicht gesund werden. Weigert sich zu essen und muss desshalb gefüttert werden. Vom 5—14. wurde 3mal tägl. eine Morph.-Inject. gemacht bis zu ¼ Gr. pro dosi. Ausser dass Pat. seitdem besser ass, war eine besondere Aenderung nicht bemerkbar. Sie jammerte und klagte anhaltend, sang Sterbelieder, zog sich aus, zerriss die Kleider, flocht die Haare auf, verbrachte die Nächte in grosser Unruhe, stieg immer aus dem Bett, sagte oft Stunden lang immer dasselbe, z. B. „ich bin die Dümmste", oder „ich bin der Teufel". Bisweilen intercurrent heitere Selbstverhöhnung, sagt unter ausgelassenem Lachen: „ich bin aber dumm, ich bin krumm vor Dummheit." Stuhlgang regelmässig, Puls 100—112

Vom 19—30. September wird einen Tag um den andern früh 10 Uhr 1 Gr. Papaverin subcut. injicirt. Seitdem verbrachte die Kranke die Nächte anhaltend ruhig, schwatzte nur einmal noch bis ½11, stieg nie mehr Nachts aus dem Bett. Auch unter Tags war sie ruhiger, weniger laut, sorgfältiger in der Kleidung, flocht sich nur selten das Haar auf. Dabei trat eine eigene Veränderung bei der Kranken ein. Der Kern ihres Deliriums ist ein trauriger geblieben, sie glaubt in einem Bordell zu sein, glaubt, dass wir alle ihrer Unschuld nachstellen, und weist deshalb alle Annäherung mit Unwillen und Schimpfreden ab, aber sie äussert dies Alles unter beständigem, ausgelassenem, verwirrten Gelächter, sie äussert ihren Zorn, ihren Unwillen, ihre Erbitterung, ihre Klagen lachend. Bisweilen fängt sie in ernsterer Stimmung an zu schimpfen, setzt dies aber plötzlich mit heiterem Lachen fort. Sie klagt lachend über ihre Dummheit, dass ihr die Gedanken fehlen. Neben einem an Gefrässigkeit grenzenden Appetit, fiel noch auf, dass Pat. sehr viel speichelte. Puls sank auf 80. Verengerung der Pupillen. Stuhlgang regelmässig.

Vom 1. Oct. an gab man das Papaverin innerlich, täglich 1 Gr. und zwar, da Pat. nichts einnehmen wollte, jeden Nachmittag im Kaffee. Der Erfolg ist derselbe geblieben, die Kranke ist äusserlich relativ ruhig, schläft Nachts immer gut. Der Puls bleibt 80—84. Erhebliche Zunahme des Körpergewichts, blühendes, frisches Aussehen. Anhaltend vermehrte Speichelsecretion. Am 20. Oct. trat die Periode zum ersten Mal ein. Während derselben keine grössere Aufregung.

Digitized by Google

9. *R. M.*, 17 J., Apothekerlehrling, aufgenommen den 12. September 1868.

Erbliche Anlage, Bruder geisteskrank. Als Knabe flatterhaft, Unlust zu ernster Arbeit, oft scheu, aufbrausend. Mittelmässige Fähigkeiten. Kommt im 15. Jahre zu einem Apotheker in die Lehre. Wechselt zweimal den Lehrherrn, weil er sich mit keinem vertragen kann, will sich nichts sagen lassen, alles besser wissen. Verlässt aus diesem Grunde Mitte Juli seinen dritten Lehrherrn. Geht zu einem Physikus und bittet, dass dieser ihn prüfe, „er habe ausgelernt." In Wirklichkeit hat Pat. noch zwei Jahre zu lernen. Kommt in ziemlicher Aufregung zu Hause an, spricht immer davon, dass er ausgelernt habe, bietet aber, ausser einem exaltirten, leicht gereiztem Wesen, öfteren Klagen über allgemeines Unbehagen und schlechten Schlaf, Wochen lang keine weiteren Krankheitszeichen.

Am 10. September ziemlich plötzlich Ausbruch von Beängstigungen, Furcht vor Dieben, am nächsten Tag die Idee, er sei vergiftet, sein Vater wolle ihn erschiessen. In Folge dessen grosse Aufregung, die am 12. September die Aufnahme nöthig machte Pat. sieht abgemagert und verfallen aus. Belegte Zunge, klagt über beständigen Schmerz rings um den Nabel, der 2—3 Mal am Tage heftige Exacerbationen macht. Pat. glaubt, der Schmerz rühre von einer Vergiftung her und geräth während der Paroxysmen, die 2-4 Stunden andauern, in die grösste Aufregung, schreit weint, ruft Hülfe, verlangt Polizei, bittet flehentlich, man solle ihm beistehen, hier sitze das Gift (auf den Nabel zeigend), er fühle, wie es nach dem Magen heraufsteige.

Der Kranke ass mit grossem Appetit, war verstopft, hatte einen Puls von 68 - 72. Neben Gebrauch von Selterswasser wurden täglich 3mal Morph.-Inject. gemacht. Hierbei trat bis zum 18. September Beruhigung, Nachlass der Schmerzen, fast völlige geistige Klarheit ein. Die Zunge wurde rein, Stuhlgang regelmässig. Nur noch zeitweise Klagen über leichten Druck in der Magengegend und das temporäre Gefühl, als führe ihm etwas Lebendiges in die Seite. Bis zum 21. blieb Pat. ohne alle Arznei. Schmerz kehrte nicht wieder. Er sagte, es könne doch sein, dass er vergiftet sei, woher sollten denn die Schmerzen kommen? Seit 2 Monaten habe er ein abnormes Gefühl im Leib und dagegen schon Digitalis, Aloe, Coloquinth., Morph. gebraucht. Trotz äusserer Ruhe schlief Pat. sehr schlecht, manche Nacht gar nicht. Vom 21. September an täglich Nachmittags 1 Gr. Papaverin. Seitdem war der Schlaf bis jetzt immer gut, mit Ausnahme der Zeit

Digitized by Google

vom 4—11. Oct., während welcher Pat. an einem ziemlich schmerzhaften Erysipel des rechten Ohres litt. Der Glaube, dass die früheren Schmerzen von einer Vergiftung herrühren, bleibt stabil, wird aber nie spontan geäussert. Pat. hat beständig etwas Scheues, Unsicheres, ist aufbrausend, trotzig, unfügsam, wie ein recht ungezogener Junge. Bisweilen Klagen über leichten Druck im Epigastr. Dabei aber sehr starker Appetit, vortreffliches Aussehen, regelmässiger Stuhl, freier Kopf, reine Zunge. Pupillen ziemlich weit, reagiren langsam, Puls, der vordem langsam war, stets beschleunigt, immer gegen 100, nie unter 96. Einige Mal wurde das Papaverin versuchsweise ausgesetzt, dann schlief Pat. sehr schlecht, einmal die ganze Nacht gar nicht.

10. *B. E.* Kaufmann 59. J. aufgen. am 21. Octbr. 1868.

Erblichkeit nicht vorhanden, besondere ätiolog. Momente nicht angegeben. Machte im Frühjahr sehr unüberlegte Gutskäufe, auf den Gütern traf er allerlei wunderliche Einrichtungen und fiel allen Bekannten durch die exaltirten und sanguinischen Hoffnungen auf, die er über die Rentabilität dieser Besitzungen äusserte. Als im Herbst die Zahlungstermine kamen, die Güter mit Schulden bewirthschaftet waren, schlug die Stimmung des Kranken in das Gegentheil um, er wurde misstrauisch, sehr unruhig, trübe gestimmt, glaubte er solle ausgepfändet werden, er sei von Betrügern umgeben, schickte desshalb seine besten Leute weg, schlief nicht mehr, klagte über beständige Angst. Ein Selbstmordversuch veranlasste die Aufnahme. Die körperliche Untersuchung ergab als Wesentlichstes ein von den Lungen fast ganz bedecktes Herz, entfernte Herztöne, beide klappend, bei beiden ein Geräusch, über der *Aorta* beim ersten Ton ein starkes Geräusch. Rechtsseitiger Leistenbruch. Puls 100. Der 8—10. Schlag aussetzend, Füllung der Arterie ungleich, bald stärker, bald schwächer. Verstopfung. Tieftrauriger Gesichtsausdruck, schlaffe, gebückte Haltung. Der Kranke geht beständig stumm im Zimmer auf und ab, drängt nach der Thür, stellt sich vor dieselbe, wenn man hinaus will, immer ohne etwas zu sagen. Auf Fragen antwortet er nicht, oder nur mit Wiederholung der Frage. Schlief die erste Nacht gar nicht, stieg immer aus dem Bett auf und ging umher, trat vor das Bett des Wärters mit erhobenem Stiefelknecht. Am 21. Nachmittags 1 Gr. Papaverin innerlich. Schlief danach nicht. Am 22. fortwährendes stummes Umhergehen im Zimmer, Drängen nach der Thür. Will nicht essen, weil man ihn vergiften wolle. Puls 100, keine Myose, wegen Verstopfung Bitterwasser. Nachmittags 1 Gr. Papaverin. Danach wieder kein Schlaf, läuft die

Digitized by Google

ganze Nacht auf und ab. Am 23. dasselbe stumme triebartige Drängen im Zimmer umher. Versucht sich beim Spaziergang die Steintreppe herabzustürzen. Puls 100, kein Stuhl. Nachmittags 1½ Gr. Papaverin. Trotzdem völlig schlaflose Nacht, stieg immer auf, drängte stumm nach der Thür. Puls 100, Verstopfung, keine Verengerung der Pupillen. Am Nachmittage 2 Gr. Papaverin, hiernach kein Schlaf. Zunehmende Angst und Unruhe, versucht 2mal sich in Gegenwart des Wärters zu erhängen. Bei der völligen Erfolglosigkeit wurden keine weiteren Versuche mit Papaverin gemacht.

11. *E. D.* stud. Chem. aufgen. 1854, gegenw. 34. J. alt.

Im 20. J. wegen primärer Verrücktheit aufgenommen, die seit mehreren Jahren in völligen Blödsinn übergegangen ist. Affectloses Schwatzen des ungereimtesten Zeuges, aus dem hie und da eine Erinnerung früherer Erlebnisse anklingt. Häufig unreinlich. Seit April 1868 der instinktartige Trieb, von einer Erhabenheit, (Stuhl, Tisch etc.) herab Purzelbäume zu schlagen, abwechselnd mit der Sucht, unter den Tisch oder das Bett zu kriechen, um dieselben zu lockern. Tag und Nacht treibt Pat. diese Beschäftigung. So oft man zu ihm kommt findet man ihn bei diesen Manövern, in Schweiss gebadet; er lässt sich durch nichts stören, sondern arbeitet mit stummem Eifer instinctartig fort. Vom 20. Mai bis 20. Juni wurde täglich 1 Gr. Papaver. ohne allen Erfolg gegeben. Es trat kein Schlaf ein. Pat. war auch am Tage nicht ruhiger, Puls und Pupillen zeigten keine Veränderung. Stuhlgang war vorher schon regelmässig und blieb es während des Papaveringebrauchs.

Es tritt nunmehr die Forderung an mich heran, das Facit aus vorstehenden Beobachtungen zu ziehen. Dieselben enthalten im Ganzen eine Bestätigung der 11 von Prof. *L.* und Dr. *Br.* über die Papaverinwirkung aufgestellten Sätze, von denen nur einige zu allgemein gefasst sind und eine Beschränkung erfahren müssen. Als Hauptergebniss stellt sich die Thatsache in den Vordergrund, dass das Papaverin für viele Fälle von Geistesstörung ein sicheres und durch die Art seiner Wirkung ein höchst werthvolles Hypnoticum ist. In 8 von 11 Fällen trat die gehoffte schlafmachende und beruhigende Wirkung mit mehr oder weniger Prägnanz und

Digitized by Google

Nachhaltigkeit ein. Die Zeit, welche zwischen der Darreichung des Mittels und dem Eintritt der Wirkung lag, zeigte mancherlei individuelle Schwankungen. Wenn sich dieselbe nach meinen Beobachtungen bei der inneren Darreichung im Durchschnitt auf 6—7 Stunden angeben lässt (meist wurde das Papaverin Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr gegeben, und es trat dann zwischen 9 und 10 Uhr Schlaf ein), und wenn ich mich von der Richtigkeit der Annahme, dass diese Zeit für viele Fälle die Norm sei, auch dadurch überzeugen konnte, dass, wenn einmal das Mittel aus irgend welchen Gründen später gegeben wurde, dann auch die Wirkung später eintrat: so zeigten doch mehrere Fälle erhebliche Abweichungnn von diesem Verhältnise. So wurden im Fall 4. wegen erhöhter Aufregung 2 Mal täglich 1½ Gran gegeben, und dennoch trat erst am Abend zwischen 9 und 10 Uhr Schlaf ein. Ferner wurden im Fall 5. und 8. die subcutanen Injectionen (und zwar in der gleichen Dosis, die andere Kranke innerlich nehmen, 1 Gran) am Morgen gemacht, und erst nach 11—12 Stunden erfolgte die Wirkung. Bei beiden Kranken erstreckte sich die Wirkung der Injection auf zwei Nächte, ein Erfolg, den auch *L.* und *Br.* mehrmals beobachteten. In dem einzigen 7. Fall wurde eine wirkliche Schläfrigkeit bemerkt; Pat. bekam am Nachmittag 1 Gran, schlief danach die ganze Nacht und wurde auch am folgenden Tag häufig schlafend getroffen. Diese Schläfrigkeit verlor sich bei längerem Gebrauch. Ein ganz aussergewöhnliches Verhalten zeigte Fall 1. Hier trat bei innerem Gebrauch nach 12 Stunden, bei der subcutanen Injection erst nach 24 Stunden Schlaf ein. Eine Erklärung hierfür bietet am Einfachsten der durch die chron. Opiumvergiftung herbeigeführte ganz abnorme Zustand des Nervensystems, ein Zustand, der gegenwärtig, bei den zur Routine gewordenen subcutanen Morphium-Injectionen leider nicht

Digitized by Google

mehr so selten zur Beobachtung kommt. Ein Beweis für die Wirksamkeit des Mittels ist es, dass der Organganismus in diesem Fall überhaupt noch auf dasselbe reagirte. Der in diesem Fall beobachtete anhaltendere Schlaf konnte nämlich nur auf Rechnung des Papaverin gesetzt werden, da Patient vordem am Tage nie so anhaltend und so tief schlief.

Die oben hervorgehobenen Ungelmässigkeiten in Beziehung auf die Eintrittszeit der Papaverinwirkung, sowie überhaupt der späte Eintritt derselben, dürften ihre angemessene Erklärung nicht sowohl in einer individuell verschiedenen Empfänglichkeit für dasselbe, als vielmehr in der schweren Löslichkeit desselben finden, welche letztere möglicherweise bei verschiedenen Individuen eine verschiedene ist. Die im allgemeinen schwere Löslichkeit des Papaverin, sowie die nach *Albers'* Angabe schwere Löslichkeit desselben im Blut, rechtfertigen die Vermuthung, dass die eingeführte Dosis ganz successive in kleinsten Quantitäten sehr allmälig resorbirt wird, so dass die Wirkung jeder Dosis als eine cumulative aufzufassen wäre.*) Diese Ansicht wird noch weiter dadurch unterstützt, dass in keinem Falle, auch nicht nach der subcutanen Injection, ein plötzlicher Eintritt von Schläfrigkeit bemerkt wurde, sondern dass der Schlaf immer mehr in der Art des physiologisch eintretenden erfolgte. Ueberhaupt bekam man in mehreren Fällen den Eindruck, als ob das Papaverin nicht so direct Schlaf herbeiführe, wie z. B. eine grössere Dosis Opium oder Morphium, sondern als ob dasselbe vielmehr nur im Allgemeinen die Bedingungen herstelle, unter denen überhaupt der Eintritt von Schlaf möglich wird. In wie weit

*) Chemische Untersuchung der Excremente während des Papaveringebrauchs zur Feststellung, ob alles oder wieviel von dem eingeführten Papaverin resorbirt wird, wären sehr erwünscht.

Digitized by Google

hierbei die gleich zu erwähnende Wirkung des Papaverin auf den Puls in Rechnung zu ziehen ist, wage ich vorläufig nicht zu entscheiden.

Eine weitere Wirkung des Papaverin besteht in einer oft erheblichen Verlangsamung des Pulses. Dieselbe betrug im Durchschnitt 20—30 Schläge in der Minute, ja es wurde in einigen Fällen Verminderung um 40 Schläge beobachtet. Die Verlangsamung des Pulses wurde in allen Fällen constatirt, in denen die beruhigende und schlafmachende Wirkung erfolgte, mit einziger Ausnahme von Fall 9., bei dem zwar Schlaf, aber keine Herabsetzung des Pulses eintrat; sie fehlte in allen Fällen, in denen die schlafmachende Wirkung ausblieb. Beide Wirkungen, die Puls vermindernde und die Schlaf machende, sind die cardinalen Eigenschaften des Papaverin, beide stehen in einem offenbaren engen Zusammenhang, da mit Ausnahme eines einzigen Falles keine ohne die andere beobachtet wurde. Einen deutlichen Beleg für den Zusammenhang beider bietet Fall 5. Hier trat in der Tobsuchtsperiode nach der subcutanen Injection die volle Papaverinwirkung ein, Ruhe, Schlaf, Verlangsamung des Pulses, in dem *Stadium melancholicum* war das Mittel ohne Einfluss auf Schlaf und Puls.

Wenn auch weniger constant als die eben angeführten Wirkungen, so ist doch als dritte, wesentliche Eigenschaft des Papaverin der verengernde Einfluss desselben auf die Pupillen zu erwähnen. Fast in allen Fällen, in denen beim Papaveringebrauch Beruhigung, Schlaf, Verlangsamung der Circulation beobachtet wurde, trat auch eine mehr oder weniger erhebliche, anhaltende Verengerung der Pupillen ein. Dieselbe wurde aber in keinem der Fälle beobachtet, in denen die andern Papaverinwirkungen ausblieben, sowie auch kein Fall vorkam, in welchem Papaverin blos Verlangsamung des Pulses und Verengerung der Pupillen, aber keinen Schlaf,

Digitized by

oder blos Schlaf und Verengerung der Pupillen, aber keine Verlangsamung des Pulses bewirkt hätte. Da nun wohl Schlaf ohne Verlangsamung des Pulses als Papaverinwirkung beobachtet wurde (Fall 9) in keinem Fall aber Verengerung der Pupillen ohne Verlangsamung des Pulses, so scheint es, dass zwischen den beiden letzteren Erscheinungen ein gewisser *Causalnexus* bestände. Diese Annahme wird durch Fall 9 wesentlich unterstützt, in welchem zwar Schlaf eintrat, aber die Verlangsamung des Pulses und Verengerung der Pupille ausblieb, wird weiter unterstützt durch eine Beobachtung, die ich in den letzten Tagen, während des Niederschreibens vorliegender Arbeit, an Fall 8 machte. Diese Kranke erhält noch täglich 1 Gr. Papaverin. Ohne dass sich eine besondere Veranlassung entdecken liess, ohne dass sich das psych. Verhalten änderte, ohne dass der Schlaf unruhiger wurde, stieg bei derselben der Puls in den letzten Tagen auf 104 und gleichzeitig erweiterten sich die vordem immer engen Pupillen. Dieser Symptomencomplex der Papaverinwirkung (Verengerung der Pupillen, Verlangsamung der Circulation) erinnert so unmittelbar an die nach Durchschneidung des Halssympathicus eintretenden Erscheinungen, dass man der Versuchung nicht widerstehen kann, in der Papaverinwirkung einen lähmenden Einfluss auf das cilio spinale und vasomotorische Nervencentrum zu erblicken. Ob zwischen dieser Wirkung des Papaverin und dem Eintritt des Schlafes ein causaler Zusammenhang besteht, ob die grössere Ruhe und der bessere Schlaf als Folgen der verlangsamten Circulation zu betrachten sind (wogegen die anhaltendere Schläfrigkeit in Fall 7 und Fall 9 sprechen würde), oder ob beide Wirkungen nur nebeneinander eintreten, hierüber muss die Entscheidung weiteren und ausgiebigeren Beobachtungen vorbehalten bleiben.

In 4 Fällen (6., 10., 11. u. 5. Fall im *Stad. melan-*

Digitized by Google

chol.) blieb das Papaverin gänzlich wirkungslos, es trat weder Schlaf, noch Verlangsamung des Pulses, noch Verengerung der Pupillen ein. Es liegt zu nahe, nach etwas, diesen Fällen Gemeinsamen zu forschen und in diesem einen möglichen Grund des Nichterfolges zu suchen, als dass ich dies unterlassen sollte. Alle diese 4, verschiedenen Formen von Geistesstörung zugehörigen Kranke charakterisirte eine continuirliche, triebartig sich äussernde Unruhe und Unstätigkeit, ein instinctives, scheinbar unbewusstes Umherdrängen, sodass diese Kranke den Eindruck machten, als würden sie von einer fremden Gewalt geschoben und getrieben. Die gleichen Erscheinungen bot ein Melancholiker, den ich unter der Casuistik nicht anführte, weil die Beobachtung schon am 3. Tag unterbrochen wurde. Auch bei diesem blieb jede Papaverinwirkung aus. Wenn das angeführte Symptom auch ein sehr äusserliches ist, so war doch die Gemeinsamseit desselben zu auffällig, als dass ich diese Thatsache mit Stillschweigen übergehen sollte. In allen diesen Fällen fand sich eine mehr oder weniger erhebliche Pulsbeschleunigung, und es scheint, als ob bei Kranken mit den angeführten Erscheinungen das Papaverin wirkungslos bliebe.

In wie weit, und ob überhaupt der in 2 von diesen Fällen vorhandene Herzfehler von Einfluss auf den Nichteintritt der Papaverinwirkung war, dies lässt sich natürlich erst entscheiden, wenn zahlreichere Beobachtungen vorliegen. Prof. *L.* und Dr. *Br.* führen einen Fall mit einem Herzfehler an, in welchem das Papaverin Schlaf und Verlangsamung des Pulses bewirkte. In dieser Richtung angestellte weitere Versuche an geistig gesunden Herzkranken wären höchst wünschenswerth und zweifelsohne auch lohnend.

Als weitere vortheilhafte Eigenschaften des Papaverin sind, in Uebereinstimmung mit Prof. *L.* und Dr. *Br.*

noch folgende hervorzuheben: In keinem Falle wurde die Papaverinwirkung durch einen Aufregungszustand eingeleitet, in keinem Fall wurde eine Verstopfung, die auf Rechnung des Mittels zu setzen gewesen wäre, beobachtet, wenn ich mich auch davon, dass eine vorhandene Verstopfung während des Papaveringebrauchs sich verloren hätte, nicht mit Bestimmtheit überzeugen konnte. Bei dem hochgradig geschwächten Fall 1 trat nach der Darreichung des Mittels Uebelkeit und Erbrechen ein, in Fall 2 wurde dasselbe nach 6wöchentlichem Gebrauch sofort wieder ausgebrochen, ohne alles weitere Unbehagen. In den übrigen Fällen wurde nie eine unangenehme Nebenwirkung bemerkt, nie Eingenommensein des Kopfes, nie Kopfschmerz, nie Uebelkeit, obgleich man das Papaverin öfter Monate lang gab. Dasselbe hatte in keinem Falle einen nachtheiligen Einfluss auf die Ernährung, im Gegentheil war bei allen Kranken nach längerem Gebrauch desselben eine Zunahme des Körpergewichtes zu constatiren, in einigen Fällen fielen die Kranken sogar auf durch das frische und blühende Aussehen, welches sie bekamen.

Eine Gewöhnung an das Papaverin scheint nur höchst selten und nur nach sehr langem Gebrauch vorzukommen, so dass im Allgemeinen eine Steigerung der Dosis nicht nöthig ist. Ich habe in den Fällen, in welchen ich mit der Dosis stieg, keinen wesentlichen Erfolg hiervon bemerken können. Es scheint auch, als ob in den Fällen, in denen nach den ersten Dosen die Papaverinwirkung ausbleibt, von einer Steigerung der Dosis kein Erfolg mehr zu erwarten wäre. Das Papaverin wirkt noch, auch wenn vorher Opium in grösseren Dosen längere Zeit hindurch gebraucht worden war, sowie auch umgekehrt das Opium noch von Wirkung ist, wenn vorher Papaverin längere Zeit angewendet worden war. Bei

Digitized by Google

3 Kranken stellte sich während des Papaveringebrauchs mit dem Eintritt grösserer Ruhe ein an Gefrässigkeit grenzender Appetit ein.

Die in Fall 8 beobachtete Vermehrung der Speichelsecretion kann nicht wohl als Folge der Papaverinwirkung angesehen werden, da dies Symptom bei keinem anderen Falle beobachtet wurde.

Bei der subcutanen Anwendung wurde nie eine nur beachtenswerthe Reaction an der Einstichstelle beobachtet. Uebrigens scheint dieselbe weder in Bezug auf die Sicherheit, noch in Bezug auf die Schnelligkeit des Eintritts der Wirkung einen Vorzug vor der inneren Anwendung zu bieten. Nur eine grössere Nachhaltigkeit der Wirkung wurde bei der subcutanen Anwendung bemerkt. Dieselbe ist aber bei sehr aufgeregten Kranken eine sehr missliche Procedur, da man meist wegen der grösseren Quantität Wasser, die zur Lösung von 1 Gr. Papaverin nöthig ist, mehrere Spritzen voll injiciren muss. Bei Kranken, die sich weigerten Arznei zu nehmen, liess ich das Mittel Nachmittags im Kaffee geben.

Entgegen der Ansicht von Prof. *L.* und Dr. *Br.* möchte ich der Wirkung des Papaverin einen mehr als nur palliativen Erfolg zusprechen. Man erreicht dadurch, dass man einem Geisteskranken einen ruhigen, 6—8stündigen Schlaf verschafft, etwas, was man häufig durch Beschäftigung, Zerstreuung etc. nur beschränkt oder gar nicht bewirken kann, man zieht den Kranken, und zwar gründlich, von seinem Delirium ab, man entrückt ihn täglich für mehrere Stunden seinem kranken Vorstellungsleben, man giebt der aufgeregten und erhitzten Phantasie Zeit zum Ausruhen, zur Erholung. So gewiss es nun ist, dass man bei vielen Geisteskranken durch psychische Ablenkung einen Heilzweck erfüllt, indem man durch dieselbe kranke Vorstellungen in den Hinter-

Digitized by Google

grund drängt und gesunden Spielraum verschafft, so gewiss muss auch in vielen Fällen eine heilende Wirkung von einem Mittel erwartet werden, welches den Kranken auf längere Zeit dem nachtheiligen Einfluss seines kranken Vorstellungskreises gänzlich entzieht. Weiter aber tritt während des Papaveringebrauches, und hierfür liefert die angeführte Casuistik mehrfache Belege, mit der grösseren Beruhigung, dem gesunderen Schlaf, auch eine bessere Ernährung bei den Kranken ein, ich konnte in mehreren Fällen eine beträchtliche Zunahme des Appetits beobachten, Prof. *L.* und Dr. *Br.* bemerkten mehrmals das Eintreten einer regelmässigeren Verdauung. Wir können nun häufig beobachten, dass bei mancherlei körperlichen Leiden, wenn es gelingt die durch dieselben herbeigeführte fehlerhafte Blutmischung und die als weitere Folge auftretende mangelhafte Ernährung zu beseitigen und einen normalen Stoffwechsel wieder herbeizuführen, sich hiermit auch der Stoffwechsel in dem kranken Organ regeln und das locale Leiden sich bessern kann. Sollte dasselbe nicht auch für die als Geisteskrankheiten bezeichneten chron. Hirnleiden zutreffen können? Sollte nicht auch bei ihnen dadurch, dass man die unter den Einfluss des Hirnleidens sich ausbildende mangelhafte Ernährung, fehlerhafte Assimilation und den abnormen Stoffwechsel bessert und hebt, dass man die Ernährung umstimmt und eine bessere Blutmischung herbeiführt, auch im Gehirn ein normaler Stoffwechsel und eine normale Ernährung desselben bewirkt werden können? Wir wissen ja längst, dass blos unter dem alleinigen Einfluss von Anämie, überhaupt von allen Zuständen, die die Ernährung des Körpers herabsetzen, Geisteskrankheit entstehen kann und häufig genug ensteht; wir kennen ja schon den günstigen Einfluss, den in diesen Fällen eine einfach roborirende Behandlung auf den Geisteszustand ausübt,

Digitized by Google

Ob ich aber diesen günstigen Einfluss auf die Ernährung dadurch ausübe, dass ich Eisen, überhaupt stärkende Mittel gebe, oder dadurch, dass ich durch ein Mittel einen allgemeinen Körperzustand hervorrufe, in welchem eine bessere Assimilation der eingeführten Nahrungsmittel ermöglicht und ein übermässiger Verbrauch verhindert wird — in beiden Fällen erfülle ich einen Heilzweck. Endlich aber entfaltet das Papaverin noch eine Wirkung, von der wir noch viel directer einen heilenden Effect erwarten müssen: es verlangsamt die Circulation. Bei vielen Fällen von Geisteskrankheit muss sich unsere Diagnose mit der Annahme von Congestivzuständen, von localen Hyperämien begnügen, in vielen anderen Fällen sehen wir die Krankheit sich unter dem Einfluss abnormer Circulationsverhältnisse entwickeln; in solchen Fällen müssen wir einen mehr als nur palliativen Erfolg von einem Mittel erwarten, welches, wie das Papaverin, eine so sichere und so wesentliche Einwirkung auf die Blutcirculation ausübt. Ich bin sonach der Ansicht, dass man in gewissen Fällen von Geisteskrankheit von der, unter Anwendung des Papaverin sich einstellenden, grösseren Ruhe, dem besseren Schlaf, von dem durch Zunahme des Körpergewichts sich kundgebenden geregelteren Stoffwechsel, endlich von der Verlangsamung des Pulses einen heilenden Einfluss auf den der Krankheit zu Grunde liegenden Process erwarten darf.

Nach all den angeführten Thatsachen ist das Papaverin durch die Sicherheit seiner Wirkung, durch den Mangel jeder unangenehmen Nebenwirkung und jedes nachtheiligen Einflusses auf den Organismus als eine höchst werthvolle Bereicherung des Arznei-Schatzes zu betrachten, und es ist dankbarst anzuerkennen, dass Prof. *L.* und Dr. *Br.* dieser verkannten Grösse zu ihrer Geltung verholfen haben. Wenn die vorliegende Arbeit den-

Digitized by Google

selben Effect bei anderen hervorbringt, den die Arbeit von Prof. *L.* und Dr. *Br.* an mir ausübte, wenn auch sie zu weiteren Versuchen und Beobachtungen mit Papaverin anregt, dann ist ihr Zweck erfüllt. Besonders dankenswerth wäre es, wenn günstiger situirte Collegen, als es der Arzt an einer Privatanstalt mit einigen 20 Kranken (und unter diesen $\frac{2}{3}$ unheilbaren) ist, sich zu umfassenderen Beobachtungen über die Wirkung des Mittels herbeiliessen. Von diesen dürfte eine Bestätigung der ausgesprochenen Ansichten und eine Aufklärung der noch zweifelhaften Verhältnisse zu erwarten sein.

Digitized by Google

Zur Casuistik.

Epilepsie mit schwerer Seelenstörung. Genesung. — Der alte Satz des Hippocrates von der Unheilbarkeit der mit Seelenstörung verbundenen Epilepsie ward bis auf die neueste Zeit als Dogma der Pathologie festgehalten, welchem Psychiater und Neuropathologen beistimmten, so *Esquirol* (Maladies mentales. V. 1. p. 317) „l'épilepsie compliquée d'alienation mentale ne guérit jamais", *Griesinger* (Pathologie, p. 413) „Epileptisch Blödsinnige sind als ganz unheilbar, die andern Formen des Irreseins mit Epilepsie complicirt, als nur in seltenen Ausnahmefällen heilbar zu betrachten", *Hasse* (Nervenkrankheiten, p. 276) — „bildet sich während der Zwischenzeit (sc. der epileptischen Anfälle) eine psychische Störung deutlicher aus, so bleibt die Krankheit unheilbar". Als seltene Ausnahme von dieser allgemein geltenden Regel ward in unserer Anstalt ein Fall schwerer mit Epilepsie complicirter Seelenstörung beobachtet, welcher mit Genesung endete; wir halten uns verpflichtet, ihn der Oeffentlichkeit zu übergeben.

W., 37 Jahre alter, verheiratheter Militair, ward den 26. Juni 1861 in Illenau aufgenommen. Keiner erblichen Disposition zu Psycho-Neurosen unterworfen, in seiner Jugendzeit geschlechtlichen Excessen ergeben, hatte er seit einer Reihe von Jahren als Ehemann und Familienvater ein wenig bewegtes und glückliches Leben geführt und sich einer guten Gesundheit erfreut.

Im März 1858 befiel ihn ohne bekannte Ursache ein epileptischer Anfall, der sich im April 1859 ohne alle Vorboten wiederholte. Von da ab kehrten die Anfälle immer häufiger wieder, zumeist bei Nacht, nur einige Male bei Tage, so dass die Zwischenräume bald nur noch zwischen 8 Tagen und 3 Wochen schwankten. In der Regel fehlten die Vorboten, nur wenn die Anfälle längere

Digitized by Google

Zeit pausirt hatten, wurden sie von einem wenige Sekunden dauernden Schwindel eingeleitet. Sie begannen gewöhnlich mit Zusammenfahren, worauf Verlust des Bewusstseins und allgemeine Convulsionen folgten. Allmälig machten sich in den Zwischenzeiten Erscheinungen der Erschöpfung und zunehmenden geistigen Schwäche geltend.

Seit Februar 1861 trat nach heftigen und rasch auf einander gefolgten epileptischen Attaquen eine Reihe in stets kurzen Pausen sich folgender Anfälle von Geistesstörung ein, deren Dauer zwischen 2 und 6 Tagen schwankte. Sie leiteten sich stets durch ein kurzes melancholisches Stadium ein, auf welches maniakalische Aufregung folgte. Im ersten Anfalle war *W.* von grosser Angst befallen, mit dem Wahne ersticken zu müssen, darauf folgte als Reaction ein wildes Schreien, und ein verworrener Rededrang, der in heiter exaltirte Stimmung überging, in welcher sich der Kranke in den Himmel versetzt glaubte. Im zweiten Anfalle, der nach 3 Monaten folgte, war er weinerlich, verstimmt, betete viel, reproducirte viele Erinnerungen an Verstorbene; bald trat wieder Umschlag in gehobene Stimmung ein, in welcher er sich für Gott, seine Frau für die Himmelskönigin hielt. Im dritten 5 Wochen später eintretenden Paroxysmus blieb es bei der schmerzlichen Verstimmung, er weinte 2 Tage anhaltend, klagte über heftige Schmerzen in der Stirne, wähnte an Gehirnentzündung zu leiden, welche seinen baldigen Tod herbeiführe. Der vierte Anfall erfolgte schon 12 Tage später und begann mit Misstrauen und Eifersucht gegen seine Frau (befreundete Officiere und sehr hohe Personen seien seine Nebenbuhler), er schloss sich mit Frau und Kindern ein, suchte mit der blanken Waffe nach den Feinden, zerschlug verschiedene Möbel, in denen er sie vermuthete, sah aus den Wänden Bajonnette und Kanonen starren etc.; nach kurzer Zeit folgte wieder heitere Exaltation mit dem Wahne, er sei Gott und müsse zu Gericht sitzen, angethan mit den höchsten göttlichen Eigenschaften.

Bei der Aufnahme in die Anstalt (den 26. Juni 1861), welche mit dem Nachlasse des 4. Paroxysmus erfolgte, sprach sich in der ganzen Erscheinung grosse geistige und körperliche Erschöpfung aus, es bestand Depression, eine schreckhafte, verzagte und reizbare Stimmung, unruhiger, häufig von ängstlichen Träumen gestörter Schlaf, Neigung zu Congestionen, Eingenommensein des Kopfes, Kopfweh, Schwindel, Ohrenklingen, Nebel vor den Augen, Formikationen in den Beinen, plötzliche Stiche im Rücken, Gefühl von Vollsein im Epigastrium. Gedächtniss und Intelligenz hatten sehr gelitten und spiegelten sich sichtbar in den verfallenen blöden Gesichts-

Digitized by Google

zügen wieder; die Wünsche waren sehr kleinlich und monoton, Geschlechts- und Nahrungstrieb hatten zugenommen.

Die körperliche Untersuchung ergab kaum Anhaltspunkte — kräftige Constitution, etwas gedunsenes Aussehen, Neigung zu Fettbildung, Puls klein, ungleich, meist frequent, Hämorrhoidalsäcke am After, Neigung zu Stuhlverstopfung.

In der Anstalt (Behandlung mit *Argent. nitric.* und *Opium* in steigender Dose) traten während des Juli und August nur 3 epileptische Anfälle ein, welche keine weitere psychische Erregung im Gefolge hatten, so dass man einen Stillstand der Erkrankung hoffen konnte. Allein im September folgte sich eine grössere Reihe von Anfällen in kurzen Pausen, zum Theil von nur 2—4 Tagen, nach welchen im October sich ein weiterer Aufregungszustand einstellte. Dieser ward wieder durch Depression eingeleitet. W. wähnte, seine Freunde hätten ein Complott gegen ihn geschmiedet, in welches auch seine Frau und eine sehr hohe Person verstrickt seien, um ihn durch Vergiften aus dem Wege zu räumen; er litt an entsprechenden Gehörstäuschungen. Bald folgte wieder ein plötzlicher Umschlag der Stimmung in heitere Exaltation. „Er empfinde ein nie geahntes Wohlbehagen, so dass die Worte ihm fehlten, um es zu schildern", zugleich allgemeine Hyperaesthesie — „er habe noch nie so scharf gesehen, noch nie so fein gehört, er fühle, dass er electrisirt werde, dass sein Blut in den Beinen circulire" u. A. m. — Auch nach dieser 8 Tage dauernden Attaque war ein Fortschritt der Erkrankung nicht zu verkennen, im psychischen Gebiet — Zunahme der geistigen Schwäche (vom Kranken selbst gefühlt) bedeutender Defect des Gedächtnisses; im Gebiet der Sensibilität — namentlich Hyperaesthesieen, welche am stärksten unmittelbar nach den epileptischen Anfällen hervortraten, Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel mit Bangigkeit, Gefühl von Zittern der Kopfnerven, von Abgespanntheit in den Gliedern, Ohrenbrausen und Zischen, zuweilen Nebel vor den Augen, Druckgefühl auf der Brust, Gefühl von Lähmung und Ungleichheit der Zungenhälften.

Die epileptischen Anfälle traten in den 3 letzten Monaten des Jahres 1861 häufig (etwa 5 in einem Monate), aber in unregelmässigen Pausen ein, sie konnten 14 Tage cessiren, aber auch sich innerhalb 2 Tagen, ja einige Male sogar am gleichen Tage wiederholen. (Seit Dezember regelmässig fortgesetzte Anwendung von Atropin, zweimal täglich $\frac{1}{75}$ Gran.)

Ende Januar 1862 trat wieder ein maniakalischer Paroxysmus auf mit gleichen Erscheinungen, wie die früheren (Gefühl des grössten Glückes, er sei im Himmel etc.), Ende Februar ein mehrtägiger

Digitized by Google

Anfall grösserer Bewusstseinsstörung mit grosser Reizbarkeit, ängstlicher Unruhe, Gehörshallucinationen und Vergiftungswahn.

Während seit Neujahr die epileptischen Convulsionen immer seltener wurden, nach dem 5. März völlig cessirten, war dagegen die Seelenstörung allmälig eine schwerere geworden, indem sie sich auch in den Zeiten zwischen den Paroxysmen durch deutliche Symptome manifestirte.

Vom 5. bis 12. April bestand eine tiefe schmerzliche Verstimmung, eine ängstliche Aufregung mit grossem Misstrauen, „man lege ihm Prüfungen auf, er sei von Schuften umgeben, welche ihn betrügen wollten, die epileptischen Anfälle würden ihm künstlich gemacht, die Gefühle durch electrogalvanische Batterieen erzeugt. Er litt an Gemeingefühlsstörungen, „er gehe nicht auf der Erde, berühre nicht den Boden, er schwebe in der Luft", er fühlte beständig leichte convulsivische Zuckungen in Gesicht nnd Händen (das Zittern komme von verdorbenem Kaffee, von Gift im Essen), er klagte über Ohrensausen, Augenschmerz, schwere Zunge. Hallucinationen aller Sinne (er roch, schmeckte mancherlei, sah Erscheinungen, hörte Gesang in der Luft) wurden zur Grundlage von Wahnvorstellungen. Alles Geschehen der Aussenwelt ward in krankhafter Weise gedeutet, „es werde Alles absichtlich verkehrt gemacht, um ihn zu prüfen, um zu sehen, ob er den Anfällen widerstehen könne, man habe den Kalender, die Zeitungen gefälscht, die Briefe seiner Frau verwechselt, um ihn zu täuschen".

Von Ende April bis Anfang Mai folgte ein von Depression eingeleiteter lebhafter Aufregungszustand mit grossem Bewegungsdrang bei tief gestörtem Bewusstsein, bei welchem namentlich die krankhaften sensiblen Erregungen (Ströme), Kriebeln in der Haut, Gefühl, als ob man ihn mit Sand bewerfe, u. A. m) hervortraten, und zumeist als Wirkungen einer gegen ihn gerichteten galvanischen Batterie gedeutet wurden.

Auch bei Nachlass der Erregungen blieb eine sehr wechselnde Stimmung, eine Neigung zu Unzufriedenheit und eine grosse Hyperaesthesie sämmtlicher Sinnesnerven, nebst dem Wahne, man lege ihm Prüfungen auf, um seine Gesundheit zu erproben; die Geistesschwäche war sehr augenfällig.

Im Juni nun trat ganz unerwartet auffallende Besserung im psychischen Befinden ein, heftige Aufregungen kehrten nicht wieder, wohl aber noch einzelne mehr oder weniger gestörte und erregte Tage, mit Reizbarkeit und Unzufriedenheit, an welchen der Kranke Alles für gefälscht, die Nahrung für verdorben hielt, sich isolirte, sammelte, viel vor sich hin sprach, wenig schlief und fortdrängte.

Digitized by Google

Die Besserung schritt im Juli rasch vorwärts; auch die letzten Reste der Aufregungszustände verloren sich, während die Sensibilitätsstörungen schwanden, und der psychische Defect sich fortschreitend wieder hob. Also gebessert wurde Patient, nachdem die epileptischen Anfälle 4½ Monate nicht wiedergekehrt waren, den 19. Juli aus der Anstalt entlassen. —

Der Uebergang in die Reconvalescenz vollführte sich bald in der Heimath. Allmälig ward die geistige Schwäche wieder völlig ausgeglichen, die psychische Reizbarkeit und die somatische Hyperaesthesie verloren sich gänzlich, epileptische Anfälle kehrten nicht wieder, so dass W. als vollständig genesen betrachtet werden darf.

Die Genesung hat sich, nachdem mehr als 6 Jahre seit der Entlassung vorübergegangen sind, als dauernd bewährt. W. steht trotz der Schwierigkeiten, welche geheilte Geisteskranke beim Wiedereintritt in die Armee stets finden, seit mehreren Jahren wieder in militairischen Diensten und ward erst vor Kurzem mit einem Orden dekorirt. —

Betrachten wir vorstehenden Krankheitsfall in kurzer Epikrise, so finden wir ausgebildete Epilepsie mit consecutiver Seelenstörung, welche den Ausgang in Genesung fand. Die 4 Jahre dauernde Epilepsie äusserte sich in schweren Anfällen, welche die Erscheinungen der gewöhnlichen epileptischen Convulsionen zeigten, und sich in stets kürzeren Pausen folgten, so dass sie schliesslich nur noch von Intervallen von wenig Tagen, einige Male nur Stunden getrennt waren. Die Seelenstörung, welche auf die kaum 3 Jahre bestehende Epilepsie folgte, äusserte sich in doppelter Form: in maniakalischen Anfällen, und in fortschreitender psychischer Schwäche. Die maniakalischen Anfälle, welche sich in unregelmässigen Pausen folgten, zeigten die charakteristischen Erscheinungen der epileptischen Tobsucht, sie dauerten nur wenige Tage, waren durch tiefe Störung des Bewusstseins, Beherrschtsein durch viele Hallucinationen, feindliche Stimmung mit Neigung zu gewaltthätigen Handlungen im ersten, durch heitere, überglückliche Stimmung im zweiten Stadium charakterisirt. In den anfallsfreien Zeiten bestand eine fortschreitende allgemeine psychische Schwäche. Hierzu traten sehr ausgesprochene Sensibilitätsstörungen, namentlich Hyperaesthesieen, und wurden später auch einzelne Rudera krankhafter Vorstellungen aus den erregten Zeiten in die ruhigen herübergezogen.

Das ausgeprägte Bild einer epileptischen Psychose (folie epileptique) charakterisirt 1) durch mehrjährige Dauer einer Epilepsie mit in immer kürzeren Pausen sich wiederholenden epileptischen Convulsionen; 2) die der Epilepsie eigenthümlichen maniakalischen An-

Digitized by Google

fälle; 3) fortschreitende psychische Schwäche; 4) Wahnvorstellungen, welche auch in die ruhigen Zeiten herübergezogen sich wie bei secundären Geistesstörungen äusserten — liess nach allen empirischen Voraussetzungen eine schwere organische Erkrankung des Gehirns annehmen, welche den gleichzeitigen tiefen Gemeingefühlsstörungen nach zu schliessen, wahrscheinlich durch Mitleidenschaft spinaler Bahnen complicirt war; die Prognose musste durchaus ungünstig gestellt werden.

Trotzdem sahen wir die Erkrankung mit Beginn des Jahres 1862 eine günstige Wendung nehmen: die epileptischen Anfälle wurden immer seltener, um nach dem 5. März überhaupt nicht wiederzukehren, die maniakalischen Paroxysmen, welche sich in den ersten Monaten noch in heftiger Weise geäussert hatten, blassten rasch zu leichten kurzen Erregungen ab, um mit Ende Juli völlig zu schweigen. Die gesetzte psychische Schwäche glich sich allmälig völlig wieder aus, es trat Genesung ein. Wie weit die therapeutischen Eingriffe jene bewirkten, wagen wir nicht mit Sicherheit zu bestimmen, so viel steht aber jedenfalls fest, dass, während die früheren Medikationen keinen dauernden Einfluss auf den Zustand geübt hatten, bald nach dem Beginn der Darreichung des Atropin (welches vom cember 1861 an regelmässig genommen wurde) eine wesentliche Besserung eintrat, welche schliesslich zur völligen Genesung führte.

Dr. *Kirn* in Illenau.

Zur therapeutischen Casuistik. — 1. Willenslähmung der unteren Extremitäten und davon abhängige langjährige Psychose. Heilung der ersteren auf psychischem Wege. Verschwinden der Psychose. — Fräulein *C. G. v. B.*, 42 Jahre, ohne erbliche Anlage zu Geistesstörung, wurde im März 1867 in Illenau aufgenommen. Bis zum 23. Jahr war sie gesund und lebensfroh, die körperliche und geistige Entwickelung war eine normale gewesen, die Menses im 15. Jahr ohne Beschwerde eingetreten und regelmässig wiedergekehrt. Im 21. Lebensjahre, kurz nach einem Verlöbniss mit einem jungen Beamten, stürzte sie eine Treppe herab auf's rechte Knie und zog sich eine bedeutende Zerrung der Gelenkbänder zu, die sie wochenlang an's Bett fesselte. Der heftige Schmerz, welchen sie jeweils in der Folge bei Gehversuchen empfand, zwang sie zu monatelanger Ruhe und erweckte in ihr den Gedanken, von ihrem Leiden nicht mehr befreit zu werden. Dieser Gedanke gewann immer mehr Oberhand und erzeugte eine tiefe schmerzliche Verstimmung. Als nach

Digitized by Google

Jahresfrist die Schmerzen bei Gehversuchen sich nicht verloren, gab Patientin diese auf, verurtheilte sich zu träger Ruhe, zog sich von der Welt zurück und entband ihren Bräutigam seines Eheversprechens, da sie nun ein Krüppel sei. So brachte sie nun mehrere Jahre in schmerzlicher Resignation einsam für sich im Hause ihrer Eltern zu. Eine tiefe melancholische Verstimmung bemächtigte sich ihrer, dazu gesellte sich träger Stuhl und periodische Congestionen nach Kopf und Brust, welche letztere sich besonders Nachts einstellten und mit Bangigkeit, Angst und Herzklopfen sich verbanden. Allmälig trat Misstrauen gegen ihre Umgebung ein, es entwickelte sich Melancholie mit dem Wahn der Verfolgung. Sie wähnte sich hintergangen und betrogen, die Leute sagten ihr alle möglichen schlechten Dinge nach, sprachen da und dort von ihr, die Zeitungen enthielten Artikel über sie, in Büchern fand sie Beziehungen auf sich; Zufälle von Angst, ausgehend vom Epigastrium, traten auf, in deren einem sie am 10. Januar 1867 sich durch Eröffnung der Adern an beiden Armen in der Handbeuge zu tödten versuchte. Sie wurde gerettet, zeigte in der ersten Zeit nach ihrem Selbsttödtungsversuch eine bedeutende Remission ihres Leidens und stellenweise auch Krankheitseinsicht; doch bald kehrten die Angstzufälle nebst dem Wahn der Verfolgung verstärkt wieder und geboten ihre sofortige Verbringung in eine Anstalt. Bei ihrem Eintritt bot sie das Bild einer tiefen schmerzlichen Verstimmung, zeigte sich misstrauisch, scheu, von verfolgenden Gehörstäuschungen befangen. Der Wahn der Verfolgung wurde anfangs nicht geäussert, trat aber in der Folge mit jeweils auftretenden Angstzufällen deutlich zu Tage. Diese gingen vom Epigastrium aus, mit ausgesprochener Congestion zu Brust und Kopf einher, dauerten jeweils mehrere Stunden und kamen meist zur Nachtzeit. Die Kranke wurde dann insolent, gereizt gegen die Umgebung, verkannte sie vorübergehend, während sie sonst scheu, in sich gekehrt, missmuthig in einer Ecke vor sich hinbrütete oder am liebsten im Bette lag. Sie verkehrte viel mit ihren Stimmen, lachte oft unmotivirt und blöd vor sich hin, die ganze Art ihres Gebahrens verrieth einen bemerkenswerthen Zug von Schwäche und Verschrobenheit. In freieren Augenblicken zeigte sie eine gewisse Einsicht in ihre Lage, bezeichnete ihren Zustand als eine schwere Nervenverstimmung, die sie dem Kummer über ihre hilflose Lage zuschrieb.

Die körperliche Exploration ergab ausser einem kleinen, etwas brachycephalen Schädel, einigen schmerzhaften Punkten in der Bahn des Trigeminus und der Intercostalnerven negative Resultate. Die Kranke weigerte sich hartnäckig zu gehen, obwohl ihre Beine ausser einer bedeutenden Atrophie in Folge der Unthätigkeit nichts Abnor-

Digitized by Google

mes boten. Mit dem Ausschluss aller Symptome eines centralen oder myopathischen Leidens, beim Fehlen jeglicher Erkrankung der Gelenke konnte die lokomotorische Lähmung, die ihr kaum 2 Schritte zu machen gestattete, nur auf Rechnung einer Willenslähmung, d. h. einer in Folge des früheren Gelenkleidens und dadurch gesetzten Schmerzhaftigkeit bei wiederbegonnenen Gehversuchen entstandenen Willensschwäche der Patientin ihren Grund haben.

Nach so festgestellter Diagnose wurde Pat. angekleidet und in eine entfernte Abtheilung des Hauses gebracht, die ihre Neugierde erregt hatte, weil sie von dort her Stimmen hörte. Sie hatte die Wahl, hier auf dem kalten Corridor zu bleiben oder in ihr Bett zurückzukehren, nach dem sie so grosses Verlangen hatte. Niemand durfte sie zurücktragen. Als die Kranke sich so auf sich selbst angewiesen sah, fing sie an aufzustehen und sich mühsam an der Wand fortzuschleppen; sah sie sich beobachtet, so affectirte sie sofort wieder ihre absolute Gehunfähigkeit, gelangte aber doch endlich in ihr Bett zurück. Diese Versuche wurden wiederholt, in geeigneter Weise auf sie psychisch eingewirkt, die Kranke begann Selbstvertrauen zu bekommen und war 8 Tage nach ihrem Eintritt in die Anstalt im Stande, unbehindert im Hause einherzugehen. Damit ging eine merkwürdige psychische Umwandlung einher. Sie wurde heiterer, dankbar, anerkennend, die Angstzufälle und Sinnestäuschungen verloren sich, sie erkannte das Irrige ihrer Wahnvorstellungen, erholte sich unter Genuss frischer Luft und guter Diät bis Mitte Juni so vollkommen, dass sie völlig genesen nach Hause entlassen werden konnte.

Ende December 1867 trat eine leichte Recidive durch ungünstige häusliche Verhältnisse auf (Angstzufälle, Verstimmung, vage Ideen im Sinn des Verfolgungswahns), die aber binnen wenigen Wochen beseitigt wurde. Die völlige Gehfähigkeit erhielt sich ungestört.

So gelang es, auf rein psychischem Weg eine über 20 Jahre bestandene Willensparaplegie, die bisher für ein schweres spinales Leiden gehalten, als solches behandelt worden war und im Verlauf zu einer langjährigen Psychose geführt hatte, binnen kürzester Zeit dauernd zu beseitigen.

Dr. *v. Krafft-Ebing* in Heidelberg.

Digitized by Google

Literatur.

Archivio italiano per le malattie nervose e le alienazioni mentali. 1868.

Carlo Livi fährt fort in einer Reihe interessanter Aufsätze die verschiedenen Gegenstände der gerichtlichen Psychiatrie in seinem Sinne zu behandeln und bespricht 1865, 2, zunächst die krankhafte Mordsucht. Der Betrachtung dieses Gegenstandes, welcher einen der schwierigsten Punkte der gerichtlichen Medicin in sich fasst, legt er seine schon früher besprochene Eintheilung der Seelenzustände zu Grunde, aus denen eben jener Mordtrieb seinen Ursprung nimmt. Ein Geisteskranker kann also Mordthaten begehen auf Grund von 1. Hallucinationen, 2. im melancholischen und tobsüchtigen Affekt, 3. aus instinctiver Monomanie und 4. durch fixe Wahnvorstellungen, und für jede einzelne dieser verschiedenen Zustände werden eine Reihe entsprechender Fälle angeführt.

Die instinctive Monomanie zerfällt ferner in eine acute und in eine mehr chronische Form. Im ersteren Falle tritt der Trieb in seiner ganzen Stärke und Unwiderstehlichkeit auf, „so plötzlich, dass Vernunft und Willen keine Zeit zum Widerstande haben und der Thäter, bestürzt und wie vom Donner gerührt, seine eigene That anstaunt.“ Im anderen Falle ist die Entwickelung eine langsamere, die Stärke des Triebes eine wechselnde, und so kann sich die Krankheit bald mehr, bald weniger intensiv Jahrelang hinziehen. Dann auch „der instinctive Trieb zu tödten“ ist eine Krankheit und hat als solche seine ätiologischen Momente unter denen die Nachahmung oben ansteht, er hat seine Symptome und seinen Verlauf. Sehr richtig ist *L.* Bemerkung, dass den Kranken in den meisten Fällen, und zwar selbst dann, wenn die Erinnerung intact ist, die Reue für die begangene That fehle. „Man sollte sagen, dass er sein Verbrechen einsehe mit der Vernunft, dasselbe aber mit der Gefühlsseite der Seele nicht zu erfassen vermöge.“

Digitized by Google

Den grössten Theil des Aufsatzes nimmt ein lesenswerthes Gutachten ein. *A. F.*, 35 J. alt, Knecht, macht bei der Heuernte plötzlich einen Erdrosselungsversuch an einem Knaben. Hinterher harmloses Verhalten, läugnen des Vorfalles seinem Herrn und dem Instructionsrichter gegenüber, bald nachher offenes Geständniss. In seiner Jugend epileptisch, hatte er schon früher 2 dem jetzigen ganz ähnliche Attentate begangen. Bei der ärztlichen Untersuchung erweist er sich als schwachsinnig und wird einer Irrenanstalt übergeben. Besonders angenehm berührt hier die richtige Betonung der Krankheit gegenüber der durchaus falschen Fragestellung. Der Arzt hat eben nur die Frage zu entscheiden, ob der Angeklagte geisteskrank sei oder nicht.

Ganz in derselben Weise wird im 5. Hefte die „Afrodisiomanie" behandelt. Ich kann mir hier um so eher ein näheres Eingehen auf die verschiedenen Unterabtheilungen, (der Erotomanie, Satyriasis, Nymphomanie u. s. w.) versagen, als sie alle nur verschiedene Aeusserungen desselben krankhaft erregten Triebes darbieten. Dass der Grundzustand, auf welchen man alle diese Verirrungen zurückführen muss, in diesem Falle die Geschlechtssphäre ist, versteht sich von selbst, von der zarten Sehnsucht, der holden Schwärmerei nach unerreichbar Hohem und Heiligen bis zu rücksichtslosester Befriedigung der thierischen Begierde. Idiopatisch kann diese Störung also auftreten durch directe Erregung und Erkrankung der Sexualorgane, während sie sich auf der anderen Seite den meisten der psych. Schwächezustände zugesellt, so besonders der Paralyse, dem eigentlichen Schwachsinn und dem Alterswahnsinn.

Den Schluss dieses Aufsatzes bildet die Necromanie oder die krankhafte Verstümmelung der Cadaver. Selbst diesen Scheusslichkeiten gegenüber, die alles Maass des Glaubhaften fast überschreiten, wie sie uns z. B. in dem bekannten Falle des Sergeant *Bertrand* entgegentreten, selbst diesen gegenüber ist daran festzuhalten, dass nie die That allein das Krankhafte derselben bedingt, da keine so scheusslich, keine so furchtbar ist, welche nicht auch von Geistesgesunden begangen wurde. Nur der Nachweis des wirklich krankhaften Gemüthszustandes kann hier eine Entscheidung geben. In gerichtlicher Hinsicht wird die incriminirte Handlung natürlich stets den Angelpunkt einer jeden medicinischen Begutachtung bilden müssen, für die Entscheidung aber wird sie weniger den Ausschlag geben, als vielmehr alles das, was bei jeder Untersuchung eines krankhaften Gemüthszustandes von Wichtigkeit ist, die Anamnese, erbliche Anlage, der somatische Zustand; und der Nachweis für das

Digitized by Google

Krankhafte der Handlung ist dann gelungen, wenn er überhaupt für den Geisteszustand des Inculpaten geführt worden ist.

Die Hefte für 1867 enthalten eine ähnliche Abhandlung über die Pyromanie und Kleptomanie, nebst reicher Casuistik.

Wesentlich Neues wird darin nicht geboten und die Behauptungen von *W. Jessen* im Wesentlichen bestätigt. Die krankhaften Brandstifter sind zum grossen Theile Kinder, und zwar in der Mehrzahl Mädchen. Der Nachahmungstrieb, der Anblick von Feuersbrünsten oder deren lebhafte Schilderung thut auch hier eine Hauptsache, und von gleich nachtheiligem Einfluss erweisen sich Pubertät und Climacterium, Schwangerschaft, Geburt und Laktation.

Für die Kleptomanie hat *W. Sander* das hauptsächlichste erörtert, die Hauptdiebe stecken meist unter den Paralytikern, für welche ja der Stehltrieb fast charakteristisch ist. Auch *L.* hebt die Häufigkeit gerade dieses Triebes bei tieferen Läsionen des Gehirnes hervor, und weist auf ihr Vorkommen bei der Epilepsie, Hemiplegie, Strabismus, Kopfverletzungen u. dergl. hin.

Nachdem der Verfasser so die gewaltthätigen Handlungen Geisteskranker gegen Personen und Eigenthum erörtert hat, geht er zu denen gegen die öffentliche Ordnung über. (1868.) Mit Uebergehung des offenbaren Irreseins, dessen richtige Beurtheilung dem Sachverständigen in der Regel keine aussergewöhnlichen Schwierigkeiten entgegensetzen wird, nähert er sich rasch jenen schwankenden Grenzen von psychischem Gesund- und Kranksein, welche für eine richterliche Beurtheilung von jeher ein recht precäres und schwieriges Gebiet dargeboten haben.

Es ist das grosse und interessante Kapitel der Geistesepidemien, die auf dem Boden des Nachahmungstriebes entstanden und einer so verschiedenen Beurtheilung zulässig sind.

Der Krankheitsstoff breitet sich hier gleichsam über die Massen aus, die Gesellschaft erkrankt, während das einzelne Individuum relativ gesund bleibt und unter dem Einflusse des religiösen oder politischen Fanatismus begehen Alle zusammen Handlungen, welche der Einzelne nachher oft genug verdammen wird. Hier kann die Verantwortlichkeit des einzelnen Individuums auch nur eine beschränkte sein, und sie wird um so geringer werden, jemehr die Ideen, aus welchen seine strafbare Handlung hervorging, Eigenthum der Massen geworden waren, und je weniger der Einzelne durch Intelligenz und Erziehung befähigt war, dieser allgemeinen Strömung Widerstand zu leisten.

Eine grosse Rolle spielt bei allen diesen Zuständen der uns angeborene Trieb der Nachahmung. Am stärksten ausgebildet in

Digitized by

der Kindheit, schwindet er mehr und mehr mit der Zunahme der Herrschaft des Verstandes, um jedoch sofort in seine alten Rechte einzutreten, wenn der Verstand aus irgend einem Grunde dauernd oder momentan seine leitende Kraft einbüsst. Unter dem Einflusse der sogenannten krankhaften Disposition, jener abnormen Spannkraft der Molecüle, bedarf es nur eines leichten Anstosses, wie es z. B. der Anblick einer besonders frappanten Handlung ist, um dieselbe Bewegung im eigenen Organismus auszulösen, und die ansteckende Wirkung des Erbrechens und Gähnens, auch der epileptischen Krämpfe u. dergl. ist bekannt. Das Contagium ist hier rein dynamischer, psychischer Natur, hat aber genügt, um seiner Zeit grosse und gewaltige Epidemien hervorzurufen (Veitstanz, Tarantella) und zeigt sich selbst im 19. Jahrhundert noch hier und da in genügender Stärke, um Anklänge an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte hervorzubringen (die Erweckungen in *Morzine*, im Elberfelder Waisenhause u. dgl.).

Livi zeigt noch durch eine Menge von Beispielen die ansteckende Wirkung gewisser, theils gewaltthätiger, theils krankhafter Handlungen, wie Diebstahl, Brandstiftung, Mord und Selbstmord (ich erinnere nur an die so häufig beobachtete Duplicität der Fälle, besonders bei Selbstmorden in einer Irren-Anstalt) und begleitet sie mit recht sachgemässen Bemerkungen. Der gesunde Sinn des Verfassers tritt hier wie überall hervor und richtet sich besonders gegen den Einfluss der Tagesliteratur, von welcher ein gewisser Theil sich nur von Mord- und Schauergeschichten nährt und so für ihre Leser die Quelle neuer Schandthaten abgibt. Er beweist die demoralisirende Wirkung öffentlicher Hinrichtungen, die um so verderblicher sich erweisen, je grösser der Applomp gewesen, mit welchem man sie in Scene setzte, und giebt für Eltern und Erzieher werthvolle Winke, dass solche und ähnliche Dinge namentlich den jugendlichen und leicht erregbaren Gemüthern nicht fern genug zu halten sind.

Weitere Fälle aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin theilt Prof. *C. Lombroso* mit; er bedient sich bei der Diagnose derselben der von ihm sogenannten experimentellen Methode (Diagnosi psichiatriche legalé condotte col metodo sperimentale 1867, 1 u. 2; u. 5; 1868 2 u. 3), welche er in einem besonderen Schriftchen „La medicina legale delle alienazione mentale studiata col metodo sperimentale, Padova 1865“ näher erläutert und auseinander gesetzt hat.

Leider war mir diese Arbeit *L.'s* nicht zugängig, da aber die zum Theil recht interessanten Fälle ohne vorherige Kenntniss dieser Methode kaum verständlich sein würden, so muss ich schon ein Plagiat begehen und die hierher gehörenden Thesen dem sehr ge-

Digitized by Google

nauen Referate *Fränkel's* aus dem 2. Hefte des Archives für Psychiatrie entlehnen.

L. will also die bisher gebräuchlichen Ausdrücke wie: Menschliche Vernunft, freier Wille, übermächtiger Instinct u. dergl. als zu eng und unbestimmt aus der gerichtl. Medicin verbannen und mit Hülfe von Massstab und Wage mehr mathematisch genaue Begriffe an deren Stelle setzen.

Auf Grund seiner zahlreichen Beobachtungen, welche er in diesem Sinne in der Klinik zu Pavia angestellt hat, kommt er zu folgenden Resultaten, welche er zum Ausgangspunkte seiner experimentellen Diagnose macht.

1. Das Körpergewicht der Irren ist geringer als das der Gesunden.
2. Das Kopfhaar wird oft gebleicht und dünn. Der Kinnbart fehlt oft bei Irren oder ist unverhältnissmässig stark.
3. Bei Tobsüchtigen, noch mehr bei Verrückten sind die Zähne unregelmässig, kariös.
4. Der Ansatz des Ohres und die Gestalt des Helix ist häufig unregelmässig.
5. Verengerung oder Erweiterung der Pupille, abnormer Glanz des Auges bei Tobsüchtigen; oft ist der Augapfel in beständiger Seitenbewegung.
6. Unabhängig von dem nationalen Typus der Schädelform neigen Dementia und Idiotismus zu enormer Brachycephalie, Manie bei Männern zu Dolichocephalie, Wahnsinn zu mittlerer Brachycephalie; die Capacität der Schädelhöhle ist vermindert bei Manie, noch mehr bei Demens und Idiotismus, am meisten bei epileptischem Blödsinn, vermehrt bei Monomanie und Mania suicida.
7. Das Harn-Volumen ist bei Manie und Demens geringer, als im Normalen, das specifische Gewicht geringer bei Melancholie, fast normal bei Manie und wächst merklich bei den Tobanfällen in der Demens.
8. Bewegungsstörungen kommen fast bei allen Irren vor.
9. Das Gemeingefühl ist in den meisten Fällen verkehrt, die Empfindung für Schmerz fehlt bei Tobsucht; bei Allen zeigt sich eine besondere Empfindlichkeit für die Abweichungen der atmosphärischen Electricität.
10. Fast Alle, ausgenommen die Hysterischen, zeigen besondere Unempfindlichkeit gegen medicamentöse Substanzen, Alkoholika und Kaffee.
11. Die Affecte sind meist geschwunden, selten normal.

Digitized by Google

12. Bei ¾ der Kranken prävaliren erbliche und physische Ursachen, die moralischen bilden nur die Ausnahme.

Ich habe dabei mehrere Punkte übergangen, die mehr bekannte und allgemeine Thatsachen betrafen.

Diese Resultate wendet nun *L.* auf die betreffenden Fälle an, und beurtheilt sie nach dem dort gefundenen Massstabe.

N. N., 40 J. alt, wird als Landstreicher mit dem Verdachte des Irreseins eingebracht. Er ist zuerst stumm, spricht aber später und verwickelt sich in Widersprüche. Grösse 5′ 7″, Körper gut genährt, wiegt 160 Pfd.; Haltung fest und gerade. Intelligentes Aussehen, Bart voll, beginnendes Ergrauen, Zähne sehr weiss, Schädel brachycephal, Tast- und Schmerzempfindung ohne Abnormitäten, Urin 1025, Sulphate und Phosphate in normaler Menge; Temperatur normal, Kopf nicht zu heiss. Die physikalischen Zeichen schliessen hier Irresein aus und lassen Simulation vermuthen, welche dann auch constatirt wird.

Lodi G., taubstumm, etwa 22 J. alt, 5′ 9″ gross, 116 Pfd. an Gewicht, im 9. Monate der Schwangerschaft, ist nach der Angabe ihrer Eltern von Jugend auf imbezil und in diesem Zustand von zwei Individuen genotzüchtigt worden.

Der Grossvater mütterlicher Seits war epileptisch, sie selbst litt als Kind von 5 Monaten an epileptischen Anfällen, welche bis zum 3. Jahre dauerten, sich aber später nicht mehr wiederholten. In Folge dieser Krämpfe wurde sie taub und blieb stumm, ihre sonstige körperliche Entwickelung ging gut von Statten, eine Erziehung irgend einer Art, hat sie dagegen nie erhalten. Der Gang ist sicher, die Haltung aufrecht, das Auge lebhaft und beweglich, die Zähne schön und vollständig, die Haare dicht, Schädel brachycephal. Eine Verständigung war mit der Person fast unmöglich, doch reagirte sie gut auf einen electrischen Strom, unterscheidet verschiedene Geldsorten recht gut nach ihrem Werthe und zeigt einen gewissen Grad von Schlauheit, die sich besonders in der Befriedigung ihrer Leidenschaften ausspricht. Sie stielt mit Geschick, namentlich Esswaaren, arbeitet nur gegen baare Bezahlung, und zeigt sich sonst sehr gefrässig, unstät und ohne alles Schamgefühl.

Gestützt auf vorstehende körperliche Untersuchung giebt *L.* sein Urtheil dahin ab, dass es sich hier nicht um eine Imbezile handle, wobei er ein ganz besonderes Gewicht auf die Ergebnisse der electrischen Behandlung, also auf ihre normale Empfindlichkeit legt.

Dagegen ist die *Lodi* eine Taubstumme, ohne alle Erziehung, aber erziehungsfähig; so wie sie jetzt, ist sie jedoch nicht im Stande, die Folgen ihrer Handlungen zu berechnen. Erblichkeit uud die

Digitized by Google

früher überstandene Epilepsie lassen eine grosse Disposition zur Geisteskrankheit bei ihr voraussetzen.

P. G. litt in den Jahren 1860 und 1863 an Melancholie mit Aufregung, und ein namhafter Irrenarzt erklärt, dass sich die unzweifelhaften Zeichen beginnender Demens bei ihm ausbildeten. Ein zweiter Arzt constatirt in den Jahren 1862 und 1863 dieselben Krankheitssymptome und warnt bereits die Gattin des Kranken vor demselben, da seine Tochter durch Schreck, den der Vater veranlasst, in Epilepsie verfiel. Von März 1862 bis Mai 1863 leidet er an acuter Meningitis, wird aber im September 1863 von 2 Sachverständigen für gesund erklärt.

Mai 1865 untersuchten ihn die Prof. *Platner* und *Lombroso*. Der Kopf ist klein, das Gesicht geröthet, die Temperatur der Stirne erhöht und steht in grellem Contrast zu der fast eisigen Kälte der Hände; die Augen injicirt, unstät, weichen beständig nach der Seite ab, Pupillen weit und wenig beweglich. Die Oberlippe zittert stark. Der Urin sparsam, roth, reich an Phosphaten. In den langen und wiederholten Interrogatorien antwortete er meist formell richtig, aber mit grosser Geschwätzigkeit. Nähere Erkundigungen ergaben dagegen eine Menge ganz sinnloser Handlungen, denen *P. G.* sich von Zeit zu Zeit hingegeben, und einzelne Aeusserungen von Verfolgungswahn, gänzlicher Mangel an Gefühl für seine Familie, das Unzusammenhängende seiner Reden lassen im Vereine mit dem Ergebniss der physikalischen Untersuchung keinen Zweifel, dass der *G.* wirklich geisteskrank ist.

In einem 4. ausführlich mitgetheilten Falle handelt es sich um einen wirklich geisteskranken Mörder, der im Gefängniss Tobsucht simulirte. Am 14. Februar 1866 wird in Pavia eine Gewürzhändlerin ermordet und wenige Tage darauf meldet sich ein gewisser *Farinx* selbst als Mörder. Die nähere Untersuchung ergiebt, dass er schon lange vorher an Hallucinationen des Gehörs une Gesichtes sowie an Verfolgungswahn gelitten, an deren Realität er fest hält. Dieser offenbar Wahnsinnige fängt nun im Gefängniss an zu toben, gesteht aber später dem Arzte gegenüber das absichtliche dieser Vorgänge ein; er hatte sich ebenso gut wie ein psychisch Gesunder wahnsinnig stellen wollen, um der Strafe zu entgehen. Trotz vieles anderen Interessanten bietet dennoch die Entwickelung dieses Falles nichts Neues mehr und sie geschieht nach denselben Grundsätzen, wie die vorherigen. Der Weg, welchen *L.* eingeschlagen, ist gewiss verdienstlich, und seine Arbeiten enthalten höchst bemerkenswerthe Winke, über Einzelne seiner Befunde lässt sich aber sicherlich noch streiten, und zum Schema der Beurtheilung erhoben

Digitized by Google

möchte sie in der Hand Unkundiger vorläufig noch eine sehr zweischneidige Waffe sein.

Schliesslich theilt *Verga* noch 2 Fälle aus der Praxis *Lussana's* mit. Der letztere hatte nämlich vorgeschlagen, die verschiedenen Bezeichnungen von Brandstiftungstrieb, Mord- und Selbstmordtrieb u. s. w. als Aeusserungen ein und desselben Triebes aufzugeben und sie unter dem allgemeinen Namen des „Zerstörungstriebes" zusammenzufassen. Dem widersetzt sich *Verga*, weil das Zerstören oft nur ein Symptom ganz verschiedener Krankheitsbilder sei (Paralyse, Manie), dem Mord und Selbstmorde aber oft ganz andere Motive als eine Neigung zum Zerstören zu Grunde liegen und es deshalb besser sei, bei den alten Bezeichnungen zu bleiben. Für die gerichtliche Medicin sind solche systematische Streitigkeiten ohne allen Nutzen und die Aufstellung der „Monomanie" hat ihr nur Schaden gebracht. Auch die folgenden Fälle beweisen wieder, wie die triebartigen Handlungen, die scheinbar inmitten der völligen Gesundheit als etwas ganz isolirt Krankhaftes auftreten, bei näherer Untersuchung von tiefen und eingreifenden Störungen des Seelenlebens begleitet sind.

Gaetano ist ein kräftig gebauter Mensch, 21 J. alt. Von Jugend auf war er unbändig, ungezogen, hatte später stets Streit mit seiner Familie, machte sich überall unmöglich und wurde endlich Soldat. Seine militärische Carriere besteht aus einer ununterbrochenen Reihe von Strafen, eine härter wie die andere und alle wegen Zerstören von Effecten. Da alles nichts hilft, fasst man endlich Zweifel an seinem Verstande und im Jan. 1866 wird er in die Irrenanstalt zu Parma aufgenommen. Sein Wesen ist apathisch, die Antworten gehalten und verständig, aus seiner selbstverfertigten Lebensbeschreibung ergiebt sich seine geistige Schwäche und zugleich sein Wahnsinn. Schon mit 14 Jahren fühlte er, wie längeres Denken ihn ermüdet und er hat ein deutliches Gefühl von der Schwäche seines Gedächtnisses. Er bildet sich deshalb ein künstliches System, indem er die verschiedenen Dinge, an die er täglich denken muss, in ein einziges Wort, „den Denkschluss" zusammenfasst. Als Knabe hat er nur wenig zu ordnen, und wenn er sich vor dem Einschlafen sagt, „der Denkschluss ist in Ordnung", so heisst das nur, „das Schnupftuch, das Handtuch und der Kamm liegen an ihrer Stelle." Beim Militär werden die Verhältnisse complicirter, immer neue Gegenstände muss er in den „Denkschluss" hineinzwängen, aber oft verwirren sich seine Begriffe, es wird ihm ganz wirr im Kopf, und er muss irgend eine gewaltthätige Handlung begehen, um wieder zu sich

Digitized by Google

zu kommen. In solchen Augenblicken ist er nicht Herr seiner Selbst, er weiss zwar, dass er eine strafbare Handlung begeht, wenn er seine Uniform zerreisst, sein Gewehr zertrümmert u. dergl., aber er „kann nicht gegen die Gewalt an, welche ihn treibt", und hat er einmal eine dahin bezügliche Idee gefasst, so muss er sie ausführen und wenn er auch wochenlang vergeblich dagegen ankämpft. Seine Urtheilskraft ist die eines Knaben von 10—14 Jahren trotz seiner guten Erziehung, und in seiner Familie galt er als „eine Art Cretin." Ein Mutterbruder war epileptisch nnd geisteskrank, ein Bruder des Pat. erkrankt psychisch und wird geheilt.

Bei dem Urtheile wird Simulation ausgeschlossen, der Kranke leidet an „Instinctiver Monomanie, an Zerstörungswahnsinn mit fixen Ideen und geistiger Schwäche."

Wir würden den Hauptwerth auf den Schwachsinn legen, und das Triebartige seiner Handlungen hieraus zu erklären suchen.

Remigio G. wird wegen 6facher Brandstiftung verhaftet, jedoch bald als Irrer erkannt. Seine Mutter ist excentrisch, ein Mutterbruder geisteskrank. Schon mit 14 J. findet er seine grösste Lust daran Thiere zu misshandeln und zu Tode zu quälen, er wird streitsüchtig, hat seine Freude am Zerstören und Zerreissen und mit 16 Jahren am Feuerlegen. Zwischendurch wirkliche Hallucinationen von Mord und Leichen. Er gehorcht blindlings einem unwiderstehlichen und stets wachsenden Triebe zum Zerstören, ohne sich von der Handlung selbst irgend eine Rechenschaft zu geben, und so zündete er mehrere Gebäude seiner Brüder an, mit denen er im besten Einvernehmen lebte. Bei seiner Arretirung lachte er und zeigte auch später weder Scham noch Reue.

Dem Einflusse meteorischer Veränderungen auf das Irresein ist eine Reihe von Aufsätzen *Lombroso's* gewidmet, (1867, 5 und 6. 1868, 1 und 3). Nach einer längeren geschichtlichen Einleitung geht der Verfasser zur Aufnahme-Statistik der Anstalten Nord-Italiens in den letzten Jahren über und zieht seine Schlüsse aus einem Materiale von fast 10,000 Kranken. Die meisten Aufnahmen fallen in den Juni, die wenigsten in den Februar.

Eine Reihe von Tabellen, welche sich über den Zeitraum von 15 Monaten erstrecken, zeigen in übersichtlicher Weise den Stand des Barometers und Thermometers, die Mondphasen und Windrichtung, Stürme sowie die Anfälle der Tobsüchtigen und Epileptischen in der Anstalt zu Pavia an jedem Tage während dieser Zeit. Er knüpft hieran eine Reihe von Schlussfolgerungen:

1. Wenn die Hitze etwa 25° R. übersteigt, so steigern sich die maniakalischen und epileptischen Anfälle in ausser-

Digitized by Google

gewöhnlichem Maasse, ein Herabgehen des Thermometers unter den Gefrierpunkt verringert die epileptischen Anfälle.

2. Ein hoher Barometerstand (höher als 28,8) wirkt ungünstig. Heftige Schwankungen nach auf- oder abwärts haben in den 2—3 vorhergehenden oder nachfolgenden Tagen eine grössere oder geringere Anzahl von Paroxysmen zur Folge, je nach der Richtung der Barometerschwankung.
3. Ebenso erweisen sich die verschiedenen Windrichtungen von Einfluss.
4. Herbst und Frühling erweisen sich von gutem Einfluss auf chronische Fälle.
5. Die meisten Todesfälle fallen in die kältesten und heissesten Monate, besonders bei kaltem und feuchtem Wetter. Mord, Selbstmord und gewaltsame Verbrechen überhaupt fallen meist in die heissen Monate, dasselbe gilt von den Revolutionen.

Es knüpfen sich hieran die praktischen Regeln, dass man Epileptiker und Blödsinnige, bei welchen der Einfluss der Witterungsverhältnisse ganz besonders hervortritt, möglichst vor denselben zu schützen hat, die an chronischer Manie Leidenden dagegen denselben mehr aussetzen soll.

Die Arbeit ist überhaupt reich an interessanten Untersuchungen und frappanten Bemerkungen über den Einfluss der atmosphärischen Zustände und Veränderungen auf Geistesgesunde und die Geburt bedeutender Menschen, und verdient bei der Neuheit des behandelten Gegenstandes unsere volle Beachtung.

Dem Einflusse des Mondes speciell gilt ein zweiter Artikel (1868, 1). *Koster*, der früher (Allg. Ztschr. Jahrg. 1859 u. 61) dasselbe Thema behandelte, hatte die Mondphasen ohne Berücksichtigung gelassen, dagegen die Beziehungen des anomalistischen Umlaufes (Apogäum und Perigäum) zum Irresein festgestellt und allerdings einen Zusammenhang mit dem Beginn oder Ende eines tobsüchtigen Anfalles gefunden. *Lombroso* findet gerade das Apogäum und Perigäum ohne nachweisbaren Einfluss, wohl aber ist dies nach ihm mit den verschiedenen Mondphasen der Fall.

Seine Resultate sind folgende:

Nicht alle Geisteskranken empfinden in gleichem Maasse den Einfluss des Mondes. Die Tobsüchtigen haben ihre meisten Anfälle nach dem ersten Viertel, die wenigsten nach dem Vollmonde. Um diese Zeit fallen die meisten Anfälle der Blödsinnigen, ihre wenigsten um Neumond; umgekehrt die Melancholiker; die Epileptiker wieder am

Digitized by Google

wenigsten um Neumond und am meisten vom ersten bis zum letzten Viertel.

Die meisten Anfälle geschehen überhaupt bei abnehmendem Licht und damit stimmt die Beobachtung *Schiapparelli's* überein, dass in diese Periode die meisten Stürme und atmosphärischen Veränderungen fallen, während bei zunehmendem Mond die geringsten Barometerschwankungen und die meisten heiteren Tage zu finden sind.

Auch auf die Verbrechen übt der Mond seinen nachtheiligen Einfluss aus, und aus der Strafliste des Gefängnisses von Alessandria ersah *L.*, dass die meisten Vergehen in die Nähe des ersten Viertels fielen. Besonders aber machten sich atmosphärische Schwankungen 2—3 Tage vorher so deutlich bemerkbar, dass man daran den bessten Barometer hatte.

Eine Eröffnungsrede *Verga's*, gehalten im Nov. 1867 im Ospitale Maggiore zu Mailand, behandelt „die Statistik und die Geistesstörung" und enthält im Wesentlichen nur die Entwürfe des internationalen statistischen Congresses von Paris und Wien 1855 u. 57. *Verga* knüpft daran eine warme Aufforderung an seine Schüler in dieser Richtung das allgemeine Unternehmen zu unterstützen und auch für Italien die Grundlage zu einer Irrenstatistik zu schaffen. So viel mir bekannt, haben die Entwürfe beider Congresse einen praktischen Erfolg bis jetzt nirgends gehabt.

August Tebaldi theilt einen Fall mit, welcher in mancher Beziehung Aehnlichkeit mit der von *Westphal* beschriebenen Form der Paralyse hat.

S. Vincenzo, 33 J. alt, zeigte schon bei seiner Entlassung vom Militär eine grosse allgemeine Schwäche, erdfahle Farbe, abendliches Fieber und eine merkliche Schwäche der unteren Extremitäten. Es erfolgte Besserung, im Herbst 65 neue Verschlimmerung und im Jan. 67 wird er in's Hospital aufgenommen.

Es ergaben sich hier die Symptome der *tabes dorsalis*, verbunden mit denjenigen der allgemeinen Paralyse. Unsicherer schwankender Gang, unwillkührlicher Abgang von Stuhl und Urin, Anästhesie der unteren Extremitäten, Unempfindlichkeit gegen den elektrischen Strom u. s. w.; dabei Stottern, zitternde Zunge, rascher Wechsel der Stimmung bei meist kindischer Heiterkeit und deutlichem Grössenwahn. Besserung unter localer Behandlung, die Gehirnsymptome verlieren sich ganz, die Erscheinungen der Rückenmarkserkrankung werden geringer, bleiben aber endlich stationär. Nach 14 Monaten deutlich ausgesprochene Muskelatrophie der unteren Extremitäten, völlige Ataxie, also weiterer Fortschritt der Tabes, während die psych. Erscheinungen sich allerdings ebenfalls verschlimmert haben,

Digitized by Google

jedoch nicht die Höhe erreichen, wie bei der ersten Erkrankung. Die Krankheitsgeschichte lässt hier verschiedene Deutungen zu, und selbst eine anfängliche Diagnose auf allgemeine Paralyse möchte sich immerhin vertheidigen lassen.

In einem italienischen Journale ist eine Erwähnung der Pellagra gewiss natürlich nnd wir finden verschiedene Artikel darüber. *Lombroso* hat eine Arbeit unter den Titel „*Pellagra maniaca*" veröffentlicht, welche *Verga* einer näheren Besprechung unterzieht. Die gewonnenen Resultate sind folgende:

1. Das Gewicht der geisteskranken Pellagrosen erreicht nicht die Norm, ihr Körperzustand ist gewöhnlich ein erbärmlicher.

2. Das Erythem fehlt nur höchst selten.

3 Schädelanomalien sind relativ selten, da die specifische Schädlichkeit ganz wo anders zu suchen ist.

4. Die Verdauung ist späterhin gemeiniglich besser, als im Beginn der Krankheit.

5. Der Urin ist von geringem specifischem Gewicht, meist neutral oder alkalisch und enthält wenig Phosphate.

6. Rigidität der Muskeln, häufige Contractionen, Herabsetzung der electrischen Reizbarkeit, Abnahme der Muskelkraft sind speciello Charaktere des pellagr. Irreseins.

7. Bei den psych. Anomalien nimmt *Verga* im Gegensatze zu *Lombroso* eine specifische Form des Irreseins, das „pellagröse Irresein" an; schliesst aber nicht aus, dass Pellagrose auch sonst psychisch erkranken können, ebenso gut wie andere Hautkranke. Das „pellagrösse Irresein" aber hat einen bestimmten Charakter, es ähnelt durch die verwirrten und anhaltenden Delirien den Trunkenbolden, die Affecte sind oberflächlich, häufiger Selbstmord, aber ohne Absicht und unbewusst, die Paroxysmen sind ohne Nachhalt, die psych. Aeusserungen in ihrer Absurdität gleichen denen der Paralytiker.

8. Ungefähr 10 pCt. der Pellagrosen werden geisteskrank, Erblichkeit kann einen gewissen Theil der Schuld übernehmen, die Hauptursache ist immer der Mais.

9. Der Tod erfolgt durch Paralyse, Selbstmord und Erschöpfungskrankheiten.

Bei der Heilung erweist sich in leichteren Fällen die Elektricität von gutem Erfolg, wie ein von *Tebaldi* genauer mitgetheilter Fall (pag. 157 ff.) beweist.

Im 4. Hefte hat *Cesare Castiglioni* in einem längerem Aufsatze „Ideen zu einem Entwurfe einer Irrenanstalt für die Provinz Como mitgetheilt."

Es war im Anfange des Jahres 1863 der Plan gefasst worden,

Digitized by Google

für Como eine Anstalt für 300 Kranke zu bauen und durch ein öffentliches Programm waren die Irrenärzte Italiens aufgefordert worden, für diese Anstalt zu concurriren. Die Ausführung scheiterte aus pecuniären Gründen, *Castiglioni* erhielt jedoch den ersten Preis. Ein Auszug der ziemlich umfassenden Arbeit würde zu weit führen; *C.* lässt übrigens den Architekten ganz freie Hand und giebt nur im Allgemeinen die irrenärztlichen Bedingungen an, unter welchen die einzelnen Theile des Gebäudes zu errichten sind.

Den Versuch einer eigentlichen Irrencolonie findet er ganz unausführbar, spricht sich dagegen für eine ferme agricole in der Nähe und unter der Oberleitung der Mutter-Anstalt aus, obgleich er selbst für diese Art der freien Behandlung keineswegs schwärmt.

Dr. *Pelman.*

Ninth Annual Repport of the General Board of Commissioners in Lunacy for Scotland. Edinburgh 1867.*)

Dieser Jahresbericht des Collegiums der Bevollmächtigten für das Irrenwesen in Schottland enthält über die Haltung und Lage der Irren und der sämmtlichen Anstalten eine vollständige und authentische Auskunft Sachverständiger, wie wir dieselbe so umfassend von keinem Lande ausser England besitzen. Wir finden in demselben auch eine vollständige Zusammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen über das System der häuslichen Beaufsichtigung von

---

*) Unser verehrter Mitarbeiter hat der Red. Abkürzungen freigestellt. Sind dieselben meist misslich, um so mehr in diesem Falle, wo es darauf ankam, die im Ganzen bei uns noch unbekannten englischen Verhältnisse aufzuklären und uns ein zutreffendes Urtheil zu gestatten. Wollte man abkürzen, so hätte man das Wesentlichste forlassen müssen, nämlich die gesetzlichen Vorschriften und Einrichtungen der Irrenverhältnisse in England. Diese sind, wie auch ihr No-restraint, von einer milden Fürsorge und möglichsten Verhütung einer Beschränkung der gesetzlichen Freiheit eingegeben. Die gesetzlichen Vorschriften über Irre greifen aber demohngeachtet energischer und rücksichtsloser in Privatverhältnisse ein, als bei uns. Das Corrigens, was dort die öffentliche Meinung versöhnt, ist die unbedingte Oeffentlichkeit. Wir hoffen daher, den Leser in Uebereinstimmung zu wissen, dass wir die vorliegende Arbeit vollständig geben. Red.

Digitized by Google

Irren, welches für das Wohlbefinden dieser Kategorie von Kranken als von gutem Einfluss befürwortet wird. Der Werth dieser Berichte liegt darin, dass alle Verhältnisse an das Licht der Oeffentlichkeit gezogen und der Beurtheilung der Wissenschaft und der Erfahrung unterworfen werden. Die detaillirte und rücksichtslose Kritik befähigt nicht bloss die aussenstehenden Sachverständigen zu einem Urtheile über die Leistungen in der Fürsorge für die Irren, sondern kann auch die öffentliche Meinung anregen, auf die Lage dieser Kranken einen wohlthätigen Einfluss zu üben. So scheinen uns nähere Mittheilungen der fremden Verhältnisse auch für deutsche wissenschaftliche Kreise Interesse zu verdienen.

Die Zahl der Irren in Schottland und ihre Vertheilung war am 1. Jan. 1866:

	Im Allgemeinen.			Private.			Armen-Kranke.		
	Männl.	Weibl.	Total	Männl.	Weibl.	Total.	Männl.	Weibl.	Total.
In öffentl. und Bezirks-Anstalten	1592	1615	3207.	441	412	853.	1151	1203	2354.
In Privat-Anstalten	366	446	812.	109	143	252.	257	303	560.
In Gemeinde-Anstalten	193	243	436.	—	—	—	193	243	436.
In Irrenabtheilungen d. Armenhäuser . .	235	337	572.	—	—	—	235	337	572.
In Privatwohnungen	698	891	1589.	8	13	21.	690	878	1569.
Summa	3084	3532	6616.	558	568	1126.	2526	2646	5490.

Gegen das Jahr vorher hatte die Zahl der Privatkranken um 50, die Zahl der Armenkranken um 98 zugenommen. In dieser Zusammenstellung ist eine beträchtliche Zahl in den gewöhnlichen Sälen der Armenhäuser untergebrachter Armenkranken nicht mit einbegriffen, welche, obwohl geisteskrank, dennoch nicht zu den Irren im gesetzlichen Sinne gerechnet werden, weil ihr Irresein nicht durch 2 Aerzte bescheinigt ist. Die Zahl der geisteskranken Verbrecher im Centralgefängniss zu Perth belief sich auf 34 männl. und 12 weibl. Kranke und war seit dem vorhergehenden Jahre um 10 gestiegen. Die officielle Zahl der Geisteskranken betrug am 1. Jan. 1866 mithin 6662 gegen 6504 am 1. Jan. 1865.

Seit einer Reihe von Jahren (nach den öffentlichen Berichten von 1858) ist die officielle Zahl der Irren im Steigen gewesen. Diese Steigerung entspricht ziemlich nahe der Zunahme der Gelegen-

Digitized by Google

heit zur Aufnahme in öffentliche und Gemeinde-Anstalten. Dagegen hat seit 1858 die Zahl der in Privatwohnungen verpflegten Kranken um so viel abgenommen. Abgesehen von den bei Verwandten lebenden Geisteskranken ist die Zahl der Armen- $3\frac{1}{2}$ mal grösser als die der Privat-Irren. Von den in die Anstalten gebrachten Irren werden mehr als $\frac{1}{3}$ als Privat-Irre bezeichnet. In 8 Jahren nahm die Zahl der Armen-Irren um 969 zu, die der Privat-Irren um 93. Die Zahl der ungenesen entlassenen Privat-Kranken ist verhältnissmässig grösser als die der Armen-Kranken, in Folge dessen eine Ueberfüllung der Asyle mit Armen-Kranken eintritt.

In Bezug auf die verschiedenen Counties herrscht eine Verschiedenheit; in einigen hat die Zahl der Armen-Geisteskranken seit 1848 wenig Veränderung erlitten, während man in anderen eine bedeutende Zunahme des Irreseins wahrnahm. Diese Zunahme steht im Verhältniss zu dem Wachsthum der Bevölkerung, giebt aber keine genügende Erklärung von anderen Grafschaften, deren Krankenzahl oft sehr differirt. Als Regel gilt, dass in der ärmeren dünn bevölkerten Gemeinden die Zahl der Kranken, welche den Anstalten nicht übergeben werden, weit grösser ist, als in stark bevölkerten und wohlhabenden Distrikten. Im Allgemeinen kamen in den 8 Jahren 1857—65 4181 männliche und 5031 weibliche Irre vor auf 1,449,848 männliche und 1,612,446 weibliche Einwohner von 1861.

Am 1. Jan. 1866 waren auf 3,062,294 Einwohner (1861) von 77895 eingeschriebene Armen (20396 M. und 57499 W.) 4590 Irre (2526 M. 2964 W.) ein Verhältniss von 117,3 weibl. auf 100 männl. Irren. Die relative Disposition des männlichen und weiblichen Geschlechts zum Irresein, wie sie aus der Zahl der in Anstalten befindlichen Privat-Kranken sich ergiebt war 100 M. zu 102,470; wenn sie aus der Zahl der in Anstalten überhaupt aufgenommenen abgeleitet wird, ist das Verhältniss von 100 zu 104. Doch ist dabei nicht zu vergessen, dass der erste Vergleich durch die verhältnissmässig grössere Sterblichkeit des männlichen Geschlechts influencirt wird, und dass der zweite Vergleich wesentlich modificirt wird durch verschiedene Einflüsse, welche die Besetzung der männlichen und weiblichen Kranken bedingen.

Aus der Tabelle über 5 Jahre, von 1862—66 geht hervor, dass durchschnittlich auf 100 männliche Arme 286,5 weibl. Arme und auf 100 männliche Armen-Irre 118,5 weibliche Armen-Irre kommen. In verschiedenen Grafschaften kommen grosse Schwankungen vor in dem Verhältniss der armen Geisteskranken zu der Bevölkerung, welche von Verschiedenheiten in der Constitution, in der Erziehung und Geistesbildung der Einzelnen, von verschiedenen

Digitized by Google

Graden des socialen Verkehrs, von dem Wesen und der Natur ihrer Beschäftigungen und von der pecuniären Lage abhängig sind. Diese Schwankungen sind so mannigfaltig, dass man für das mehr oder weniger häufige Vorkommen des Irreseins bei den Armen in der Fabrik- oder Ackerbaubevölkerung, in der Sächsischen oder Celtischen Raçe sich nicht aussprechen kann. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Ausdehnung des Pauperismus und des Irreseins unter den Armen in den Jahren von 1859 — 1865 wesentlich sich nicht verändert hat. Im Durchschnitt waren in diesem Zeitraum unter 1000 Einwohnern 26,084 Arme und 1,742 Arme geisteskrank, und unter 1000 Armen 66,882 Geisteskranke.

Die Sterblichkeit der Geisteskranken differirt zwischen den Schottischen und Englischen Anstalten zu Gunsten der ersteren. Das durchschnittliche Ergebniss der Jahre 1861—1865 war, dass in Schottischen Anstalten 9,05 männliche und 7,56 weibliche und im Allgemeinen 8,21 Irre gestorben sind, während in Englischen Anstalten dagegen 12,32 männliche, 8,42 weibliche und im Allgemeinen 10,23 Irre verstarben Ebenso ergab sich, dass von 1000 Kranken, welche in Schottischen Anstalten starben, 512 männlichen und 488 weiblichen Geschlechts sind, dagegen von 1000 in den Englischen Anstalten Verstorbenen 567 männlichen und 433 weiblichen Geschlechts sind. In Französischen Anstalten war die durchschnittliche Mortalität für die Jahre 1854—1866 14,03 pCt, bei männlichen Kranken war das Verhältniss der Mortalität zu den weiblichen Kranken wie 131 zu 100. Im Jahre 1866 wurden 1568 (773 M., 795 W.) Geisteskranke aufgenommen, von welchen im genannten Jahre 306 männl. (39,6 pCt.) u. 367 weibl. (46,1 pCt.) genasen und 215 männl (27,8 pCt.) und 218 weibl. (27,4 pCt.) verstorben sind. Die tabellarische Uebersicht der 8 Jahre 1858—1866 ergiebt, dass in den Monaten Mai, Juni, Juli, August die überwiegende Zahl der Aufnahmen und Genesungen vorkamen und im December, Januar, Februar, März und April die Todesfälle vorwiegend waren, die Genesungen sind beim weiblichen Geschlecht zu allen Jahrszeiten weit günstiger, als beim männlichen Geschlechte, bei welchem die Mortalität beträchtlich höher ist.

Die Ausgaben für arme Geisteskranke in Schottland sind von £ 80,652 im Jahre 1858 auf £ 104,974 im Jahre 1865 gestiegen. Die Gesammtzahl der Verpflegungstage der armen Irren im J. 1865 betrug 1,964,126 und war um 42,022 Tage mehr als im Jahre 1864.

In den 7 Jahren von 1859—1865 ist die Zahl der verpflegten Kranken in den öffentlichen und den Bezirks-Anstalten stetig grösser geworden, während die der Privatkranken in correspondirendem

Digitized by Google

Grade abgenommen hat. Dies wird dadurch möglich, dass von den im Bau begriffenen Bezirks-Asylen mehr und mehr eröffnet werden. Duchschnittlich befanden sich 1865 71,5 pCt. in Anstalten und 28,5 in Privatwohnungen. Die durchschnittlichen Kosten des täglichen Unterhalts war in den öffentlichen und Bezirksanstalten 1 sh. 3¾ d., in Privatanstalten 1 sh. 4 d., in Armenhäusern 1 sh. ½ d., in Privathäusern 6¾ d.; durchschnittlich 1 sh. ¾ d.

Ueber die Todesursachen ergiebt eine Tabelle im Anhange eine Uebersicht, welche sich auf die in den öffentlichen Privat- und Gemeinde-Asylen, in den Privatwohnungen und Irrenabtheilungen der Armenhäuser im J. 1866 vorgegebenen Todesfälle erstreckt. An Gehirn- und Rückenmarksleiden, an convulsiven Krankheiten, an allgemeiner Paralyse und organischen Gehirnkrankheiten waren mehr Männer verstorben und nur an maniacalischer und melancholischer Erschöpfung mehr Frauen. Dagegen war der tödtliche Ausgang bei Schwindsucht, Entzündung der Lungen beim weiblichen Geschlechte häufiger, während Herzleiden etwas häufiger beim männlichen Geschlecht vorkamen. Abdominalleiden waren bei beiden Geschlechtern ziemlich gleich vertheilt; Erysipel, Krebs, allgemeine Schwäche und höheres Alter führten beim weiblichen Geschlechte mehr zum Tode und Selbstmord kam mehr beim männlichen Geschlechte vor.

Die gesetzlichen Verordnungen, betreffend die Fürsorge und die Behandlung von Geisteskranken wollen wir in den Hauptgrundzügen kurz zusammenfassen.

Das in Schottland gebräuchliche Verfahren beim Irresein ist von dem englischen Verfahren in mancher Hinsicht verschieden. In Schottland werden die Irren in 3 Rubriken, in Privat-, Arme- und Criminelle Geisteskranke geschieden. Die vorliegenden Bestimmungen beziehen sich jedoch ausschliesslich auf die beiden ersten, und berücksichtigen 1. die Art und Weise, in welcher Geisteskranke zur Kenntniss der Commission für das Irrenwesen (General *Board* of Commissioners in Lunacy) gelangen; 2. die zu ergreifenden Massregeln, um Irre in Asylen oder in Privatwohnungen in Behandlung und Pflege zu bringen; 3. die Garantie, welche der Staat zur Fürsorge ihretwegen verfügt hat; 4. die gesetzlichen Garantien gegen die Gefahr einer unnöthigen Haft und 5. die Garantie für die richtige Verwenduung des Vermögens Geisteskranker zu ihrem Unterhalt.

Die Kenntnissnahme von Irren 1. Von Privatkranken, die in ihren Familien sich aufhalten, nimmt der Staat keine Notiz, so lange kein Grund zum Verdachte vorliegt, dass der Kranke hart oder grausam behandelt werde. Ist indessen ein Kranker länger als ein

Digitized by Google

Jahr irre, wird er zwangsweise im Hause eingesperrt gehalten, oder erfährt derselbe eine Freiheitsbeschränkung und Zwang irgend einer Art, so ist es Vorschrift, dass der Commission (*Board*) von dem Falle eine Anzeige gemacht werden soll; in diesem Falle oder auch ohne dass eine solche Anzeige gemacht worden ist, sind die Commissionsmitglieder, wenn sie zu dem Glauben Grund haben, dass Zwang oder harte und grausame Behandlung Statt gefunden hat, gesetzlich autorisirt, den Kranken zu besuchen und, finden sie Grund dazu, denselben unter Vermittlung des Sheriff's (Polizeirichter) als Behörde in eine Anstalt zu versetzen. Fälle der Art kommen gewöhnlich nur zufällig zur Kenntniss der Commission und der Umfang, in welchen sie in Schottland vorkommen mögen, ist nicht bekannt; die Erfahrung zeigt jedoch, dass sie sich vorzugsweise unter den ärmeren Klassen ereignen können, wenn die Mittel der Familie zu ärmlich sind, um die Kosten der Behandlung in einer Anstalt zu tragen und wenn entweder Abneigung gegen die Annahme der Gemeindehülfe vorliegt oder Weigerung der Gemeinde, dieselbe zu gewähren. Die Unterbringung eines Irren bei Fremden in Kost ist nur auf Anordnung des Sheriff oder unter Gutheissung der Commission für das Irrenwesen gesetzlich erlaubt, welche die eine oder die andere binnen 14 Tagen nach der Aufnahme des Kranken nachgesucht werden muss, bei Strafe von 20 Pf. St.; und ein Jeder, der einen Irren oder eine Person, welche bei der Untersuchung für geisteskrank befunden wird, in Haft hält, ohne diese Autorisation, oder bei der Haft sich betheiligt, ist derselben Strafe verfallen. Nur ausnahmsweise auf eine ärztliche Bescheinigung, dass die Krankheit noch nicht erwiesen und der zeitweilige Wechsel des Aufenthaltes der Genesung förderlich sei, können Kranke zum Zweck eines temporären Aufenthaltes, der einen Zeitraum von 6 Monaten nicht überschreitet, untergebracht werden. Aber ungeachtet dieser gesetzlichen Vorschrift, dass ohne Erlaubniss des Sheriff's oder Gutheissung der Commission (Board) Niemand einen Geisteskranken aufnehmen oder bei sich unterhalten soll, waren nach officieller Feststellung vom Jan. 1866 33 Privat-Kranke in der Weise untergebracht. Um den Nachweis solcher Fälle zu erleichtern, ist die gesetzliche Vorschrift zuerst dahin ausgedehnt, dass der verantwortliche Geschäftsführer des Gerichtshofs die Namen aller Irren, welche gerichtliche Vertreter haben, der Commission übermittelt, und diese stellt nach ihrem Ermessen Untersuchungen an, um sich zu vergewissern, wie die Irren behandelt und verpflegt werden. Bei armen Kranken hat der Armen-Inspector die Verpflichtung, die Fälle der Commission anzuzeigen und zwar binnen 7 Tagen, nachdem er ihre Anwesenheit im

Digitized by Google

Kirchspiele oder ihre Zugehörigkeit zu demselben in Erfahrung gebracht hat. Ebenso haben die Inspectoren über alle armen Irren, welche einem jeden Kirchspiele Schottlands angehören, einen jährlichen Bericht einzureichen mit Angabe der Anstalten und Häuser, in welchen die Irren untergebracht sind. Am 1. Januar 1866 war die Anzahl derselben 1568. In Privatwohnungen können die Irren einzeln oder in grösserer Zahl, jedoch nicht über 4 ausgethan werden, im letzteren Fall, wenn die Zahl mehr als vier ist, wird ein kostenfrei zu ertheilender Erlaubnissschein der Commission erforderlich. Man will durch diese Verfügung eine anderweitige Unterbringung als in regelmässigen Anstalten erleichtern.

2. Die Versorgung der Irren. — Wofern nicht ein Fall von grosser Vernachlässigung, Grausamkeit oder wo Gefahr zu besorgen ist, vorliegt, ist die Versorgung der Privatkranken dem Belieben ihrer Freunde überlassen, denen die Entscheidung obliegt, ob sie zu Hause gehalten, in Kost gegeben oder in Anstalten versetzt werden sollen. Anders verhält es sich mit den armen Kranken, welche, nach der Verordnung, den Bezirksanstalten übergeben werden müssen. Diese Verpflegung hat Statt, sobald durch den Armen-Inspector ein armer Geisteskranker bei der Commission zur Anzeige gebracht ist, und kann nur umgangen werden, wenn auf Gesuch die Commission die Genehmigung ertheilt hat, den Kranken zu Hause zu behalten, in Kost zu geben, oder in die Irrenabtheilung des Armenhauses unterzubringen. Im Fall der Gemeinderath den Kranken in die Anstalt zu bringen versäumt oder dies binnen 21 Tagen nach der Requisition bei der Commission zu thun verweigert, sind mit Zwangsmaassregeln die Kosten von dem Gemeinderathe einzuziehen. Die Schottischen Anstalten werden eingetheilt in Bezirks-Anstalten, Oeffentliche Anstalten, in Gemeinde- und Privat-Anstalten. Die ersteren sind durch Steuern des Bezirks gegründet, die zweiten, welche den für milde Zwecke bestimmten Legaten oder Sammlungen von freiwilligen Beiträgen ihre Entstehung verdanken, werden ohne Absicht auf Geldgewinn verwaltet; die dritten sind vom Gemeinderathe errichtet mit Geldern, welche unter dem Poor law Act erhalten werden; die vierten Anstalten endlich gehören Privateigenthümern und werden des Gewinns wegen gehalten. Oeffentliche, Gemeinde- und Privat-Anstalten können mit Genehmigung der Commission (*Board*) zu Verpflegungen des Bezirks verwandt werden, für die beiden letzteren jedoch ist eine jährliche Licenz erforderlich, deren Gebühr im Minimum 15 Pf. Sterl. beträgt und noch erhöht wird, wenn die Kranken eine gewisse Zahl übersteigen. Zwischen Asylen und Privatwohnungen stehen die Irrenabtheilungen der Armenhäuser in der Mitte, denen die Commission Erlaubniss zu geben berechtigt ist, zur

Digitized by Google

Aufnahme von solchen armen Irren, die nicht gefährlich sind und keine ärztliche Behandlung erfordern. Wenn man einen Kranken, Privat- oder Armen-Kranken in eine Anstalt zu versetzen wünscht, ist für diese Aufnahme die Anweisung des Sheriff zu erwirken, und diese Anweisung wird ertheilt auf eine Bescheinigung von 2 Aerzten, welche den Kranken gesondert untersuchen müssen und welche von der Anstalt, in welche der Kranke untergebracht werden soll, keinen unmittelbaren oder Geldvortheil haben. Wenn diese Anstalt eine öffentliche oder Bezirks-Anstalt ist, kann eine dieser Bescheinigungen von einem der Anstalts-Aerzte ausgestellt werden, für einen Privatkranken aber darf von einem der leitenden Aerzte eines Asyles die Bescheinigung zur Aufnahme unter ihre eigene Pflege keinesfalls ausgestellt werden.

Das ärztliche Certificat muss genau die Thatsachen angeben, auf welche das Urtheil über das Irresein begründet ist, mit Unterscheidung zwischen den von dem Aussteller desselben beobachteten Thatsachen von denjenigen, welche von Anderen ihm mitgetheilt sind; mit einem Certificate, dessen Inhalt sich nur auf Thatsachen letzterer Art gründet, kann gesetzlich Niemand in eine Anstalt aufgenommen werden. Das Gesetz bestimmt keine Grenze der Dauer der Gültigkeit der ärztlichen Bescheinigung, und überlässt es der Umsicht des Sheriffs, die von zu altem Datum zu verwerfen; aber der Kranke kann in das Asyl nicht aufgenommen werden nach Ablauf von 14 Tagen nach dem Datum der Order des Sheriff's, nur bei den von dem Sheriff der Orkeny und Shetland-Inseln ausgestellten Order sind 21 Tage gestattet. Wenn die Order oder das ärztliche Certificat, auf welches ein Kranker in ein Asyl aufgenommen worden, in irgend einer Weise incorrect oder fehlerhaft ist, so können dieselben mit Genehmigung der Commission (*Board*) binnen 14 Tagen nach der Aufnahme des Kranken, von dem Aussteller verbessert werden. Geschieht diess nicht, so soll der Sheriff seine Ordre widerrufen, wenn er von dem Vorhandensein eines Irrthums oder Fehlers überzeugt ist. (Diese Verfügung ist zu unbesimmt, um einen practischen Nutzen zu haben, und wir kommen darauf zurück bei den gelegentlich vorkommenden Schwierigkeiten, die mit der Ordre des Sheriffs und den ärztlichen Certificaten in Beziehung stehen.) In Nothfällen ist es gestattet, einen Kranken in ein Asyl zu bringen und ihn während eines 3 Tage nicht überschreitenden Zeitraumes dort zu verwahren ohne Ordre des Sheriffs, wofern die Dringlichkeit des Falles von einem Arzte gehörig bescheinigt ist. Dies Certificat kann von irgend einem Arzte ausgestellt werden, wobei auch der dirigirende Arzt oder ein angestellter Arzt der Anstalt, in welche der Kranke Aufnahme findet, nicht ausgeschlossen

Digitized by Google

ist, aber für einen längeren Aufenthalt nach Ablauf von 3 Tagen, müssen nach den gewöhnlichen Verfahren die ärztlichen Certificate und die Ordre des Sheriffs beigebracht werden.

Zum Schutze des Publicums besteht die Verordnung, dass wenn von einem Irren Angriffe oder Beleidigungen zu befürchten sind, oder wenn derselbe sich in einem Zustande befindet, welcher für ihn selbst oder für das Publicum gefährlich zu werden droht, oder in welchem er den Anstand verletzt, so soll derselbe auf die ärztliche Bescheinigung seines Irreseins von dem Sheriff in sicheren Verwahrsam genommen werden, bis über den Fall eine Untersuchung angestellt ist. Die Vornahme einer derartigen Untersuchung ist in den Zeitungen zu veröffentlichen, und es ist eine besondere Anzeige dem Armen-Inspector zu machen, unter dessen Obhut der Kranke etwa gehört, wofern dieser binnen 24 Stunden nicht Maassregeln zu sicherer Bewachung trifft, welche dem Sheriff genügen. Nimmt der Armen-Inspector sich nicht der Sache an, oder wenn die von ihm vorgeschlagenen Anordnungen dem Sheriff nicht genügen, wird die Untersuchung fortgesetzt und die weitere Beweisführung bezüglich des Irren vor dem Sheriff-Gerichte (Polizei-Gerichte) vorgenommen; ist der Sheriff überzeugt, dass der Verhaftete irre und gefährlich ist, oder dem öffentlichen Anstande Anstoss erregt, so wird von ihm eine Order erlassen zur Versetzung des Kranken in ein Asyl zur Verwahrung daselbst bis zur Genesung oder bis Bürgschaft für eine sichere Bewachung geleistet ist. Um die Behandlung in einem Asyl zu erleichtern in Fällen, wo die Geistesstörung nicht so genügend declarirt ist, um in einem ordremässigen Certificate das Irresein bezeugen zu können, oder wenn der Leidende nichtsdestoweniger selbst wünscht, der Behandlung sich zu unterziehen, ist der Director eines Asyles, nach vorgängiger Zustimmung eines der Commissions-Mitglieder, welche Zustimmung nur auf ein geschriebenes Gesuch des Kranken selbst gewährt werden soll, ermächtigt, derartige Kranke als Pensionäre aufzunehmen. Für die Aufnahme von Kranken in die Irrenabtheilung der Armenhäuser genügt die Gutheissung der Commission, welche auf ein ärztliches Zeugniss ertheilt wird, aus welchem hervorgeht, dass der Kranke irre, nicht gefährlich ist und von der Behandlung in einer Anstalt keinen Nutzen zu ziehen vermag.

3. Garantien für die gehörige Pflege. — Die Staatsseitig bestimmten Garantien für die gehörige Pflege der Irren, entweder in Privatwohnungen oder in Anstalten lassen sich am passendsten nach diesen besonderen Categorien übersehen:

1. Garantien für die Irren in Privatwohnungen.

Für Privatkranke, die in ihren Familien oder ohne Order des

Digitized by Google

Sheriffs oder Genehmigung der Commission *(Board)* in Kost gegeben sind, ist der gesetzliche Schutz sehr begrenzt und wird für die ersteren wirksam, nur wenn zur Kunde kommt, dass grobe Vernachlässigung oder Grausamkeit Statt gefunden hat, und für die anderen nur, wenn Beweise von einer Uebertretung der Gesetze vorliegen. Bei Kranken in Privatwohnungen, welche der Commission officiell zur Anzeige gebracht sind, werden zeitweise, nach dem Ermessen der Commission *(Board)*, in der Regel vierteljährlich, von einem Arzte Visitationen gemacht, bei welchen vorschriftsgemäss in einem in dem Hause gehaltenen Buche das Datum der Visitation verzeichnet wird, sowie der geistige und körperliche Zustand, in welchem der Irre befunden wurde. Das Gesetz (Poor law Act) verlangt ferner, dass mindestens 2mal im Jahre jeder arme Irre von dem Armen-Inspector oder von seinem Vertreter besucht werden soll. Es ist sodann Vorschrift, dass jeder Kranke in Privat-Wohnungen einmal im Jahre im Auftrage der Commission (Board) durch eines der Mitglieder derselben oder dessen Stellvertreter besucht werde, wo die Schwierigkeit der Commission das hindert, wie bei den Orkeny, Shetland oder den westlichen Inseln, wird die Visitation alle 2 J. verlangt. Das untersuchende Mitglied der Commission ist verpflichtet, darauf zu sehen, dass die vierteljährlichen Besuche des Gemeinde-Arztes regelmässig gemacht und zu Protocoll genommen sind, dem Armen-Inspector etwaige Winke zu geben, in Bezug auf die gehörige Pflege und Haltung der Kranken und über jeden Fall der Commission (Board) einen besonderen Bericht abzustatten, der alles zu Empfehlende zusammenfasst, was er den Umständen nach für angemessen hält. Die Commission erlässt nach Erwägung dieser Berichte die nothwendig erscheinenden Anordnungen; in den Fällen, wo die Garantie für die gehörige Behandlung ungenügend ist, oder wo man von der Behandlung in einer Anstalt sich eine Förderung der Genesung oder Besserung versprechen darf, wird die Genehmigung zurückgenommen und bei Armenkranken die Versetzung in ein Asyl verlangt, bei Privatkranken empfohlen.

2. Garantien für die Irren in Anstalten.

Die gehörige Pflege der Kranken in Anstalten wird verbürgt durch die Besuche ihrer Directoren und Verwalter, durch die Inspectionen der Mitglieder der Commission für das Irrenwesen und durch die Besuche der Sheriffe, der Friedensrichter, der Bezirks-Inspectoren. Die Directoren und Verwalter der Asyle besuchen die unter ihrer Obhut stehenden Anstalten in Zwischenräumen, die nach der Ordnung jedes Hauses verschieden sind.

Die Mitglieder der Commission für das Irrenwesen haben laut

Digitized by Google

Vorschrift wenigstens 2mal im Jahre eine Visitation zu machen, um Untersuchungen anzustellen über die Einzelnheiten der Haltung und der Beschaffenheit des Asyls, so über den Zustand der Reparaturen, der Heizung und Ventilation, Reinlichkeit, Wasserversorgung, Diät etc. und das Resultat der Untersuchung in ein für diesen Zweck gehaltenes Buch einzutragen. Eine Abschrift dieser Eintragung ist innerhalb 8 Tagen, nachdem sie geschehen ist, der Commission (Board) einzusenden. Dem Sheriff und dem Friedensrichter sind die Visitationen nur gestattet, werden von dem Sheriff selten vorgenommen und sind von dem Richter, soviel bekannt, bis jetzt nur in einem Falle angestellt worden Die Bestellung eines Bezirks-Inspectors ist der Bezirks-Behörde (District Board) freigestellt und hat bisher nur in dem Bezirk von Forfor stattgefunden. Diesem Inspector liegt es ob, jedes Asyl innerhalb seines Bezirks zu besuchen, sobald derselbe von der Bezirks-Behörde, von dem Sheriff oder der Commission für das Irrenwesen dazu aufgefordert wird, und über den Zustand, in welchem er das Asyl fand, zu berichten, sowie über den körperlichen und geistigen Gesundheitszustand der Kranken. Bisher haben die Visitationen des Bezirks-Inspectors von Forfor nur einmal jährlich stattgefunden und zwar stets auf Veranlassung der Bezirks-Behörde.

Zur Vermehrung der durch die Visitationen gewährten Bürgschaften gegen Vernachlässigung oder schlechte Behandlung, ist noch eine andere Bürgschaft angeordnet durch die Forderung, 1) dass jeder Brief eines Kranken in einem Asyle an die Commission (Board) oder an eines ihrer Mitglieder uneröffnet an seine Adresse befördert werden soll, wofern nicht besondere Bestimmungen vom Gegentheil von der Commission oder eines der Mitglieder gegeben sind, und 2) dass jeder Brief von der Commission oder von einem ihrer Mitglieder an einen Kranken, wenn das Couvert mit „privat" bezeichnet ist, uneröffnet an ihn abgeliefert werden soll. Wer einen derartigen Brief auffängt, zurückhält oder öffnet ohne Erlaubniss des Kranken, von welchem derselbe geschrieben oder an welchen er gerichtet ist, verfällt in eine Strafe bis zu 10 £. Zur Verhütung eines möglichen Missbrauchs mit Aufnahmen freiwilliger Kranken, muss bei den gesetzlichen Besuchen der Mitglieder der Commission jedes derartige Individuum vorgeführt werden und ebenso wie bei anderen Geisteskranken muss ihnen von der Aufnahme, der Entlassung und dem Tode derselben eine Anzeige gemacht werden. Um bei Veränderung der Sachlage und der Umstände Erleichterungen zu gewähren, sowie zur Wiedererlangung entwichener Kranker, ist noch bestimmt, dass, wenn auch der Kranke von dem

Digitized by Google

Asyle abwesend sein sollte, die Ordre des Sheriff 28 Tage in Kraft bleibt; und diese Zeit auf 3 Monate ausgedehnt wird, wenn der Kranke von Beamten oder Wärtern der Anstalt begleitet wird oder unter ihrer unmittelbaren Pflege bleibt.

Da es vielfach wünschenswerth ist, dass vor der dauernden Entlassung der Kranken die Kraft der Selbstbeherrschung und die Fähigkeit, die Freiheit richtig zu gebrauchen, bei ihnen auf die Probe gestellt werden, ist eine Commission (Board) ermächtigt, die Entlassung eines Kranken auf Probe zu gestatten, und zwar auf Ansuchen desjenigen, von welchem das Gesuch, den Kranken in Behandlung zu nehmen, ausgegangen ist. Die Zeitdauer und die Anordnungen bleiben dem Ermessen der Commission anheimgestellt, die Ordre des Sheriff bleibt in Kraft, der Kranke wird angesehen als auf Urlaub und für seine Wiederaufnahme, zu welcher der Dirigent des Asyles auf Verlangen verbunden ist, bedarf es keiner anderen Formalitäten, als die Anzeige an die Commission.

Ebenso wie bei den in Privatwohnungen gehaltenen Kranken, steht auch die Entlassung armer Kranken auf Probe unter Aufsicht der Commissions-Mitglieder. Einen solchen Kranken von der Armenliste zu streichen oder ohne Genehmigung der Commission während der Probezeit die Verhältnisse zu ändern, auf welche die Probe-Entlassung bewilligt war, ist gegen das Gesetz. Dem Gesetze ist aber noch nicht genug gethan mit Vorschriften für gute Pflege und Behandlung der Irren; es schreibt auch schwere Strafen vor für Vernachlässigung und Grausamkeit. Dasselbe enthält eine sehr umfassende Bestimmung, welche darauf berechnet ist, den Dirigenten der Asyse eine grosse Stütze zu gewähren, in ihren Anstalten eine humane und milde Disciplin zu erhalten. Das Gesetz bestimmt nämlich, dass, wenn irgend ein Angestellter in einer öffentlichen, Privat- oder Bezirks-Anstalt oder Hause, oder wenn derjenige, welcher Irre hat oder an der Pflege Theil nimmt, wissentlich eine für irre gehaltene Person missbraucht, schlecht behandelt oder absichtlich vernachlässigt, dies Vergehen mit einer Geldstrafe bis zu £ 100 oder Gefängniss bis zu 6 Monaten bestraft werden soll, ohne Beeinträchtigung der Klage auf Schadenersatz von Seiten der gekränkten Partei oder in Vertretung derselben durch denjenigen, auf dessen Veranlassung der Kranke aufgenommen ward, oder durch einen Anderen, welcher sich für den Kranken interessirt.

4. Garantieen gegen unnöthige Haft. — Wenn ein Irrer genesen ist, so wird durch eben dies Factum die Zurückhaltung desselben in einer Anstalt ungesetzlich und in Ermangelung eines besonderen gesetzlichen Verfahrens, wird derselbe ohne

Digitized by Google

andere Formalität als die Anzeige an die Commission (Board) von dem Dirigenten des Asyles entlassen. Es besteht aber die besondere Verordnung, dass der Dirigent, wenn nach seiner Meinung der Kranke soweit genesen ist, um ohne Gefahr für das Publikum und für ihn selbst sicher in Freiheit gesetzt werden zu können, in dieser Beziehung eine Bescheinigung auszustellen und abschriftlich demjenigen einzusenden hat, auf dessen Gesuch der Kranke im Asyle aufgenommen wurde, oder in Ermangelung desselben den nächsten Verwandten des Kranken, bei Armen dem Armen-Inspector. Wenn innerhalb 14 Tagen nach der Absendung der Abschrift der Bescheinigung zur Befreiung des Kranken keine Schritte geschehen sind, hat der Dirigent das Factum der Commission (Board) mitzutheilen, welche, nach einer ihr etwa nothwendig scheinenden Untersuchung, die Entlassung des Kranken anordnen kann, wenn sie überzeugt ist, dass derselbe ohne Gefahr für das Publikum oder für ihn selbst befreit werden kann. Das Gesetz traut übrigens für die Entlassung der Kranken nicht unbedingt dem Urtheile der Dirigenten oder dem Belieben desjenigen, auf dessen Verlangen der Kranke in ein Asyl aufgenommen worden ist; denn es erklärt, wenn Jemand die Bescheinigung der Genesung eines Irren von zwei vom Sheriff gutgeheissenen Aerzten bringe oder ein Zeugniss derselben, dass der Irre ohne Gefahr einer Beeinträchtigung des Publikums in Freiheit gesetzt werden könne, nebst der Ordre des Sheriff für die Befreiung desselben, so ist vom Dirigenten des Asyles, in welchem der Irre sich aufhält, die Befreiung desselben zu verlangen und der Kranke demgemäss in Freiheit zu setzen. Auf eine analoge Weise können Kranke von der Commission (Board) entlassen werden, aber die Autorität dieser beschränkt sich nur auf die Befreiung von Kranken, deren geistige Gesundheit ihnen auf befriedigende Weise bescheinigt wird. Vor der Entlassung des Kranken aber, sei es auf Ordre des Sheriff oder der Commission, muss derjenige, auf dessen Gesuch der Kranke aufgenommen war, von dem Vorhaben 8 Tage vorher schriftlich benachrichtigt werden. Diese Vollmacht zur Befreiung erstreckt sich aber nicht auf Irre, die durch gerichtliche Verurtheilung in Haft sind.

Um diese Garantien gegen eine unnöthige und ungehörige Zurückhaltung der Kranken in Anstalten noch zu erhöhen, besteht die Verordnung, dass die Ordre des Sheriff, welche früher von unbegrenzter Dauer war, nicht länger in Kraft bleiben soll, als bis zum 1. Januar, welcher nach Ablauf von 3 Jahren nach dem Datum der Ausstellung der Ordre eintrifft, und die nur auf ein Jahr sich erstrekkende Verlängerung der Ordre wird nur ertheilt, wenn der ärzt-

Digitized by Google

liche Dirigent des Asyles an jedem ersten Januar oder innerhalb voller 14 Tage vorher auf Eid und Gewissen eine Bescheinigung ausstellt und der Commission übersendet, dass er nach sorgfältiger Prüfung und Ueberlegung des Falles eine dauernde Verwahrung des Kranken für nothwendig hält. So werden die Kranken, die länger als 3 Jahre in einer Anstalt in Verwahrung gehalten werden, jedes Jahr einer sorgfältigen Prüfung unterworfen. Unterlässt man, dieser Verordnung nachzukommen, so wird die fernere Zurückhaltung eines Kranken ungesetzlich und diese Versäumniss ist nur durch eine neue vom Sheriff ausgestellte Ordre nachzuholen.

Wenn Privatkranke in Anstalten gebracht werden durch ihre freiwillig handelnden Freunde, so erfolgt deren Entlassung auch jeder Zeit von denselben Parteien ohne weitere gesetzliche Formalität, wie auch ihr Geisteszustand sein mag, wofern der Director nicht die Entlassung eines derartigen Kranken für gefährlich hält. In einem solchen Falle muss der Director (Superintendent) sofort mit dem Staats-Anwalt (Fiscal-Procurator) des Bezirkes sich berathen, während der Irre mittlerweile in Verwahrsam bleibt. Das Verbleiben in der Anstalt oder die Entlassung des Kranken hängt dann von der Ansicht ab, welche der Staatsanwalt von dem Falle bekommen hat. Wenn er denselben für gefährlich hält, so hat er den Beweis dafür zu führen nach dem Verfahren wie in den Fällen, wo gefährliche Irre im freien Zustand gefunden werden; findet er dagegen keine Veranlassung zu einem derartigen Schritte, so wird auf seine Entscheidung der Kranke von dem Director sofort entlassen. — Arme Kranke können von dem Gemeinderathe (Parochial Board), welcher für ihren Unterhalt zu sorgen hat, aus den Asylen entfernt werden, wenn sie nicht durch die Instanz des Staatsanwalts als gefährliche Irre in Haft sind. Die Entlassung eines Kranken muss durch ein Protokoll in einer ordnungsmässig constituirten Versammlung des Gemeinderaths genehmigt sein und auf Vorzeigung der beglaubigten Abschrift solchen Beschlusses hat der Director der Anstalt binnen 7 Tagen den Kranken zu entlassen. Um aber den Kranken vor Schaden zu wahren und das Publikum vor Gefahren, kann die Commission (Board), auf die schriftliche Vorstellung des Directors, dass der Kranke sich oder dem Publikum gefährlich ist, oder in irgend einer Weise ungeeignet, um entlassen zu werden, nach einer Untersuchung des Falls, die Entlassung verbieten. Die Uebertretung dieser Vorschrift wird mit einer Geldstrafe bis zu £ 10 geahndet. Liegt kein Grund zu den angedeuteten Besorgnissen vor, so ist die Genehmigung der Commission (Board) zu der Entlassung eines armen Kranken aus einem Asyle nicht nöthig, aber der Armen-

Digitized by Google

Inspector ist verpflichtet, innerhalb 14 Tagen nach der Entlassung das Datum derselben der Commission anzuzeigen, sowie die Lage des Hauses, in welches der Kranke untergebracht ist, den Namen des Inhabers, den Betrag und die Art des Zuschusses der Gemeinde zu seinem Unterhalt. Der Irre wird nun in die Liste der Einzelkranken eingetragen und wird nun ein Gegenstand der periodischen Untersuchungen des Gemeindearztes, des Armen-Inspectors und der Mitglieder der Commission. Sollte seine Lage nach einer Untersuchung von den Mitgliedern der Commission als ungenügend berichtet werden, so kann die Commission durch Aenderung des Aufsehers, oder in anderer Weise, nach ihrem Ermessen eine Besserung herbeizuführen versuchen, sollte dieses sich aber als unmöglich erweisen, so wird von ihr dem Armen-Inspector die Ordre ertheilt, den Kranken in das Asyl zurückzubringen und zwar innerhalb 14 Tagen bei Strafe bis zu £ 10. — Freiwillige Kranke können in einer Anstalt nicht länger als 3 Tage zurückgehalten werden, nachdem sie ihre Absicht und den Wunsch, dieselbe zu verlassen, zu erkennen gegeben haben, wenn nicht deutlich markirte Symptome von Irrsinn eingetreten sind und auf ärztliche Bescheinigung von Irrsinn, nach dem üblichen Verfahren die Ordre des Sheriff ertheilt worden ist, aber in diesem Falle kann weder ein mit dem Asyle in Beziehung stehender Arzt, noch wer ein unmittelbares oder pecuniäres Interesse an dasselbe hat, die ärztlichen Zeugnisse ertheilen. — Gefährliche Irre, d. h. Irre, die von dem Sheriff durch die Instanz des Staatsanwalts den Anstalten übergeben sind, verbleiben daselbst bis zu ihrer Genesung oder bis dem Sheriff genügende Bürgschaft gegeben ist für ihre sichere Bewahrung; um jedoch auch für diese Kranken einer unnöthigen und ungebührlich verlängerten Haft vorzubeugen, wo entweder ein Unvermögen der Verwandten Bürgschaft zu leisten vorliegt, oder die natürliche Unlust des Armen-Inspectors diese Verpflichtung zu übernehmen, kann der Sheriff mit Genehmigung des Staatsanwalts die Entlassung solcher Kranken verfügen, auf die Bescheinigung zweier Aerzte, dass diese Anordnung ohne Gefahr geschehen kann.

5. Schutz des Vermögens. — Zum Schutze des Vermögens der Irren besteht die Verordnung, dass, wenn die Commission (Board) oder der Rechnungsführer des Gerichts (Court of Session), Grund haben zu dem Glauben, dass das Vermögen eines Kranken nicht gehörig verwaltet oder zu seiner Unterhaltung nicht ordnungsmässig verwandt werde, dieselben zur Bestellung eines gerichtlichen Geschäftsführers seines Vermögens schreiten sollen. Wenn aber das Capital nur gering ist, sind die Kosten einer solchen Massregel ver-

Digitized by Google

hältnissmässig zu schwer, um dieser Verordnung eine praktische Bedeutung zu verleihen und ein minder kostspieliges Verfahren für die Verwaltung und Verwendung des Vermögens der Irren ist unter solchen Umständen noch immer ein Desiderat. Auch wenn die Commission oder der Rechnungsführer die Meinung hegen, dass das unter der Obhut eines gerichtlichen Geschäftsführers gestellte Besitzthum nicht gehörig verwaltet und zur Unterhaltung der Irren nicht treu verwendet wird, haben sie die Weisung diesem Uebelstande zu steuern und, damit die Commission in der Lage ist, sich ein richtiges Urtheil über diesen Gegenstand zu bilden, erhält dieselbe ein Verzeichniss der Namen aller Irren, welche einen gerichtlichen Geschäftsführer haben, mit einer Uebersicht ihres Vermögens; sie ist autorisirt zu Untersuchungen und nachzuforschen, wie derartige Irre behandelt und verpflegt werden.

Einzel-Kranke. Die Erfahrung ergiebt, dass vorzugsweise in Familien, die aber über der Verarmung stehen, die Misshandlung von Einzel-Kranken zu befürchten steht; um in dieser Beziehung zu steuern, sind unlängst die Vollmachten der Commission (Board) ausgedehnt worden; wie nothwendig dies war, wird durch Beispiele erläutert, so bei der Visitation am 2. October 1866, fand man *H. D.* mit einer 4 Fuss langen Kette am Heerde angekettet, um ihn am Entlaufen zu hindern. *W. T.* wurde am 18. September vollständig nackt im Bette gefunden und gefesselt mit Stricken, die mit ledernen Handfesseln verbunden zweimal um die Brust gingen und zur Seite der Bettstelle befestigt waren, während die Füsse mit zusammengedrehter Leinwand am Fussbrett gefesselt waren. In dieser Lage, in welcher nur die Bewegung des Kopfes, der Zehen und Finger möglich war, befand er sich seit einer Woche und sollte das Jahr vorher 3 Monate so gefesselt gewesen sein, blos um sein Entlaufen zu verhindern.

Wenn die Armen-Inspectoren ihre Pflichten zu enge auffassen und die nachgesuchte Unterstützung verweigern, so bleiben üble Folgen nicht aus, wie in einem Falle, wo bei einer geisteskranken Frau, der en Ehemanne wegen einigermassen guten Verdienstes die Versetzung in eine Anstalt auf Kosten der Gemeinde verweigert war, der mehrfach versuchte Selbstmord gelang. Die Lage der Einzelkranken war im Ganzen günstig, über 164 Arme-Kranke und über 80 Privat-Kranke wurde berichtet. Die Mortalität der Armen-Kranken in Privatwohnungen war 1865 5,3 pCt. (4,3 männlich, 6,1 weiblich). Am 1. Januar 1866 waren von 5490 Armen-Kranken 2918 in öffentlichen oder Privat-Anstalten, 1008 im Armenhause und 1564 in Privathäusern (28,5 pCt).

Digitized by Google

Anstalten. Während der Dirigent der Anstalt bei der Aufnahme eines Kranken die Meinung festhält, dass seine Verantwortlichkeit durch die Order des Sheriff gedeckt werde, differiren die Ansichten der Sheriffe über die ärztlichen Certificate, indem die Einen die Prüfung der Gründe derselben nicht für ihre Aufgaben ansehen, verweigern mitunter die Andern ihre Order, selbst wenn die Certificate das Bestehen von Irresein mit starken Gründen bestätigen. Es werden Fälle angeführt, wo die Verweigerung der Order bei dem unbeaufsichtigten Kranken einen Selbstmord zur Folge hatte. Wenn das ärztliche Certificat das Bestehen von Irresein bescheinigt, sollte die Order ertheilt werden, ohne dass die Erheblichkeit der Facta zu kleinlich geprüft würde, aber die Gründe, auf welche das Irresein angenommen wurde, sollten in dem ärztlichen Zeugnisse klar dargethan sein und die von dem Arzte selbst beobachteten Facta wenigstens einen sicheren Beweis des Vorhandenseins von Geistesstörung abgeben. Mitunter wurde von dem Arzte in sehr nachlässiger Weise dieses verantwortliche Geschäft vollführt. Der Misscredit, in welchem die ärztliche Meinung über Irreseinsfälle beim Publikum steht, liegt ohne Zweifel in dem Gebrauch unzusammenhängender Gedanken, welche solche Certificate zur Schau tragen. Da bei der Aufnahme und Bewachung der Geisterkranken die Verantwortlichkeit, welche die die Certificate ausstellenden Aerzte, den Sheriff und den Director des Asyles trifft, durch gesetzliche Bestimmung noch nicht geregelt ist, so empfiehlt die Commission (Board) dem Dirigenten, vorsichtig zu erwägen, ob des Sheriffs Order als ein gerichtliches Zeugniss, dem man gehorchen muss, anzusehen sei, oder ob es ihre Pflicht ist, ihr eigenes Urtheil zu gebrauchen und Aufnahmen von Kranken zu verweigern, wenn der vollständige Beweis von Irresein aus den ärztlichen Certificaten nicht erhellt.

Die Mitglieder der Commission für das Irrenwesen in England sehen in Certificaten von Aerzten in Schottland, Irrland oder ausserhalb Englands keine sichere Bürgschaft für die Feststhaltung von Geisteskranken nach dem nur auf England und Wales beschränkten Gesetze. In Schottland würde es ähnlich sein, doch geht der Sheriff oft von anderer Erwägung aus und schliesst die Zeugnisse von gehörig qualificirten Aerzten nicht aus, weil sie ausserhalb Schottlands wohnen. Allein in Erwägung, dass in Fällen von Irresein in Schottland die Certificate am zweckmässigsten von Schottischen, der Jurisdiction des Schottischen Gerichtes unterworfenen Aerzten ausgestellt werden, ist neuerdings vom Sheriff-Gerichte in Edingburg die Instruction gegeben, dass Certificate von Irresein von Aerzten ausserhalb Schottlands nicht mehr angenommen werden sollen.

Digitized by Google

Bei der Aufnahme waren die Kranken in manchen Fällen in einem sehr jämmerlichen Zustande, die Glieder mitunter geschwollen und schmerzhaft vom Binden. Indessen wurde die allgemeine Leitung der unter Aufsicht stehenden Asyle im verflossenen Jahre im Ganzen befriedigend befunden. In den Privat-Asylen Saugton-Hall (52 Kranke), in Hallcross House (74—80 Kranke) und in der Irren-Abtheilung des General-Prison zu Perth (45—50 Kranke) brach die Cholera aus. In ersterem, wo dieselbe durch einen der Dienstboten eingescheppt zu sein scheint, verbreitete sie sich rasch in verschiedene Theile des Hauses, so dass man nach 4 tödtlichen Ausgängen sich zu dem misslichen Experimente entschloss, sämmtliche Kranke zu entfernen und in Privatwohnungen unterzubringen, was indessen keine nachtheiligen Folgen hatte, aber die Verbreitung der Krankheit schnell hemmte. In Hallcross-House, in dessen Nähe die Krankheit epidemisch war, starben 4 Kranke, in dem General-Prison zu Perth 2 Kranke. Selbstmord mit tödtlichem Ausgange kam im Laufe des Jahres in Gemeinde-Anstalten ungewöhnlich viel, in 9 Fällen vor und ebenso viele ernstliche Versuche dazu. Die Ausführung geschah durch Halsabschneiden 4 mal, durch Ertrinken 2 mal, durch Schiessgewehr, durch in Brandstecken der Kleider, durch Trinken von zum Tünchen bestimmtem Kalk je einmal. Unter den zufälligen Unfällen kamen 71 geringfügige und 13 bedeutendere vor, unter den letzteren 2 durch Wärter veranlasst, von welchen der eine, der einen Kranken angegriffen und ernstlich misshandelt hatte, dem Staatsanwalt angezeigt wurde. Das Wartepersonal erfordert überhaupt vielfachen Wechsel, zumal in Privat-Asylen. Um gute Wärter zu fesseln sind neuerdings die Directoren der privilegirten (ohertered) Asyle gesetzlich autorisirt, nach wenigstens 15jähriger Dienstzeit und nach dem 50. Jahre einen Ruhegehalt zu gewähren.

Die Entlassung auf Probe wird nach der Ansicht der Commission von den Dirigenten nicht häufig genug veranlasst, vielleicht weil die chronischen nicht stark markirten Irreseinsfälle von Jahr zu Jahr mehr aus Gewohnheit, als aus Ueberzeugung der Nothwendigkeit in der Anstalt verbleiben. Einige Beispiele zeigen, wie die Entlassung oder die Bewachung von Kranken von anderen Umständen, mehr von den Interessen der Anstalten abhängen, denn von dem Besten der Kranken. Im Laufe von 1866 sind 102 Fälle auf Probe entlassen, von welchen am Ende des Jahres 24 genesen, 3 gestorben, 15 in die Anstalten zurückgekehrt, 18 unter Obhut der Freunde und 42 auf Probe geblieben sind; die ganze Zahl der Probe-Entlassungen seit ihrer Einführung vom Jahre 1862 bis zum Schlusse des Jahres 1866 betrug 387. Im Jahre 1866 wurden 15 Kranke

Digitized by Google

als freiwillige in Anstalten aufgenommen. Im Laufe des Jahres 1866 sind 104 Kranke entwichen, von welchen 95 beim 1. und 7. Tage zurückgebracht, 9 nicht wieder erlangt wurden.

In den 14 öffentlichen und Bezirks-Asylen Schottlands wurden im Jahre 1866 im Ganzen 4762 Kranke verpflegt, von welchen im Laufe des Jahres 1550 Kranke aufgenommen wurden (gegen 1126 im Jahre 1865). Am Schlusse des Jahres befanden sich 3527 in Verpflegung. Genesen waren 497, entlassen 459 und gestorben 288. Fast in allen Asylen hatte die Aufnahme zugenommen. In den 9 Jahren von 1858—1866 schwankte die Sterblichkeit beim männlichen Geschlechte zwischen 8,1 und 10,4 pCt., beim weiblichen Geschlechte zwischen 6,6 und 8,1 pCt. und war im Jahre 1866 8,3 pCt. M. und 8,1 pCt. W. In den Berichten der ärztlichen Commission wurde der Zustand der Asyle bei den Untersuchungen durchaus befriedigend befunden, und wurden nur hie und da einige Mängel gerügt.

Von den 12 Privat-Asylen Schottlands verpflegen 11 Asyle männliche und weibliche Kranke und ein Asyl (Somerside House) nur weibliche Kranke. Die Kranken-Bewegung in diesen Asylen war im Jahre 1866 folgende:

Bestand am 1. Januar	336	männl.	430	weibl.	Kranke.
Aufnahmen im Jahre .	145	„	215	„	„
Summa	481	männl.,	645	weibl.	Kranke.
Es sind genesen . . .	43	männl.,	55	weibl.	Kranke,
ungeheilt entlassen . .	148	„	174	„	„
gestorben	31	„	35	„	„
Bestand am 1. Jan. 67	259	„	381	„	„
Summa	481	männl.,	645	weibl.	Kranke.

Die durchnittliche Sterblichkeit in den Jahren 1858—1866 betrug beim männlichen Geschlechte zwischen 5,5 pCt. und 10,8 pCt., beim weiblichen Geschlechte zwischen 7,3 pCt. und 8 9 pCt., sie war im Jahre 1866 10,2 pCt bei männl. und 8,5 pCt. bei weibl. Kranken. Das durchschnittliche Sterblichkeitsverhältniss ist im Allgemeinen weniger günstig als in den öffentlichen und Bezirks-Asylen und zumal im Jahre 1866. Die Berichte der ärztlichen Commission sprechen sich über etwa die Hälfte der Asyle mehr oder weniger ungünstig aus und einige Asyle sind geschlossen worden. Lobend erwähnt wurden Gilmer House, Milholm House, Saughton Hall, Somerside House und Whitehouse, auch Hawkfield, wo nur Fälle von Dementia verpflegt werden und Sougdale House, wo eine profitable Industriebeschäftigung in zu grosser Ausdehnung betrieben wird.

In den 5 Gemeinde-Asylen sind die Insassen ziemlich stationär, indem der Abgang dem Zugange gleichkommt. Im Jahre 1866 be-

Digitized by Google

trug die Zahl 443 (194 M., 249 W.). Von den Neuaufgenommenen hatte das männl Geschlecht 48,6 pCt., das weibl. Geschlecht 47,3 pCt. Genesungen. Von den verpflegten männl. Kranken starben 1866 10,8 pCt., von den weibl. Kranken 9,3 pCt. Die Behandlung wird in den 5 Asylen als einigermassen befriedigend geschildert, wenngleich der Zustand der Baulichkeiten oft viel zu wünschen übrig lässt.

In den 15 Irrenstationen der Armenhäuser wurden im Jahre 1866 558 Kranke (249 M., 309 W.) verpflegt. Hier betrugen die Genesungen im Jahre 1866 von den Aufnahmen nur 1,7 pCt. bei männl. und 4, 9 pCt. bei weibl. Kranken, die Mortalität der Verpflegten war 6,6 pCt. oder 7,8 pCt. der männl. und 5,2 pCt. der weibl. Kranken. Während einige dieser Irrenstationen durch ihre Lage und mangelhafte Einrichtung, durch die Mängel in der Verpflegung und körperlichen Reinlichkeit der Kranken, durch Mangel an Beschäftigung und Bewegung, durch Unzulänglichkeit des Wartepersonals den Tadel der Irren-Commission erfahren, haben andere einen günstigen Eindruck gemacht und sind lobend erwähnt

Zur Erziehung blödsinniger Kinder sind zwei Schulen vorhanden, Baldovan Institution und Larbert Institution. Die Zahl der gefährlichen Irren hat in den Jahren 1858—66 von 60 bis auf 10 abgenommen und zwar dadurch, dass die Armen-Inspectoren für eine sichere Bewachung der Irren Sorge trugen und dadurch das gesetzliche Verfahren bei gefährlichen Irren vermieden. Um trunksüchtige Personen ohne Genehmigung des Sheriff in Aufsicht und in Behandlung zu bringen, sind die Asyle durch den Lunacy Amendement Act autorisirt, jede Person in Pflege und Behandlung aufzunehmen, welche der Commission schriftlich den Wunsch zu erkennen giebt, als freiwilliger Kranker aufgenommen zu werden und dazu ihre Zustimmung erhalten hat. Die einzige Anstalt, die speziell für die Behandlung der Unmässigkeit bestimmt ist, findet sich in Queensberry Lodge, welches zu dem House of Refuge in Edinburgh gehört.

In der Irrenabtheilung der allgemeinen Strafanstalt zu Perth wurden im Jahre 1866 8 männl. geisteskranke Verbrecher aufgenommen. Sträflinge, die in der Strafanstalt in Irresein verfallen, werden nach Ablauf des Strafurtheils zu dem Local-Gefängnisse zurückgesandt, in welchem sie aufgenommen wurden, um in Freiheit gesetzt zu werden, bei der Befreiung aber von der Polizei oder dem Armen-Inspector in Obhut genommen und als gewöhnliche Kranke in die Asyle ihres Districts versetzt. Auf diese Weise wird die Häufung der geisteskranken Verbrecher in der Strafanstalt verhütet, sowie die Zunahme ihrer Zahl als einer besonderen Klasse von Geisteskranker. Unter den Insassen der Irrenabtheilung der

Digitized by Google

Strafanstalt finden sich mehrere, welche in langer Zeit keine Symptome von Irresein gezeigt haben, allein aus Furcht vor einen Rückfall scheut der Arzt eine unbedingte Entlassung zu empfehlen und so währt die Haft ohne Aussicht auf Entlassung. Wenn der Staatssekretair des Innern die Vollmacht besässe, die Entlassung solcher Patienten auf Probe zu genehmigen für eine bestimmte Zeit und unter genügenden Beschränkungen, würde man eine Gelegenheit erhalten, die Kraft ihrer Selbstbeherrschung zu prüfen. Bei der Gewährung der Wohlthat dieser Milde sollte die Meinung des Arztes maassgebend sein. Ein Kranker wurde durch Vollmacht des Staatssecretairs aus dem Gefängnisse zu Dingwall in das Bezirks-Asyl von Inverness verzetzt.

Im Jahre 1866 wurden von armen Irren 26, die in Schottland kein Heimathsrecht hatten, nach England und Irland versetzt.

Die 4 ersten Anhänge enthalten detaillirte Nachweise über die Zahl, das Geschlecht und die Art der Unterbringung der armen Geisteskranken eines jeden Kirchspiels in Schottland am 1. Januar 1866; ferner Listen über die in Asylen und Armenhäusern befindlichen Privat- und Armenkranken jeder County, über die Kosten der den Gemeinden angehörigen Kranken, über die Zahl der Aufnahmen, Genesungen, Entlassungen und Todesfälle, über die Dauer des Aufenthaltes und die Ursache des Todes der in Asylen und Armenhäusern befindlichen Kranken. An diese schliessen sich die Einzeichnungen, welche die Commissäre in die Krankenbücher der Asyle und Armenhäuser gemacht haben. Diese Einzeichnungen genauer Berichte über die zweimal im Jahre von den Commissionären gemachten Besuche in den öffentlichen und Bezirks-Anstalten, in den Privat- und Gemeinde-Asylen, in den Irrenabtheilungen der Armenhäuser, in den Erziehungsinstituten blödsinniger Kinder, in der allgemeinen Strafanstalt zu Perth geben eine detaillirte Kritik über jedes Asyl, welche alle Verhältnisse und Einrichtungen der Anstalt, die Leitung und die Pflege der Kranken einer besonderen Untersuchung unterzieht, insbesondere die Führung der Bücher und Register, die Anwendung von Beschränkungen und Isolirung als Correctionsmittel, das Vorkommen von Selbstmord und Unglücksfällen, die Abweisungen von Besuchen bei Kranken u. s. w. speciell erwähnt. Bemerkungen und Vorschläge zu Verbesserungen finden sich am Schlusse eines jeden Berichtes. Es ist leicht ersichtlich, mit welchem Nachdruck die jährliche Veröffentlichung dieser Kritiken und der Schilderungen der verschiedenen Anstalten ein Hebel für Reformen und einen Sporn zu Fortschritten abgeben muss.

Im 6. Apendix finden sich die Generalberichte über die Lage

Digitized by Google

der Einzelkranken, welche im J. 1866 von den Deputirten-Commissairen Dr. *Mitchell* und Dr. *Peterson* besucht sind. Auf diese Berichte dürfen wir wohl etwas näher eingehen, weil eine derartige Einrichtung der Visitation aller in Einzelpflege befindlichen Kranken auf das Wohlbefinden derselben einen wesentlichen Einfluss haben muss und so viel mir bekannt, schwerlich anderswo als in England gesetzlich eingeführt ist. Dr. *Mitchell* besuchte in 14 Counties 619 Kranke in Privatwohnungen, von welchen 558 der armen Klasse angehörten und 29 mehrfache (2 — 3) Besuche erhielten. In 14 ländlichen Armenhäusern befanden sich in den gewöhnlichen Wohnräumen 25 irre Personen. Dr. *Peterson* besuchte 605 arme Irre, 19 in Armenhäusern, 23 in Häusern mit besonderer Lizenz in 8 Counties. Ueber den Zustand eines jeden besuchten Geisteskranken wird der Commission (Board) ein besonderer Bericht gegeben, ausserdem wurden von Dr. *Mitchell* 192 Briefe mit besonderer Beziehung auf Einzelkranke geschrieben und musste überall mit den verschiedenen officiellen Behörden conferirt werden. Meistens wurden die Besuche in Begleitung des Arztes des Kirchspiels, des Vorsitzers der Behörde und des Armen-Inspectors gemacht. Die Art und Weise, wie die Inspection der Kranken in Privatwohnungen angestellt wird, dürfte nicht ohne Interesse sein. Man legt hierbei die Liste der in dem District nach Namen und Wohnung verzeichneten armen Geisteskranken zu Grunde, sowie der auf Ordre des Sheriffs befindlichen Privatkranken. Jeder arme Kranke erhält jährlich in der Regel eine Visite, über welche der Commission (Board) ein besonderer Bericht abgestattet wird. Auf den Orkney- und Shetland-Inseln wird die regelmässige Visitation nur alle 2 Jahre angestellt. Bei alten Fällen, über welche schon früher günstig berichtet worden, soll der Bericht den unveränderten Zustand des Kranken darthun, oder die etwa vorgekommenen Veränderungen schildern, aus welchen sich ergiebt, ob der Dispens ferner zu gewähren ist oder Aenderungen nothwendig sind. Bei alten, früher ungünstig geschilderten Fällen, soll der Bericht die Resultate der seit dem letzten Besuche von der Commission (Board) ausgegangenen Empfehlungen darthun, sowie ob weitere und welche Veränderungen nothwendig sind. Bei neuen, früher noch nicht gesehenen Kranken wird in dem Berichte der geistige und körperliche Zustand des Kranken vollständig beschrieben und die Massregeln für die Verpflegung und die Sicherheit des Kranken ausführlich geschildert, um zu zeigen, ob die Erlaubniss als angemessen beibehalten oder entzogen werden soll und im ersten Fall, ob gewisse in ihrer Nothwendigkeit zu begründende Aenderungen gefordert wer-

Digitized by Google

den sollen Derartige Aenderungen können sich auf den Aufseher beziehen, auf den Aufenthalt, auf die Lieferung von Kleidung, auf die zu gewährende Freiheit, auf die Verbesserung der Schlafgelegenheit, auf die Leitung des Kranken u. dgl. m. mit Begründung der etwa empfohlenen Aenderungen. Falls der Kranke durchaus für unpassend zur Privatverpflegung erklärt werden muss, oder alle Bemühungen, einen befriedigenden Zustand herbeizuführen, gescheitert sind oder hoffnungslos scheinen, muss die Fassung des Berichtes die Nothwendigkeit darthun, dass die Erlaubniss zu widerrufen und die Versetzung in ein Asyl anzuordnen sei. Sollte für einen Kranken mehr als ein Besuch im Jahre räthlich erscheinen, so wird die Commission von diesem Vorhaben in Kenntniss gesetzt und dann in Ausnahmefällen 2 und mehrere, bis 3 Besuche gemacht. In bestimmten Fällen, in welchen die Einrichtungen mit Zuverlässigkeit als befriedigend bekannt sind, werden nicht in jedem Jahre Besuche gemacht, aber in dem Falle sind der Commission in einem Berichte die Gründe anzugeben, wesshalb der Besuch nicht gemacht wurde. Wird ein Kranker aus einer anderen Ursache nicht besucht, so ist in gleicher Weise ein Bericht an die Commission einzureichen, welche über jeden Kranken, er sei besucht oder nicht, jährlich einen Bericht erhält. Die Zahl der nicht besuchten Kranken überschreitet selten 1 pCt. Bei Verdacht, dass die wahren Umstände eines Kranken nicht mitgetheilt sind, soll eine Nachtvisite angestellt werden, die gute Resultate zur Folge gehabt haben soll. Durch diese bei den eingezeichneten armen Einzel-Kranken geübte Untersuchungsweise sind für deren Zustand die besuchenden Commissaire in gewissem Sinne verantwortlich. Sie haben aber auch noch andere Aufgaben; dahin gehört noch der Besuch der Geisteskranken, welche Unterstützung erhalten und der Commission nicht angezeigt sind und Berichterstattung an die Commission, was in derartigen Fällen am zweckmässigsten verfügt werden könnte. Armen-Inspectoren, Gemeindeärzte, Prediger oder die Polizei bringen diese Fälle meistens zur Anzeige bei dem Deputirten-Commissair. Nicht selten werden auch zweifelhafte und schwierige Fälle bis zum Besuche der Commissaire aufgespart, um durch die Untersuchung und genaue Erforschung des Falls über das Vorhandensein der Geistesstörung und über die geeignete Weise, wie mit dem Kranken zu verfahren, ein Gutachten zu erhalten. —

Privatkranke, welche unter Ordre des Sheriffs stehen und in Häusern mit besonderer Concession leben, werden ebenso wie die eingezeichneten armen Geisteskranken einmal im Jahre besucht und über dieselben in gleicher Weise Bericht erstattet. Auch auf andere

Digitized by Google

Fälle von Privat-Geisteskranken wird die Visitation ausgedehnt, wenn auf verschiedenen Wegen die Aufmerksamkeit auf diese Fälle gelenkt wird. Hier kommen bei dürftigen Lebensverhältnissen Fälle von Grausamkeit, Nachlässigkeit und schlechter Behandlung vor.

Seit der Errichtung der Commission für das Irrenwesen (1858) hat die Zahl der Einzelkranken in den verschiedenen Counties mehrfach gewechselt und in den letzten 3 Jahren im Allgemeinen abgenommen (von dem Maximum 1577 im J. 1859 bis 1562 im J. 1865). Dr. *Peterson* erklärt dies daraus, dass eine Reihe neuer Anstalten eröffnet sind, ferner, dass man die Zahl der blödsinnig Geborenen oder in früher Kindheit so Gewordenen nicht angeben kann. Diese werden selten vor dem Schulbesuch oder wenn die Selbsterhaltung in Frage kommt, Gegenstand der Gemeindeunterstützung, während bei früher Beachtung eine geeignete Erziehung die Gemeinde-Hilfe im späteren Leben oft zum Theil entbehrlich machen könnte. Er verweist hierbei auf das Gesetz, welches unter dem Ausdruck Irrsein jeden Grad von Geistesschwäche oder Defect begreift. — Mit der Abnahme der offiziellen Zahl der Kranken sind in demselben Zeitraum die Kosten für die Kranken fast von Jahr zu Jahr progressiv gestiegen. Der gegenwärtige Durchschnitt des jährlichen Kostgeldes ist £ 9, 10 sh., 1¼ d. und zeigt eine durchschnittliche Zunahme in 8 Jahren von £ 1, 18 sh., 6¼ d. Die Höhe des Kostgeldes ist in den verschiedenen Jahren und in den verschiedenen Counties verschieden, und im Allgemeinen höher in den südlichen als in den nördlichen Counties, das Maximum war £ 13, 1 sh., 1¾ d. In gewissen Grenzen steht die gute Verpflegung der Kranken in Verhältniss zu einem liberalen Kostgelde, aber dies Verhältniss ist nicht constant, verständige Leitung und Aufsicht sicheren oft einen grösseren Comfort, als wo bei grösserem Geldaufwand eine sorgenlosere Leitung zu Hause ist. Aber, wo Liberalität herrscht, können die Kranken manchmal zu Hause behalten werden, die sicher in Anstalten versetzt werden müssen, wenn für Sicherheit und Pflege mit kurzsichtiger Oekonomie gesorgt wird. Bei Festsetzung des Kostgeldes sind die Verhältnisse und Besonderheiten eines jeden Falles zu erwägen und danach die Höhe festzusetzen. Die bei Verwandten lebenden Kranken, etwa 70 pCt., erhalten in der Regel eine geringere Unterstützung, als Kranke in Pflege bei Fremden. Die wachsenden Kosten des Irrenwesens erregen besondere Beachtung, doch wird jetzt allgemein eingeräumt, dass der frühere Zustand vor 1858 keineswegs befriedigend war, dass die Verpflichtung des Gemeinwesens für diese unglücklichen Leidenden nicht vollkommen erfüllt wurde, eine beträchtliche Steigung der Ausgaben

Digitized by Google

für das Irrenwesen nothwendig war, ehe eine Besserung des Uebels sich möglich erweist. Wiewohl man die Grenzen für eine angemessene Höhe der Kosten nicht angeben kann, so hat man sich andererseits auch zu hüten vor dem Aufkommen einer Routine, die in allen Fällen dieselben Ausgaben gewährt. Armuth begleitet den Irrsinn und die meisten Geisteskranken sind arm. Sie fallen der öffentlichen Mildthätigkeit also anheim, und diese sollte wo möglich alle in ihre Obhut nehmen. Wenn einige Fälle kostspielige Vorkehrungen und eine kundige Behandlung erfordern, so kann bei anderen der Grundsatz Geltung finden, nur das Nothwendige zu gewähren. Dadurch kann die Steigerung der Lasten, welche der Irrsinn dem Gemeinwesen auferlegt, einigermaassen verhütet werden. Einer der ökonomischeren Wege für eine gewisse Klasse von Geisteskranken zu sorgen, ist die Unterbringung derselben in Privathäusern. Wenn man diesen Weg ohne Nachtheil für den Kranken einschlagen kann, darf die Oekonomie die Berücksichtigung desselben beanspruchen, aber es giebt noch dringendere Forderungen für denselben. Unstreitig giebt es unter den Geisteskranken eine nicht unbeträchtliche Zahl, welche sich in Privatwohnungen glücklicher und behaglicher fühlen wird, als in Asylen.

Nach *Peterson* haben die städtischen Gemeinden von Glasgow und Edinburgh dieses System in einem grösseren Maassstab angenommen. Nach den Vorschriften der Lunacy Act, wird an kleine Ackersleute von guter Reputation die Lizenz zur Verpflegung armer Irren ertheilt. Die Dirigenten der Asyle wählen dazu geeignete Subjecte aus. In der Regel ist die Verpflegung derjenigen gleich, welche die bessere Klasse armer Irren, die bei ihren Familien leben, geniesst. Die Kranken, bei denen Dementia mehr oder weniger ausgebildet ist, werden als Familienmitglieder behandelt, theilen die Mahlzeiten und, soweit der Geisteszustand es zulässt, die Beschäftigung der Wächter. Schwierig zeigte es sich oft auf dem Lande geeignete Localitäten für die Häuser und Leute von ehrenwerthem Charakter zu finden, die willig sind, die Sorge für Irre zu übernehmen, so dass, wenn die Nothwendigkeit einer Vermehrung der Gelegenheit zur Verpflegung nicht dringend ist, man die leicht erreichbaren Mittel vorzieht, weshalb andere Gemeinden, die in Asylen und Armenhäusern hinreichende Gelegenheit zur Verpflegung ihrer armen Irren hatten, diesem Beispiele nicht gefolgt sind.

Der Geisteszustand der in den gewöhnlichen Wohnräumen der ländlichen Armenhäuser verpflegten Kranken differirt nicht von dem der in öffentlichen und Districts-Asylen befindlichen vielen hundert Kranken; er würde die Entziehung der bürgerlichen Rechte bedin-

gen, und in allen testamentlichen und criminellen Fragen die Dispositionsunzurechnungsfähigkeit nehmen. Dennoch würden sie im Allgemeinen wie die gewöhnlichen Insassen des Hauses behandelt, jedoch in Anbetracht, dass sie lebenslängliche und unfreiwillige Bewohner des Hauses sind, werden ihnen oft Begünstigungen zu Theil. Die rüstige Körperbeschaffenheit der Geisteschwachen, welche unter den sonstigen Insassen der Armenhäuser ungewöhnlich ist, macht dieselben ungeachtet ihrer Geistesschwäche oft zu den nützlichsten und zuverlässigsten Mitgliedern des Hauses Der unfreiwillige Aufenthalt ist so zu verstehen, sie würden ihre Entlassung erhalten, wenn sie dieselbe verlangten, aber zu diesem Schritt fehlt ihnen meistens Urtheil und Verständniss. Ihre Behandlung ist eine milde, aber Kranke, die irgend eine Beschränkung erfordern oder durch ihre Schwäche oder schmutzige Gewohnheiten Störungen veranlassen, suchen die Vorsteher baldigst zu entfernen.

Die Zahl der Einzelkranken, welche als unheilbar und harmlos aus den Asylen entlassen werden, ist im Steigen. Etwa 30 pCt. der von der Commission in den letzten 3 Jahren gewährten Dispensationen gehören den Entlassungen aus den Asylen an. Dieser Uebergang der chronischen und langsamen Fälle aus den öffentlichen Anstalten in Privatpflege, bezweckt die Verhütung der ungehörigen Zunahme der Bevölkerung der Asyle und ändert nach und nach den Charakter der Einzelkranken, bei welchen das Procentverhältniss des Blödsinns abnimmt, während *Dementia* in erhöhtem Maasse vertreten ist. *Peterson* fand unter 48 neu besuchten Fällen im Jahre 1866: Blödsinnige, Geistesschwache und Epileptische 24, acute und chronische Manie 11 Kranke, Melancholie 2 und Dementia 11. Bei sorgfältiger Auswahl bewiesen sich Blödsinn und Dementia für die häusliche Verpflegung geeignet, wenn gleich der Unterhalt Letzterer wahrscheinlich immer etwas theuerer sein wird. In einigen Fällen, wo die Angemessenheit der Privatverpflegung zweifelhaft erschien, konnte die Zweckmässigkeit derselben nur die Zeit beweisen und wenn selbstverständlich bei Einzelnen als ungeeignet erkannten Fällen die Rückkehr in die Asyle als nothwendig sich ergab, so blieb doch die grosse Mehrzahl der Kranken in Privatverpflegung. Fehlerhafte Anordnungen rührten gemeiniglich von einer mangelhaften Kenntniss des fraglichen Falles her, indessen vorgefallene Missgriffe vermindern die Aussicht zu einer Wiederholung derselben. Die Vereinigung von 3—4 Kranken in einem Hause liess bisweilen befürchten, dass eine Trennung derselben nothwendig sein werde, allein während der 2 oder 3 Jahre, dass das Experiment währte, ging

Digitized by Google

Alles gut. Jedoch rieth Dr. *Mitchell*, am besten die Kranken einzeln unterzubringen, wenn auch 2 Kranke oft mit Vortheil für sich selbst und ihre Wärter sich in einem Hause vereinigen lassen. Wo diese Zahl überschritten wird, zumal bei unvorsichtiger Auswahl und wenn die Pfleger nicht zu den vorzüglichen gehören, ist Zank und Unruhe zu besorgen, und weicht die innere Oekonomie leicht von den häuslichen Gewohnheiten des Privathauses ab und nähert sich den der Anstalten, was nicht wünschenswerth ist.

Einige der aus Asylen in Privatwohnungen versetzten Kranken schätzten die ihnen gewährte Freiheit hoch, wovon Beispiele erzählt werden, aber die grosse Mehrzahl der Armenkranken in Privatwohnungen besteht aus Blödsinnigen, aus geistesschwachen Personen, deren Würdigung der Freiheit nicht so gross sein kann. Wenn ihnen Freiheit, milde Aufsicht, ein gutes Bett, reichliche Nahrung und Kleidung gewährt wird, bleibt wenig mehr zu wünschen. An den täglichen Geschäften des Lebens in einem kleinen Hause werden sie mehr Geschmack finden, als an dem einer grossen Anstalt. Was da vorgeht, erfassen sie leichter, erregt ihre Theilnahme, es beglückt sie das Gefühl, an Allem Antheil zu haben, sowie dass sie ihre Persönlichkeit nicht verloren haben. Beschäftigungen und Vergnügungen sind mehr gewöhnlicher Art als die der Asyle, aber sie sind aus diesem Grunde nicht nothwendiger Weise die weniger dienlichen. Die Küche des Häuschens bietet eine immer wechselnde bunte Scene und für einen ruhigen Kranken, der von acuter Krankheit zu unheilbarem Blödsinn übergegangen ist, lässt sich nicht leicht ein ansprechenderes Plätzchen denken als am Heerde, wo die Umgebungen natürlich und die Einflüsse heilsam sind. Der Tagesraum eines Asyles wird schwerlich so günstige Bedingungen darbieten, noch geeignetere, die weitere Zerstörung des Gemüthes aufzuhalten. Erwägungen der Art überkamen Dr *Mitschell* oft bei dem Besuche Geisteskranker in Privatwohnungen und oft vernahm er dabei die Bemerkung des Gemeindearztes, dass der Stumpfsinn der Kranken weniger hervortrete als in der ersten Zeit der Beobachtung. Dr. *Peterson* spricht diesem Systeme auch das Wort, und sieht in demselben für die Geisteskranken ähnliche Vortheile, wie in der neuerdings in städtischen Gemeinden immer mehr gebräuchlich werdenden Verpflegung der armen Kinder, welche in Gruppen auf dem Lande in Kost gegeben werden. Eine Vermehrung der Zahl derartiger Kranken erscheint Dr. *Mitchell* aber nicht wünschenswerth, indem Privathäuser sich niemals als ein angemessener Zufluchtsort für den Ueberfluss chronischer Fälle aus den Anstalten erweisen

Digitized by Google

würde. Unter den vielen Hindernissen erscheint das bedeutendste die natürliche Abneigung der Armeninspectoren und der Gemeinde-Aerzte gegen die lästige Mehrung ihrer Arbeiten und ihrer Verantwortlichkeit durch die Uebernahme der Besorgung der aus den Asylen entlassenen Kranken. Dessenungeachtet betrug die Zahl der in Privathäusern besuchten Kranken, welche in Asylen verpflegt waren, nicht weniger als 21 pCt., während unter den neuen Dispensertheilungen 30 pCt. derartige Fälle waren. Man hat sich bemüht, die mögliche Ausdehnung dieses Systemes zu beweisen und unter den Berufsmännern und im Publicum hat die wachsende Meinung einige Begründung gefunden, dass ein Theil der Geisteskranken zu einer gehörigen Verpflegung den kostbaren Apparat eines vollkommen eingerichteten Asyles nicht bedürfe; sowie dass Ansichten, welche ihre Gültigkeit hatten für die Bevölkerung der Asyle vor 25 Jahren, gegenwärtig weniger zutreffend sind, seit der Charakter dieser Bevölkerungen und ihrer Elemente durch den combinirten Einfluss der Gesetzgebung und die aufgeklärte Behandlung der Geisteskranken wichtige Veränderungen erfahren haben.

Der günstig lautende Bericht über die Nichtarmen in Privathäusern schreibt die befriedigende Lage derselben nur dem zu, dass diese Kranken durch die Ordre des Sheriff und die Verordnung des Board unter öffentlicher Aufsicht stehen. Dr. *Mitchel* constatirt indessen, dass die gesetzlichen Forderungen in einem Zehntel der Fälle keine Beachtung finden, während doch jeder Kranke, welcher bei Fremden sich aufhält und des Gewinns wegen verpflegt wird, der Inspection unterworfen sein soll. Als Beispiel wird die Insel Aron erwähnt, wo die Untersuchung eine Anzahl Kranker unter die Jurisdiction des Board und Andere, deren Zustand eine Pflege in Privathäusern unmöglich machte, in die Asyle führte. Beispiele von Elend, Vernachlässigung und Grausamkeit kommen gelegentlich unter der Klasse der Nichtarmen vor, die bei Freunden leben, welche an der Grenze des Pauperismus stehen. Die Besuche werden bei diesen bedürftigen Privat-Geisteskranken meistens durch Aerzte, Armen-Inspectoren oder Freunde der Kranken veranlasst. Viele derselben litten an *Delirium tremens*, welches in den unteren Ständen durch das Whiskeytrinken veranlasst zu Irrsein führt und Entbehrungen an Nahrung und Kleidung und allgemeines Elend zur Folge hat. Bei derartigen, Aufsehen erregenden Fällen von ungewöhnlicher Vernachlässigung und Grausamkeit, die bei Armen-Kranken in Privatwohnungen ganz fehlen und nur bei Nichtarmen von Zeit zu

Digitized by Google

Zeit vorkommen, erleichtert das letzte Amendement des Schottischen Irrenhauses (Clause 14) ein wirksames Verfahren. Von den erzählten Beispielen betraf ein sehr instructives eine 70jährige Frau, die mit 2 Töchtern allein lebte. In Folge der getäuschten Hoffnung auf eine indische Erbschaft erkrankten alle drei gleichzeitig an gemeingefährlichem Irrsein, welches die Versetzung der beiden Töchter in Asyle zur Folge hatte. Eine besondere erbliche Anlage war hier von Einfluss: ein Sohn und eine Tochter waren in Irrsein verstorben, eine Nichte und ein Enkelkind waren noch irre.

Unmittelbar nach der Inspection jeder County wird eine Gruppirung und Classificirung der in den Specialberichten enthaltenen Empfehlungen dem Board eingesandt, um dessen Aufmerksamkeit auf die neuen Fälle zu lenken. Die Empfehlung der Versetzung in Asyle kam Dr. *Mitchell* in 14 Fällen vor, einer wirksameren Aufsicht in 7 Fällen und andere Veränderungen als bessere Bequemlichkeiten, bessere Schlafgelegenheit, bessere Räumlichkeit, Nahrung und Pflege, Versorgung mit Kleidung, Wohnungsänderungen sind in 38 Fällen angegeben und finden bei den Localbehörden mehr oder weniger ein bereitwilliges Gehör. Anregungen zu einer wirksameren Beaufsichtigung haben gewöhnlich die Fälle bei jungen blödsinnigen Frauenzimmern gegeben, bei welchen man Eroticismus argwöhnte. *Mitchell* unterscheidet zwischen positivem und negativem Eroticismus. Wenn der Eroticismus sich positiv zeigte, ward die Versetzung in ein Asyl empfohlen; der negative Eroticismus ist vielleicht verständlicher als „Nothwendigkeit oder Bereitwilligkeit dem Begehren zu willfahren" aufzufassen. Fast alle gesunden blödsinnigen Frauenzimmer sind in diesem Sinne erotisch, aber hier fand man meistens eine gewöhnliche Aufsicht zu ihrem Schutze genügend. Jedoch kam im Jahre 1866 eine Schwangerschaft vor, auf welche bei Gelegenheit der Visitation die öffentliche Aufmerksamkeit gelenkt wurde. Durch Mittheilungen an den Armeninspector, an den Sheriff, den Staatsanwalt und an die Polizei suchte man die Vaterschaft darzuthun. Die Mutter, eine Blödsinnige, aber gesund und von reinlichem Benehmen, konnte nicht der begehrende Theil gewesen sein noch gesetzlich der einwilligende, und eine Beiwohnung mit ihr war desshalb Nothzucht. Diese Ansicht gilt aber nicht bei dem öffentlichen Ankläger und doch ist bei Schwangerschaftsfällen der Art offenbar ein Verbrechen begangen.

Bei 600 Kranken sah Dr. *Peterson* 27 Todesfälle vorkommen, was 4½ pCt. ergiebt, von welchen in einer County unter 70 Kranken

Digitized by Google

nicht weniger als 11 oder 15,7 pCt. vorkamen, vorzugsweise be chronischen körperlichen mit dem Irrsein verbundenen Leiden.

Der 7. Anhang enthält die vollständige Instruction für den Armeninspector und für dessen Verfahren in der Haltung und Versorgung der Armen-Irren.

Die angehängten Regeln und Bedingungen, unter welchen der General Board of Lunacy die specielle Erlaubniss zur Aufnahme von armen Irren, jedoch nicht über 4 gewährt, schliessen diesen lehrreichen Bericht.

Anstaltsberichte.

Die Pflege-Anstalt Rheinau im Canton Zürich.

Etwas über eine Stunde unterhalb des Rheinfalles bei Schaffhausen liegt auf einer vom Rheine gebildeten 1300' langen, in der Mitte bis 300' breiten, Insel die ehemalige Benediktiner Abtei Rheinau, die vermittelst einer steinernen Brücke mit dem auf einer Halbinsel befindlichen Dorfe gleichen Namens in Verbindung steht.

Die theilweise um- theilweise neugebauten Räumlichkeiten der Abtei dienen seit mehr als einem halben Jahre als Pflege- und Versorgungs-Anstalt des Kantons Zürich.

Da die Pfleglinge grösstentheils Geisteskranke sind, werden die Leser gewiss mit Interesse Näheres über die Anstalt erfahren mögen. —

Zuerst einige Bemerkungen über die Entwicklung der staatlichen Fürsorge für unsere Geisteskranken.

Seit der Reformation schon wurden Geisteskranke des Cantons im Spital, einem in der Mitte der Stadt Zürich gelegenen Häusercomplexe, der zur Aufnahme von körperlichen Kranken, Pfründeren, als Gebärhaus etc. bestimmt war, untergebracht.

Als 1803 das Spital aus seiner Stellung einer städtischen Anstalt zu einer cantonalen erhoben worden war, konnten die Räumlichkeiten allen an sie gestellten Anforderungen nicht mehr genügen. Im zweiten Jahrzehent unseres Jahrhunderts wurde daher in unmittelbarer Nähe des Spitals ein neues Gebäude gebaut, das Irrenhaus, das anfänglich zur temporären Aufnahme aufgeregter unheilbarer Kranken bestimmt war, allmälig aber zur Heilanstalt des Kantons wurde, während die unheilbaren Geisteskranken im Spital blieben. Seit 30 Jahren schon stellte es sich

Digitized by Google

heraus, dass beide Localitäten dem Bedürfnisse nicht genügten, obwohl Anfangs der Vierziger Jahre die körperlich Kranken in das neue Spital versetzt werden konnten. Die Heil- wie die Pflege-Anstalt konnten die Aufnahmegesuche nicht befriedigen, und bei der allmäligen Ueberfüllung der Anstalten stellten sich unvermeidliche Nachtheile heraus, die immer dringender nach Abhülfe riefen.

Im Sommer 1862 war die Abtei Rheinau durch Aufhebung des Klosters vom Staate erworben worden. Schon seitdem Herbste 1862 wurde die Frage der Verlegung der Pflege-Anstalt aus dem alten Spital nach Rheinau von der Behörde geprüft, am 1. Juli 1863 vom grossen Rathe beschlossen und endlich im Juni 1864 der Regierung das zu diesem Zwecke ausgearbeitete Programm vorgelegt. Im Januar desselben Jahres war dann auch vom grossen Rathe die Erbauung einer Irrenheilanstalt einstimmig beschlossen worden.

Die im Programm für Rheinau vorgesehenen Um- und Neubauten wurden im Wesentlichen genehmigt und im September 1864 mit dem Bau begonnen. Zuerst begann der Umbau der zur Frauenabtheilung bestimmten Gebäude mit einem Anbau für die weiblichen Tobsüchtigen. Im Mai 1865 begann der Umbau des Administrations-Gebäudes, der zur Männerabtheilung bestimmten Räumlichkeiten und ein grösserer Neubau zur Erweiterung der letztern mit der männlichen Tobabtheilung.

Im Jahre 1866 begannen der Bau des Waschhauses, die Umgebungsarbeiten in den Höfen und Gärten und die Brunnenleitung. 1867 wurden die Bauten derart vollendet, dass bis Ende Juni der Einzug des ärztlichen Vorstandes und Ende Juli der Umzug der Kranken von Zürich nach Rheinau erfolgen konnte. Ende dieses Jahres konnte auch noch das Waschhaus seiner Bestimmung übergeben und somit der Bau als definitiv vollendet betrachtet werden.

Das Areal der Insel, auf der die Anstalt steht, beträgt etwas über 7½ Juchart. Die umgebenden Ufer bilden mässige Höhenzüge, durch welche die in der Tiefe gelegene Insel vor Winden ziemlich geschützt ist. Wenn dadurch im Winter das Klima ein verhältnissmässig gemildertes ist, so sorgt im Sommer der hier schon mächtige Rheinstrom für Wechsel und Kühlung der Luft. Die Lage der Anstalt ist somit als eine sehr gesunde zu betrachten, wozu noch kommt, dass die meisten der von den Kranken

bewohnten Räume gegen Osten gelegen sind. Durch die Lage auf einer Insel an sich und in der Nähe eines kleinen stillen Dorfes, das von den grossen Verkehrsstrassen abgeschlossen ist, ist die Ruhe und Stille der Anstalt und ihrer Umgebung mehr als gesichert. Immerhin trennt uns von den nächsten Stationen sowohl der Badischen als wie der Schweizer Eisenbahn nur eine Stunde Weges. Trotz der Lage der Anstalt im Flusse sind die Gebäulichkeiten völlig trocken. Die Anstalt ist durchgängig mit Ausschluss des Paterres zweistöckig. Etwa in der Mitte der Gebäulichkeiten einen Seitenflügel bildend und in einem rechten Winkel auf die Hauptfront der Anstalt gestellt, steht das Administrationsgebäude. Der Längenflügel südlich desselben bildet die Männerabtheilung, während die nördlich davon gelegenen Wohnräume als Aufenthalt der Frauen dienen. Durch diese Eintheilung ist die Wohnung des ärztlichen Directors und des Verwalters so ziemlich im Mittelpunkt beider Abtheilungen. Die Verbindung und den Zugang der verschiedenen Räumlichkeiten vermitteln fünf Treppenhäuser, die denn auch wieder eine Absonderung und Trennung der einzelnen Abtheilungen ermöglichen.

Ich beginne mit der Beschreibung I. der Männerabtheilung. A. Parterre. Den äusseren Theil des Parterres nimmt 1) die Abtheilung der Nachts Lärmenden und Gewaltthätigen resp. die Tobabtheilung, ein, die aus einem 130' langen und 14' breiten Corridor, 10 Isolir-Räumen, einem Wärterzimmer mit Theeküche, Garderobe und Abtritt besteht. Eine Zelle hat 15—2000 Cubikfuss Raum. Die eine Hälfte derselben ist mit Cement verputzt, mit Oelanstrich versehen, enthält feste Bettladen und eingemauerte Abtritte, die vom Zellencorridor aus geleert werden. Die andere Hälfte hat bewegliche Bettladen, freie Nachtstühle, einfach getünchte Wände. Die Fenster in den Zellen sind mit Drathgittern versehen und in einer Höhe von 6' angebracht. Im Zellencorridor sind gewöhnliche Kreuzstöcke angebracht, an denen die untere Hälfte der Fenster ebenfalls mit Drathgittern versehen ist. Vom Zellencorridor führt direct ein Ausgang in den Tobhof, einer ins Bad und der dritte in ein Treppenhaus.

Nach innen gegen die Mitte der Anstalt folgt nun 2) die Abtheilung der Unreinen. Auf derselben befindet sich das Bad mit Kesselraum, ein Wärterzimmer, 3 Schlafsäle mit je 4 Betten und ein Abtritt. Von hier führt wieder ein Ausgang auf den entsprechenden Hofraum, zwei in die zunächst liegenden Abtheilungen.

Dieser Abtheilung zunächst folgt 3) die der Epileptiker mit

Digitized by Google

einem Tagraum, 5 Schlafsälen für 36 Betten, zwei Wärterzimmern mit einer Theeküche, 2 Abtritten, daneben noch ein Raum für Aufbewahrung alter Wäsche. Von dieser Abtheilung aus geht es ins Administrationsgebäude und zwar zunächst in die Küche.

Nach hinten führt eine Thüre direct in den entsprechenden Hofraum und nach vorn eine in den vordern Hofraum.

B. 1ster Stock. Ueber der Tobabtheilung und der der Unreinen liegt 4) die Abtheilung für ruhige Blödsinnige und solche Kranke mit andern Formen psychischer Störung, die wegen ihrer Eigenschaften eine fortwährende Beobachtung erfordern (sogenannte gefährliche Kranke). Sie besteht aus einem 100' langen und 14' breiten Corridor, der als Tagraum dient, aus 7 Schlafsälen, in welche 55 Betten gestellt werden können, 3 Wärterzimmern, Theeküche und 2 Abtritten. Zu beiden Seiten der Abtheilung führen Corridore zu den Treppenhäusern.

Von da gegen die Mitte liegt 5) die sogenannte Pfründnerabtheilung, auf der ruhige Geisteskranke höheren Alters, dann geistesgesunde alte Männer und körperlich Kranke, also im Allgemeinen arbeitsunfähige Kranke untergebracht sind.

Für den Aufenthalt der Kranken dienen 2 Säle als Tagräume, 7 Schlafsäle mit 57 Betten; ausserdem sind auf dieser Abtheilung 2 Wärterzimmer mit 2 Theeküchen, das Zimmer des Oberwärters, 2 Abtritte; 2 Treppenhäuser vermitteln die Communication dieser Abtheilungen nach aussen.

C. 2ter Stock. Ueber der Abtheilung der ruhig Blödsinnigen ist 6) diejenige der unruhig Blödsinnigen. Sie besteht aus einem Saalcorridor mit dem Raumverhältniss des im 1sten Stock gelegenen, 3 Schlafsälen für je 10 Betten, 2 Wärterzimmern, ein Einzelzimmer, Theeküche und Abtritt. Von da nach innen folgt der Betsaal mit einer Länge von 73 und einer Breite von 35', in dem 350 Kranke bequem Platz haben. Die Männerabtheilung beschliesst nach innen 7) die Abtheilung der ruhigen Geisteskranken in früheren Stadien der Krankheit. Ihr stehen völlig dieselben Räumlichkeiten mit derselben Eintheilung zu Gebote, wie die der Pfründner im 1sten Stock.

II. Frauenbau. A. Parterre. Der äusserste Theil desselben bildet 1) die baulich abgesonderte und nur durch einen bedeckten Durchgang mit dem Hauptgebäude in Verbindung stehende Tobabtheilung, die nur Parterregebäude ist. In derselben sind 13 Isolirräume, 1 Tagsaal, 2 Wärterzimmer, Theeküche und Abtritt. Der Corridor von 130' Länge ist leider nicht heizbar und daher im Winter als Tagraum nicht benutzbar.

Dieser Abtheilung folgt nach innen zu 2) die Abtheilung der unreinen und unruhigen, in irgend einer Weise störenden Geisteskranken. Daselbst befindet sich auch das Bad nebst Kesselraum. Ausserdem sind hier ein grösserer und ein kleinerer Tagraum, 4 Schlafsäle für 42 Betten, 2 Garderobezimmer, 3 Wärterzimmer, 2 Theeküchen, 1 Esszimmer für die Wärterinnen, zwei Abtritte.

Es folgt jetzt gegen das Mittelgebäude zu 3) die Abtheilung der epileptischen Frauen mit einem Tagsaal und zwei Schlafsälen für 24 Betten. Daneben 2 Wärterzimmer, eine Theeküche, Abtritt und mehrere abgesonderte Räume zur Aufbewahrung von Holz, alter Wäsche und zur Garderobe.

B. 1ster Stock. Ueber der Abtheilung der Unreinen ist 4) die der Idioten, Imbecillen, ruhiger aber tief blödsinniger und solchen in anderen Stadien der Störung befindlicher Geisteskranken, die eine Beschränkung ihrer freien Bewegung und eine anhaltende Beaufsichtigung nöthig machen.

Sie haben einen gemeinsamen Tagraum, 5 Schlafsäle für 51 Betten, 1 Wärterzimmer mit Theeküche, 2 Garderobezimmer, vier Einzelzimmer, 1 Abtritt.

Daneben folgt 5) die Abtheilung der marastisch Schwachsinnigen, sehr betagter ruhiger Geisteskranken und solcher, die wegen körperlicher Krankheit im Bett liegen müssen. Sie haben einen gemeinsamen Tagraum, 1 Schlafsaal für 9 Betten, 5 Schlafzimmer für je 4 Betten, 1 Wärterzimmer mit Theeküche, 1 Garderobe und 1 Abtritt.

Gegen das Mittelgebäude zu schliesst dieser Stock 6) die weibliche Pfründnerabtheilung ab mit körperlichen Kranken, Greisinnen und solchen Geisteskranken, die in ihrem freien Intervall sich befinden. Es findet sich hier ein grösserer und ein kleinerer Tagsaal, 5 Schlafsäle, 4 Schlafzimmer für 49 Betten, 2 Wärterzimmer mit 2 Theeküchen, 1 Zimmer für Aufbewahrung der alten Wäsche, 1 Abtritt.

C. 2ter Stock. Den ganzern äussern Flügel nimmt 7. die Abtheilung der ruhigen Geisteskranken in früheren Stadien der Störung ein. Die hier untergebrachten Kranken benutzen einen grössern und einen kleinern Tagraum, ausserdem 4 grosse Schlafsäle und 2 Schlafzimmer mit 52 Betten. Daneben sind auf dieser Abtheilung 2 Wärterzimmer mit 2 Theeküchen, dann der weibliche Arbeitsaal mit der Lingerie. Neben letzterer ein Zimmerchen zum Heissmachen der Bügelstähle und 2 Abtritte. Am äussersten Ende dieser Abtheilung ist ein grosser, heller, schön ausgestatteter

Digitized by Google

Saal, der zu gemeinsamen Festlichkeiten und Unterhaltungen benutzt wird.

Ueber dieser Abtheilung, mit ihr durch eine offene Treppe verbunden, auf dem Estrich, sind noch 2 grosse Reservesäle, die im Nothfalle als Schlafsäle benutzt werden können. Sie sind so hell, luftig, sonnig, freundlich, so gut von den übrigen Abtheilungen zu trennen, dass sie wohl auch im Falle einer in der Anstalt ausbrechenden Epidemie als Absonderungs-Krankensäle benutzt werden können. Am Ende des Frauenhauses folgt nun 8. eine Abtheilung mit arbeitsfähigen, ruhigen, aber doch mehr verstörten Kranken, als sie sich auf der vorigen Abtheilung finden. Sie haben einen grössern und einen kleinern Tagsaal, daran 6 Schlafsäle und 6 Schlafzimmer für 65 Betten; ausserdem finden sich 2 Wärterzimmer mit 2 Theeküchen und ein Abtritt.

III. Administrations-Gebäude. Im Parterre sind die Anstaltsküche, dann eine grosse, helle, heizbare Halle zum Putzen und Zurichten des Gemüses, die Vorrathskammern für Victualien, Wohnung des Naturalien-Verwalters, hier Speisemeister genannt, Esszimmer für das Dienstpersonal.

Im ersten Stock ist die Wohnung und das Bureau des Directors und die Apotheke.

Im 2ten Stock die Wohnung und Bureau des Verwalters und der Conferenzsaal zu Versammlungen der Behörden.

Ueber der Wohnung des Verwalters sind noch verschiedene Vorrathskammern für Bedürfnisse der Anstalt.

Am Eingang der Insel zunächst der Brücke ist ein einzeln stehendes einstöckiges Häuschen, in dessen Parterreräumen die Wohnung des Portiers, des Schneidermeisters und die Schneiderwerkstätte sich befinden, während im 1sten Stock die Wohnungen der Mägde sind *).

Alle die bisher beschriebenen Räumlichkeiten befinden sich auf der Insel und bilden die eigentliche Anstalt. Die nun folgenden zur Anstalt in weiterem Sinne gehörigen Gebäude liegen auf dem der Insel gegenüberliegenden Rheinufer und sind mit ihr durch eine Brücke verbunden, vom Dorfe jedoch durch eine Mauer getrennt. Es sind dies die Gemüse- und Obstgärten und Weinberge der Anstalt im Betrage von circa 35 Jucharten.

Von Gebäulichkeiten sind anzuführen: das sogenannte Gast-

*) Auf der westlichen Seite der Insel ist die ehemalige Klosterkirche, gegenwärtig Pfarrkirche des Dorfes Steinau. Die Kirche und der Zugang zu ihr ist von der Anstalt völlig abgesondert.

haus, ehemaliger Wohnraum für Klostergäste, jetzt im Falle einer Vermehrung der Anstaltsbewohner als Wohnraum für etwa 100 Kranke bestimmt, wozu jedoch noch beträchtliche bauliche Veränderungen nöthig wären.

Vorläufig sind im Parterre dieses Gebäudes die Arbeitsräume zum Holzsägen und Strohflechten, die Weintrotte und Küferwerkstätte. Im 1sten Stock sind die Schlafräume des männlichen Dienstpersonals. Im Garten ist ein Gärtnerhaus mit der Gärtnerwohnung.

Am äusseren Thor ist die Wohnung des 2ten Portiers, daneben ein Raum zum Holzhacken für die männlichen Kranken. Hinter ihm stehen die Metzgerei, Schreinerei und Wagnerei. In deren Nähe sind die Pferde- und Schweineställe, Wagen- und Holzremisen, Fruchttonnen und sonstige Räume für landwirthschaftliche Zwecke.

Etwa 100 Schritte davon entfernt sind Ställe für 40 Kühe mit Sennerei und Wohnung der Sennen. Ausserdem besitzt die Anstalt in geringerer und grösserer Entfernung von ihr etwa 190 Jucharten an Wiesen und Aeckern.

Bauliche Einrichtungen. A. Heizung, Ventilation, Beleuchtung. Im Administrationsgebäude und allen nicht von Kranken bewohnten Räumen ist Ofenheizung und natürliche Ventilation. Auf den Abtheilungen ist Luftheizung mit künstlicher Ventilation nach dem System von *Stail* und Comp. in Genf. Die Männerabtheilung wird durch 5, die der Frauen durch 11 Oefen, (Calorifères) von dreifach verschiedenem Caliber geheizt. Die Oefen des grössten Calibers heizen einen Raum von 140 F., die mittleren von 70 F., die kleinen von 40 F. Horizontalausdehnung. Die 2 Oefen grössten Calibers liegen im Souterrain, die übrigen im Parterre und werden theils von den Corridors theils von abschliessbaren Räumen aus geheizt.

Die Feuerung und Regulirung der Klappen an den Calorifères sind der Art einfach, dass sie von jedem mittelmässig begabten Individuum besorgt werden können. Sie liegen in der dienstlichen Aufgabe des Wärterpersonals. Der Feuerraum ist von Eisen, frei im Ofen stehend, im Falle einer Reparatur leicht aus einander zu nehmen. Er hat in seiner Construction den Vortheil, möglichst grosse Flächen der Luft in der Heizkammer darzubieten; die Kamine sind ohne Klappen und geben dadurch keine Veranlassung zu Stockungen des Rauches. Unter dem Feuerraum ist eine eigene Vorrichtung, um Zug im Kamine hervor zu bringen. Die in den Heizkammern einströmende Luft wird durch Canäle

Digitized by Google

oberirdisch und meistens vom Rheine aus hergeleitet, wodurch für Zufuhr von frischer, kühler und feuchter Luft vorgesorgt ist. Ausserdem streicht die erwärmte Luft über täglich wieder auf zu füllende Wasserschichten, durch deren Auftrocknen sie sich weiter mit Feuchtigkeit versieht. Von der Heizkammer aus führen weite und gerade Canäle in die einzelnen Zimmer und zwar in je ein Zimmer ein eigener Canal. Mittelst der Klappe an den Calorifères kann der Strom der Luft in die Zimmer beliebig vermindert und abgeschlossen werden. An den Mündungen der Heizcanäle in den Zimmern sind ebenfalls Klappen, die halb und ganz geschlossen werden können.

Die Luft in den Zimmern und Sälen wird der Art von der aus den Heizcanälen nachströmenden gedrängt, dass nach einer Berechnung des Herrn Professor *Bolley* die Zimmerluft in 1—2 Stunden erneuert wird*). Durch ein den Heizcanälen gegenüber angebrachtes System von Evacuationscanälen strömt die benutzte Zimmerluft auf die Bodenräume, die allenthalben möglichst gut geschlossen sind und dadurch nur geringen Zug entstehen lassen. Auch an den Evacuationscanälen sind Klappen, die nach Bedürfniss den Abgang der warmen Luft reguliren lassen.

Beim Gebrauch von trockenem Buchenholz zum Heizen werden die Räume im 1. und 2. Stock bereits nach einer Stunde Feuerns hinlänglich Wärme haben, im Parterre nach etwa 1½ bis 2 Stunden der Feuerung. Bei der in diesem Winter beobachteten strengsten Kälte von 9—10° R. haben die Wohnräume am Morgen um 5—6½ Uhr noch hinlängliche Wärme und zwar eine mittlere Temperatur von 11—13° R., wenn am Abend zuvor um 8½ Uhr mit der Feuerung aufgehört wurde.

Es wird weit mehr Wärme producirt, als nöthig ist; doch ist die Luft in den Zimmern überall angenehm und wohlthuend. Allein in Zimmern von bettlägerigen Kranken ist es nöthig, die Betten wenigstens 6—8 F. von der Heizung entfernt aufzustellen, wenn nicht die an der Ausmündung der Heizcanäle mit einer Temperatur von 60—80° R. ausströmende Luft dem bettliegenden Kranken temporär unangenehm werden soll. Ausserdem ist die Luft frei von fremden Bestandtheilen und ohne auffallende Strömung.

Was die Kosten der Heizung betrifft, stellen sich dieselben

---

*) Mittheilungen von Beobachtungen und Untersuchungen dieses Luftheizungssystems von Hrn. Prof. *Bolley* in Zürich sind im 13. Bd. der schweiz. polytechn. Zeitschrift.

im Durchschnitt auf Frs. 40—50 für den Tag, welche Summe sich für's nächste Jahr vermindern dürfte, wenn einmal die Heizkanäle völlig trocken sind und zur Heizung mehr getrocknetes Holz zu Gebote steht, als dies im ersten Jahr der Fall war.

Der Zweck der Heizung und Ventilation ist durch den angewendeten Apparat erreicht, indem genügend Wärme und zuträgliche Luft den Zimmern zugeleitet wird, auch selbst noch in den nicht heizbaren Corridors eine mittlere Temperatur herrscht. Einen wesentlichen Nachtheil hat das System dadurch, dass ein grossartiger Aufwand von Kräften zu seiner Anwendung nöthig ist.

Es sind 7 Personen zur Feuerung nöthig und wohl eben so viel haben genügende Arbeit, um die Klappen in den einzelnen Zimmern zu reguliren und nur bei sorgfältiger Regulirung derselben entspricht die Heizung allen Anforderungen. Bei der Aufstellung einzelner grösserer Caloriféres im Souterain würde zwar die Feuerung vereinfacht, die Klappenregulirung bliebe aber noch in gleicher Weise complicirt. —

Als Beleuchtungsmaterial dient durchgängig Stein- und gewöhnliches Oel.

B. Abtritte. In den Vorplätzen der Abtritte der Männerabtheilung sind Pissoirs von Porzellan angebracht. Jeder Abtritt ist doppelt und nur von aussen verschliessbar. Da es bei unserer ausgedehnten Landwirthschaft von Werth ist, die Excretions-Stoffe möglichst vollständig verwerthen zu können, sind die Abtrittgruben insgesammt cementirt. Zu ihrer Leerung hat man eine mechanische Güllenpumpe, mit der ihr Inhalt völlig, ohne übeln Geruch zu verbreiten, entleert werden kann. An den Gruben sind Ventilationsrohre angebracht, welche jedoch nicht verhindern, dass einzelne Abtritte zeitenweis ziemlich starken Geruch verbreiten.

Die Abtritte sind überhaupt eine der schwächsten Seiten in der Anstalt, woran zum Theil das Terrain schuldig ist, das eben nur sehr beschränkten Raum zur Anlage bot.

C. Treppen. In der Anstalt sind fünf geräumige helle Treppenhäuser zur Vermittlung der Communication. Die Treppen sind grösstentheils aus Sandstein, die Wände zwischen den Treppen laufen ausgemauert.

D. Die Corridore auf der Frauenabtheilung sind durchgängig prächtig, 12—15' breit. Im Parterre sind alle mit Cement bedeckt, die im ersten und zweiten Stock, mit Thonziegeln. Auf der Männerabtheilung sind sie ausgenommen, da, wo sie zugleich als Tagräume benutzt werden, nur 8' breit.

Digitized

E. Die Fenster sind durchaus mit Gittern versehen. Im Parterre wurden die alten massiven Stockgitter stehen gelassen, die keinen guten Eindruck machen. Im ersten und zweiten Stock sind die Gitter durchgängig von recht gefälliger Form und von dünnen Stäben zusammengesetzt. Die Gitter können alle von den Zimmern aus mittelst eines Drückers geöffnet werden und hängen in Angeln. Die Fenster in den Abtheilungen der Tobsüchtigen und im Corridor der unruhigen Frauen sind nach innen durch Drathgitter geschützt.

F. Küche. Die Küche ist im Parterre des Administrationsgebäudes.

Die Heerdeinrichtung stammt von Staib u. Co. in Genf und hat sich gut bewährt, nachdem man mittelst eines eigenen Mantels und Abzugsrohrs für Entfernung des Dampfes gesorgt hat. Im Allgemeinen wäre der Küche eine grössere Geräumigkeit zu wünschen. Die Heizung erfolgt mit Holz.

Gegen den Eingang ist sie durch einen Anrichttisch und ein Holzgitter geschieden. Hier holen die Wärterinnen der weiblichen Parterreabtheilung die Speisen ab, während die Wärter dieselben von einem Fenster eines Ganges vor der Küche, der durch eine Thüre vom Mittelbau abgeschieden ist, in Empfang nehmen.

Von der Küche aus geht ein Kanal bis in den zweiten Stock, in dem mittelst einer Winde die Speisen in die verschiedenen Stockwerke befördert werden, um dort vom Wärterpersonal auf ihre betreffenden Abtheilungen abgeholt zu werden.

G. Bade-Anstalt. Die Lage derselben ist schon früher angegeben worden.

Die Einrichtung ist von den Herren Sulzer in Winterthur und kann als eine vorzüglich gelungene bezeichnet werden. Der Heisswasserkessel bedarf nur der Feuerung, regulirt sich ausserdem mittelst Ventilen ganz von selbst. Vom Kesselraum aus führen eiserne Rohre das Wasser in's Bad. Warmes und kaltes Wasser wird gesondert in's Bad eingelassen; die Hähne sind nur mittelst besonderer Drücker zu öffnen. In jedem Bade sind 5 gusseiserne, innen emaillirte Wannen, die fest im Cementboden stehen, in dem sie etwa ½ Schuh tief eingelassen sind. Je eine Wanne hat eine Vorrichtung zum Tropf- und Douche-Bad und einen Deckel, um widerstrebende Kranke zu fixiren. Am Boden des Bades sind Abzugskanäle, die das Abwasser entfernen; die Wände des Bades sind 3′ hoch cementirt.

H. Wäsche. Es besteht Dampfwäsche, die von dem obigen Herrn Sulzer eingerichtet ist, und sich von den anderen Ein-

richtungen dieser Art nicht unterscheidet. Das Waschhaus ist an dem Frauengarten angebaut. Die Wäsche kann in einem Tage trocken wieder abgeliefert werden. Der Wasserpumpapparat und die Centrifugal-Auswindemaschine werden übrigens von Menschenhand in Bewegung gesetzt

I. Wasserbedarf. Das Trinkwasser liefert eine im Anstalts-Rayon liegende Quelle von einer Mächtigkeit, dass sie in der Viertelminute zwischen 7—10 Schweiz. Maass Wasser liefert, welche Menge bisher alle Bedürfnisse deckte. Mittelst gusseiserner Röhren wird das Wasser auf die Insel gebracht, und speist daselbst den im Hofraum vor der Anstalt sich befindlichen laufenden grossen steinernen Brunnen. Ein anderer Zug der Röhrenleitung geht in die Anstalt und ist daselbst so vertheilt, dass er in den 4 Treppenhäusern der Abtheilungen je einen Brunnen mit selbstschliessendem Hahne speist, der durch einen Druck, der das Ventil öffnet, einen kräftigen Wasserstrahl entleert. Ausserdem sind in der Gemüsehalle und in der Küche Trinkwasserröhren. Das Wasser für den sonstigen Bedarf wird mittelst zweier, je in einer Abtheilung angebrachter Pumpwerke aus dem Rhein durch Menschenhände auf den Dachboden befördert und zwar in zwei daselbst befindliche Reservoirs, von denen je eines den Inhalt von 175 Cubikfuss hat.

Von diesen Reservoirs führen Leitungsröhren in alle Theeküchen der Anstalt (20 an der Zahl), in die Bäder, in's Sectionszimmer. Ausserdem stehen mit ihnen 4 Röhrenleitungen von starkem Kaliber in Verbindung, die mittelst eines Hebels zu öffnen und durch eine Schraube mit Schläuchen in Verbindung zu bringen sind und zwar in jedem Stockwerk des Hauses, um bei Feuersgefahr die nöthige Hülfe zu ermöglichen. Die Reservoirs communiciren wieder miteinander, so dass bei Beschädigung eines Pumpwerkes dennoch Wasser auf beide Abtheilungen kommt.

Im Waschhaus ist ein eigner Grundwasserbrunnen, aus dem durch eine Handpumpe das Wasser in den Dampfkessel gebracht wird.

K. Gärten. Die Tobsüchtigen, Unruhigen und Unreinen und die Epileptischen haben je einen mit Rasen-Anlagen versehenen und mit Bäumen bepflanzten Hof. Alle diese 6 Höfe haben jedoch für die grosse Anzahl der Kranken, die sich darin bewegen sollen, eine zu geringe Ausdehnung, leiden theilweis (die für Männer) an Mangel des Schattens, sind schmal und durch hohe Mauern eingeschlossen, so dass ihnen jede Aussicht mangelt.

Digitized by Google

Die für die ruhigen Geisteskranken dienenden Hofplätze und Gärten leiden weniger an diesen Mängeln. Für die bessern unter den Geisteskranken und die nicht geistig gestörten Verpflegten beider Geschlechter gemeinsam ist dann noch ein grosser, mit Kegelplatz und Schatten spendenden Bäumen versehener Rasenplatz zwischen beiden Rheinarmen vorhanden, der allen Anforderungen entspricht.

L. Mobiliar. Dieses stammt grösstentheils aus dem frühern Aufenthaltsorte unserer Kranken, und bietet durch die Verschiedenheit des Alters und der Grössenverhältnisse der einzelnen Stücke eben keinen recht harmonischen Anblick dar. Allein die Bestuhlung im Beetsaal ist eine neue und gleichmässige. Die Bettladen sind durchaus aus weichem Holze, angestrichen und der Art durch Haken in den einzelnen Stücken zu befestigen, dass kein Ungeziefer darin wohl entstehen kann. Nach Landessitte haben alle reinlichen Kranken statt der Matratzen Unterbetten, im Sommer und Winter die gleiche Federdecke und 2 Federkissen. Der allmäligen Einführung der Matrazen stehen die Vorurtheile und die Gewohnheit entgegen. Für die Unreinen *) habe ich die dreistückigen Strohsäcke, die wenigstens den Anforderungen der Reinlichkeit genügen.

Die Wandungen der Bettladen für Epileptische sind mit einschiebbaren Bretterläden versehen, um das Herausfallen der Kranken im Anfalle zu verhindern.

Die Bettladenstücke der Tobsüchtigen und Zerstörungssüchtigen sind durch eiserne Klammern zusammengehalten und im Boden fest gemacht.

Alle Kranken, denen man irgendwie die selbstständige Besorgung der Kleider und Wäsche anvertrauen kann, haben ihren eigenen Kasten und den Schlüssel dazu. Diese Kästen sind bei den Frauen auf den Vorbauen der breiten Corridore, so dass die Kranken selbe in nächster Nähe haben, bei den Männern dagegen auf dem Dachboden, wohin ihnen zu einer gewissen Zeit des Tages der Zugang geöffnet wird.

Kleider und Wäsche der Kranken, die ihre Garderobe nicht besorgen können, sind in den bei Beschreibung der einzelnen

---

*) Auf der Männerabtheilung sind 10, auf der Frauen 12 unreine Kranke. Ausgenommen 4 idiotische Knaben sind alle andere nur Nachts unreinlich und auch dann nur 11 Kranke allnächtlich, die übrigen 7 nur zeitenweis unrein. 9 darunter sind epileptisch.

Digitized by Google

Abtheilungen erwähnten Zimmern untergebracht und werden vom Wärterpersonale besorgt.

Ausserdem steht vor jedem Bette, ausgenommen vor denen der Tob-Abtheilungen, ein eignes Bettkästchen, worin die Kranken Waschgegenstände und andere Artikel unterbringen können. Bettlägerige Kranke haben Nachttischchen.

Die Reinigung der Kranken erfolgt in den Theeküchen und den steinernen Korridors.

Der Gebrauch von Messern und Gabeln ist ein fast allgemeiner, ausgenommen davon sind nur die Tob-Abtheilungen und theilweise die Bewohner der epileptischen Abtheilungen und die weiblichen Unruhigen.

Diese Räumlichkeiten also bilden die Pflegeanstalt des Kantons Zürich. Wenn die Wahl gerade dieser Lokalitäten hierzu manche Nachtheile mit sich führt, ich rechne dahin die zu tiefe Lage des Gebäudes, die jede Aussicht in die Ferne verhindert, wodurch leicht das Gefühl der Vereinsamung erzeugt wird, dann die für die grosse Anstaltsbevölkerung in zu geringem Umfang zu Gebote stehenden und ungünstig gelegenen freien Räume, so stehen diesen Nachtheilen auch wieder grosse Vortheile gegenüber, nämlich der für eine Pflegeanstalt nöthige ländliche Charakter und die dadurch bedingte ländliche Ruhe und Stille und die Verbindung der Anstalt mit einer grossartigen Landwirthschaft.

Was die Anstaltsräume an sich betrifft, sind sie hell, geräumig, sonnig, also den Anforderungen der Gesundheitspflege in hohem Grade entsprechend.*) Sie bieten die Möglichkeit leichter und bequemer Communication, und die von der psychiatrischen Wissenschaft geforderte Trennung der ganzen Abtheilungen nach den Geschlechtern, so wie der Theilabtheilungen nach den Krankheitsformen und Stadien und den individuellen Eigenschaften der Kranken, war in der naturgemässesten Weise und ohne Zwang durchzuführen.

Die innern Einrichtungen der Anstalt sind dem gegenwärtigen Standpunkte der Praxis und der Wissenschaft grösstentheils entsprechend. Ich erinnere nur an die Heizung, Ventilation, an un-

*) Das Minimum des Luftraumes, der für ein Bett in den Schlafsälen trifft, ist, wenn die Anstalt einmal gefüllt ist, noch 530 Cubikfuss. In der Regel treffen aber auf ein Bett 7—900 Cubikfuss Luftraum.

Digitized b

sere Wasserleitung, Dampfwäsche, Bäder etc., alles Einrichtungen, wie sie sonst nur in neuen Heilanstalten anzutreffen sind.

Natürlich wird eine adoptirte Anstalt auch ihre schwächern Seiten haben. Jedoch es wäre unpassend, über Rheinau als Anstalt Kritik anzuwenden, die sich mit unwesentlichen Dingen beschäftigt. Wenn man bedenkt, dass der kleine Staat Zürich für seine unheilbaren Kranken eine solche Anstalt herrichtet, wie sie Rheinau vorstellt, so ist dies eine That von einer solchen grossartigen Bedeutung, dass zu deren Beurtheilung auch nur ein grosser Massstab angelegt werden kann. Und da fällt dann vor allem der Geist der Gesittung und der Humanität in's Gewicht, der so grosse Opfer für seine Aermsten und in solch' vortrefflicher Anwendung bringt. Ein solcher Geist verdient die höchste Anerkennung aller Menschenfreunde und ihm gegenüber hat Lob und Tadel von Unwesentlichen keine Bedeutung mehr.

Anstaltsbevölkerung.

In 14 Transporten von Zürich bis zu der der Anstalt zunächst liegenden Station mit der Eisenbahn, von der Station bis in die Anstalt theils zu Fuss theils zu Wagen wurden vom 22. Juli bis zum 7. September 451 Kranke und zwar 211 Männer und 240 Frauen mit 9 Wärtern und 20 Wärterinnen in die Anstalt Rheinau übergesiedelt.

Von diesen Kranken wurden aufgenommen in die alte Zürcher Anstalt:

1817:	1 Mann	—	Frau	=	1
1820—30:	2 -	4	-	=	6
1831—40:	11 -	12	-	=	23
1841—50:	27 -	30	-	=	57
1851—60:	75 -	90	-	=	165
1861—66:	89 -	95	-	=	184
Vom Jan. bis Juli 1867:	6 -	9	-	=	15
Summa	211 Männer	240 Frauen		=	451.

Von Anfang Juli bis Ende December 1867 wurden in Rheinau direct aufgenommen:

14 M. 22 Fr. = 36 im Ganzen.

so dass also bis zum Jahresschluss

225 M. 262 Fr. 487 im Ganzen

in der Anstalt verpflegt wurden.

Von diesen Verpflegten waren alt:

Digitized by Google

zwischen 10—20 Jahren	6 M.	— Fr.,	6	im Ganzen,	
- 20—30 -	20 -	25 -	45	-	-
- 30—40 -	51 -	55 -	106	-	-
- 40—50 -	45 -	66 -	111	-	-
- 50—60 -	43 -	58 -	101	-	-
- 60—70 -	36 -	46 -	82	-	-
- 70—80 -	19 -	11 -	30	-	-
- 80—90 -	5 -	1 -	6	-	-
Summa	225 M.	262 Fr.,	487	im Ganzen.	

Der älteste Verpflegte, ein Geisteskranker, war 88 Jahre alt, die älteste Verpflegte, eine Geisteskranke, 84 Jahr alt.

Der Confession nach gehörten alle Verpflegten, 3 Katholiken (1 M., 2 Fr.) ausgenommen, dem reformirten Glaubensbekenntnisse an.

Dem Berufe nach gehörten an:

dem Landwirthschaftlichen (Bauern, Knechte, Mägde) .	69 M.	72 Fr.,	141	im Ganzen,
den Fabrikarbeitern, sowohl Arbeitern in als an Fabriken, d. h. solchen, die daheim arbeiten (meist Seidenfabrikation)	15 -	77 -	92	- -
den Handwerkern	59 -	— -	59	- -
dem Hauswesen und den damit verbundenen Arbeiten standen vor als Hausfrauen oder Mägde	— -	38 -	38	- -
Näherinnen waren	— -	24 -	24	- -
Wäscherinnen	— -	2 -	2	- -
Händler	2 -	2 -	4	- -
Taglöhner	20 -	4 -	24	- -
Kaufleute	10 -	1 -	11	- -
Gelehrte Berufsarten (Lehrer, Studirende)	8 -	2 -	10	- -
Militairs	4 -	— -	4	- -
Ohne Beruf	36 -	34 -	70	- -
Unbekannt	2 -	6 -	8	- -
Summa	225 M.	262 Fr.,	487	im Ganzen.

Dem Civilstande nach waren:

ledig	151 M.	184 Fr.	335	im Ganzen,
verheirathet . . .	40 -	33 -	73	- -
Latus	191 M.	217 Fr.,	408	im Ganzen.

Transport	191 M. 217 Fr.,	408 im Ganzen,	
verwittwet	33 - 36 -	69 -	-
geschieden	— - 8 -	8 -	-
unbekannt	1 - 1 -	2 -	-
Summa	225 M. 262 Fr.,	487 im Ganzen.	

Von diesen Kranken sind:

geistig schwach oder gestört .	195 M. 241 Fr.,	436 im Ganzen	
geistig gesund	30 - 21 -	51 -	-
Summa	225 M. 262 Fr.,	487 im Ganzen.	

Die nicht Geisteskranken leiden:

an Alterschwäche	9 M. — Fr.,	9 im Ganzen,	
an körperlichen Krankheiten .	9 - 20 -	29 -	-
an angeborenen Difformitäten der unteren Extremitäten . .	3 - — -	3 -	-
an Blindheit	6 - 1 -	7 -	-
an Taubstummheit	3 - — -	3 -	-
Summa	30 M. 21 Fr.,	51 im Ganzen.	

Von den körperlich Kranken litten an Erkrankung

des Gehirns	2 M. 2 Fr.,	4 im Ganzen,	
des Rückenmarks	4 - 2 -	4 -	-
an Hysterie	— - 1 -	1 -	-
an Paralysis agitans . . .	— - 1 -	1 -	-
der Lungen	1 - 1 -	1 -	-
des Magens	— - 2 -	2 -	-
der Wirbelsäule	— - 3 -	3 -	-
des Hüftgelenkes	— - 4 -	4 -	-
des Kniegelenkes	— - 1 -	1 -	-
der Arthritis deformans . .	1 - 3 -	4 -	-
der Hauthypertrophie . .	1 - — -	1 -	-
Summa	9 M. 20 Fr.,	29 im Ganzen.	

Von den Geisteskranken waren im Zustande

1) der Intermission, des freien Intervalls	9 M. 12 Fr.,	21 im Ganzen.	
2) periodischer, chron. Melancholie und melancholischen Wahnsinns . . .	16 - 12 -	28 -	-
3) circulärer Seelenstörung .	1 - 12 -	13 -	-
4) secundären Wahnsinns bis Verrücktheit	33 - 68 -	101 -	-
5) von Verrücktheit bis Blödsinn	59 - 69 -	128 -	-
Latus	118 M. 173 Fr.,	291 im Ganzen.	

Digitized by Google

6) der *Dementia paralytica progressiva*	3 M.	3 Fr.,	6 im Ganzen,
7) der Epilepsie mit Seelenstörung und letzterer aus Epilepsie	32 -	27 -	59 - -
8) angeborener psychischer Schwäche, Idiotie, Imbecillitat, Cretinismus	25 -	33 -	58 - -
9) der *Dementia primaria* . .	1 -	2 -	3 - -
10) der *Dementia marastica* .	6 -	2 -	8 - -
11) des *Alcoholismus chronicus*	10 -	1 -	11 - -
	Summa 195 M.	241 Fr.,	436 im Ganzen.

Bemerkungen — ad 1. Die 21 hierher gehörigen Individuen haben seit ihrem hiesigen Aufenthalt sich innerhalb der Breite psychischer Gesundheit bewegt. Anhaltend gleichmässige ruhige Stimmung, sich gleichbleibender Thätigkeitstrieb, Mangel an Wahnvorstellungen und Sinnesdelirien, Mangel auffallender psychischer Defecte charakterisiren sie.

Sie scheinen zum grössten Theile in die Klasse der periodisch und circulair Gestörten zu gehören mit sehr langen Intermissionen.

Auch bei den unter der Rubrik 2 aufgeführten Kranken findet in der Mehrzahl der Fälle ein periodischer Verlauf der Störung statt, indem fast alle Kranke mehrere Wochen relativ psychisch frei sich zeigen, dann aber wieder ein Stimmungswechsel eintritt, und die Symptome einfacher Melancholie oder des melancholischen Wahnsinns, meist mit dem Charakter des Verfolgungswahns durch mehrere Wochen andauern.

Nach deren Ablauf tritt wieder eine mehr oder weniger lange Intermission ein. 6 Kranke sind darunter, bei denen der melancholische Krankheitsprozess nur in Intermissionen und Exacerbationen sich bewegt, ohne dass es bisher zu einer freien Stimmung je gekommen ist.

ad 3. Bei diesen Kranken interveniren ausser den melancholischen auch ausgesprochene hochgradige Krankheitsanfälle mit dem Charakter der Manie, doch kömmt es auch bei ihnen nach Ablauf der Anfälle zu völliger Intermission von kürzerer oder längerer Dauer.

Die Kranken unter 4 und 5 sind alle im Stadium secundärer Störung mit mehr oder weniger stark ausgeprochenen Symptomen psychischen Verfalles, bei denen es also nie mehr zu freien Zwischenzeiten kömmt.

Digitized by Google

ad 6. Auffallend ist die geringe Anzahl der an *Dementia paralytica progress.* Leidenden. Eine theilweise Erklärung findet dieser Umstand dadurch, dass die Bevölkerung der Anstalt eine vorwiegend ländliche ist.

ad 7. Es sind dies alle mit Epilepsie behafteten Kranken, die in der Anstalt sind. Meistens ist bei ihnen die Form der Störung angeborner oder primaerer Schwachsinn, der sich nie wesentlich bisher änderte. Bei einem Drittheil der Fälle kommt es aber auch zu periodischen Anfällen hochgradiger Exaltation in verschiedener Form von nur ganz kurzer Dauer oder auch mit wochenlanger psychischer Störung.

ad 8. Sind alle Fälle von den verschiedenen Graden des Idiotismus und Cretinismus vereinigt, wenn der letztere Name in der Weise gebraucht wird, dass man ihn auf die Fälle des schweren Idiotismus anwendet, die auch von angebornen schweren körperlichen Missstaltungen begleitet sind. Es gehörte vielleicht noch mancher Fall hierher, der unter der Rubrik des secundaeren Blödsinns aufgeführt ist, bei dem aus Mangel jeder Anamnese die Diagnose mit Sicherheit nicht mehr zu machen war.

ad 9. In einem Falle entstand die *Dementia* in Begleitung von Lähmungs-Symptomen aller Extremitäten aus Onanie, in den andern beiden besteht sie neben den Symptomen einer cerebralen Heerderkrankung.

ad 10. Auch bei diesen Fällen entstand die geistige Schwäche ohne vorhergegangene anderweitige psychische Störungen in Folge der durch das Alter bedingten Hirnveränderungen. Die Kranken der Rubrik 11. waren fast alle unverbesserliche Trinker und theils zuvor schon, theils in Folge des Trinkens mit moralischen Defecten verschiedener Art behaftet. Fast alle kamen in die Irrenanstalt, nachdem alle andern Mittel fruchtlos geblieben waren, aus der Corrections-Austalt. Sie gehören der psychischen Störung nach in die Form der Moral insanity, indem die abnormen psychischen Erscheinungen mehr im Gebiete der moralischen als des intellectuellen Seelenlebens sich äussern.

Daneben bieten sie mehr oder weniger ausgesprochene Erscheinungen chronischen Alkoholismus körperlicherseits dar. —

Von den Geisteskranken litten an folgenden Complicationen:

An Sprachstörungen (Mangel der Sprache oder mühsames Hervorbringen einiger Worte . .	19 M.	26 Fr.,	45 im Ganzen,
Sehstörungen (hochgradige Sehschwäche bis Blindheit), . .	4 -	6 -	10 - -

Gehörstörungen (hochgradige Schwerhörigkeit bis Gehörlosigkeit	3 M.	6 Fr.,	9 im Ganzen,
An Hemiplegie	4 -	1 -	5 - -
An angebornen Difformitäten der untern Extremitäten . .	4 -	5 -	9 - -

---

Organisation der Anstalt.

Die Oberaufsicht über die Anstalt steht der Spitalpflege zu. Sie hat über Aufnahmen und Entlassungen zu entscheiden, die Verpflegungstaxe der Aufgenommenen zu bestimmen, überhaupt alle die Organisation der Anstalt betreffenden Bestimmungen unter Vorbehalt der Genehmigung des Regierungsrathes zu erlassen. Die nächste Aufsicht über die Anstalt im allgemeinen und über deren ärztliche, landwirthschaftliche und ökonomische Verwaltung insbesondere übt eine von der Spitalpflege bestellte Aufsichtskommission aus, die aus dem Präsidenten der Spitalpflege und 4 weitern Mitgliedern besteht, gegenwärtig einem praktischen Oekonomen und Finanzmann, 2 Aerzten und einem Geistlichen.

Den monatlich in Zürich stattfindenden Sitzungen der Spitalpflege wohnt der Director mit berathender Stimme bei, den wenigstens vierteljährlichen der Aufsichtskommission in Rheinau Director und Verwalter gemeinsam.

Die Leitung der Anstalt als solcher hat der Director, die Leitung und Besorgung der Oekonomie nach allen ihren Richtungen ein Verwalter, dem zur Beaufsichtigung der Landwirthschaft im besondern ein Oekonom beigegeben ist.

Die geistlichen Verrichtungen versehen zwei Geistliche aus der Nachbarschaft, die abwechselnd am Sonntag den Gottesdienst halten und unter der Woche einmal die Kranken besuchen.

Kellerei und Küferei besorgt ein Kellermeister mit einem Gehülfen, die Verwahrung der Speisevorräthe und die Vertheilung derselben ein Speisemeister. Ausserdem gehören männlicherseits zum Dienstpersonal 1) ein Metzgermeister, 2) ein Gärtner, 3) ein Heizer für das Waschhaus, 4) ein Portier, 5) ein Rebmann, 6) 7 Knechte für die Landwirthschaft. Zum weiblichen Dienstpersonal gehören 1) eine Weisszeugverwalterin, 2) 2 Köchinnen und eine Küchenmagd, 3) eine Waschfrau, 4) eine Hausmagd. Das Wärterpersonal besteht aus einem Oberwärter und 14 Wärtern, aus einer Oberwärterin und 19 Wärterinnen, wonach auf 15 männ-

Digitized by Google

liche Kranke ein Wärter und auf 13 weibliche eine Wärterin, auf etwa 14 Kranke im Ganzen eine Wartperson kommt.

Inneres Anstaltsleben. Die Haus- und Wärterordnung ist im Ganzen denen anderer Anstalten gleich. In der Praxis muss in der Pflegeanstalt noch mehr als in der Heilanstalt der Grundsatz herrschen, erstere in der mildesten Form anzuwenden und den Bestimmungen derselben den möglichst weiten Spielraum zu lassen.

Vor allem erwähne ich, dass seit dem Bestehen der Anstalt Non-restraint im vollen Sinne des Wortes durchgeführt werden konnte.

Beschränkung wurde bisher nur in folgenden Formen angewendet. Einmal bei zwei Kranken (1 männlicher und 1 weiblicher) wegen permanenten Zerzupfens der Kleider unter Tags das je nach Umständen längere oder kürzere Tragen von Handschuhen, die mit Schnallen am Handgelenk leicht befestigt sind. Dann vorübergehende Isolirung einzelner Kranken, die selten die Dauer eines Tages überschritt. Endlich andauernde Isolirung eines männlichen Kranken, der noch nie das Zusammenleben mit andern Kranken länger als eine Stunde ertrug.

Mit Ausnahme des letztern Kranken leben alle Kranken unter Tag gemeinsam in ihren Tagräumen. Während der Nacht ist es nöthig, durchschnittlich 20 Kranke beider Abtheilungen isolirt schlafen zu lassen. — Ich habe das Bestreben, den Kranken dasjenige Maass von Freiheit zu gestatten, das sie zu ertragen fähig sind. Es ist daher innerhalb der Abtheilungen und der dazu gehörigen freien Räume die Bewegung für den grössern Theil der Kranken eine ungehinderte. Nur je drei Abtheilungen eines Baues, nämlich die der Tobsüchtigen, der unruhigen und der theilweis ruhigen Blödsinnigen, unter denen die gefährlichen Kranken untergebracht sind, sind abgeschlossen, während die übrigen Abtheilungen frei unter sich und mit den Hofräumen communiciren können. Die Freiheit der Bewegung erstreckt sich aber auch auf den Verkehr mit der Aussenwelt. 45—50 geisteskranke Männer und 35—40 Frauen haben die Erlaubniss die Anstalt ungehindert verlassen zu dürfen, mit der Nachbarschaft zu verkehren, daselbst kleine Einkäufe zu machen, einen Schoppen zu trinken, oder selbst Besuche in grösserer Entfernung auf einen und mehrere Tage und Wochen zu machen. Zur Bestreitung solcher Ausgaben erhalten alle Kranke, die einen einigermassen vernünftigen Gebrauch

vom Gelde machen können, alle 4 Wochen einen halben Franken. Kranke, die sich durch besondern Fleiss und gutes Betragen auszeichnen, erhalten ausserdem eine vierteljährliche Gratification von Frs. 2—5. Wer seine Freiheit nicht missbraucht, hat den sogenannten freien Ausgang, das heisst, das Recht ohne vorher eingeholte Erlaubniss die Anstalt verlassen zu dürfen. Missbrauch der Freiheit führt bedingtes Ausgangsrecht nach sich, wonach der Kranke immer zuvor die Erlaubniss zum Verlassen der Anstalt einzuholen hat. Oefterer Missbrauch führt zum Entzuge der Freiheit. Für die andern, nur immer dazu passenden Kranken, finden jeden Sonntag, wenn es das Wetter erlaubt, gemeinsame Spaziergänge in Begleitung von Wartpersonen und zwar häufig mit Einkehr statt.

Für Aufenthalt und Beschäftigung der Kranken im Freien wird überhaupt nach Möglichkeit gesorgt. Bei der ausgedehnten Oekonomie gäbe es hinlänglich Arbeit für den grösseren Theil der Kranken, doch ist natürlich nur eine beschränktere Zahl fähig dazu.

Immerhin ermöglicht die Unternehmung von Erdarbeiten der verschiedensten Art auch geistig beschränktere Kranke im Freien zu beschäftigen.

Im Allgemeinen werden die Kranken auf folgende Weise beschäftigt:

Von den männlichen Kranken mit Holzarbeit 36, mit Landwirthschaft 34, mit Hausgeschäften 19, mit Wasserpumpen 12, mit Strohflechten 14, mit Gartenarbeit 5, mit Sandklopfen 5, mit Schneiderei 5, mit Schreinerei-Dreherei 4, mit Stricken 8, in der Waschanstalt 2, mit Bureau-Arbeiten 3, mit Küferei 2, mit Pappearbeit 2; als Portier 1, als Metzger 1, mit Spulen 1, als Uhrmacher 1, als Bote 1. Summa 151 im Ganzen.

Von den weiblichen Kranken beschäftigen sich: mit Stricken 53, mit Spinnen 34, mit Nähen 29, mit Küchengeschäften 25, mit Hausgeschäften 16, mit Waschen 11, mit Bügeln 4, mit Charpiezupfen 12, Spulen 3, Endeschuharbeit 1. Summa 188 im Ganzen.

Im Sommer lassen sich etwa 30 Frauen zur Feldarbeit verwenden. Zu zeitweiliger, das heisst im Ganzen unregelmässiger Arbeit lassen sich bringen: 18 M., 24 Fr., 42 im Ganzen.

Völlig zu solcher Arbeit unfähig sind: 56 M., 50 Fr. 106 im Ganzen.

Alle Kranken, die in den nicht geschlossenen Abtheilungen untergebracht sind, also über die Hälfte derselben haben einen eigenen Kasten mit Schlüsseln zur Verfügung, so dass sie ihre Hab-

Digitized by Google

seligkeiten selbst aufbewahren und besorgen können. Wer dies unordentlich thut, den geschlossenen Kasten missbraucht, dem wird der Schlüssel je nach Umständen für einige Zeit oder für immer abgenommen und der Wärter bekommt den Kasten zur Besorgung.

Es ist auf diese Weise den Kranken die Möglichkeit geboten, das Maass sittlicher und intellectueller Freiheit, das noch in ihnen vorhanden ist, praktisch zu verwerthen, sowie die fortdauernden persönlichen Beziehungen mit der Aussenwelt sich zu erhalten.

Ich erlaube mir noch die Verhältnisse unserer Anstalt und ihrer Bewohner vom Gesichtspunkte der neuesten Irrenpflege-Reformenbestrebungen aus zu betrachten.

Rheinau ist also nicht nur Irrenpflegeanstalt, sondern es dient auch unheilbaren und solchen Geisteskranken zum Aufenthalt, die arbeitsunfähig sind, völliger Pflege bedürfen; es ist also die Verbindung der Irrenpflege mit der Versorgungsanstalt.

Gegen die Berechtigung einer solchen Verbindung kann Niemand etwas einwenden, besonders wenn in der Bauart, Einrichtung und Organisation der Anstalt die Möglichkeit geboten ist, dass die Kranken beider Kategorien sich gegenseitig nicht stören, und die denselben zuträglichen Verhältnisse gehörig gewahrt werden können.

Ich glaube allerdings, dass die der Versorgungsanstalt zugehörigen Pfleglinge nicht der Staatsfürsorge übergeben werden sollten.

Ich halte es auch nicht für zweckmässig, dass davon eine allzugrosse Menge (mehr als 50) in gemeinsamen Häusern untergebracht werden. Für solche Kranken dienten wohl am besten Bezirks- und Kreisanstalten für eine Bevölkerung von 30 bis 50000 Seelen berechnet. Es könnten in solchen auch einige Zimmer vorhanden sein, in denen andere körperliche Kranke Verpflegung und Behandlung finden könnten, z. B. Krätze-, Syphilis-Kranke, acut körperlich Kranke, die keine häusliche Stätte haben oder eine solche, in der sie die gehörige Pflege nicht finden können.

Also den letzten Modus hielt ich für den besseren, während der erstere, die Verbindung der Pflege- mit der Versorgungsanstalt, ein jedenfalls zu rechtfertigender ist. —

In Versorgungsanstalten gehörten also unsere körperlich Kranken, Stummen, Blinden, mit angebornen Difformitäten Behafteten, Altersschwachsinnigen, Altersschwachen, die an *Dementia primaria* und ¼ der an *Dementia congenita* Leidenden, während die stumpf-

sinnigen Epileptiker nur ausnahmsweise dorthin passen, da intercurrirende Zornanfälle, tiefere Störungen des an sich schwachen Bewusstseins und dadurch anhaltendes Störendwerden fast ausnahmslos bei denselben vorkommen.

Im Durchschnitt unter unsern auf 500 gerechneten Anstaltsbewohnern würden etwa 120 (60 Männer, 60 Frauen) dorthin gehören.

Es blieben also noch 380 Kranke für die Irrenpflegeanstalt.

In solche Häuser will *Griesinger**) nur arbeitsfähige oder strenger nur arbeitende Kranke bringen; denn p. 33 heisst es, dass dort alle arbeiten müssen, Arbeitsunfähige oder es werdende dem Versorgungshause zugehören. P. 31 will er aber in der geschlossenen Anstalt auch solche Geisteskranke beherbergen, welche wegen körperlicher Krankheit etc. eine besondere Pflege bedürfen, ohne doch dem Versorgungshause anheimfallen zu können.

Doch abgesehen von den Kranken der letztern Art wird man in der Pflegeanstalt auch immer noch eine Anzahl aus andern Gründen nicht arbeitender Kranken finden.

In der Pflegeanstalt blieben also die periodisch und circulair Gestörten, die an den secundären Stadien der Geisteskrankheit Leidenden, die mit Moral insanity Behafteten, die Aufgeregten mit *Dementia congenita* und *Dementia paralytica*, die epileptischen Geisteskranken. Von diesen nun sind es 80 — 30 Männer und 50 Frauen —, die sich nicht beschäftigen. Etwa 20 davon, 5 Männer, 15 Frauen, möchten noch mit mehr oder weniger Unbequemlichkeiten in die Versorgungsanstalt untergebracht werden können, obwohl bei mehreren von diesen zeitweilige Zurückversetzungen in die Irrenanstalt in wahrscheinlichster Aussicht stünde. Die Uebrigen gehören durchaus in dieselben.

Etwa 25 — 14 Männer, 11 Frauen — sind durch Alter oder körperliche Unbeholfenheit unfähig zur Arbeit. Die andern 35 sind Arbeitsverweigerer aus System oder es sind zu plötzlichen Gewaltthaten, raffinirten Fluchtversuchen der Art angelegte Individuen, dass man ihnen nach Möglichkeit jede Gelegenheit dazu nehmen will.

Mit einem noch stärkeren Apparat von Aufsichtspersonal liesse sich noch Mancher vielleicht zur Arbeit bringen, doch wären die Opfer zu diesem Zweck wohl zu gross.

Wenn auch die Kranken hiesiger Anstalt durch den früheren Aufenthalt, woselbst ihnen vielfach die Gelegenheit zur Beschäf-

---

*) Archiv für Psychiatrie etc. I. 1.

Digitized by Google

tigung abging, nicht so recht an Arbeitsamkeit gewöhnt sind, so sind sicher noch manche Anstalten, in denen diese Verhältnisse noch ungünstiger sind.

Unter allen Umständen aber wird in der Pflegeanstalt stets eine grössere Anzahl nicht arbeitender Kranken untergebracht sein.

Von den 300 arbeitenden Kranken können ohne Anstand 40—50 Männer und 20—30 Frauen mit der Feld- und Gartenarbeit beschäftigt werden. Natürlich leistet nicht Jeder das Gleiche, aber Jeder leistet doch wenigstens etwas Ausgiebiges. Immerhin sind aber unter den arbeitenden Kranken überhaupt 28 Männer und 26 Frauen mit einer solchen Arbeitsleistung, dass ihre Verrichtungen denen von 27 rüstigen Arbeitern gleichkommt, nachdem ihre Arbeitszeit eben auch die Hälfte der für jene üblichen Arbeitszeit erreicht. Im Nothfalle füllt aber auch die Hälfte von ihnen den Platz eines wirklichen Arbeiters aus. — Von den 360 Kranken also, für die wir die staatliche Aufsicht und Verpflegung für nothwendig halten, gehören die 60 nicht arbeitenden unbedingt in die geschlossene Anstalt.

Von den übrigen 300 arbeitenden Kranken glaube ich, dass die eine Hälfte die geschlossene Anstalt nöthig hätte, während für die andere Hälfte irgend eine freiere Verpflegungsform zulässig wäre.

Ich würde mir dieselbe unter den nöthigen Bedingungen wohl durchzuführen getrauen.

Ich würde ohne Bedenken von unsern 60 — 80 zum Feldbau geeigneten Kranken 40 auf das von der Anstalt abgesonderte Gut bringen, und daselbst unter der Aufsicht unseres Oekonomen ihrer Beschäftigung obliegen lassen. Es liessen sich wohl noch 10 bis 20 weitere Kranke heranziehen für eine solche Verpflegung, so dass noch etwa 100 übrig blieben, die für eine agricole Verpflegung nicht passen, aber auch die geschlossene Anstalt nicht unbedingt nöthig haben. Ich bin überzeugt, dass die Meisten von ihnen für das familiale System passten.

Die familiale Verpflegung ist eine doppelte, indem einmal die Kranken überhaupt ausser der Anstalt bei Privaten im Lande umher untergebracht sind und dann mit ersteren in keiner weiteren Verbindung stehen. Oder die Kranken sind bei Privaten in solcher Nähe einer Anstalt untergebracht, dass deren Verpflegung von den Anstaltsärzten überwacht werden kann.

Ich glaube, dass die erstere Art der familialen Verpflegung von vorn herein für die hiesigen Verhältnisse auszuschliessen ist,

wenn auch dieses System anderswo (wie z. B. in Schottland) mit Erfolg ausgeübt wird.

Wenn man weiss, mit welchen Schwierigkeiten es verbunden ist, Geistesschwache und Gestörte privatim hier unterzubringen, hieraus allein schon können die Schwierigkeiten der familialen Irrenverpflegung dieser Art einleuchten. Und sind solche endlich einmal untergebracht, dann möchte man untersuchen, wie sie untergebracht sind, und ob nicht der Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt gegenüber einer solchen Verpflegung in freiesten Verhältnissen nicht nur an sich, sondern auch eine von den Verpflegten selbst anerkannte Wohlthat ist.

Ueberhaupt ist diese Art der Verpflegung von den Irrenärzten schon lange praktisch ausgeübt, also von vornherein principiell anerkannt worden, indem ja aus Irrenanstalten alljährlich genug ungeheilte, unheilbare Kranke entlassen werden in der Hoffnung, dass selbe in Familien leben können. Die Meisten von ihnen kommen wieder in die geschlossene Anstalt zurück und zwar nach meiner Erfahrung kommen sie nicht ungern zurück.

Wenn man dazu noch den Zustand, in dem sie die Anstalt verlassen haben, mit dem vergleicht, in dem sie wieder in dieselbe zurückgebracht werden, so fällt der Vergleich wohl grösstentheils zu Gunsten der Anstalt aus, so dass der Irre der Irrenanstalt denn doch nicht als der schlimmere erscheint gegenüber dem der freien Verpflegung.

Es erübrigt also noch die zweite Form der familialen Verpflegung, nämlich die irrenärztlich organisirte, überwachte und geleitete, die in Verbindung mit einer Anstalt stehende. Bedürfte die Ausführung derselben nur eines organisatorischen Talentes, so wäre die Sache allerdings einfach genug. Doch auch *Gheel* ist nicht das Werk solcher, sondern es ist die allmälig reifende Frucht eines Jahrhunderte dauernden Wachsthums und Entwickelns. Die grossartigen dort gemachten Erfahrungen aber darf und kann die Psychiatrie nicht unberücksichtigt lassen. Sie werden früher oder später eine Modification der bisherigen Verpflegungsart der Geisteskranken nach sich ziehen. Die Irrenärzte haben die dringendste Pflicht, dieselbe vorzubereiten, statt sich in einen unfruchtbaren Kampf hinsichtlich einer Frage einzulassen, die die Erfahrung schon entschieden hat.

Ich habe schon oben angeführt, dass 100 meiner Kranken ohne Anstand in Familien verpflegt werden könnten, insofern eine irrenärztliche Ueberwachung derselben stattfände.

Ich bin auch überzeugt, dass deren Kräfte bei den verschie-

Digitized by Google

denen Vorkommnissen einer Haushaltung noch nützlicher zu verwerthen wären, als es in der Anstalt der Fall ist.

Ueber die praktische Durchführung der Sache unterlasse ich es, meine Meinung anzuführen, da eine solche von Umständen abhängt, über die der Irrenarzt nicht verfügen kann.

Ich wollte im Vorhergehenden nur meine Uebereinstimmung mit dem Satze anzeigen, dass die jetzigen Bewohner der Irrenanstalten durchaus nicht alle der geschlossenen Anstalt bedürfen, dass es Verhältnisse giebt, in denen sie für sich und für andere vortheilhafter unterzubringen wären.

Nach obigen Auseinandersetzungen nämlich haben von 500 Kranken, wie sie hier untergebracht sind, allein etwa 220 die geschlossene Anstalt nöthig.

Zum Schlusse noch einige Bemerkungen über die Anzahl der Irren in unserm Kanton und über das Verhältniss der staatlichen Fürsorge zu derselben. Die letzte Zählung der Geistesschwachen und Geisteskranken war im Jahre 1851, und ergiebt nach einer Zusammenstellung eine Anzahl von 1252 Kranken, wovon über zwei Fünftel der Rubrik der *Dementia congenita* oder doch der vor dem 8ten Lebensjahr erworbenen angehörten, nämlich 510. Nimmt man angeboren Geistesschwache und Gestörte zusammen, so traf damals 1 Geisteskranker auf 200 Geistesgesunde, während es Bezirke gab, in denen das Verhältniss noch weit ungünstiger war. Z. B. traf in einem Bezirk 1 Kranker auf 110 Gesunde*).

Nimmt man das Verhältniss der Geistesgestörten allein, so traf 1 Geisteskranker auf 337 Einwohner. Jedenfalls ist es sicher, dass nicht zu viel Kranke in der damaligen Zählung aufgenommen wurden. Ebenso wird der Canton Zürich kaum eine Ausnahme bilden, und nicht wie die andren Staaten wenigstens in einem der Bevölkerung überhaupt entsprechenden Verhältnisse in Betreff der Anzahl der Geisteskranken und Geistesschwachen zugenommen haben. Man darf daher als höchst wahrscheinlich annehmen, dass das gegenwärtige Verhältniss der Kranken zu den Gesunden wenigstens ein der früheren Zählung entsprechendes sei.

Es wäre demnach gegenwärtig ihre Anzahl etwa 1500. — Von diesen sind gegenwärtig der frühern Angabe gemäss 436 in Rheinau untergebracht und können, bis die Anstalt einmal gefüllt

---

*) Nach Dr. *Zinn* (die öffentliche Irrenpflege im Canton Zürich) trifft 1 Kranker auf 192 Gesunde im ganzen Canton; in jenem Bezirk nach ihm 1 Kranker auf 119 Gesunde. —

ist, 480 aufgenommen werden, insofern in bisheriger Weise bei der Aufnahme auch nur körperlich Kranke berücksichtigt werden.

Nach Vollendung der Heilanstalt kann man etwa 200 rechnen, die aus dem Canton darin Aufnahme finden können, so dass zu dieser Zeit der Canton Zürich 680, also noch nicht die Hälfte seiner Geistesschwachen und Geisteskranken in Anstalten versorgen kann.

Ich glaube nicht, dass diese Zahl für eine längere Reihe von Jahren genügen wird. Es wird wohl in nicht zu ferner Zeit Rheinau ausschliesslich von Geistesalienirten in Anspruch genommen werden. Ja, man wird zuletzt zu den verschiedenen andern Formen der Irrenverpflegung übergehen müssen, um den Aufnahmsgesuchen entsprechen zu können.

Es kamen in den letzten 9 Monaten etwa 180, also durchschnittlich im Monat 20 Aufnahmsgesuche für Geistesschwache oder unheilbare Geisteskranke.

Es betreffen diese Gesuche fast ausschliesslich die ärmeren Bewohner des Cantons, so wie auch die gegenwärtige Anstaltsbevölkerung grösstentheils diesen Kreisen angehört, da der wohlhabendere Theil der Bevölkerung meistens für seine Kranken zu aussercantonalen Anstalten seine Zuflucht nimmt. Man kommt diesen Thatsachen nach gewiss nicht zu weit, wenn man annimmt, dass mit der Zeit der Canton für 1000 Geistesschwache und Geisteskranke Unterkommen und Versorgung zu schaffen hat, also für $\frac{1}{3}$ seiner geistesgestörten Bevölkerung.

Es erscheint diese Summe zwar im ersten Augenblick sehr gross, doch ein Staat, der eine solche Summe für das Irrenwesen ausgegeben hat, wie der Canton Zürich, wird auch den Anforderungen und Bedürfnissen seiner Bevölkerung völlig gerecht werden. Uebrigens stände er auch dann noch nicht in dieser Beziehung allein da.

So waren 1858 in Belgien von:
6451 Geisteskranken 4420;
in England 1865 von:
44695 Geisteskranken 29425;
in Schottland von:
8207 Geisteskranken 6515;
in Irland von:
16399 Geisteskranken 8485;
in Hamburg von:
1100 Geisteskranken 300 in Anstalten versorgt.

Digitized by Google

Auf Grund der mit Dr. Rudolf Blochmann über Anschlussmaße und Befestigung einer Pflug-Anhängevorrichtung angestellten Versuche, sowie der Erfahrungen, welche mit dem Blochmann'schen Anschlusse bei Pflügen gemacht worden sind, hat der Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten für die Anhängung von Pflügen mit mehrscharigen Kreuzpflügen folgende Normalien aufgestellt. Dieselben umfassen die Anschlussmaße für Pflüge mit Anhängevorrichtung, die Befestigung der Vorrichtung am Pflugbaume, sowie die Anordnung der Vorrichtung selbst, welche in den nachfolgenden Figuren dargestellt ist.

Anordnung.

Pflüge mit Anhängevorrichtung.

A. Schnitt nach Linie a-a, Grundriss.

B. Hinterer Anschlussbolzen. C. Vorderer Anschlussbolzen.
a. Unterlage.
b. Schraubenbolzen.
c. Mutter mit Bund.
d. Splint.
e. Kopf mit Bund.
f. Kopf mit Splint.

Anordnung. Die mit C bezeichneten Bolzenmaße sind für Spur-Anhängevorrichtungen, die mit B für gewöhnliche Anschlussvorrichtungen.

Verhandlungen psychiatrischer Vereine.

Der psychiatrische Verein zu Berlin — hielt am 15. December a. pr. seine fünfte Sitzung unter persönlicher Theilnahme der Collegen *Boettger*, *v. Gellhorn*, *Hecker*, *Ideler*, *Laehr*, *Levinstein*, *Liepelt*, *Müller*, *Nötel*, *Schroeter* und *Sponholz*. Der Vorsitzende gedachte zunächst des grossen Verlustes, den der Verein sowohl als die Psychiatrie überhaupt durch den Tod zweier Mitglieder, des Geh. Raths Dr. *Griesinger* und Director Dr. *Kern*, erlitten habe, widmete ihrem Andenken ehrende Worte und forderte die Anwesenden auf, sich von ihren Sitzen zu erheben.

Als Geschenk war vom Medicinalrath Dr. *Kelp* aus Wehnen eingegangen dessen Uebersetzung der Vorträge *Erichsen*'s „über die Verletzungen der centralen Theile des Nervensystems, vorzüglich durch Unfälle auf Eisenbahnen." Der Vorsitzende beauftragte den Secretair, Herrn *Kelp* den Dank des Vereins auszusprechen und übergab das eingegangene Werk dem Journal-Zirkel. In Bezug auf letzteren wird eine geeignete Auswahl der zu versendenden Journale getroffen.

Dr. *Böttger* theilte hierauf einen Fall von Irresein nach Bleiintoxication mit:

Herrmann S., 41 Jahr alt, Zimmermaler, stammt aus einer Familie, in welcher Geistesstörungen zeither nicht vorgekommen sind. — Sein Vater war ein Sonderling, war aber physisch gesund, ebenso seine Mutter; letztere lebt noch. — Patient erlernte die Stubenmalerei in seiner Heimath, ging später nach Berlin, und besuchte, während er daselbst conditionirte, die Kunstakademie; ausserdem beschäftigte er sich, sein nicht unbedeutendes musikalisches und Sprachtalent daselbst auszubilden. Von Berlin ging Pat. nach Magdeburg und beschäftigte sich daselbst mit Portraitiren und Ausführung ein-

Digitized by Google

zelner grösserer Bilder, die jedoch sich über das Niveau des Gewöhnlichen nicht erhoben. — Inzwischen starb der Lehrherr des S. in Egeln und da die Aussichten daselbst günstig schienen, siedelte Patient dahin über und betrieb neben der Oel- „auch die Decorationsmalerei". Anfangs blühte das Geschäft, allmählich wurde es durch Concurrenz etwas geschmälert, jedoch nicht so, dass Patient nicht mit seiner Familie (er hatte sich inzwischen verheirathet und war Vater zweier Kinder) sein gutes Auskommen gehabt hätte. — Im Jahre 1864 stellten sich einige Mal leichte Verdauungsstörungen ein, die bei einer entsprechenden Behandlung jedoch leicht schwanden, sonst war Pat. völlig gesund. Im Frühjahr 1865 bekam *S.* den Auftrag, den Gasometer in Egeln zu streichen. Die dazu verwandte Farbe bestand aus Mennige und da die zu streichende Fläche eine sehr grosse war, brachte *S.* tagelang mit der Arbeit zu, die überdies bei hoher äusserer Temperatur und unter sehr unvollkommenem Luftzutritt stattfinden musste. — Bald danach stellten sich Verdauungsstörungen, Verstopfung, Druck und Schmerz im Unterleib ein und nach 4wöchentlichem Bestehen dieser Symptome begann der Kranke eine auffällige Aenderung seiner Stimmung zu zeigen. Der sonst gesellige umgängliche Mensch wurde stiller, begann sich mehr zurückzuziehen, er wurde mürrisch und reizbar, so dass ihn die unbedeutendsten Aergernisse des täglichen Lebens sehr aufregten. Patient begann sich darüber zu äussern, dass er nicht mehr mit seiner Familie auskommen könne, er müsse mit dieser verhungern, zeigte beträchtliche Präcordialangst und trug sich mit Selbstmordgedanken. Kurzum, es zeigten sich die Symptome einer activen Melancholie, welche sich rasch erheblich steigerten. Nahrung nahm Patient unregelmässig und nur wenig, ausserdem klagte er oft über grosses Kältegefühl und Zusammmenschnüren des Unterleibs. Allmählich zeigte sich immer grössere Schlaffheit und Unthätigkeit und da Patient nunmehr auch jede ärztliche Behandlung energisch von sich wies, wurde seine Unterbringung in das Asyl Carlsfeld beschlossen, wo er am 13. Juli 1865 eintraf.

Status praesens. Patient ist von mittelgrosser schlanker Statur und leidlich gut genährt. Schädel wohl gebildet. Gesichtsfarbe etwas kachektisch, gelblich. Wangen und Augenlieder etwas geröthet. Sinnesorgane gesund. Das Zahnfleisch zeigt an den Zahnrändern einen mässigen schiefrigen Belag, wie man ihn bei Bleiintoxication zu finden pflegt, desgleichen ist auch der Athem von üblem Geruche. Die Zunge, welche gerade herausgestreckt wird, ist in ihren hinteren Partieen schwach weisslich belegt. Schwacher Rachencatarrh.

Hals und Brust völlig normal.

Bauch durchaus tympanitischen Ton zeigend. Leber und Milz ohne Abnormitäten. Bauchdecke aufgetrieben, hart, bei Druck nicht schmerzhaft. —

Im ganzen Wesen des *S.* zeigt sich eine grosse Schlaffheit und Schwerfälligkeit; auch seine psychischen Functionen, sein Denken ist ein langsames; sein Gedächtniss scheint an Schärfe verloren zu haben. Grosse Neigung zum Schlaf und zum Ruhen; jeder Thätigkeit abhold liegt Patient meist auf dem Sopha und ist nur mit Mühe dazu zu bewegen, sich irgendwie etwas zu beschäftigen. Häufige Klagen über Kopfweh, äusserst hartnäckige Stuhlverstopfung, so dass Entleerung nur durch Laxantien und Clysmata zu erzielen sind. Gebrauch von Sennainfusen und dem Decoct. cort. rhamni. — In dem beschriebenen Zustande verblieb Patient fast 2 Monate, dann begann sich allmählich eine grössere geistige Regsamkeit zu zeigen. Der Kranke wurde umgänglich, arbeitete ab und zu, und klagte seltener. — Körperliche Bewegungen, Arbeiten im Freien, z. B. Holzsägen, Gartenarbeit etc., gleichzeitig aber auch Wiederaufnahme der früher von ihm so eifrig geübten Musik und des Zeichnens beschäftigten den Patienten abwechselnd; er begann Sehnsucht nach seiner Familie und nach geregelter Thätigkeit zu zeigen und so war es möglich, dass am 4. December 1865 der Versuch seiner Entlassung gemacht werden konnte. — Leider war die erzielte Besserung von kurzer Dauer; Patient verfiel daheim wieder in den alten Zustand, es traten Aufregungszustände ein, welche die Unterbringung des Patienten in die Provinzial-Anstalt zu Halle nöthig machten. — Daselbst verschlechterte sich Patient allmählich, er verfiel in Blödsinn und starb im Laufe vorigen Jahres.

Der mitgetheilte Fall veranlasste mich zu einer genauern Revision der sonst zugänglich in der Literatur verzeichneten Beobachtungen und es ergab sich daraus ungefähr Folgendes:

Sämmtliche Fälle oder wenigstens die grosse Mehrzahl zeigt ein Krankheitsbild, welches dem einer *Dement. paralytica* täuschend ähnlich ist. — Die Prodromen zogen sich oft lange Zeit hin und bestanden hauptsächlich in Congestivzuständen, Neuralgieen, Tremor, leichter Ermüdung und hypochondrischer Gemüthsstimmung. Die Intoxicationssymptome gingen zuweilen der Psychose voran, meist jedoch entwickelten sich beide gleichzeitig. Das Gedächtniss war in allen Fällen erheblich geschwächt, zuweilen gänzlich erloschen. — Von Seiten der Motilität war der Tremor öfters das einzige Zeichen, in den meisten Fällen war der Gang auch der paralytische, die Sensibilität war bedeutend herabgesetzt. Nadelstiche wurden nicht oder nur wenig empfunden. — Im übrigen bot der Verlauf

nichts von dem klinischen Bilde der *Dementia* Abweichendes. Zeitweilig traten epileptiforme Anfälle auf, welche in einzelnen Fällen den Tod zur Folge hatten. Auch zeigte sich in einigen Fällen, allerdings der Minderzahl, ein günstiger Ausgang; der Patient wurde geheilt, namentlich in frischen Fällen, öfters wenn die Symptome nur einen völligen Verfall in Blödsinn erwarten liessen. — Die in den lethal endigenden Fällen vorgenommene Autopsie bot nichts Erhebliches, nur die sonst gewöhnlichen Erscheinungen chronischer Entzündungsvorgänge. — Die chemische Analyse konnte in einigen Fällen das Blei im Gehirn nachweisen.

Dr. *v. Gellhorn* machte weitere Mittheilungen über den von Dr. *Boettger* beobachteten Fall:

Der in Rede stehende Kranke sei im October a. pr. in der Provinzial-Irrenanstalt bei Halle verstorben und habe die durch den Dr. *Köhler* zu Halle vorgenommene, aber noch nicht beendete Analyse mit Wahrscheinlichkeit Blei in der Hirnsubstanz ergeben. Dr. *v. Gellhorn* vervollständigte dann das klinische Bild des vorliegenden Falles, zeigte, wie derselbe mehrfachen Wechsel von Depressions- und Exaltations-Stadien mit Grössenwahn, sowie eine längere Remission durchgemacht habe, um schliesslich bei zunehmender geistiger Schwäche in einem Zustande von Abulie mit Nahrungsverweigerung sein Ende zu finden. Nach einigen Mittheilungen aus dem Sections-Protokoll sprach Redner schliesslich die Ansicht aus, dass der vorliegende Fall wohl unter die Sammelgruppe der *Dementia paralytica* zu stellen sei.

Eine genauere Beschreibung dieses interessanten Falles wurde von Dr. *v. Gellhorn* vorbehalten.

Hierauf machte Dr. *Noetel* Mittheilungen über die Temperaturverhältnisse bei Epileptischen.

Bei fünf epileptischen Mädchen wurden in einem Zeitraum von drei bis zwölf Wochen regelmässige Temperaturmessungen des Morgens gegen 9 Uhr, des Abends gegen 6 Uhr vorgenommen. In den drei ersten Fällen, bei denen die epileptischen Insulte unregelmässig, selten zu drei bis vier an einem Tage auftraten, wurde nur ausnahmsweise einmal nach einem Anfalle die Höhe von 38,4° C. erreicht; sonst blieb die Temperatur stets unter 38,0°. Die höheren Temperaturen wurden nicht immer in den den Anfällen zunächst liegenden Tageszeiten erzielt; es kam auch vor, dass eine höhere Steigerung erst an dem folgenden, selbst anfallsfreien Tage auftrat. Die Messungen, welche unmittelbar nach Anfällen gemacht wurden, er-

gaben verschiedene Resultate. Im zweiten Falle blieben die desfallsigen Temperaturen um zwei bis drei Zehntel Grad unter der höchsten Höhe; im dritten stieg sie einmal bis zu derselben, blieb drei Mal ein und mehrere Zehntel Grad unter derselben und zeigte von den beiden Malen, da zufällig auch unmittelbar vor dem Anfall gemessen worden war, ein Mal eine Abnahme um ein Zehntel Grad, das andere Mal eine Zunahme um zwei Zehntel Grad gegen die Temperatur vor dem Anfall.

In vielen Fällen traten die Anfälle mehr periodisch und zwar dann mehrere Nächte hinter einander zu drei bis vieren auf. Sobald an einem Tage die Temperatur von 37,7° C. überschritten wird, sind auch die Nacht mehrere Anfälle notirt. Nur einmal trat Morgens eine Temperatur von 38,0 auf, ohne dass in der Nacht oder am Tage vorher sich Anfälle gezeigt hätten. Die höchste erreichte Höhe beträgt 38,3° C.; öfters wird das Maximum der Steigerung erst am Abend erreicht, eben so oft aber folgt auch auf die morgendliche Steigerung ein abendlicher Abfall. Im Zusammenhang mit diesen Temperatursteigerungen können in diesem Falle vielleicht die zu mehrfachen Beschwerden Veranlassung gebenden, mehr oder weniger ausgedehnten Alterationen der Zunge und Verletzungen an einem Ellenbogen gebracht werden.

Im fünften Falle traten die Anfälle in der ersten Periode der Beobachtung nur vereinzelt auf und verhielten sich die Temperaturen in dieser Zeit wesentlich analog den drei zuerst angeführten Fällen. In der zweiten Periode werden bei gehäuften Anfällen hohe Temperaturen bis über 38,0° C. erreicht, ohne dass aber die höchsten Steigerungen sich auf die den Anfällen zunächst liegenden Zeiten beschränkten, noch auch der Zahl der Anfälle entsprächen. In der dritten Periode traten endlich die Anfälle wieder nur vereinzelt auf, ohne dass sich der Gang der Temperatur wesentlich verändert hätte; er behielt den Typus des unregelmässig remittirenden Fiebers bei und es wurden nur noch bedeutendere Steigerungen bis 39,9° C. beobachtet. Schon in der zweiten Periode wurde eine Lungentuberculose nachgewiesen, welche im weiteren Verlaufe immer bedeutendere Fortschritte machte.

Muss es schon in den vier ersten Fällen mindestens zweifelhaft erscheinen, ob die beobachteten Temperatursteigerungen auf Rechnung der Anfälle als solcher zu setzen sind, so wird es im letzten Falle gewiss gerechtfertigt erscheinen, wenn man die Lungentuberculose und nicht die epileptischen Anfälle für dieselben verantwortlich macht.

Digitized by Google

Dr. *Ideler* brachte zur Kenntniss des Vereins, dass im Anschluss an die jüngst hier stattgefundenen Kirchen- und Schulvisitationen Seitens des betreffenden Superintendenten ein Besuch auf den einzelnen Stationen der städtischen Irrenverpflegungsanstalt in Aussicht gestellt worden sei, der den Zweck gehabt, sich an Ort und Stelle zu überzeugen, wie der Anstalts-Geistliche auf die Kranken selbst einwirke. Es sei dieser Besuch des Herrn Superintendenten durch die Armen-Direction, Abtheilung für die Verwaltung der Irrenverpflegungsanstalt, der die qu. Angelegenheit zur Entscheidung vorgelegen habe, abgelehnt, demselben aber anheimgegeben worden, dem Gottesdienst, welcher für eine beschränkte Anzahl von Geisteskranken in einem der Anfenthaltssäle stattfindet, beizuwohnen, da hiergegen ärztliche Bedenken nicht obwalteten. Die Anwesenden billigten diese Massnahme.

Dr. *Boettger* demonstrirt einen Fall von grossem Schädeldefect und Vernarbung der einen Hemisphäre in Folge bedeutender Schädelverletzung bei einem Epileptiker unter Vorzeigung des Präparates. (cf. Taf. I. Fig. 1. u. 2.)

Sophie Rüprich, 66 Jahre alt, aus Zennewitz, stammt aus einer Familie, in welcher Geisteskrankheiten sonst nicht weiter vorgekommen sind; über ihren früheren Gesundheitszustand, ihren Entwicklungsgang, sowie über ihr psychisches Verhalten vor der Verletzung konnte ich nichts Genaueres erfahren. Im 17. Jahre half Patientin, welche bei einem Bauer im Dienst stand, demselben beim Fällen eines Baumes und zwar sollte sie an einem an der Spitze des Stammes angeschleiften Seile den Stamm zu Falle bringen; dies geschah aber in so unglücklicher Weise, dass Patientin noch von dem fallenden Baume getroffen wurde. — Die erlittene Verletzung war eine sehr beträchtliche, sie bestand in einer Fractur des Scheitel- und Stirnbeins, sowie einer ausgedehnten Verletzung des Gehirns und seiner Häute; über deren weiteren Verlauf, Therapie etc. gar nichts zu ergründen war. Die Wunden sind geheilt, jedoch die psychischen Functionen blieben gestört, die Kranke wurde blödsinnig, epileptisch und behielt eine Contractur der rechten oberen Extremität und zeigte mässige Hemiplegie der rechten Seite überhaupt. — Die Verletzung hatte die linke Kopfhälfte betroffen, es fand sich daselbst, von der Stirn nach dem Scheitel verlaufend, eine circa 14 Centimeter lange, unregelmässige Narbe, bei deren genauerer Untersuchung sich ein bedeutender Knochendefect leicht constatiren liess. — Gehirnpulsationen liessen sich an dieser Stelle nicht beobachten.

— Die Kranke war, wie erwähnt, blödsinnig; ihr Sprachvermögen jedoch durchaus nicht gestört, sie spricht und articulirt völlig gut und sicher, spricht oft viel, kann vorgesprochene Sätze sehr gut nachsprechen, und liefert somit einen sprechenden Gegenbeweis gegen die *Dax*'sche und *Broca*'sche Ansicht, welche bekanntlich das Sprachvermögen in der dritten linken Stirnwindung zu localisiren versuchte. — Die Patientin starb im Juni 1868 nach kurzer Krankheit und es wurde mir die Section, welche sich allerdings der Umstände halber auf die Schädelhöhle beschränken musste, gestattet. Bei dem Hautschnitt fand ich bereits die Kopfschwarte durch eine wesentliche Fettablagerung bedeutend verdickt und beim weiteren Abtrennen der ersteren gerieth man an der Stelle der Narbe direct in die Höhle des Seitenventrikels, aus welcher sich massenhaftes Serum ergoss. Schädeldecke ist dick, massiv, nirgends durchscheinend, die Gefässfurchen sind auffallend tief und in der Gegend der Verletzung von Knochenwucherungen überbrückt, der Schädel selbst ist etwas asymmetrisch, die Suturen sind sämmtlich verknöchert. Auf dem linken Stirn- und Scheitelbein zeigt sich ein schräg von vorn und innen nach hinten und aussen gestelltes Loch von 10 Centimeter Länge und 5 Centimeter Breite, die Ränder desselben sind theils glatt, theils scharfkantig; an dem inneren Rande des Loches zeigt sich eine scharf vorspringende Knochenecke. Die Dura ist in ihrer ganzen Ausdehnung mit dem Schädeldache verwachsen und an der Stelle der Verletzung auch mit der Kopfschwarte völlig verknöchert. Die übrigen Häute verdickt und getrübt. Sinus wenig Gerinnsel enthaltend, völlig permeabel.

Die linke Hemisphäre präsentirt sich in ihrer Convexität als ein schlotternder Sack, Gyri linkerseits ganz verschwunden, durch Narbengewebe ersetzt, die Innenwand des Ventrikels zeigt zahlreiche Adhäsionen, als Reste alter stattgehabter Entzündungsvorgänge. Die Ventrikelhöhle, wie bereits erwähnt, mit Serum angefüllt, auf dem Boden hin und wieder Granulation. Die übrigen Hirntheile sind gesund und bieten microscopisch keine Abnormitäten dar.

Die ferner angekündigten Vorträge anzuhören verhinderte die vorgeschrittene Zeit.

Dr. *Ideler*, z. Z. Secretair.

Fünfte Jahresversammlung des Vereines schweizerischer Irrenärzte am 10. und 11. September 1868 in Rheinau, Pflegeanstalt des Cantons Zürich. — Anwesend waren: die Herren *Binswanger* von Kreuzlingen, *Brenner* von Basel, *Cramer* von Rosegg, *Ellinger* von Wyl, *Fetscherin* von der Waldau, *Henne* von Münsterlingen, *Wille* von Rheinau, *Zinn* von Pirminsberg und als Gäste: die Herren *Kolb* jun., *Sigg* von Andelfingen und *Ritzenberger* von Konstanz. Entschuldigt die Herren *Borrel* und *Chatélain* von Préfargier, *Schärer* von der Waldau.

Eröffnung der Sitzung um 11 Uhr. — Nach kurzer Begrüssung durch den Präsidenten Herrn *Wille* wird das Protokoll der letztjährigen Verhandlung in Münsterlingen verlesen. Herr *Wille* macht die Bemerkung, dass er nur deshalb keinen definitiven Abschluss seines vorjährigen Referates über Einführung gleichheitlicher Jahresberichte in den schweizerischen Anstalten geliefert habe, weil die gleiche Frage zur selben Zeit im Pariser Psych. Congresse behandelt worden. Er habe nur das Resultat jener Verhandlungen abwarten wollen, nicht aber Herrn *Borrel* die Beendigung des Referates zugemuthet, wie es im Referate irrthümlich heisse (Z. f. Psych. B. 25 Heft 3). Herr *Brenner* wünscht, dass das Protokoll dieses Jahres den Mitgliedern zukommen möchte, und Herr *Cramer*, dass das Protokoll auch dem Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten von *Griesinger* zugeschickt, und dass den Collegen der romanischen Schweiz durch Einsendung der Protokolle in die Annales médico-psychologiques von Paris Rechnung getragen werden möchte. Beide Wünsche wurden zum Beschlusse erhoben, letzterer eventuell nach vorher zugehender Anfrage an die Französisch sprechenden Mitglieder der Gesellschaft. — Die wissenschaftlichen Verhandlungen begannen mit dem Referat des Herrn *Cramer* über No-restraint.

Herr *Cramer* beginnt seinen Vortrag mit einem kurzen historischen Ueberblick der Entwicklung des No-restraint und bedauert, dass diese Frage in letzter Zeit Anlass zu Zänkereien gegeben habe, wie sie von dem Forum der Wissenschaft fern gehalten werden sollten. Er erinnert an die erfolgreiche Bekämpfung der Reformen *Conollys*, welche dieselben bei ihrem ersten Auftreten in den 30ger und 40ger Jahren namentlich von Seiten *Jacobi's* in Deutschland und *Ferrus* in Frankreich zu erfahren hatten, die dazu auch mehr Berechtigung hatten, da Anfangs viele Uebelstände zu beseitigen waren (ungenügendes Wartpersonal, Misstrauen der Comité-Mitglieder, Missstimmung der Beamten etc.). Allein die Psychiatrie sei vorwärts geschritten, *Jacobi**) gestorben, und das Jahre lang so berühmte Sieg-

*) Zur gehörigen Würdigung dem Verdienste *Jacobi's* um die Lichtung dieser Frage sei hingewiesen auf seinen Aufsatz im Isten

burg werde zur Zeit nicht mehr für eine Pflegeanstalt tauglich befunden, und *Ferrus* Nachfolger, *Lunier*, halte dafür, dass höchstens auf tausend Kranke eine Jacke vorkommen dürfe.

Dankbar gedenkt Referent der daherigen Anregung der englischen Nation und der Bestrebungen unserer dortigen Kollegen, welche Abschaffung der Zwangsmittel als Heilmittel und eine bedeutende Reduktion ihrer Anwendung überhaupt in den Anstalten Englands sowohl als des Continents zur glücklichen Folge hatten.

Eine neue Discussion der Frage in Deutschland wurde hervorgerufen durch die Uebersetzung der Schrift von *Conolly* durch *Brosius* im Jahre 1860, welcher 1861 *Griesinger's* Erklärung für unbedingte Abschaffung der Zwangsmittel folgte. 1862 (Allgemeine Zeitschrift. 19. Bd.) habe *Dick* das Verdienst gehabt, eine Controle über die Motive für Anlegung des Zwanges zu empfehlen, welche gewissenhaft geführt den Zwang nothwendig vermindern müsse. *Dick* habe das Princip des absoluten No-restraint dadurch bekämpfen wollen, dass er sich's zur Aufgabe machte, die beständige Bemühung aufzuweisen, die Anwendung der Beschränkung zu vermindern bis zu dem Grade, welchen das ausschliesslich im Auge zu haltende Wohl der Kranken nur irgend zulässt! Herr *Cramer* glaubt, dass diese Kritik in ihrer Nüchternheit und dem überall durchscheinenden sittlichen Ernst mehr Eindruck gemacht habe in Deutschland als *Conolly's* Werk. Als die wichtigste Arbeit über die vorliegende Frage bezeichnet Hr. *Cramer* diejenige von *Ludwig Meyer*, damals in Hamburg. *Meyer* weise zunächst nach, wie besonders die deutsche Psychiatrie durch dogmatisch psychologische Doctrinen auf Abwege gerathen sei; von 1820—1840 sei die spiritualistische Schule maasgebend gewesen; das habe zu einer Art pädagogischer Therapie geführt, welche Laster und Leidenschaft als Ursache der Psychose betrachtete. Erst *Jacobi* begründete die mehr somatische Schule.

Meyer zeigte zuerst in Deutschland an der Hand zweijähriger Erfahrung, dass die Behandlung ohne Zwang möglich sei und den Kranken zum Wohle gereiche. — Referent erwähnt hierbei des schon früher in Holland durch *van Leuwen* und *Everts* auf diesem Gebiete gemachten erfolgreichen Vorgehens. Aus *Meyer's* Arbeit hebt er besonders dessen Ueberzeugung hervor, dass jeder wissenschaftlich gebildete Irrenarzt dahin streben müsse, die Zwangsmittel möglichst zu verbannen. Dass es nicht jedem gelingt, habe seinen

---

Bde. S. 583 dieser Zeitschrift. Die Aussprüche, zu welchen der Verf. damals, im Jahre 1844 gelangt ist, dürften auch jetzt noch im Wesentlichen gültig sein. Anm. d. Red.

Digitized by Google

Grund nicht in den Anstalten, denn diese seien in Deutschland meist eben so gut als in England, der Grund liege vielmehr ausserhalb der Anstalten, namentlich in der Erschwerung der Aufnahme der dürftigen Kranken. In England werde auf 620, in Frankreich auf 1320, in Deutschland erst auf 3160 Einwohner ein Geisteskranker verpflegt. In Folge der Erschwerung der Aufnahme degeneriren viele Fälle schon ausserhalb der Anstalt, die einmal aufgenommen Ausnahmeverhältnisse zur Behandlung darbieten. Gewiss sei es, dass heilbare Fälle viel leichter ohne mechanische Beschränkung zu behandeln seien als unheilbare.

Zum zweiten Theile seines Referates übergehend fügt Herr *Cramer* bei, dass er seit 2. November 1863 nur noch in 3 Fällen mechanische Zwangsmittel angewendet habe.

Referent verlangt zuerst, wie überhaupt bei der Behandlung der Geisteskranken im Allgemeinen, so besonders bei Beiseitelassung des Zwanges, Individualisirung jedes einzelnen Falles und spricht sich entschieden gegen alle rigorose Behandlung auch in physischer Beziehung aus, sieht auch in der Anwendung der Manutention durch Wärterfäuste keine Beseitigung des Zwanges.

Im freundlichsten Benehmen des ärztlichen und Wärterpersonals und consequenter Aufsicht sieht er die beste Behandlung und das beste Mittel zur Erreichung des *No-restraint*. — Zweckmässig eingerichtete Isolirräume, für einzelne Fälle Polsterzimmer seien in gehöriger Zahl einzurichten zur Unterstützung dieser Bestrebungen.

Die Polsterzimmer verlangen aber eine vollständig gute, zweckentsprechende Einrichtung, sonst werden sie unnütz. Namentlich muss ihre Reinigung auf leichte Weise vollzogen werden können, was nur dadurch erreicht werde, wenn die einzelnen Polster herausgenommen und gereinigt werden könnten.

Bezüglich der Bäder hält Referent die Anwendnng der Baddeckel als zulässig bei Reinlichkeitsbädern, hält die Bäder aber für unnütz zu Heilzwecken, wenn der Kranke sich energisch weigere zu baden, will dann lieber gar nicht baden.

Die Krankheitsformen und die Kranken, bei denen Anwendung von Zwang in Frage kommen könne und die bisher vorzüglich mit Zwangsmitteln behandelt worden seien, theilt er in folgende Kategorien:

1. Krankheitsformen mit dem Charakter grosser Aufregung, wo alle psychische Einwirkung unmöglich ist.

Delirium acutum in der melancholischen Form, *Delirium tremens* in den heftigsten Fällen; wüthende Epileptiker; Blödsinnige.

Digitized by Google

Alle diese Fälle gehören nach Ansicht des Vortragenden in das Polsterzimmer, das eben auch nur für solche Fälle passe.

2. Selbstmordsüchtige. Zur Verhütung von Unglück schützt die Jacke allein durchaus nicht, es müssen diese Kranken bei Tag und Nacht unter specielle Aufsicht gestellt werden. Hierzu ist in schweren Fällen ein besonderes Wachzimmer nothwendig zu bestimmen, in welches Abends die Kranken gebracht und von einem Wärter bewacht werden.

In leichteren Fällen genügt es, den Wärter dicht neben dem Kranken schlafen zu lassen; in noch leichteren Versetzung der Kranken in einen gemeinschaftlichen Schlafsaal mit anderen Kranken.

3. Kothschmierer, Kothesser und Onanisten. Referent empfiehlt bei dieser Klasse von Kranken regelmässige Ueberwachung durch die Nachtwache sowohl, als durch einen hierzu bei Tage bestellten Wärter, welcher zunächst mit möglichst schneller Entfernung des Kothes und Reinigung des Kranken betraut ist. — Noch schwieriger aber und auf gleiche Weise zu behandeln sind tobsüchtige Kranke mit Kothschmieren. Bei Onanisten ist mit mechanischen Mitteln nicht viel zu erreichen, so wenig als durch medicamentöse Behandlung. Auf psychische Einwirkung ist hier besonders Gewicht zu legen. Am wirksamsten bewährt sich ermüdende Feldarbeit, zu welcher man auch die Kranken höherer Stände anhalten müsse.

4. Kleiderzerreisser. Es könne die Wichtigkeit der Geldfrage denn doch nicht in dem Grade berücksichtigt werden, dass die Humanität darunter leiden muss. Durch spezielle Aufsicht und Beschäftigung eines Wärters mit solchen Kranken könne viel erreicht werden. Ebenso auch durch Anwendung sehr fester Kleider für solche Patienten.

Die Mittheilungen unserer Erfahrungen auf diesem Gebiete seien ganz besonders nothwendig.

Der Vortragende wendet starke Zwilchkleider an, die mit englischen Knöpfen geschlossen werden. Er macht noch besonders darauf aufmerksam, wie viel schwieriger solche Kleider für Männer denn für Weiber herzustellen seien. An vielen Beispielen erläutert er dann, wie er sich bisher geholfen.

5. Maniakalische Kranke mit besonders agressiver Haltung verlangen nebst Isolirung, dass sie nie von einzelnen Wärtern oder Aerzten besucht werden. Solche Kranken sind auch im Freien zu isoliren. Jede Tobabtheilung sollte verschiedene Höfe haben. —

Zu den meist schwer zugänglichen und zu behandelnden Patienten

gehören namentlich auch unruhige und schreiende Melancholiker ohne Selbstmordstrieb, sowie periodisch Tobsüchtige. Längere oder kürzere Isolirung ist auch hier nebst genauer Ueberwachung anzuwenden.

Herr *Cramer* warnt ferner vor Uebertreibungen der Wirkungsweise des No-restraint; oft liest und hört man, dass keine Zwangsfütterung mehr nöthig sei, dass die Schreisucht verschwinde und selbst die Onanie seltener werde bei consequenter Durchführung des No-restraint.

Herr *Cramer* kann die Fütterung der Sonde nicht entbehren, ist dagegen der Ansicht, dass diese Operation rascher und besser von statten gehe ohne Jacke. Er urgirt gegen *Lähr**), dass das Anlegen der Jacke länger daure und den Kranken mehr quäle als die Fütterung mit der Sonde.

Die Schmiersucht konnte der Vortragende bisher noch nicht beseitigen, ebenso wenig die Onanie, doch hegt er die Ueberzeugung, dass sich beide Futalitäten vermindert haben. Was man ohne Zweifel sofort mit der Einführung des No-restraint gewinnt, das ist die Reinlichkeit.

Nachdem Referent noch mit einzelnen Fällen aus seiner Praxis die verschiedenen Ordnungen illustrirt, spricht er sich dahin aus, dass die Beseitigung der Kosten für Zwangsmittel die viel humanere Vermehrung von Mitteln zur Unterhaltung gestatten werde.

Unzertrennlich von der Einführung des No-restraint sei die Einführung der Nachtwache in jeder Anstalt.

Ein Hauptpostulat zur Erreichung des No-restraint sei, dass jeder Fall von Geistesstörung in unseren Anstalten Aufnahme finden könne und solle. Dadurch dass jedem

---

*) Mir ist diese Stelle nicht ganz klar. Um Missverständnissen vorzubeugen, wiederhole ich, was ich früher ausgesprochen, dass ich möglichste Beseitigung jedes mechanischen Zwanges in der ärztlichen Behandlung der Irren wünsche, dass die Individualisirung bei Geistesstörungen noch nothwendiger ist als bei anderen körperlichen Krankheiten, dass der Arzt in der Wahl seiner Mittel nicht beschränkt werden dürfe, dass mechanische Beschränkungen eines Kranken nicht länger andauern müssen, als dies nothwendig ist und dass die Fütterung mit der Sonde schonender zuweilen mit mechanischer, zuweilen mit manueller Beschränkung, zuweilen ohne beide Arten vor sich geht. Es ist leichter, No-restraint in eine Anstalt einzuführen, als den Restraint in rechter Weise zu handhaben.

L.

Kranken die Wohlthat des Anstaltslebens möglichst früh zu Theil werde, werde derselbe passend dadurch beeinflusst und Anwendung von Zwang weniger nöthig werden.

Der No-restraint zeigt nach Ansicht des Referenten erst dann seine beste Wirkung, wenn das Wartpersonal keine Zwangsmittel mehr kennt.

Herr *Cramer* erwähnt dann noch 2 chirurgische Fälle, bei welchen er kurze Zeit Zwangsmittel anzuwenden genöthigt war; ferner schildert er einen 3ten Fall, wo er in Folge grosser Aufregung und Zerstörungssucht bei einer weiblichen Kranken sich zur Anwendung der gewöhnlichen Zwangsmittel verleiten liess. In diesem Falle machte der Zwang vollständig Fiasko, die Kranke zerstörte alle angewandten Zwangsmittel und beruhigte sich erst, nachdem man sie ausgiebig beschäftigte und unterhielt. Er betont schliesslich, dass der No-restraint ausserhalb guter Anstalten und bei gewissen chirurgischen Kranken nicht durchführbar sei.

In der darauf folgenden Discussion wird allgemein die Beseitigung des Zwanges und die Behandlung nach möglichst humanen Grundsätzen als zu erreichendes Ziel unserer Bestrebungen vorangestellt.

Es dürfe Zwang namentlich nicht als Strafe angewendet werden. — Aus der reichen Casuistik aus den einzelnen Anstalten wurden aber einzelne Fälle citirt, bei denen Zwang nicht entbehrt werden konnte, so bei einer Frau, die an geschwollenen Füssen leidend durchaus nur durch mehrtägiges Aufbinden auf ihr Bett gezwungen werden konnte, dasselbe nicht zu verlassen und nachher freiwillig im Bett blieb.

Aus andern Fällen, bei denen momentane Beschränkung zur wahren Wohlthat für den Kranken werden kann, werden solche von *Melancholia agitans* und Fälle von *Delirium acutum* hervorgehoben. In einzelnen solchen Fällen kann Anwendung von Zwang Ruhe herbeiführen.

Allgemein war man auch darüber einig, dass bei Ueberfüllung einer Anstalt die Zwangsmittel nicht leicht entbehrt werden können, welcher fatale Umstand in einzelnen unserer Anstalten leider vorhanden ist.

Zum Schlusse wurde folgender Satz einstimmig angenommen:

Der Verein schweizerischer Irrenärzte spricht sich in seiner Jahresversammlung vom 10. September 1868 einstimmig für gänzliche Beseitigung der mechanischen Zwangsmittel aus den schweizerischen Irrenanstalten aus.

Digitized by Google

Zu dem Zwecke halten sich seine Mitglieder für verpflichtet, in ihren betreffenden Kantonen dahin zu wirken,

a) dass jeder der Staatsfürsorge bedürftige Geisteskranke sofort die für seinen Zustand geeignete Behandlung und Verpflegung finden kann; —

b) dass das Wartepersonal nach Quantität und Qualität besser und dadurch eine consequente und stetige Aufsicht bei Tag und bei Nacht in den Anstalten möglich werde.

c) dass in allen Anstalten eine genügende Zahl von Einzelzimmern zur Disposition stehe.

Zweite Sitzung: Eröffnung am 11. Septbr. Morgens 8½ Uhr. Anwesend sind die Herren: *Binswanger*, *Brenner*, *Cramer*, *Fetscherin*, *Henne*, *Wille* und *Zinn*. Als Gast Herr *Kolb* jun.

I. Referat des Herrn *Wille*: Ueber Irrenpflege und Irrenanstalten.

Herr *Wille* beginnt seinen Vortrag mit einem Hinblick auf die grossartige Ausdehnung, welche die Sorge für die Irren in den letzten Jahrzehnten in allen civilisirten Staaten genommen, so dass sich kaum irgend eine Seite des menschlichen und wissenschaftlichen Strebens und Wirkens einer solchen Theilnahme von Seiten des Staats und von Seiten des gebildeten Publikums rühmen dürfte. Mit einer gewissen innern Beruhigung habe der Fachmann im redlichen Bewusstsein seiner Theilnahme und Mitwirkung an diesen Bestrebungen auf das Geschehene zurückgeblickt, in der zuversichtlichen Hoffnung einer ruhigen allmäligen Weiterentwicklung der bisherigen Leistungen.

Der unerwartet erhobene Ruf nach Reformen, deren das deutsche Irrenwesen bedürfe, indem das bisherige nicht genüge, habe diesem Zustande und der Ruhe ein plötzliches Ende gemacht. Auf diese in der deutschen Psychiatrie in jüngster Zeit erhobene Discussion eingehend, will Referent diejenigen Angriffe eingehender behandeln, die sich auf Irrenpflege und auf die Beschaffenheit der gegenwärtigen Anstalten beziehen. Die bisherigen Erfahrungen auf dem Gebiete der Irrenversorgung haben vielfach gelehrt, dass trotz aller Anstrengungen und Opfer der einzelnen Staaten die einstigen Heilanstalten überfüllte gemischte Anstalten wurden, die Pflegeanstalten sich anfüllten bis zur Ueberfüllung und der Zudrang Aufnahmebedürftiger stets sehr gross sei, ja grösser als die zu gewährende Abhülfe. Es dränge sich daher die Frage auf, ob nicht auch ohne Errichtung neuer Anstalten der Pflege bedürftige Geisteskranke und ob nicht mit geringern Kosten untergebracht werden können? Weit schwie-

riger aber sei es, diese Frage gehörig zu beantworten, als neue Anstalten zu bauen. Jeder Rath müsse daher willkommen sein in Beantwortung derselben, um so mehr, wenn er sich auf Erfahrungen stütze. Speziell zu *Griesinger's* Vorschlag übergehend, der die Abhilfe in der Verbindung der sogenannten freien Verpflegungsformen mit der Verpflegung in geschlossenen Anstalten findet, bemerkt Referent, dass er zunächst nur die Versorgung der unheilbaren Irren ins Auge fassen werde.

Das freie Verpflegungssystem sei ein doppeltes:

1) das Leben in der Familie, familiale Verpflegung;

2) der Aufenthalt in einer Ackerbau-Colonie.

Modificationen der familialen Verpflegung kommen folgende vor:

1) Entlassung gebesserter, ungefährlicher Kranker in ihre Familien oder Gemeinden, ohne besondere Aufsicht oder Schutz. (Sehr häufig vorkommend besonders in Ländern mit überfüllten Anstalten zur Ermöglichung neuer Aufnahmen.)

2) Entlassung solcher Kranken, welche aber einer mehr oder weniger umfassenden Beaufsichtigung von Seiten der Anstalt oder von Behörden oder von organisirten Vereinen unterstellt werden (s. gut organisirt in einigen französischen Departements, in Baden, in Holland; Aufsichtsverein im Canton St. Gallen für geheilt und und ungeheilt Entlassene).

3) Unterbringung solcher entlassenen Kranken bei Privaten in nächster Nähe der Anstalten unter Aufsicht der Anstalt. (Vorbild das jetzige Gheel, vorübergehend in Illenau's Umgebung bei ältern verdienten Wärterpaaren, anhaltende Versuche in England, cottage.)

Als Typus einer Ackerbaucolonie nennt Referent die mit der Anstalt der Gebrüder *Labitte* in Clermont verbundene Ferme Fitz-James. Versuche im Kleinen wurden von Dr. *Landerer* in Göppingen, in Einum bei Hildesheim, in Margarethenberg bei St. Pirminsberg gemacht.

Bei Beurtheilung des Werthes dieser verschiedenen freieren Verpflegungsformen spreche die Erfahrung dafür, dass die Unterbringung ruhig gewordener ungefährlicher, sogenannter gebesserter Kranken in Privatpflege nach dem Verfahren unter 1 und 2 eine genügende sei. Weit vorzuziehen sei die dritte Art der Familienverpflegung in der Nähe einer Anstalt mit Organisation und Ueberwachung von dieser aus. Biete dieselbe auch grosse Schwierigkeiten, so habe sie dennoch so grosse Vorzüge für die Möglichkeit einer rationellen Ausdehnung der Irrenpflege, dass sie durchaus Berücksichtigung verdiene. Es entspreche dieses System in gewisser Beschränkung eben so sehr den Anforderungen der Wissenschaft,

Digitized by Google

als der Erfahrung, wie die Verpflegung der Geisteskranken in geschlossenen Anstalten. Die Erfahrungen, die er selbst in seiner Pflegeanstalt Rheinau gemacht habe, wo er seit Uebernahme der Anstalt möglichst grosse Freiheit der Bewegung im Innern, und selbst ausserhalb der Anstalt, etwa dem fünften Theile seiner Kranken, eingeräumt habe, haben ihn vollkommen günstig gestimmt für diese freiere Verpflegung. Er betrachtet die daselbst getroffenen Einrichtungen als Vorbereitung des Uebergangs zur familialen Verpflegung.

Ueber den Werth der Ackerbaukolonien sieht er die Akten als bereits geschlossen an. In Gegenden, in denen es an einer hinlänglichen Anzahl ackerbautreibender Elemente fehle, da biete sich die Einrichtung von Handwerkerkolonien dar. Muster für dieses System seien die detached building der Engländer. Doch sei die Einrichtung dieser Colonien nur eine halbe Massregel, wenn damit nicht zugleich der Grundsatz der möglichst freien Bewegung der Kranken verbunden werde.

Auf die finanziellen Gründe der Frage eingehend, sei voraus zu bemerken, dass die bisherigen Anstalten so wenig als die der Zukunft die Existenz der Versorgungsanstalten entbehrlich machen für Altersschwache, Idioten, ruhige Epileptiker mit ansteckenden oder ekelhaften körperlichen Krankheiten behaftete Irren etc., welche durch die Aufnahmebedingungen der meisten Anstalten geradezu ausgeschlossen seien. Es handle sich also im Folgenden nur um eigentliche Irrenpflegeanstalten.

Die Durchschnittskosten für ein Bett in den neugebauten Anstalten betragen gegenwärtig Frs. 3700—8000, in den adaptirten Anstalten ca. Fr. 1000, steigen aber vielfach in letztern durch die im Verlaufe der Jahre noch nöthigen baulichen Veränderungen bedeutend höher. Diesen Summen gegenüber stehen als vorgeschlagene Projekte:

1. Die Arbeiterwohnungen nach Art der Mühlhauser zu Frs. 3000 für 2 Kranke, zu Frs. 4500 für 4 Kranke, also ein Bett zu Frs. 11 — 1500.

2. Ein Cottage (*Robertson*) für eine Wärterfamilie und 3 — 6 Kranke berechnet zu Frs. 3500, also für 1 Bett Frs. 1100—600.

3. *Bucknill's* detached blocks für etwa 100 Ackerbautreibende eingerichtet zu Frs. 900 pro Bett.

4. Die grössern Cottage nach *Toller* für eine Wärterfamilie mit 15 Kranken, mit Gas- und Wasserleitung, auf Frs. 865 pro Bett.

by Google

5. Anlage einer Ackerbau-Colonie nach *Czermak* auf Frs. 1400 pro Bett.

Die Verpflegungskosten in Anstalten verglichen mit denjenigen bei freiern Verpflegungsverhältnissen zeigen folgende Zahlen:

In englischen Anstalten kostet 1 Kranker 450—640 Frcs. jährlich.
- französischen - - 1 - 375 - -
- deutschen - - 1 - 300—350 - -

in den schweizerischen annähernd wie in den französischen, theilweise sie übertreffend.

In Clermont kostet 1 Kranker seiner Gemeinde 365 Frcs.
- Gheel - 1 - - - 240—270 Frcs.,

nach *Czermak* kostet 1 Colonist seinem Landesfonds 235 Frcs.

Seien diese Zahlen auch nicht ganz als sicher zu betrachten, so ist doch so viel sicher, dass die bisherigen Anstalten mehr weniger bedeutender Staatszuschüsse bedürfen, während die freieren Verpflegungssysteme durch sich selbst bestehen; dass Bau- und Unterhaltungskosten bei Letzteren sich günstiger herausstellen als bei Ersteren und dass sich in freieren Verhältnissen Kranke wohler fühlen und geistig sich länger erhalten, als es in geschlossenen Anstalten möglich sei. Aus diesen Gründen erwachse für jeden Psychiater die Pflicht, nach Kräften diesem System Eingang verschaffen zu suchen. In Berücksichtigung der Verhältnisse Rheinau's möchten wohl 31 pCt. von seinen Pfleglingen für freiere Verpflegung passen, welches Verhältniss auch mit anderweitigen Beobachtungen übereinstimme.

Auf die baulichen Reformvorschläge *Griesinger's* übergehend (1. Irrenversorgungsanstalten, 2. Anstalten für chronische Geisteskranke, 3. solche für acute) hält Referent in Beziehung auf die Errichtung von ersteren Bezirksanstalten für's zweckmässigste, je eine für 50,000 Seelen mit einem Hausvater und Besorgung durch einen auswärts wohnenden Arzt berechnet.

In Bezug auf die Anstalt für chronische Kranke bemerkt er, dass, so sehr er einverstanden sei mit *Griesinger* für chronische Krankenanstalten einfachere Verhältnisse anzustreben und Verbindung mit einem grossen Gütercomplexe, ebenso entschieden ihn seine mehrjährige Erfahrung im Anstaltsleben gegen Entfernung der Tobabtheilungen aus diesen Abtheilungen sich zu verwahren bestimmt, obschon er zugeben wolle, dass eine nicht geringe Zahl solcher chronischen Bewohner der Tobzellen Kunstproducte seien. In diese Anstalten gehörten heilbare und unheilbare Kranke und gerade auf sie angewendet gelte Alles das, was er in Rücksicht der freien Verpflegungsformen früher ausgesprochen habe. Gerade den chro-

Digitized by Google

nischen Kranken, seien sie heilbar oder unheilbar, möchte er die Wohlthat des Familienlebens möglichst zugänglich machen. Die Behauptung, dass unsere Anstalten das Letztere ersetzen, bedürfe keiner ernsthaften Widerlegung.

Die Anstalten für acute Kranke, Stadtasyle nach *Griesinger*'s Vorschlag, eignen sich namentlich zur Verbindung mit einer psychiatrischen Klinik. Um ihrem Zweck gänzlich zu entsprechen, sei Einführung des Pavillon-Systems nothwendig zur Trennung der momentan Aufgeregten und Unruhigen. Indem Referent namentlich die Nothwendigkeit der psychiatrischen Klinik betont, bezweifelt er die Zweckmässigkeit der Verbindung der Professur mit der Directorenstelle in einer Person. Es werde in einem solchen Asyle der zweite Arzt gewissermassen als Hausdirector gestellt werden müssen, damit der Docent sich möglichst frei zu Gunsten der Wissenschaften bewegen könne. Denn ausschliessliche Beförderung der Letzteren und das Streben selber zum ärztlichen Gemeingute zu machen, sei Aufgabe eines psychiatrischen Dozenten. Daher müsse er von den gewöhnlichen Aufgaben eines Directors befreit sein. Er will aber die Asyle für acute Kranke nur dann, wenn es sich um Errichtung psychiatrischer Lehranstalten an Orten handle, an denen eine Anstalt zu bauen, Verhältnisse nicht erlauben. Ohne diesen speciellen Fall, hält er die Verbindung der Anstalten chronischer mit solchen acuter Kranker nicht nur für erlaubt, sondern sucht darin, insofern dabei die Rücksichten möglichster Einfachheit und der Verbindung mit den freien Verpflegungsformen maassgebend sind, organische Entwickelungen, hervorgegangen aus den Beobachtungen der Bedürfnisse jener, für die sie bestimmt sind.

Es seien im Ganzen genommen die *Griesinger*'schen Vorschläge, namentlich in ihrer Befürwortung einer Ausdehnung der familialen Verpflegung als eine Quelle sicheren Fortschritts in unserer Frage der Irrenpflege und der Versorgung zu betrachten.

Schliesslich glaubt Referent gleichwohl nicht, dass alle gemachten Vorschläge auf die Dauer einer Ueberfüllung der Anstalten vorbeugen werden, und dass diesem Uebelstande einzig durch Verhinderung der Entstehung der Geisteskrankheiten entgegengewirkt werden dürfte.

In dem Erfahrungssatze, dass einerseits blos 20 pCt. der Geisteskranken auf die Dauer geheilt bleiben, dass andererseits die Zahl der unheilbar Gewordenen nach Abzug der Todesfälle diejenige der Geheilten bedeutend überwiege, liege der Schlüssel zu

jener Erscheinung. Die Vermehrung der Geisteskranken sei als ein soziales Uebel zu betrachten, das eben nur durch die allgemeine Gesellschaft, die es herbeigeführt habe, auch wieder gehoben werden könne.

Noch glaubt Referent der Einführung centraler Aufsichtsbehörden über Irrenanstalten und Irrenwesen das Wort reden zu sollen, welche in England so ganz besonders segensreich gewirkt hätten. Der in England bestehenden gemischten Zusammensetzung würde er vor den in Frankreich und Holland eingesetzten Inspectoren den Vorzug geben.

Die Discussion bewegte sich vorzüglich über die Wünschbarkeit der famialen Verpflegung und der Ackerbaucolonien, beides in Verbindung mit den geschlossenen Anstalten, wobei auch die grossen Schwierigkeiten dieser beiden Verpflegungsarten besprochen wurden.

Hr. *Zinn* theilte seine Resultate mit über die schon von seinen Vorgängern seit einer Reihe von Jahren während des Sommers von Pirminsberg aus organisirten kleinen Colonie auf dem Margarethenberge.

In derselben wurden

1864	während	4	Wochen	16	männliche	Kranke,	
1865	-	4	-	18	-	-	
1866	-	6	-	20	-	-	
1867	-	13	-	30	-	-	
1866	-	17	-	39	-	-	(15 heilbare, 24 unheilbare) untergebracht.

Von der Colonie aus wurden nach Hause oder in Privatpflege entlassen: 8 genesen, 3 gebessert, 3 ungeheilt. — Fluchtversuche kamen nur 3 vor, in den Jahren 1865, 1866, 1867 gar keiner. — Höchster Krankenstand in der Colonie (1868) 25 Kranke, 3 Wärter, 2 Knechte, 1 Taglöhner, 1 Köchin. Zusammen 32.

Der im Canton St. Gallen ins Leben gerufene Hülfsverein für entlassene Geisteskranke zählt 450 Mitglieder und hat in den $2\frac{1}{2}$ Jahren seines Bestehens 9 Kranke untergebracht, von denen einer zurückgekehrt ist in die Anstalt, die 8 übrigen gut verpflegt sind.

Bezüglich der Aufsichtsbehörden wurde die Ansicht ausgesprochen, dass die beste Controle in unseren schweizerischen Verhältnissen darin bestehe, dass dem gebildeten Publikum und namentlich den Aerzten der Zutritt in die Anstalten möglichst erleichtert werde.

Die Versammlung einigte sich schliesslich zur Annahme folgender Sätze:

1) Die geschlossenen Anstalten sind für einen Theil unserer Geisteskranken weder nothwendig noch wohlthätig. Den Anstalten sollen sich überall agricole Colonien und die Verpflegung bei Privaten ganz nach den localen Verhältnissen organisirt und eingerichtet anreihen.

2) Der Besuch der psychiatrischen Klinik soll an den schweizerischen Universitäten obligatorisch erklärt und über Psychiatrie im Staatsexamen geprüft werden.

3) Candidaten der Medicin und Aerzten ist behufs ihrer weiteren Ausbildung in der Psychiatrie der Zutritt und der längere Aufenthalt in den öffentlichen Irrenanstalten von den Staatsbehörden zu gestatten und möglichst zu erleichtern.

II. Herr *Henne* legt den Schädel vor eines unter den Erscheinungen allgemeiner psychischer Depression mit Kräfteverfall (ohne Lähmungserscheinungen) verstorbenen Melancholikers. Derselbe hatte früher schon vor 10 Jahren an Melancholie gelitten und war nach kurzem Aufenthalt in der Anstalt Münsterlingen geheilt entlassen worden. Der Wiedererkrankung war 3 Monate vorher eine körperliche Verletzung, Stockstreich auf den Kopf, vorausgegangen. Bei der Section fand sich in der Mitte der linken Kranznaht über der Schläfe eine Hervorwölbung des Schädels 3 Zoll im Quadrat und 1 Zoll in der Höhe haltend. Dieser Stelle entsprechend fand sich eine ähnliche Exostose der Innenfläche des Schädeldaches von 3 Zoll Höhe mit der *Dura* fest verwachsen und mit Granulationen reichlich bedeckt. Die Hirnsubstanz zeigte dieser Stelle entsprechend eine Vertiefung von 3 Zoll und die graue Substanz war bis zum äusseren Rande des *corp. striatum* herabgedrängt. Im Uebrigen keine wesentliche Abnormität.

III. Zur Besprechung für die nächste Versammlung schlägt Herr *Wille* die Frage über das Verhältniss zwischen Syphilis und Psychose vor, und mit Benutzung des in jeder Anstalt vorhandenen Materials die Beantwortung folgender Fragen:

1) Wie oft wurde Syphilis als ätiologisches Moment angegeben und bei welchen psychischen Erkrankungsformen?

2) In wie vielen Fällen gelang während des Krankheitsverlaufes der objective Nachweis der Syphilis?

3) In wie viel Fällen gelang der Nachweis erst durch die Obduction? In wie viel Fällen gab die Obduction negative Resultate?

Digitized by Google

4) Welche Symptome verhelfen zur Diagnose der Natur der Krankheit während ihres Verlaufes? Welchen Obductionsbefund wies die Syphilis nach?

5) Kurze Krankengeschichten über die mit Genesung endenden Formen.

IV. Auf Einladung des Herrn *Zinn* wurde Pirmasens als Versammlungsort für 1869 bestimmt.

Schluss der Verhandlungen um 12 Uhr.

Den 3. December 1868.

Der Actuar gez. Dr. *Fetscherin.*

Digitized by Google

Kleinere Mittheilungen.

Forense Psychologie in Italien. — *Cesare Castigtioni*, ärztlicher Director der Senavra in Mailand hat im Fasci. 6. v. J. 1866 Dec. und Fasci. 1 E. 2. v. J. 1867 des Arch. Ital. per le malattie nervose ėpiu par ticolar mente per le Alienazioni mentali p. unt. d. Titel: Idee per una legge sugli alienati, seine Ideen für ein Irrengesetz, veröffentlicht.

Dieses kann nach dem Gesichtspunkte, wovon man ausgeht, eine verschiedene Ausdehnung nehmen. Jeder Mensch hat Rechte zu behaupten, Pflichten zu erfüllen, ist verantwortlich für jede Handlung, für jede Unterlassung in den verschiedenen Beziehungen mit diesen und jenen.

Irre erscheinen in der Gesellschaft nicht mehr mit dem gewöhnlichen Kleide des socialen Menschen, — sie sind andere Menschen. Als solche müssen sie anders behandelt und beurtheilt werden; — sie versetzen die Gesellschaft in die Nothwendigkeit, sich Irren gegenüber andere Normen und andere Massnahmen aufzuerlegen. Von hier aus schon kann man übersehen, welche Tragweite in der That ein Gesetz für sie nehmen kann. Letzteres hätte sich stets auf Stoffe der Ordnung, der öffentlichen Sicherheit, auf Vorkommnisse zu beziehen, welche die Competenz der Civil- und Gerichts-Tribunale angehen. Daran knüpft sich aber noch eine sehr wichtige Aufgabe, basirt auf die Principien der Humanität und auf Gesundheitsregeln d. h. auf die Sorgfalt, die den Irren zu widmen ist, um sie wieder in die Würde des socialen Menschen einzusetzen, sie zu schützen, ihr Leben im Unglücke zu schirmen, wenn sie der Gesellschaft nicht wieder zurückgegeben werden können.

Indem Vrf. glaubt, hiermit den vollen Gesetzeskreis für Irre ausgespannt zu haben, setzt er sich vor, sie zu betrachten, 1) in Bezug

Digitized by Google

auf Civilrechte, 2) vor den Straftribunalen, 3) der Ordnung und der öffentlichen Sicherheit gegenüber, dann 4) in Rücksicht auf Anforderungen der Humanität und der Gesundheit.

Aus dem Begriffe des Irrseins (S. 334. Fasc. 6.) geht hervor, dass Irre sich nicht im Zustande socialer Individuen befinden, bei welch letzteren normaler Verstand, moralische Freiheit, freier Wille, freie Wahl, so zu sagen, unerlässliche Eigenschaften sind. Hiermit müssen Individuen ausgerüstet sein, um für ihre Handlungen bei voller Ausübung ihrer zuständigen Rechte, bei der Erfüllung ihrer Pflichten verantwortlich zu sein.

Indem Irre keine Verantwortlichkeit bieten, können sie nicht an Rechenschaft ihrer Handlungen gebunden sein, noch ihrer Unterlassungen, noch kann man sie bei freier Ausübung ihrer Rechte belassen, gleichviel ob bürgerlicher oder politischer. Dessenohngeachtet ist es nöthig, dass für sie, statt des Gesetzes für Individuen mit Verstand und moralischer Freiheit begabt, ein eigenes Gesetz eingelegt werde, passend für alle Wechselfälle ihres Lebens und geeignet, sie in allen Phasen ihrer Krankheit zu decken.

Eine Frage, nicht neu, aber neuerlich mehr als je bestritten ist die, „ob ihnen in mehreren Fällen eine theilweise Verantwortlichkeit zuzumessen sei?“ Viele ausgezeichnete Autoren messen sie ihnen auf diese oder jene Weise bei, — die Mehrzahl aber nicht und zu Letzteren bekennt sich unser Vrf. — Widerlegung der Gegner und Rechtfertigung eigener Ansicht liegt hier nicht in seinem Plane. Der Schwerpunkt für das Gesetz ist herzustellen, ob ein Individuum geistesgestört sei oder nicht? Ist dieses der Fall, dann fällt Verantwortlichkeit weg, es selbst aber unter das Particular-Gesetz.

Nach Vrf. ist es nur auf der nicht kurzen Linie der Unentschiedenheit erlaubt und pflichtgemäss, die Grade der Verantwortlichkeit zu discutiren die zum Endurtheile über den Bestand von Geistesstörung im Individuum führen können; — ist man dahin gekommen, dann hört alle Diskussion auf. —

Hier drängt sich eine andere Frage heran, nämlich: ob in lichten Intervallen, die sich bei Irren zu erkennen geben, die bei ihnen aufgehobene Verantwortlichkeit neuerdings wieder und zwar ganz oder zum Theile in Geltung zu treten habe?

In dieser Beziehung nährt Vrf. die Ueberzeugung, dass einem Geistesgestörten wiederaufgenommene Verantwortlichkeit nur bei mehr oder weniger lange auseinander geschobenen freien Zwischenräumen imputirt werden könne.

In allen andern sogenannten lichten Intervallen lässt sich nur

eine scheinbare Wahrnehmung von Verstand mit mehr oder weniger scheinbarer Kundgebung von scheinbarer moralischer Freiheit oder freien Willenskraft in Betracht ziehen, aber weit entfernt Verantwortlichkeit herbeizuführen.

Es bestehen wie bekannt mehrere Formen von Geistesstörung, und solche Formen, bei denen der Verstand nicht gestört zu sein scheint; zuweilen erscheint er sogar schärfer; — in diesen Formen aber herrschen Läsionen besonderer Fähigkeiten vor, welche gerade die moralische Freiheit dem freien, wählbaren Willen unterjochen, worauf hauptsächlich Verantwortlichkeit begründet ist. Vrf. sagt hauptsächlich, denn bei Geistesstörung kann sich Verletzung oder gänzliche Aufhebung des Verstandes kundgeben, d. i. das Bewusstsein der Handlungen. Dann ist aber der Wille seiner Natur nach nicht frei oder vernichtet. Verstand und Bewusstsein der Handlungen könne auch scheinbar bestehen und dennoch der Wille nicht frei sein, dagegen von Ideen, Impulsen, den Elementen und der Ausstattung der Geistesstörung selbst.

Die wesentlichen Elemente in allen Formen ist die Verletzung des Verstandes und der moralischen Freiheit. Es ist zweckdienlich alle Elemente der Geistesstörung zu erwägen, um vor dem Gesetze zur Aufklärung der Wahrheit neben dem synthetischen auch noch ein analytisches Urtheil zu fällen. Es ist rein die Störung der Intelligenz, welche vom Gesetze an dem Geistesgestörten in höchste Acht genommen wird: der Rest gehört der Wissenschaft.

I. Die Irren im Verhältnisse zum Civilrechte. (S. 337.) — In der bürgerlichen Genossenschaft müssen vor Allem die individuelle Freiheit und das Eigenthum gewährleistet sein.

Weil dem Irren moralische oder gleichzeitig auch Verstandes-Freiheit fehlt, so ist keineswegs die Folge, dass er auch das Eigenthumsrecht verlieren müsse. Gleiches gilt aber nicht weder von der individuellen Freiheit, noch von freier Verfügung über Eigenthum. Die Gesellschaft muss sicher gestellt sein vor jedem Schaden seiner Seits — auch muss verhindert werden, ihm oder der Gesellschaft schädliche Handlungen zu begehen.

Es handelt sich hier blos um die grössten Cautelen für Mittel zur Verwahrung gegen seine individuelle Freiheit, welche nothwendig entweder beschränkt, suspendirt oder gänzlich aufgehoben werden kann.

Den Status alienationis haben kompetente Aerzte zu constatiren, die Civil-Behörden haben Entscheidung zu geben. Ist ärztlich ein Individuum für geistig gestört erklärt und konnte die Behörde nicht anders, als ein Interdikt auf Ausübung seiner Rechte zu verhängen, so ist

dessen individuelle Freiheit zu beschränken, ihm grösstentheils oder völlig zu entziehen. Wo aber dieses Gestörtsein im Zweifel steht, da ist es, so lange eben letzteres nicht gehoben ist, unter legale Aufsicht zu stellen. Im ersten Falle ist ihm ein Curator zu bestellen, ein Mandatar, der für ihn seine Rechte übt, — im zweiten Falle übt er sie zwar aus, aber unter Controlle eines verantwortlichen Beistandes. Sohin ist durch den Curator seine Freiheit schon beschränkt, wo es sich aber noch um grössere Beschränkung handelt oder völlige Aufhebung derselben, da ist ihm sein Aufenthalt in einer Familie, in einem besonderen Hause oder in einer Anstalt anzuweisen.

Um hierüber zu entscheiden hat man hauptsächlich 2 Dinge im Auge zu behalten, 1) darauf bedacht zu sein, das Individuum vor Verfall seines Geistes zu wahren, der Intelligenz und moralischen Freiheit, der Vernunft wieder zurückzugeben; 2) Sorge zu tragen, den Geistesgestörten und ihm gegenüber die Gesellschaft vor jeder möglichen erheblichen Störung, vor jedem Schaden zu wahren.

Es bleibt immer eine delikate aber sehr wichtige Aufgabe herzustellen, wann die volle individuelle Freiheit eines Irren geopfert werden soll oder muss.

Die Wissenschaft hat heut zu Tage zur Genüge gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit der Heilung eines Irreins um so grösser ist, je näher am Ursprunge derselben die Kur beginnt, daher wäre es heut zu Tage unverzeihlich, diesen Moment der Heilungsmöglichkeit verstreichen zu lassen.

Die oberste Sorgfalt und Heilung der unglücklichen Irren in diesen günstigen Modalitäten besteht in dem, was die Wissenschaft unserer Tage im Vereine mit weisrer Erfahrung zu rathen und anzuwenden weiss. Die oberste Cautele besteht in Bestimmung des legalen Consulenten oder in der Interdiction nach dem angegebenen Sachverhalte. Die allgemeine Absicht möchte freilich sein, diese Cautelen so lange als möglich zu verschieben und erst im äussersten Nothfalle, nachdem dieser durch langen Zeitlauf constatirt ist, zu ergreifen, — auch sohin die individuelle Freiheit, den kostbaren Schatz des socialen Menschen, nicht zu verletzen, — und endlich diesen erniedrigenden Schandfleck so entfernt als möglich zu halten.

Diese Nothwendigkeit wird dringend und unangreifbar, sobald zweifelhafte oder gewisse geistige Störung besteht, durch competente Personen als solche erklärt. Der vorgeblich anhaftende Flecken einer Erniedrigung gründet sich nur auf Vorurtheil; denn mentale alienation ist eine Krankheit, welche die fragliche Massregel erheischt und Krankheit kann nicht erniedrigen. Interdiction und

Digitized by Google

legales Consulent können nur auf mündige Individuen sich beziehen; für den unmündigen hat die vaterländische Behörde vorzusehen und ihn zu überwachen.

Die Bestimmung, wie weit sich die Befugniss des legalen Beistands oder die gerichtliche Beaufsichtigung zu erstrecken habe, ist nicht Sache des Arztes. Es versteht sich von selbst, dass für einen Irren neben den Civilrechten auch die politischen aufgehoben sind, so lange er nämlich Irrer ist.

Auf 2 Dinge glaubt Vrf. bei bemeldeten Cautelen antragen zu müssen: 1) dass man bei Ausführung derselben nicht zu Formalitäten greife, welche den Zustand des Individuums beschweren könnten, — 2) dass man nicht zögere es in seinen normalen Zustand zurückzugeben, sobald von competenter Seite sein psychischer Zustand wieder normal geworden.

II. Die Irren vor den Strafgerichten. S. 3. fasc. 1 vom 25. Februar 1867.

In den sehr seltenen Fällen, wo dieses vorkäme, würde sich ein Individuum entweder schon im Verdachte oder im wirklichen Zustande von Geistesstörung befinden oder unter Aufsicht oder unter Interdiction. In dem einen Falle handelte es sich dann um seine Verantwortlichkeit, im anderen Falle hätte diese schon aufgehört.

Bei zweifelhafter Alienation, in der der zweifelhafte Bestand wirklich zweifelhaft ist, kann nicht in Abrede gestellt werden, dass sich die Verantwortlichkeit in dem Maasse vermindern müsse, in welchem die Zweifelhaftigkeit zunimmt und umgekehrt.

Der Ausspruch oder die Erklärung einer zweifelhaften Alienation oder eines wirklichen Bestandes derselben steht ausschliesslich den Aerzten zu; es kann dieselbe auch wiederholt erhoben werden, — ist aber bei Gericht zu respectiren, — das übrige entscheidet das Gesetz.

Diese ärztliche Autorität vor Gerichtsforum wäre nichts Neues, denn unter dem Codex Justinianus pflegten sich viele Fragen auf ärztliche Autorität zu entscheiden.

Wenn ein Individuum in Begehen oder Unterlassungen verfallen ist, die das peinliche Gericht berühren, wenn es wirklich geistig gestört befunden worden, dann aber nicht in den oben bezeichneten Categorien inbegriffen wäre, oder wenn es erst nachher als geistesgestört erkannt worden, so muss dieses nothwendig zu vielfachen Nachforschungen Veranlassung werden.

Es ist von Belang, dass diese Erforschungen dahin zielen, darzuthun, ob wirkliche Geistesstörung vorhanden sei oder nicht, wo sie vermuthet wird, und ist dieses in der That der Fall, auf

Digitized by Google

welche Epoche sie sich bezieht, ob sie angedauert und Bestand gehabt?

Für ein Begehen oder eine Unterlassung, wesshalb ein Irrer sich den peinlichen Gerichten gegenüber befindet, wird es ins Besondere Aufgabe herzustellen, ob die Geistesstörung vor, in die Zeit des Begehens oder der Unterlassung fällt, oder aber nach denselben und überhaupt wann diese geistige Störung Statt hat? — Legisten und Gemeinsinn „halten sich an den Grundsatz, dass ein Individuum bei Begehen und Unterlassen geistesgestört war, wenn es dieses bereits schon vor und nach der That gewesen."

Ergiebt sich in Folge competenten Urtheils, dass ein Individuum zur Zeit der That oder der Unterlassung, deren es schuldig geworden, schon irre war, dann gehört es nicht mehr den Tribunalen, sondern der Irrenanstalt an.

Wird ein Individuum von den Aerzten für geistesgestört erklärt vor das Schwurgericht gebracht mit der Angabe, dass er es bereits vor, während und nach seiner Schuld gewesen, so ist den Geschwornen die Entscheidung seines Verschuldens zu überlassen. Diese können aber wohl nicht anders als ihn für nicht zurechnungsfähig, für nicht schuldig erklären, sie müssten denn gerade den ärztlichen Ausspruch für gezwungen erklären. (Leider kömmt im wirklichen Leben das Gegentheil vor, indem man mit der Schuld auf „Irre" die schwere Strafe des Kerkers fallen lässt, ja noch übleres, während man ihnen vielmehr mitleidige Sorge spenden sollte.)

Das ärztliche Gutachten, oder vielmehr das Zeugniss des Arztes hat in legaler Form eine mit den Gründen der Wissenschaft nnd der speciellen Facherfahrenheit motivirte Wahrheit auszusprechen, während der Geschworene, weder Arzt noch Alienist, zwar eine Wahrheit seines Gefühles dennoch aber unsichere, selbst irrthümliche Wahrheit hier ausspricht.

Wollte man nun auch zugeben, dass Geschworene eine volle, von Gott eingegebene, oder in den Gerichtsdebatten erworbene Kenntniss besässen, so sind sie dennoch ausser Stand, vorausgesetzt, dass sie nicht selbst wirkliche Aerzte oder Alienisten sind, zu entscheiden, ob ein Individuum geistesgestört sei oder nicht?

Mentale Alienation ist ein verworrenes, geheimnissvolles, dunkles, schweres Thema, so, dass sich selbst professionelle Alienisten in den zur Entscheidung gestellten Fällen wohl anzustrengen haben, um das Wesen derselben genau zu bestimmen.

Nun bleibt noch zu bemerken, dass man zugiebt, sie entschieden ja nicht über Geistesstörung, wohl aber über Zurechnungsfähig-

Digitized by Google

keit, Schuld . . . Wo es sich aber um einen in competenter Weise für geistesgestört Erklärten handelt, da kann Zurechnungsfähigkeit, Schuld nicht in Discussion gestellt werden, — hier handelt es sich um die richterliche Erörterung der Geistesstörung. Den Geschwornen stünde diesem gemäss nichts anderes zu entscheiden zu, als: „ob das ärztliche Gutachten richtig sei oder nicht?“ oder aber mit anderen Worten: „ob wirkliche mentale Alienation bestünde oder nicht?“ allein eben dieses vermögen sie nun einmal nicht zu entscheiden.

Es ist hier ferner unstatthaft „Ueberzeugung“ in Scene zu setzen, denn hier erscheint Ueberzeugung als inhaltloses Wort, — woher kommt sie? Aus dem Gewissen? Dem Vrf. gälte in dergleichen Fällen eine solche Entscheidungsweise für ein wahres Scandal, eine offene Beschimpfung der Wissenschaft der Principien der Humanität und der Civilisirung.

Wo ein Geistesgestörter wegen verbrecherischer That oder Unterlassung nicht vor Gericht, wohl aber unter ärztliche Behandlung gestellt wird oder gestellt werden soll, und wo es sich darum handelt, ihn nach gehobener Krankheit vor Gericht zu bringen, auch da ist der Arzt, selbst, wenn er nicht Alienist ist, wieder Richter, er entscheidet ohne Controlle, und nimmt den Kranken vor dem Tribunale hinweg, um ihn in eine Anstalt zu bringen.

III. Der Irre gegenüber der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. (fascicol. II. v. April 1867. S. 73.)

Die Gesellschaft in Mitte der liberalsten Institutionen bedarf bestmöglichster Gewährleistung öffentlicher Ordnung und Sicherheit.

Die Gesetze stellen mit dem Maasse der Gleichheit die Pflichten und Rechte der Personen, der Rangklassen, der Gemeinden fest. Wenn die Ruhe, der Frieden und das Erblühen des Lebens Früchte und Belohnungen der Beobachtung dieser Pflichten, der Achtung vor diesen Rechten sind: dann sind Beunruhigung, Unfrieden, Wüstigkeit traurige Folgen der Missachtung derselben.

Gerechte Strafen sind über Jeden zu verhängen, der öffentliche Ordnung und Sicherheit verletzt.

Die Exceptionalität des Geistesgestörten entzieht ihn diesen, auch wenn er letzten verletzt.

Das ganze Verhältniss des Geisteskranken geht nun der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gegenüber hinaus auf Erkenntniss seines specialen Krankheitszustandes und dessen Beziehung zum exceptionellen Stand des Gesetzes.

IV. Die Anforderungen an Gesundheit und Humanität bei Geistesgestörten. (S. 75.)

Es handelt sich bei einem anerkannt Geistesgestörten zunächst darum, klug und zeitgemäss Alles in Anwendung zu bringen, was zu seiner Heilung dient, wenn anders diese möglich ist, ihm zu helfen, wachsamen Beistand zu leisten, Erleichterung und Trost ihm zu spenden, wo keine Heilung zu ermöglichen ist. Die ihm zu widmende Sorgfalt erstreckt sich noch weiter, da Jedermann weiss, dass manche Irre von irren Eltern herstammen und wieder irre Nachkommen erzeugen können.

Damit eröffnet sich mit einem Male ein weiter Horizont für psychisch-moralische Mittel, um dem Geistesgestörten Heilung, Beistand und Ueberwachung zu widmen.

Man hat immer von der Idee auszugehen, was ist der Geistesgestörte? welches seine Exceptionalität?

Die Gesundheitsrücksichten und die Gefühle der Humanität haben sich hier stets mit den socialen Rechten zu verschwistern, um als Zweck Heilung und Beistand des Geistesgestörten, sein und der Gesellschaft Wohl zu erreichen.

Dieser Zweck der Heilung und des Beistandes ist um so fester unter wachsamer Aufsicht im Auge zu behalten, je grössere Gefahr und je grösserer Nachtheil für den Kranken und für die Gesellschaft zu besorgen ist.

Vrf. legt nun ein Gesetzes-Project für Geistesgestörte vor. S. 77.

Er bringt nämlich die im Voranstehenden niedergelegten Prinzipien in 96 Paragraphen in Gesetzes Form.

Für den andern Abschnitt: Der Irre in civilrechtlichem Verhältnisse nimmt er 24 Paragraphen in Anspruch. Die Herstellung der Zurechnungsfähigkeit und Schuld eines Geistesgestörten, in wie ferne seine mentale Alienation positiv als solche erklärt oder vor der Hand noch in Zweifel gestellt werden müsse, mit allen anhängigen Consequenzen scheint der Kern zu sein, aus dem Vrf. seine Irrengesetzgebung organisirt.

Der systematische Plan, welchen er hierbei befolgt, ist ohngefähr folgender: A. er will für die Geistesgestörten einen Direktorats- oder Inspectorats-Dienst beim Ministerium des Innern eingesetzt wissen (S. 82. §. 25 — 33.) Unter B. legt er die Verfügungen ein über die Irren selbst in nachstehenden Punkten: 1) Gutachten über Bestand des Irrseins; 2) ob der Geistesgestörte in seiner Wohnung zu verbleiben habe oder in eine besondere Familie untergebracht werden soll, die sich mit seiner Aufnahme befasst; 3) dessen Aufnahme in eine Irrenanstalt; 4) seine Entlassung aus dem Kreise der bemerkten Familie oder der Anstalt.

Digitized by Google

Cur und Ueberwachung spaltet er nach den über die Geistesgestörten getroffenen Verfügungen in 1) jene zu Hause; 2) bei besonderen Familien; 3) im Irrenhause.

Der erste Abschnitt: das Gutachten über bestehende Geistesstörung in einem Individuum, das man für geistesgestört hält, wird in 7 Paragraphen, von 34 — 40 formulirt (hiezu verfasst er besonders für den prüfenden Arzt oder Alienisten S. 92 bis 95 ein Formular, worin 34 Rubriken auszufüllen sind) — der zweite: der Geisteskranke zu Hause oder in einer besonderen Familie wird in den §§. 43—47 ausgeführt. — Dem dritten Abschnitte: der Geistesgestörte im Irrenhause sind die gesetzlichen Bestimmungen von §. 48 — 61 gewidmet; zum vierten Abschnitt endlich: die Zurücknahme oder Entlassung des Irrsinnigen aus den Familien oder der Anstalt verwendet Verf. die §. 62—71.

Hiemit schliesst er den ersten Theil seines Gesetz-Entwurfes ab, namentlich die gesetzlichen Paragraphen bezüglich auf den Irren in sich selbst.

Der zweite Theil: „Vorkehrungen für Cur und Ueberwachung der Irren," umfasst im ersten Abschnitte: Der Irre zu Hause die §§. 72—74 — im zweiten der Irre im Kreise besondrer Familien die §§. 75—79 — im dritten Abschnitte endlich: der Irre in der Anstalt die §§. 79 — 96. Als Irrenvorstand der Senavra scheint uns *V.* diesem Abschnitte besondere Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Es spricht deshalb auch für die praktische Kenntniss und Erfahrung des Vf's.

Ullersperger.

Ueber Gheel. — Der Irrenfreund (1868. Nr. 9. und 10.) bringt unter der Ueberschrift: „Gheel und seine Bedeutung für die praktische Psychiatrie", einen Vortrag des Herrn Dr. H. *Cramer*, Director der Heil- und Pflege-Anstalt Rossegg bei Solothurn, gehalten in der schweizerischen psychiatrischen Gesellschaft zu Münsterlingen, welcher uns die durch das angegebene Rubrum bezeichnete, bisher vielfach erörterte Frage zum endlichen Abschluss zu bringen scheint und der deshalb nachgelesen zu werden verdient. Es handelt sich hierbei bekanntlich um die Vorzüge der familialen Verpflegung, wie sie in der Irren-Colonie zu Gheel ausgeführt wird, vor der Verpflegung in sonstigen abgeschlossenen Asylen, — Vorzüge, welche laut der Versicherung ihrer Lobredner nicht allein in der Gewährung freierer und behaglicherer, mehr zufriedenstellender Lebens-Verhältnisse an die Irren, und in beträchtlicher Verminderung der

Verpflegungskosten, sondern selbst in der Erreichung günstigerer Heilungs-Resultate bestehen, und die deshalb zur Nachahmung dieser Einrichtung, ja, zum gänzlichen Aufgeben der abgeschlossenen Irren-Anstalten auffordern sollen. — Der Autor beklagt, dass er bei einem Besuche in Gheel seine persönlichen Beobachtungen nicht länger als drei Tage habe fortsetzen können und dass er der persönlichen Bekanntschaft des gerade abwesenden ersten Arztes, Dr. *Bulkens*, nicht theilhaft geworden sei. Aus dem vorliegenden Berichte geht indessen hervor, dass der Verf. die ihm zu Gebote stehende Zeit theils unter der Führung zweier der vier Unterärzte und eines in Gheel wohnhaften jungen Schweizers sorgfältig benutzt hat, um eine genaue und wahrheitsgetreue Schilderung der sämmtlichen Verhältnisse liefern zu können, die er denn ohne die mindeste Voreingenommenheit, völlig unparteiisch und sachgemäss und mit Bezeichnung einiger neueren, bisher unbeachteten Gesichtspunkte giebt, und die ihm zu einem Endurtheile über die gesammte Einrichtung führt, welches mit demjenigen anderer Beobachter im Wesentlichen übereinstimmt und das selbst der schärfste Kritiker wird unterschreiben müssen. Ref. verzichtet darauf, einen Auszug dieses dankenswerthen Berichts mitzutheilen, weil derselbe nicht einen gleich überzeugenden Eindruck, wie die Lectüre des Artikels selbst, würde machen können, und begnügt sich, die hauptsächlichsten Resultate der Beobachtungen des Vf.'s hervorzuheben. — Den „Nourriciers" von Gheel zollt auch der Vf. volle Anerkennung, sowohl hinsichtlich ihres Verhaltens, als hinsichtlich ihrer Natural Leistungen gegen die Kranken. Die letzteren sind ausschliesslich inoffensive, ungefährliche Unheilbare; nur ausnahmsweise treten leichtere Fälle heilbarer Formen von Melancholie und Manie ein. Daher eignen sie sich für die familiale Verpflegung, während das Erforderniss abgeschlossener Asyle für alle offensiveren Formen nicht ausgeschlossen wird. Selbst Gheel besitzt zur Zeit ein solches in seiner Infirmerie, welche für 50 Kranke, eingerichtet, doch selten bis zu 20 beherbergend, keinesweges eine „*simple infirmerie*", sondern ein wirkliches „*asyl fermé*" ist, von schöner Bauart, besonders durch sein Aeusseres einen vortheilhaften Eindruck macht, und eine Umgebung von prächtigen Gärten hat, die jedoch nicht den Kranken zugänglich, sondern für den dirigirenden Arzt und den Secretair reservirt sind. Für die Kranken dienen die „offenbar mit zu hohen Mauern umgebenen" Höfe: wie denn überhaupt in Gh. alles auf Verhütung auf Entweichungen berechnet ist, die an dem Wachtpersonal als das grösste Verbrechen hart bestraft werden. Selbst von der Infirmerie ist die körperliche Beschränkung (durch einen Gürtel) nicht ausgeschlossen;

Digitized by Google

sie bewahrt einen ziemlichen Vorrath von Zwang-Jacken, die nebst den „kleinen Fussketten" auch in der Stadt und den Dorfschaften angewandt werden. Die Placirung der Kranken ist einer Commission, nicht dem Chef-Arzte zugewiesen, der von jener nur consultirt wird. Der verwerfliche Cultus der heil. *Dymphna* hält sich trotz der Anstrengungen des verstorbenen *Guislains* noch immer aufrecht, weil die Colonie von der politisch-klerikalen Partei dominirt wird, der auch *H. Bulkens* sich fügen muss. Dem ärztlichen Dienst kann durch die vier, spärlich besoldeten und auf Privatpraxis angewiesenen Aerzte, deren Chef durch Büreau-Arbeiten vollständig in Anspruch genommen wird, nur sehr unvollkommen genügt werden. Die Zimmer derjenigen Kranken, für welche der niedrigste Satz gezahlt wird, sind um ⅓ bis ½ zu enge, nicht heizbare, dürftig ausgestattete Kerker mit Hochlicht. Die gepriesene Kosten-Ersparniss dieser Verpflegungsweise, welche nur bezüglich der unvermögenden Kranken, also nur für Staats- und Communal-Kassen in Betracht kommen kann, wird nicht allein lediglich auf Kosten der Kranken, die in Folge derselben nur kümmerlich erhalten werden können, erreicht, sondern erweist sich auch als irrthümlich, wenigstens im Vergleich zu den Verpflegungs-Kosten in dem Asyl zu Solothurn. Was endlich das grössere Behagen anlangt, welches die familiale Verpflegung durch die, immer nur scheinbare, grössere Freiheit den Kranken gewähren soll, so zeigt der Vf., dass es durchaus illusorisch ist. Als der einzige Vorzug Gheel's vor unsern Asylen bleibt nur: dass es eine Bevölkerung besitzt, die mit dem Kranken sehr gut umzugehen versteht. Und da diese Bevölkerung sich nicht schaffen lässt, sondern durch Uebung und Lehre von Jahrhunderten entstanden ist, so würde sich diese Colonie, selbst wenn sie eine Nachbildung verdiente, nicht nachahmen lassen.

Fl.

[*Aus Posen.* — In der 3. Plenar-Sitzung des Provinzial-Landtags wurden in Betreff der Irrenbewahr-Anstalt zu Kowanowko und die Herstellung einer neuen Provinzial-Irrenanstalt in Owinsk folgende Beschlüsse gefasst: 1) Von dem Ankauf der Anstalt Kowanowko als Provinzial-Irren-Pflegeanstalt sowohl, als auch von Herstellung einer neuen Provinzial-Irren-Pflegeanstalt auf dem von dem Sanitätsrath Dr. *Zelasko* unentgeltlich angebotenen Areale und von weiteren Zuwendungen zu der Kowanowker Anstalt aus Provinzial-Fonds wird Abstand genommen. 2) Es soll eine neue Provinzial-Irren-Heil- und Pflege-Anstalt nach dem Bauprogramm des Regierungs- und Baurathe *Koch* neben der bereits bestehenden Provinzial-

Digitized by Google

Irren-Heilanstalt zu Owinsk erbaut werden. 3) Die Kosten zur Erwerbung des Grund und Bodens hierzu (etwa 100 Morgen) und zur inneren Einrichtung der Anstalt, so wie zu etwaigen Abänderungen und Reparaturen an der alten Anstalt im Betrage von 300,000 Thalern werden bewilligt. 4) Es wurde beschlossen, dass diese Kosten durch Emission von Provinzial-Obligationen zu 5 pCt. Zinsen, mit 1 pCt. Amortisationsfonds, gedeckt werden sollen. 5) Eine Ausführungs-Commission soll hierzu, namentlich in Betreff der Emission der Provinzial-Obligationen und des Abschlusses eines Kaufvertrages mit dem Rittergutsbesitzer *v. Treskow* über die erforderliche Landfläche erwählt werden. — Die von dem Grafen *v. d. Recke-Volmerstein* für das Deutsche Samariter-Ordensstift zu Kraschnitz erbetene Unterstützung von 1000 Thlrn. jährlich, gegen die von demselben zu übernehmende Verpflichtung, 15 Freistellen für Blöd- und Schwachsinnige der Provinz Posen zu gewähren, wurde bewilligt. (Posn. Ztg. v. 19. Octbr.)

Aus Sachsen. — Von dem Bezirksgerichte Borna ist nach öffentlicher Hauptverhandlung ein gewesener Wärter der Irrenversorgungsanstalt zu Kolditz Namens Nagel wegen an einem Verpflegten verhangener „Körperverletzung mit tödtlichem Erfolge" zu 8jähriger Zuchthausstrafe verurtheilt worden. Diese von dem Ministerium des Innern in Oberaufsicht der Landes-Irrenanstalten veranlasste Criminaluntersuchung hat einen schrecklichen Beleg geliefert, bis zu welchen verbrecherischen Ausbrüchen unverständige Leidenschaftlichkeit gereizt durch das nächtliche tobsüchtige Gebahren eines in der Zelle isolirten Irren sich hat steigern mögen. Der Sessel des Kranken, ein würfelförmiger Holzrahmen mit breiten Gurten überspannt, ist von dem Wärter gemissbraucht worden, den Tobenden wiederholt auf die Brust zu schlagen. Die dadurch veranlassten zahlreichen Knochenbrüche des Brustkorbs (erklärlich durch die mit gewissen Formen vorgeschrittenen Irreseins verbundene Knochenbrüchigkeit, insbesondere der Rippen) haben nach ärztlichem Urtheile den Tod des Kranken vorzeitig herbeigeführt.

Wenn jedoch ein Referat des „Frankf. Journals" an die Meldung des Vorfalls die Bemerkung knüpft, es solle in dessen Folge die Anstalt Kolditz einer seit langer Zeit geforderten zeitgemässen Reform unterworfen werden, so ist dagegen zu bemerken, dass die Anstalt Kolditz überhaupt nicht anders, als zur Zeit derartige umfängliche Irrenanstalten aller Orten, organisirt ist, und dass auch irgend welche denkbare andere Organisation keine Garantie dafür zu leisten vermöchte, dass nicht in der Auswahl der Wärter, na-

mentlich bei zufällig stärkerem Bedarf und geringerem Angebote, durch empfehlende Aeusserlichkeit bei gewandter Verstellung ein mehr oder minder verhängnissvoller Missgriff herbeigeführt werden könne. Der Wärter muss Muth und Energie besitzen, andererseits, obschon er aufgeregten und gewaltthätigen Irren gegenüber stets in Gefahr des Leibes und des Lebens gestellt ist, muss doch noch von ihm verlangt werden, dass er gefährlichen Angriffen gegenüber selbst auf das Recht der Nothwehr verzichte, sofern solche die Kranken gefährden würde. Hier kann nur die rechte Gemüthsbeschaffenheit Sicherstellung vor Ausschreitungen gewähren. Auf deren Erforschung aus den Lebensvorgängen der zum Wärterdienst sich Anbietenden und auf sonstige Erprobung als erstes Erforderniss der Auswahl hinzuweisen, hat deshalb auf Anlass des traurigen Ereignisses sich beschränkt werden müssen.

Die angebliche Reform der Anstalt Kolditz, von welcher der Referent des „Fr. Journ." gehört hat, betrifft dagegen nur eine Erweiterung und Erleichterung der Anstalt durch Einrichtung einer benachbarten, auf landwirthschaftliche Beschäftigung bei ländlichem Unterkommen berechneten Anstaltsabtheilung nach Art der fermes agricoles, Meiereien u. s. w. einiger Irrenanstalten.

(Dresdner Journ. Nr. 294.)

Aus Ungarn. — Das für das Königreich Ungarn nächst Ofen unter dem Namen: „Königlich Ungarische Landesirrenanstalt am Leopoldsfelde bei Ofen" erbaute Asyl für Geisteskranke ist eine „öffentliche Landesirrenanstalt."

Die Anstalt ist selbständig, sie ist eine vereinigte Heil- und Pflegeanstalt, als Pflegeanstalt jedoch nur für gemeinschädliche Kranke bestimmt.

Obwohl die Anstalt nur für Ungarn begründet wurde, so werden doch nach Zulässigkeit des Raumes auch Geisteskranke aus anderen Provinzen aufgenommen.

Director der Anstalt ist Med. und Chir. Doctor *Emil Schnirch*, Primararzt Dr. *Carl Bolyó*, I. Secundararzt Dr. *Paul von Jesrensky*, II. Secundararzt Dr. *Leopold Heckinger*. Vorgesetzte Behörde ist das Königliche Ungarische Ministerium des Innern. Nächste Eisenbahnstation sind gleichmässig die Eisenbahnstation zu Ofen oder Pest, je nachdem der Reisende vorzieht, auf der Wien-Ofner, oder Wien-Pester Route zu reisen; die Entfernungsunterschiede sind unbedeutend.

Die Anstalt ist für die Unterbringung von 800 Geisteskranken

erbaut, die Bau- und Einrichtungskosten betrugen bisher mehr als 1,300,000 Thlr.

Eröffnet wurde die Anstalt am 6. December 1868, und es wurden an diesem Tage 41 Männer und 43 Frauen, zusammen demnach 84 Kranke aufgenommen.

Erbaut wurde die Anstalt aus den schon durch Kaiser *Joseph II.* hiezu gesammeltem Fonds und den zu Folge Allerhöchster Entschliessungen Seiner Majestät des jetzt regierenden Kaisers von Oesterreich und Königs von Ungarn noch ausserdem zur Erbauung dieser Anstalt grossmüthigst geschenkten Beiträgen. Die Einrichtung wurde durch den Reichstag des Königreichs Ungarn aus dem Allg. Ungar. Landes-Aerar bewilligt. Nach Belegung der Anstalt mit einer verhältnissmässig grösseren Anzahl von Kranken wird der gesammte Personalstand der Anstalt bestehen aus: 1 Director, 2 Primarärzten, 4 Secundarärzten, 1 Prosector, 1 Apotheker, 1 Verwalter, 1 Controleur, 1 Amtsadjuncten, 1 Amtsschreiber, 2 Portieren, 1 Amtsdiener, 1 Postboten, 2 Inspectionsdienern, 6 Oberwärtern, 20 Wärtern, 20 Wärterinnen, 2 Badedienern, 1 Gärtner, 1 Gärtnersgehilfen, 1 Wäschbesorgerin, 1 Maschinisten, 1 Maschinistengehülfen, 1 Maschinenheitzer, 1 Hausmaurer, 4 Hausknechten.

Das Personal der Anstalt, — Aerzte und Beamten (mit Ausnahme der Secundarärzte, die vorläufig nur auf die Dauer von je 2 Jahren ernannt werden), ist nach den für Königlich Ungarische Staatsbeamte bestehenden Normen pensionsberechtigt; ebenso sind alle Diener der Anstalt nach 10jähriger tadelloser Dienstleistung pensionsberechtigt nach den bestehenden Normen.

In Ungarn besteht gegenwärtig ausser dieser Anstalt noch die selbständige Privatirrenanstalt für 100 Kranke des Med. Dr. *Franz Schwarzer* zu Ofen. — Irrenabtheilungen bestehen bei den allgemeinen Krankenhäusern zu Ofen, Pest, Pressburg, Erlau, Papa, Grosswardein, S. A. Ujhely, Francsin, Neutra, Arad, Miskolu Sregsrard, Kaposvár und mehreren andern.

Aus Kasan. — Die Irrenanstalt ist vollendet und wird nun bald definitiv eröffnet werden. Sie ist mit Dampfheizung und Ventilation, in den Beamten-Wohnungen mit Wasserheizung versehen. Die Directorialwohnung ist seit September bezogen und die Heizung hat sich auch bei strengem Frost bewährt. Seit drei Jahren lehrt unser verehrter College *Frese* im fernsten Osten von Europa den Medicinern Psychiatrie, seit einem Jahre den Juristen gerichtliche Psychologie und Psychiatrie. Bei der Unsicherheit, mit welcher jetzt noch in Deutschland dieser Gegenstand aufgefasst wird, dürfte die

Digitized by

Besetzung des Lehrstuhles durch den Director der Anstalt auch unser lebhaftes Interesse erwecken.

Aus New-York. — Die grosse Irrenanstalt zu Cleveland im Staate New-York ist am 19. Nov. durch eine Feuersbrunst zerstört worden, wobei 6 Menschen ums Leben kamen. (Illst. Ztg. Nr. 1326.)

Von einer Feuersbrunst der Irrenanstalt in Columbus wird berichtet, dass sie Abends 9 Uhr im rechten Flügel begann, wo 50 weibliche Irre einen Schlafsaal bewohnten. Als die Spritzen ankamen, war der Brand noch nicht über die Thür hinaus, aber drinnen der Rauch so dick, dass sich Niemand hinein getraute. Endlich drangen einige beherzte Männer mit den Wärtern des Hauses mit Gewalt in den verschlossenen Schlafsaal (der Schlüssel war in der Bestürzung nicht zu finden gewesen) ein. Einige Kranken wollten nicht heraus, andere wurden glücklich entfernt, etwa 20 hatten schon den Erstickungstod gefunden. Man glaubt, eine der Irren habe das Feuer dadurch veranlasst, dass sie ein Stück Papier am Gasbrenner, der den Flur erhellt, angezündet und dann ihr eigenes Bett angesteckt habe. (Sor. Ztg. Nr. 1.)

Psychische und physische Degenerationen. — Dr. *Morel* hielt in der Sitzung der Acad. de méd. zu Paris am 25. Februar 1868 einen Vortrag über folgendes Thema: Analogies entre les dégénérescences physiques, morales et intellectuelles des habitants des contrées paludéennes et celles des habitants des pays goîtrigènes, und kam zu nachstehenden Conclusionen:

Die Entartungen des intellectuellen Wesens, des ursprünglichen Körperzustandes und des Gemüthes, welche man bei den Bewohnern der Sumpfländer und in den kropferzeugenden Gegenden antrifft, bieten hinreichende frappante Analogieen dar, um sie in dem einen, wie andern Falle als das Resultat einer Malaria betrachten zu können, die von der speciellen Bodenbeschaffenheit und dem Verhalten des Untergrundes, sowie der Verdorbenheit der Atmosphäre, welche die Folge davon ist, abhängt.

Wenn diese beiden Degenerescenzen distinctive Charaktere haben, welche nicht zulassen, eine einzige Krankheitsvarietät davon zu machen, so besitzen sie hinsichtlich der bei den individuellen Opfern beider Endemieen beobachteten pathologischen Phänomene Berührungspunkte genug, die es möglich machen, die Behandlung, die Hygieine und die Prophylaxis auf eine Basis zu stellen, die der rationellen Anschauung des fraglichen Objectes und der Wissenschaft entspricht. Das Jod scheint bei der Behandlung des Kropfes und der Kropf-

Digitized

cachexie in der Weise der sogenannten tonisch-neurosthenischen Medicamente zu wirken, die nach *Trousseau* und *Pidoux* zur Mission haben, den Lebenskräften eine grosse Resistenz aufzudrücken und in ihnen Synergieen zu bilden.

Die Folgen der Sumpfmalaria und der Malaria der kropferzeugenden Gegenden sind von solcher Natur, dass die excessive Herabsetzung der Lebenskräfte, welche bei den afficirten Individuen von vornherein erscheint, ihnen nicht erlaubt, eine energische Reaction zu entwickeln und ihre Existenz unter allen Destructionsursachen, welchen sie ausgesetzt sind, bis zu deren Termine auszuführen.

Wenn das Jod und die China vortreffliche Medicamente sind, die den Kranken dazu dienen, gegen die auf sie einwirkenden Ursachen der Zerstörung zu reagiren, so bleiben sie doch ungenügend, die Bewohner der contaminirten Länder zu regeneriren, wenn man nicht mit Hülfe der energischen Mitwirkung der Regierung zur Gesundmachung der betreffenden Erdstriche schreitet. Scheint die Theorie der vermeintlichen nachtheiligen Trinkwässer auch nicht begründet genug, um die Ursachen des Kropfes und des Cretinismus zu erklären, so scheint es nichtsdestoweniger unbestreitbar, dass der Gebrauch der Regen- und Jodwässer vorzugsweise der Hygieine der Bewohner der kropferzeugenden Gegenden von unsäglichem Nutzen sein muss. Allein man wird zu keinem radicalen Resultate gelangen, wenn die Vorschriften einer guten intellectuellen, physischen und moralischen Hygieine der Aerzte und deren strenge Befolgung, sowie die Beschützung derselben von einer wachsamen und kräftigen Administration diesen Menschen nicht aufgedrungen werden, denen im Allgemeinen die Initiative und Energie fehlen. Gegenüber den durch die Veränderung des Clima's erlangten ausgezeichneten Wirkungen, sowie dem den medicinischen Vorschriften von Seiten der Eltern der mit Kröpfen behafteten Kinder entgegengesetzt werdenden Verfahren, welche hoffen, sie dadurch der Conscription zu entziehen, sollte man den Revisionsräthen vorschlagen, die Kröpfe nicht mehr unter die Exemptionsfälle des Militairstandes zu zählen.

Dies Siechthum, Symptom einer Endemie, die in mehr denn 52 unserer Departements herrscht, ist heilbar, wie die Sumpf- und Pellagracachexie, durch Veränderung des Clima's und der Nahrungsmittel, ohne auf die Anwendung der Jodsalze und vornehmlich des Deutojodürquecksilbers zu rechnen.

Dies wären die Schlussfolgerungen dieser Exposition, deren Kürze wegen des Interesses entschuldigt werden möge, das sich für die Zukunft dieser heimgesuchten Bevölkerung darin ausspricht. Viele Personen glauben noch, dass man bei der Unwissenheit, worin

Digitized b

man sich in Bezug auf die nächste Ursache des Kropfes und des Cretinismus immer noch befinde, es unmöglich sei, dem Uebel vorzubeugen. Da Grund ist, das Gegentheil anzunehmen, so ist zu wünschen, dem kritischen Wohlwollen der Academie die theoretischen Ideen zu unterwerfen und die Hoffnungen unter ihren Schutz zu stellen. Dr. *Droste.*

Ein spontanes Othämatom — beobachtete *Wendt* in der Leipziger Poliklinik. Bei einem kräftigen Manne entwickelte es sich aus einer Art „Hautblüthe", die Anfangs geröthet nie schmerzhaft gewesen sei und allmälig an Grösse zugenommen hat. Eine traumatische Einwirkung wurde in Abrede gestellt. Die taubeneigrosse, pralle, deutlich fluctuirende Geschwulst nahm den vorderen oberen Theil der concaven Seite der Muschel der Art ein, dass durch sie die *Fossa innominata*, die *Crura furcata*, der *Anthelix* und dessen Anfangstheil überdeckt wurden. Die Haut war von normaler Färbung und Temperatur. Ein Einschnitt ergab als Inhalt eine gelbliche, schwach blutig tingirte Flüssigkeit, welche unter dem Mikroskop zahlreiche, meist wohlerhaltene Blutkörperchen wahrnehmen liess und ein am Grunde ziemlich fest haftendes Gerinnsel. Später erfolgte eine Apoplexie in die Geschwulst und wurde so eine Vergrösserung herbeigeführt. Nach Entfernung der Gerinnsel trat Verheilung ein.

Verletzungen der Ohrmuschel wurden mehrfach beobachtet; nie waren sie mit Othämatom complicirt. (Arch. f. Ohrenheilk. 1867. II., s. d. Pr. Vierteljahrsschr. 1868. I. S. 73).

Die Psychiatrische Section der Naturforscherversammlung in Dresden. — „Wahrhaft wohlthuend wirkte auf den stillen Beobachter die Section für Psychiatrie. Das vortreffliche collegialische Zusammenhalten ihrer Vertreter erschien mir wenigstens als der Ausfluss einer Humanität, die so recht die eigentliche Grundlage einer der bedeutungsvollsten Sectionen der medicinischen Wissenschaften ist. Die Verhandlungen der sechs Sitzungen bewegten sich auch meist auf diesem Boden." — (Dr. *Ule* in „die Natur". 1869. Nr. 10.)

Dr. Carl Ferdinand Kern, Nekrolog. — *Carl Ferdinand Kern*, der Sohn eines Nadlers, wurde geboren zu Eisenach am 7. Juni 1814, besuchte zunächst die Bürgerschule (in der er schon zeitig als Lehrer seiner jungen Mitschüler mit verwendet wurde), dann aber das Gymnasium und Schullehrerseminar seiner Vaterstadt. Alsbald, nachdem er das Schulamtscandidaten-Examen überstanden, übernahm er fast ganz allein unter Leitung des Oberconsistorialraths

Toepfer zu Eisenach die Erziehung und Belehrung zweier Knaben, die, im Confirmandenalter stehend, bis dahin wegen hochgradiger physischer und psychischer Schwäche ohne allen Unterricht geblieben waren, von denen der eine blödsinnig, der andere ein taubstummer Cretin war, sowie später die eines geistesschwachen und taubstummen Mädchens. Ostern 1836 begab er sich zu weiterer Ausbildung in diesem schwierigen Zweige der Pädagogik an die Taubstummen-Bildungsanstalt zu Weimar und drei Monate später nach Leipzig, wo er vom seligen Director *Reich* mit dem grössten Wohlwollen aufgenommen wurde. Nach Hause zurückgekehrt fand er leider nicht die nöthige Unterstützung zur Begründung eines derartigen Instituts und war schon im Begriff, der Vocation der Kurfürstlich Hessischen Regierung zur Uebernahme einer städtischen Lehrerstelle zu folgen, als ihn ein Brief *Reich's* zum Lehrer der Leipziger Taubstummenanstalt berief, wo er 3 Jahre lang wirkte. Im Jahre 1839 nach Eisenach zurückberufen, fand und benutzte er sofort die Gelegenheit, neben seinen Taubstummen auch geistesschwache und blödsinnige Kinder zu unterrichten und zu erziehen, ja es wurde durch Rescript vom 2. März 1843 nach sorgfältiger Prüfung seiner Methoden durch das Grossherzogliche Kirchen- und Schulraths-Collegium sein Institut zur Bildung Schwach- und Blödsinniger ausdrücklich autorisirt, so dass es am Schlusse dieses Jahres bereits 18 Zöglinge zählte. Als sich nun seine Schwestern, die bis dahin sein Hauswesen verwaltet hatten, verheiratheten, verehelichte er sich selbst am 1. Januar 1843 mit seiner gleich strebsamen und höchst ehrenwerthen Frau *Caroline* geb. *Köhler* aus Bitterfeld. Gern und freudig erkannte er es stets an, wie sehr diese seine treue Lebensgefährtin ihn bei Allem, was er erreichte, wirksam gefördert und unterstützt, Tag und Nacht alle seine Arbeiten und Mühen getheilt, seinen Kindern und Pflegebefohlenen, ohne sich Rast und Erholung zu gönnen, eine treue sorgende Mutter gewesen. — 1844 wurde *Kern's* Anstalt, die damals unter ihren Schülern allein schon 13 blödsinnige Kinder zählte, durch den Grossherzoglich Sächsischen Geheimen Medicinalrath Dr. *von Froriep* inspicirt, der eine Erweiterung derselben befürwortete und ihr noch von auswärts neue Zöglinge zuwies. Je mehr nun blödsinnige und geistesschwache Kinder ihm zugeführt wurden, um so weniger konnte er sich der Unmöglichkeit verschliessen, zahlreiche Taubstumme und Blödsinnige gleichzeitig gewissenhaft zu erziehen und der ihm überdies noch obliegenden Verpflichtung zu genügen, die Schulamts-Candidaten in der theoretischen und practischen Erziehung der Taub-

Digitized by Google

stummen und Stammelnden zu unterweisen, und so reifte sein Entschluss, sich nun allein der Schwach- und Blödsinnigenbildung zu widmen. Obwohl die Bürger Eisenachs zusammentraten, um durch Vermehrung seiner Einkünfte ihn dauernd der Heimath zu erhalten, liess er sich in der vollständigen Ausführung seiner Pläne nicht beirren und in richtiger Erkenntniss seiner Aufgabe und im unendlichen Drange nach grösster Vervollkommnung seiner Anstalt verlegte er dieselbe mit Genehmigung des Cultus-Ministeriums im Monat Februar 1847 nach Leipzig und liess sich nach erlangter Dispensation (deren er als verheiratheter Mann bedurfte) am 13. December desselben Jahres als Student der Universität inscribiren, Anfangs allerdings nur, um Anatomie und Physiologie zu hören. Wie aber unser *Kern* nichts halb sein konnte, verfolgte er alsbald das ganze medicinische Studium mit Glück und Ausdauer neben unausgesetzter, gewissenhafter Leitung seiner Anstalt, der er gleichzeitig als Lehrer und allseitig gebildeter Arzt nun um so erfolgreicher vorzustehen vermochte. Seine Inauguraldissertation: „De fatuitatis cura medica et paedagogica consocianda", durch deren Vertheidigung er sich am 16. März 1852 die medicinische Doctorwürde erwarb und eine in der Zeitschrift für Psychiatrie, 12. Band, 4. Heft veröffentlichte Arbeit: „Gegenwart und Zukunft der Blödsinnigen-Bildung" sind sogar als bahnbrechende Schriften für seine speciellen Fachgenossen von bleibendem Werthe. Es wird daher nicht Wunder nehmen können, dass auch bei Verschmähung aller Reclame und trotz der grossen Bescheidenheit, mit der er weitern Veröffentlichungen über seine Anstalt und deren Erfolge entsagte, seine Zöglinge sich jährlich mehrten und ihm zum Theil aus weiter Ferne (aus der Schweiz, Russland, Ostindien) zugeführt wurden, so dass zur Beschaffung immer grösserer Räumlichkeiten die Anstalt 1854 nach Gohlis und 1859 nach Möckern verlegt werden musste. Am letzteren Orte sind ausserdem noch einige erwachsene Geisteskranke und Nervenleidende verpflegt worden, und namentlich hinsichtlich der Letzteren wurden von ihm durch Aufwendung grossen diagnostischen Scharfblicks und genauer Beobachtungen Erfolge erzielt, welche mit Recht die höchste Ueberraschung anerkannter Autoritäten in der Psychiatrie erregten. Wer seine Anstalt nur zu besuchen und das Leben in derselben zu beobachten Gelegenheit hatte, wird es uns gern bestätigen, dass er nicht leicht, ohne Mühe, oder in gewöhnlicher Ruhe dahin gelangte, dass er unausgesetzt besserte und vervollkommnete an den Einrichtungen, der Hausordnung, Unterrichts- und Heilmethoden nach gewissenhafter und unparteiischer

Prüfung aller obwaltenden Verhältnisse, mit unverdrossenem Eifer Tags und Nachts mit Frau und Kindern seine Pflegebefohlenen beobachtete, sie hütete, über sie wachte.

Hatte zwar *Kern* auch nur die Zwecke der Blödsinnigen-Bildung allein vor Augen gehabt, als er das medicinische Studium unternahm und erfolgreich durchführte, so war er doch in den Stunden der Noth seinen Nachbarn und selbst den Gliedern dieser oder jener Nachbargemeinde als Arzt, Wundarzt und selbst als geschickt und sicher operirender Geburtshelfer gern nahe, versah auch im Sommer 1866 während der Choleraepidemie die Function eines adjungirten Bezirksarztes für Möckern und Umgegend. Daneben verfolgte er mit Ernst und Eifer unausgesetzt die medicinische und pädagogische Wissenschaft in der Literatur, wie im Verkehre mit deren Anhängern; so war er bis an seinen Tod thätiges Mitglied der Leipziger pädagogischen Gesellschaft, des ärztlichen Kreisvereins, wie deren Leipziger Zweigvereine (für Standesangelegenheiten, Medicinalgesetzgebung und Gesundheitspflege) der medicinischen Gesellschaft, der Gesellschaft für Geburtshülfe, des Vereins von Freunden der Erdkunde zu Leipzig, der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie u. s. w. Nicht minder emsig und erfolgreich war seine Thätigkeit für das allgemeine Wohl und das festbegründete allgemeine Vertrauen bewirkte seine Wahl zum Mitgliede des Gemeinderaths zu Möckern, des Kirchenvorstandes in der Parochie zu Wahren, des Vorstandes vom Landwaisenhause zu Leutsch; er gehörte auch zahlreichen wahrer Humanität dienenden Gesellschaften an, wie er auch gegen Jedermann ein ehrliches Wohlwollen hegte und stets bereit zu finden war, wo es galt, ein gutes Werk zu fördern. Es hiesse seinem edlen Herzen im Grabe wehe thun, hier noch speciell die rührenden Züge seines so gern geübten Wohlthätigkeitssinnes, seiner unerschöpflichen Menschenfreundlichkeit einzeln aufzuführen, wie sie die Bewohnerschaft seines Wohnsitzes sattsam kennt. Ein stilles, aber herrliches Familienglück, — Gott hatte seine Ehe mit zehn gesunden und wohlgerathenen Kindern gesegnet, — verschönerte sein Leben, das leider! nach menschlichem Ermessen, viel zu früh enden sollte. Der heftige Orkan am 7. December 1868 mit seinen Verheerungen in der ganzen Umgegend hatte ihn ungemein geistig erregt erscheinen lassen, und kaum schienen die Wogen seiner Unruhe und Besorgniss beschwichtigt, als er am 9. Dezember Abends gegen 7 Uhr schon aphasisch in die Wohnung eines Schwagers eintrat, alsbald unter Zittern der oberen Extremitäten umsank und bald nach Mitternacht sanft und ruhig ver-

Digitized by Google

schied*)! — Die Obduction ergab eine heftige Gehirnapoplexie, ausgehend von einer Gefässruptur an der Basis, während der Erguss die ganze linke und den vorderen Lappen der rechten Hemisphäre überzog. — Mit unendlicher Wehmuth sieht jeder wahre Menschenfreund sobald ein Tagewerk sich schliessen, das voll Mühe, Arbeit, Beschwerden und Aufopferung für die Menschheit und ihre heiligsten Interessen war, wie irgend eines, das aber sicher auch ein herrliches war:

„Denn wer den Besten seiner Zeit genug
Gethan, Der hat gelebt für alle Zeiten!"

Dr. *Emil Apollo Meissner*,
Privatdocent an der Universität und Arzt
am Taubstummen-Institut zu Leipzig.

Drei Nekrologe und einige Anschuldigungen. — Der unerwartet frühe Tod des Geheimrath und Professor *Griesinger* zu Berlin hat der medicinischen Wissenschaft, der dortigen Hochschule und seinen Freunden einen grossen und schweren Verlust zugefügt. Den letzteren musste es nahe liegen, ihrer Trauer vernehmlichen Ausdruck zu geben und wir verdanken diesem gerechtfertigten Drange einige biographische Denkschriften, welche der lebhaften Theilnahme an dem Verstorbenen und an seinem Hinscheiden in nahen und fernen Kreisen entgegen kommen. Von einer solchen, dem Andenken eines ausgezeichneten und thätigen, fruchtbaren Arbeiters im Felde der medicinischen Wissenschaft gewidmeten Todtenfeier geben uns die von seinen Freunden, den Professoren *Lazarus* und *Westphal* in der med.-psych. Gesellschaft zu Berlin gehaltenen Reden, (vergl. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten I. B. 3. Hft., S. 760 und f.) und die biographische Scizze des von Jugend auf mit *Griesinger* befreundeten Professor *Wunderlich* in Leipzig (aus dem Archiv der Heilkunde 1869, 2. Heft, durch einen Separatabdruck verbreitet) willkommene Kunde. Standreden, wie sie bei jenen aegyptischen Todtenbestattungen gehalten zu werden pflegten, welche nicht nur alle Tugenden und lobenswerthe Eigenschaften des Verstorbenen, alles, was er Rühmliches erstrebt und der Mit- und Nachwelt Dan-

---

*) Die *Kern*'sche Anstalt besteht unter der bewährten Leitung der Gattin des Verstorbenen, unter dem Curatorium der Herren Professoren *Sonnenkalb* und *Winter*, des Privatdocenten *A. Meissner* in Leipzig und des Dr. *Köhler* in Hubertusburg fort. Der Hausarzt Dr. *Haenel*, der seit 7 Jahren dort thätige Lehrer *Funke*, und als Lehrerin Fräulein *Kern* wohnen in der Anstalt. Anm. d. Red.

kenswerthes geleistet hatte, sondern zugleich alle seine Mängel und Schwächen aufzählten, — solcherlei Standreden wird man heut zu Tage nicht erwarten. Gewöhnlich begnügt man sich mit dem ersten Theile dieser Aufgabe, indem man, den Gefühlen der Pietät und der Freundschaft genügend, einen vollen Kranz des Ruhms und des Dankes auf den Grabhügel des Todten niederlegt. Wer wollte sich nicht gern diesem feierlichen Zuge anschliessen und ein Lorbeerreis diesem Todtenopfer hinzufügen, der die Verdienste *Gr.'s* kennt; der dem regsamen, ordnenden, aufklärenden Geiste gefolgt ist, welcher die Pathologie und Therapie der Geisteskrankheiten, das Werk über die Infections-Krankheiten und so viele weniger umfangreiche, aber nicht minder zum Beifalle und zum Weiterdenken anregende Schriftstücke geliefert hat —? Auch wir schliessen uns diesem Zuge an mit solcher Hingebung, dass sie uns abhält bei der Schilderung jener Mängel zu verweilen, die unsers Fleisches Erbtheil, jenen Schwächen und Fehlern des Verstorbenen, welche, lobend sei es anerkannt, namentlich die Feder eines der oben genannten Biographen, des Prof. *Wunderlich*, aufrichtig und treu entworfen hat, und welche zur Erklärung der mancherlei Widersprüche in dem Character, wie in dem Verhalten des nun Entschlafenen dienen mag. Aber wir beklagen es, wenn wir sehen, wie man diese Todtenfeier ihrer Würde entkleidet, indem man, um sie gleichsam durch einen künstlich gesuchten Gegensatz zu erhöhen, auf diejenigen Steine des Vorwurfs wirft, welche, von dem Verstorbenen im letzten Stadium seines Lebens zu einem wissenschaftlichen Kampfe aufgefordert, diesen Kampf aufgenommen und ernstlich, aber ehrlich geführt haben. Dieser Versuchung haben die genannten Biographen nicht widerstehen können, und noch andere haben sich dabei mit ihnen vereinigt. Uns aber, — wir reden im Namen Aller, gegen welche jene Vorwürfe gerichtet sind, — muss es gestattet sein, muss es als eine Verpflichtung gelten, solche unziemliche Angriffe zurückzuweisen, und wir werden es hier thun, indem wir mit allen denen, die sich uns so zu Gegnern aufwerfen, wo möglich ein für allemal die Rechnung abschliessen. Wir erklären, dass wir es dabei nur mit ihnen, nur mit den Lebenden, nicht mit dem Todten zu thun haben. Es wird nicht immer gelingen, seiner unerwähnt zu lassen: doch nicht wir, sie selbst, unsere Gegner beschwören diesen Schatten herauf, damit er durch ihren Mund Klage gegen uns erhebe. — Und da sich die vorgebrachten Anschuldigungen ziemlich gleichlautend, nur hier in schärferem, dort in milderem Tone wiederholen, so werden wir uns vornehmlich an den mildesten Ausdruck derselben halten, wie er uns in der biographischen Scizze des Herrn Prof. *Wunder-*

Digitized by Google

lich entgegentritt. Wir werden dabei nicht unbeachtet lassen, dass seine Beurtheilung der Vorgänge offenbar auf unzureichender Kenntniss derselben beruht, was Andern, die sich zu Richtern aufwerfen, nicht zur Entschuldigung dienen kann. Jedoch müssen wir darum nicht minder kräftig gegen die Urtheilssprüche Protest erheben.

„*Griesinger*" so heisst es in der citirten Biographie S. 22, „war auf einer nur selten erreichten Höhe wissenschaftlicher Autorität, aber auch auf einem Puncte äusserster geistiger Spannung angekommen. Trotz vieler und einflussreicher Widersacher galt er als der erste Nerven- und Seelenarzt Deutschlands. Aber die Höhe, zu der er sich emporgearbeitet, war für ihn kein Platz zu geistigem Ausruhen und behaglichem Geniessen. Grossartige Pläne für die Reconstruction der ganzen Nerven- und Seelen-Pathologie gährten in seinem Kopfe: Vieles lag so fertig in ihm, dass nur die Musse zur Ausarbeitung mangelte. Der Kampf, der durch seine Forderung humanerer Behandlung der Irren angefacht worden war, hatte ihn intensiver ergriffen, als seine haltungsvollen Entgegnungen erkennen liessen; es glühte in ihm, wie in dem jüngsten Heissporn; sicher seines schliesslichen Sieges dürstete er danach, in nächster Zeit die Gegner seine Ueberlegenheit empfinden zu lassen. Da sollte ihn, der keine Ruhe sich gönnte, die gezwungene und letzte Ruhe erfassen." Es ist hier von dem Zeitpunkte die Rede, in welchem *Griesinger* im Jahre 1868 im 1. Hefte seines Archivs für Psychiatrie und Nervenkrankheiten sein Project einer Reform der gesammten psychiatrischen Wissenschaft, ihres theoretischen wie praktischen Theiles ankündigte. Bis dahin war kein einziger „Widersacher", weder ein einflussreicher, noch der unbedeutendste gegen ihn aufgetreten, und wenn er sich die glänzenden Prädikate, die ihm hier beigelegt werden, selbst beigelegt hätte, was wir kaum für möglich halten, — wenigstens konnte Niemand auf den Gedanken kommen, sie ihm streitig zu machen. Dieses Reform-Project selbst eröffnete einen Kampf, welcher ihn so intensiv ergriff, dass ihm dabei, zum Bedauern aller, die sich kein anderes Gefühl als das der Achtung gegen ihn zu bewahren wünschten, gänzlich die ruhige und leidenschaftslose Haltung verloren ging (vergl. die Streitschrift gegen *Laehr*), — nicht aber seine Forderung humanerer Behandlung der Irren fachte diesen Kampf an. Es liegt allzu nahe, aus diesen Worten herauszulesen, dass *Gr.* eine inhumane Behandlung der Geisteskranken vorgefunden und sich gedrungen gefühlt habe, sie aus dem Wege zu räumen. Wie stark und vielfach sich aber auch der Verstorbene bei seinen Angriffen auf die dermalige staatliche und privative Fürsorge für die Irren in

Digitized by Google

den Ausdrücken vergriffen, wie ungerecht er dieselbe oft verurtheilt haben mag: wenigstens die Humanität, welche dieselbe seit *Pinel* zur Trägerin hat, ist von ihm nicht einmal angezweifelt worden. Vielmehr hat er diese Humanität nur vervollständigen wollen, theils dadurch, dass er jedem Geisteskranken dasjenige volle Maas der persönlichen Freiheit gewährt wissen wollte, welches ihm seinem Krankheitszustande nach gewährt werden könne, theils durch die Verpflegung einer grösseren Anzahl innerhalb der dafür bezahlten Familien, — theils durch die gänzliche Beseitigung jeder körperlichen Beschränkung bei der Irrenbehandlung, welche nach dem Vorgange in englischen Anstalten auch bereits in mehreren deutschen eingeführt worden ist. Die ausnahmslose Zulässigkeit und Zweckmässigkeit dieser Forderungen und die Möglichkeit ihrer Erfüllung bildeten einen Theil jener Controversen, die eine durch *Gr.*'s Tod unterbrochene wissenschaftliche Fehde hervorriefen. — Eine Seite früher (S. 21) hören wir den Verf. der biographischen Scizze nachdem er des Beifalls erwähnt hat, welchen das *Gr.*'sche Reform-Project bezüglich der Irren-Anstalten (vergl. den Artikel über Irren-Anstalten und deren Weiterentwickelung in Deutschland) hervorgerufen haben, — also fortfahren: „Eine ungleich andere Aufnahme fand die *Griesinger*'sche Abhandlung bei einem Theile der deutschen Anstalts-Directoren. Die Heftigkeit, mit der dieselbe und ihr Verfasser angegriffen wurden, ist um so wunderbarer, als einzelne der Gegner doch zu beweisen suchten, dass der *Griesinger*'sche Artikel so gut wie nichts Neues enthalte, und dass die darin vorgebrachten Gedanken längst Gemeineigenthum der deutschen Psychiatrie seien." Wir gehen darüber hin, dass den Kritikern dieses Reform-Projectes „Heftigkeit" vorgeworfen wird: denn, wenn der Ernst und die Entschiedenheit, mit welcher die Kritik sprach, Heftigkeit genannt zu werden verdient, so wurde diese doch weit überboten in einer darauf erfolgenden Entgegnung (vergl. die Streitschrift *Gr.*'s gegen *Laehr*). Der Widerspruch aber, den der Verf. den Kritikern zur Last legt, lös't sich einfach und leicht. Man kann sehr wohl von einer Sache urtheilen, dass sie ihr Gutes und zugleich ihr minder Gutes habe. Von allen Kritikern des Reform-Projectes ist anerkannt worden, dass in demselben viel Beachtenswerthes enthalten sei, — Neues und Gutes: aber das Gute nicht neu, — aber das Neue nicht gut. — Endlich einige Zeilen weiter lesen wir: „Als *Gr.* wehrlos und bereits fast ohne Hoffnung auf dem Krankenbette darnieder lag, hielt man es für geeignet, die Dresdener Naturforscher-Versammlung zu benutzen, um über ihn das Anathem zu verhängen." Diese Worte sind nur der schwächste Wiederhall

Digitized by Google

ähnlicher Aeusserungen, welche sich in einem nicht sehr wählerisch stylisirten Correspondenz-Artikel aus der Dresdener Naturforscher-Versammlung in der Wiener med. Wochenschrift (Nr. 78, Jahrg. 1868) und in einem Berichte über die Verhandlungen der Section für Psychiatrie bei dieser Versammlung im 3ten Hefte des Archivs für Psych. und Nervenkrankh. S. 743 und f. vernehmbar machen. Sie deuten an: dass man in schmachvoller Feigheit zu einem Angriff auf *Gr.* den Zeitpunkt wahrgenommen habe, wo der „kranke Löwe" weit entfernt und ausser Stande war, sich zu vertheidigen. Diese Anschuldigung können wir nicht anders, als eine unwürdige nennen. Was gegen *Gr.*'s Reform-Project geschrieben war, als Niemand an seiner Vertheidigungsfähigkeit zweifelte, und wie von beiden Seiten der Streit geführt wurde, liegt jedem, der es lesen will, vor Augen. Dass er nicht selbst auf dem Kampfplatze erschien, — erscheinen konnte, wurde von keinem mehr bedauert als von denen, die ihn als Gegner erwartet hatten, nicht minder jetzt, wie damals, als er in Berlin durch sein Ausbleiben die von ihm herbeigerufenen Gegner in Verlegenheit setzte. Sollte man die Discussion der wichtigsten Tagesfragen, die er angeregt hatte, vertagen bis er genesen oder für immer verstummt sein würde? Jetzt, da eine ansehnliche Anzahl von Männern vereinigt war, welche die Psychiatrie sich zum Lebensberufe gewählt hatten? Jetzt, da der Tag, da die Stunde dazu drängte? Denn, in der That, — wie keck es auch von Einigen bestritten werden mag, — war die Discussion mehrerer dort verhandelter Fragen, die auf das „Reform-Project" Bezug nahmen, von einer Seite angeregt worden, welche officiell zu bezeichnen, nur die Fügsamkeit des Bureau's der psychiatrischen Section Anstand nahm, weil kein officielles Document vorlag. Und die Einstimmigkeit in der — (keineswegs „nach wenigen Bemerkungen", sondern nach langer und lebhafter Debatte) — auf diese Fragen gefundenen Antwort, (denn der Protest der wenigen dissentirenden Stimmmen bezog sich durchaus nicht auf diese Antwort, sondern nur auf einige ihr fern liegende Formalien), — diese Einstimmigkeit beweis't, dass das „Reform-Project" bei denen, welche ihre Lebensaufgabe an die Probleme der Psychiatrie geknüpft haben, nicht gleichen Anklang gefunden hat, wie bei Vielen, welche sich nur flüchtig dieser Disciplin zuwenden konnten.

So steht es mit den Anklagen, unter welchen die Fortsetzung des wissenschaftlichen Streites angekündigt und eingeleitet wird. Möge dieser denn ehrlich geführt werden und ohne die Feindseligkeit, welche jene dictirt hat; mit diesem Wunsche scheiden wir in

Frieden vom Grabe dessen, der gewiss in guter Absicht den Streit anfachte.

Flemming.

Preis - Aufgaben.

Soc. méd.-psych. Ende 1869 (800 Frcs.).

„Des aliénés dangereux, et des mesures à prendre à leur égard. Y-a-t-il des aliénés non dangereux? En cas d'affirmative, quelles dispositions faut-il leur appliquer?"

Einzusenden Dr. *Loiseau*, Paris, rue Vieille du Temple 26.

Académie de méd. de Belgique. Ende 1869 (1000 Frcs.).

„Etudier expérimentalement les effets de l'application du froid et de la chaleur, à différents degrés, sur le système nerveux."

Secretariat de l'Académie, place du Musée à Bruxelles.

Société de Méd. de Gand. Ende 1869. (Une médaille d'or d'une valeur à déterminer suivant l'importance du travail).

1) „Quelles sont les causes de l'augmentation toujours croissante de la population des asiles d'aliénés? Y-a-t-il lieu d'y remédier et par quels moyens peut-on y parvenir?"
2) „Etudier l'influence du physique sur le moral, au point de vue de la responsabilité morale. S'appuyer sur des faits bien constatés."

Dr. *Ch. Willens*, Secrét. de la Soc., rue des Epingles, 10, à Gand.

Prix Guislain. 1. Oct. 1869. (500 Frcs.)

„Faire l'exposé des doctrines médicales dont l'ensemble constitue aujourd'hui la psychiâtrie."

Dr. *Ch. Willens*, rue des Epingles, 10, à Gand.

Société méd. de Philadelphie. 1 April 1870. (1000 Frcs.)

„Aphasie ou Rapports du cerveau avec la pensée."

Dr. *Jeffries* zu Philadelphia.

Digitized by Google

Fig. 1.

Fig. 2.

Lithograph of Figure 1 by Adam, Black & Co.

Personal - Nachrichten.

Prof. extraord. Dr. *Skrzeczka* in Berlin ist zum ausserordentlichen Mitgliede der wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen,

Privatdocent Dr. *Carl Friedrich Otto Westphal* zum ausserordentl. Professor in der med. Facultät der Königlichen Universität zu Berlin ernannt worden.

Berichtigung.

Bd. XXV. Nr. 5. und 6. Seite 734 Z. 4 v. u. lies: der Winkel, womit dieser Curvenstieg von der beigezeichneten Richtungslinie *E R* abweicht, ist kaum grösser, statt: der Winkel, womit dieser Curvenstieg von der bezeichneten Richtungelinie *E R* abweicht, ist kaum kleiner.

Erklärung der Tafel I.

Fig. 1. Ansicht des verletzten Gehirns (Einsicht in den Ventrikel, welcher von der Seite her geöffnet ist und dessen aus Narbengewebe bestehenden Decken zurückgeschlagen sind).

a. *Dura mater.* b. Ventrikelwände.

Fig. 2. Ansicht des Schädeldaches von oben.

Die Stelle eines ordentl. Assistenzarztes an der Irrenheilanstalt zu Siegburg mit einem Gehalt von 300 Thlrn. und freier Station 1ster Classe ist am 1. April c. erledigt.

Ebendaselbst die Stelle eines einjährigen ausserordentlichen Assistenzarztes (200 Thlr. und freie Station 1ster Classe) vom 1. April c. ab.

Die Stelle eines 2ten Assistenten im Asyle Schweizerhof bei Berlin ist zu besetzen. Gehalt 300 Thlr. und freie Station.

Für die Heilanstalt Sachsenberg bei Schwerin in Mecklenburg wird eine Oberwärterin gesucht. Gehalt 175 Thlr. und freie Station. Meldungen an die Direction.

Digitized by Google

Inhalt.

Seite

Gedanken über den Sitz des Gemüths oder die Functionen des kleinen Gehirns. Von Prof. Dr. *P. Jessen* 1

Untersuchungen über das specifische Hirngewicht bei Geisteskranken. Von Geh. Rath Dr. *Nasse* 76

Ueber Papaverinwirkung bei Geisteskranken. Von Director Dr. *C. Stark* 120

Casuistik.

Epilepsie m. schwerer Seelenstörung. Genesung. Von Dr. *Kirn* 146

Zur therapeutischen Casuistik. 1. Willenslähmung d. unteren Extrem. u. dav. abhäng. Psychose. Von Dr. *v. Krafft-Ebing* 151

Literatur.

Archivio italiano (1868) — von Dr. *Pelman* 154

Ninth Ann. rep. of the Gen. Board of Commiss. in Lun. for Scotland 1867 — von Dr. *Lorent* 166

Anstaltsberichte.

Pflege-Anstalt Rheinau im Canton Zürich. Mit 1 Holzschn. 196

Versammlungen psychiatrischer Vereine.

5. Sitzung des psychiatr. Vereins zu Berlin 224

Boettger, Irres. n. Bleiintoxicat. 224

Noetel, Mittheil. üb. Temperaturverhältn. bei Epilept. . . 227

Boettger, Fall v. gr. Schädeldef. etc. bei Epilept. M. 1 Taf. 229

Der Verein schweizerischer Irrenärzte 231

Cramer, über No-restraint. 231

Wille, über Irrenpflege und Irrenanstalten. 237

Henne, Schädel eines Melancholikers. 243

Kleinere Mittheilungen.

Forense Psychologie in Italien. — Ueber Gheel. — Aus Posen. — Aus Sachsen. — Aus Ungarn. — Aus Kasan. — Aus New-York. — Psych. u. phys. Degenerationen. — Ein spontanes Othämatom. — Psychiatr. Section der Naturf. Versamml. in Dresden. — Dr. *Kern*, Nekrolog. — Drei Nekrologe und einige Anschuldigungen 245

Preis-Aufgaben 270

Personal-Nachrichten 271

Berichtigung 271

Erklärung der Tafel 271

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.

Digitized by Google

Beobachtungen über den Puls bei Geisteskranken.

Von

Dr. **O. J. B. Wolff,**

an der Irrenheilanstalt Sachsenberg.

V.

Zwei Elementarthatsachen sind es, welche die sphygmographische Untersuchung der Geisteskranken zu allernächst ergiebt. Die erste bisher fast ausschliesslich behandelte hiess: Die unheilbaren Geisteskranken haben *Pulsus tardus*; die zweite lautet: Die grosse Mehrzahl der heilbaren Geisteskranken hat ebenfalls tarde Pulsphasen.

So werden also, dem Pulse nach zu urtheilen, die beiden Hauptkategorien, in welche die Geisteskranken dem gegenwärtigen Stande unserer Wissenschaft gemäss zerfallen, wieder zusammen geworfen? So würde der wesentliche Unterschied, welchen wir alle gewohnt sind, zwischen den einen und den anderen unserer Kranken zu machen, hinfällig und nur ein äusserlicher sein?

Thatsache ist:

Die Kranken, welche wir den herkömmlichen Anschauungen zufolge anfangs für heilbar halten, die aber dennoch *Pulsus tardus* haben, können sich zwar beruhi-

gen, werden aber niemals gesund; sie können gesund scheinen, gelangen aber niemals wieder zum Vollbesitze ihrer geistigen Kraft; sie können dem oberflächlichen oder nachsichtigen, dem beschränkten oder selber unfreien Beurtheiler das täuschendste Bild der Genesung darbieten: Aber sie sind doch nur geistig geschwächte Menschen. Dass dem so ist, hat bei näherer Ueberlegung nichts Auffallendes für uns; denn die Erfahrung zeigt ja alle Tage, wie wenig von allen präsumtiv Heilbaren gesund, und wie selten wir in unseren Hoffnungen nicht getäuscht werden.

Aber auch abgesehen von jener grossen Zahl von Fällen, die sich nachmals als unheilbar herausstellen, haben auch noch die übrig bleibenden wenigen heilbaren Kranken zum grossen Theil tarde Pulsformen, und nur der allerkleinste Theil von ihnen hat sie entschieden nicht. Der letztere begreift diejenigen, welche wirklich gesund werden, und die Ersteren sind die, welche den gewöhnlichen Anforderungen an die Genesung zwar genügen, aber bei guter, gründlicher, andauernder Prüfung ihres Zustandes und ihrer Leistungsfähigkeit, bei einer Prüfung, die oft in der Anstalt gar nicht möglich ist, die aber der nähere Umgang und der Verkehr mit ihnen im gemeinen Leben bildet, sowohl psychisch als auch somatisch eine mehrweniger grosse Menge von Krankheitserscheinungen und Krankheitsresiduen an den Tag legen, die wir nicht anders als Schwächen bezeichnen können.

Hieraus folgt zunächst, dass der Puls der Geisteskranken von unschätzbaren und bisher nie geahntem Werthe ist in Beziehung auf die Prognose.

Um den praktischen Werth der tarden Pulsformen zu begreifen ist es aber nöthig, dass man sich über

das Vorkommen und die Zeit, wann sie sich entwickeln, näher orientirt.

Das erste, was man angesichts einer Beobachtung von *Pulsus tardus* entscheiden muss, ist die Frage, ob er in dem gegebenen Falle eine stationäre oder nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Diese Unterscheidung ist in der Mehrzahl der Fälle gar nicht schwer; aber man muss dabei einerseits das übrige Verhalten des Kranken mit in Betracht ziehen, und andererseits darüber klare Vorstellungen haben, wie sich eine Pulsphase in Folge occasioneller Umstände, und zwar namentlich bei den verschiedenen Graden von Gemüthsbewegung zeitweilig verändert.

In Nr. II. unserer Abhandlungen machten wir zum ersten Male auf die Thatsache aufmerksam, dass affectartige Erregung mit veränderter Pulsphase einhergehe. Dort handelte es sich um die ersten Anfänge dieser Veränderung, die sich in verstärkter oder wiedererlangter Tricrotie, also in gereizter Herz- und Gefässarbeit zu erkennen gab (vergl. Jahrg. 1867 S. 596 ff.). Das war die Erregung ersten Grades. Steigt nun die Gemüthsbewegung höher, kann der Erregte nicht mehr an sich halten, wird die anfangs im Kopf und Herzen verborgene Unruhe zur äusserlich wahrnehmbaren Aufregung, kann der Mund nicht mehr schweigen, bricht Lachen oder Weinen hervor, und bemächtigt sich des ganzen Körpers eine fieberhafte Unruhe, ein unwiderstehlicher Bewegungsdrang: dann geht auch der Puls die grossartigsten Veränderungen ein, Veränderungen, die graphisch dargestellt, ausserordentlich überraschen, und die für die Beurtheilung sowohl der acuten als auch der chronischen Erregung von grosser Wichtigkeit sind.

Die Erregung zweiten Grades, wie wir die höheren Umgestaltungen des Pulses im Affecte kurz be-

nennen, zeichnet sich im Gegensatz zu der Erregung ersten Grades dadurch aus, dass die Gefässarbeit gehäuft ist. Die sphygmographische Beobachtung des Affectes ergiebt demnach das schlotzte Beispiel, einen exacten Beweis von dem im Organismus sich immer und immer wiederholenden Vorgange von Reizung und Lähmung, zeigt uns, wie die letztere aus der ersteren hervorgeht und wie die normale Function, die normale Blutvertheilung, der normale Puls selber wieder das Werk einer Reizes ist, nämlich eines Reizes mittleren Grades.

In den folgenden Figuren nun wird der Process, welchen die uns bei Gemüthsraketen am häufigsten begegnenden Arten des Pulses im Affecte bis zu seiner Explosion durchmachen, vor Augen geführt.

Fig. 106. stellt einen normalen Puls, und zwar den



Fig. 106.



Fig. 107.



Fig. 108.

Puls einer jugendlichen Reconvalescentin in der Ruhe bei 84 pro Minute dar. Fig. 107. zeigt nun den Anfang der Erregung, die Erregung ersten Grades — erhöhte Celerität, verstärkte Tricrotie, nebst der sehr gewöhnlichen Begleiterin dieses Pulses, nämlich atypischer Irregularität. Diese Veränderung war die Folge einer an die Reconvalescentin gerichteten Frage, mit deren Beantwortung sie zögerte. Da mit Einem Male ward die Frequenz und Phase anders. Sogleich beginne ich zu zeichnen, aber der Zeichenhebel sprach nur bei den beiden ersten Schlägen an, wie die untere Zeile von Fig. 108. zeigt, und ehe 10 Secunden verflossen und die Vorbereitungen zur neuen Zeichnung geschehen waren, seufzt sie noch einmal und bricht dann unter Kichern und Lachen in die Worte aus: „Mein Geburtstag ist heute!“ Gleich nach Explosion dieser Herzensergiessung konnte ich zeichnen, natürlich an dieselbe Platte und die Zeichnung gelang, wie so selten in solchen Augenblicken, vollkommen. Welch' ein Unterschied zwischen diesen Pulsen der Fig. 108. und jenen der Fig. 107.! Was zunächst ins Auge fällt, ist die ungemeine Frequenzvermehrung; denn auf die Zeit von 4 in der Ruhe dieses Individuums erfolgenden Pulsstössen fallen jetzt im Affecte nicht weniger als 7 Schläge, während also die Frequenz dort 80 war, so ist sie hier 140. Aber was für Schläge! Erstens sind sie armselig klein, und zweitens hochgradig metamorphosirt. Die Kleinheit zeigt, wie schwach das Herz arbeitet, wie es, zusammengehalten mit der grossen Frequenz seiner Actionen, sich fast überarbeitet; die Pulsmetamorphose aber, die Phase namentlich der letzten Schläge, wo die hohe Frequenz schon wieder nachlässt, lehrt, dass die Arterie in derselben Weise gelähmt ist, wie wir es in der vorhergehenden Abhandlung für den *Tardo-dicrotus* und seine Uebergänge zum *Tardus planus* nachgewiesen haben. Diese Meta-

Digitized by Google

Lot 1021 Schweiz Kantone Unterwalden Sarnen, Rp. Rappen (1850-1854), Rollenstempel, Nr. 1 (1850), Rp. Rappen, Rollenstempel, Nr. 1 (1850), Rp. Rappen, Rollenstempel, Nr. 1 (1850), Rp. Rappen,

tet, dass man zur graphische Darstellungen seines Zitterkrampfes, nicht aber seines Pulses erhält. Werden doch schon die einfachsten, in Lachen oder Weinen ausgedrückten Affekte, die auf ihre Höhe mehr oder weniger lange ja ununterbrochen sich steigernden, eine reflektorisch erregte, stärmische Thätigkeit gewisser Muskelsysteme sind, aussahmslos von Zittern des ganzen Körpers, also von einem allgemeinen klonischen Krampfe begleitet, der die Pulswirkungen während dieses Zustandes verunreinigt, oder sogar unbrauchbar machen kann!

Wie verhält sich nun während des Affektes der Puls bei den Kranken, die im ruhigen Zustande schon tactile Formen bieten? Im Prinzip genau ebenso wie bei Gesunden oder Solchen, mit nicht tactilen Pulsen. Anfangs drückt er Reizung und schliesslich Lähmung des vasomotorischen Systems aus. Nur wird das Bild der Reizung in vielen Fällen blos relativ an dem Bilde der Ruhe die Charaktere der Gefässreizung, aber an und für sich betrachtet vielleicht immer noch die Zeichen von Gefässlähmung an sich tragen. Die folgenden Beispiele werden dies klar machen.

Fig. 113. zeigt die anfängliche Gefässreizung, und

Fig. 113.

Fig. 114.

Digitized by Google

[1] Zu Anfang[1] Chronologisches zu meinem Leben. Ich bin geboren am 1. Juni 1844 zu Rudolstadt, wo ich auch die Vorschule und das Gymnasium bis Ostern 1862 besuchte. Ostern 1862 bezog ich die Universität Jena, wo ich bis Ostern 1865 studierte. Ostern 1865 bis Ostern 1866 war ich Hauslehrer in Leipzig. Ostern 1866 bis Ostern 1867 war ich Einjährig-Freiwilliger in Rudolstadt. Ostern 1867 bis Ostern 1868 war ich Hauslehrer in Leipzig. Ostern 1868 bis Ostern 1869 war ich Assistent am Polytechnikum in Karlsruhe. Ostern 1869 bis Ostern 1870 war ich Hauslehrer in Leipzig. Ostern 1870 bis Ostern 1871 war ich Assistent am Polytechnikum in Karlsruhe. Ostern 1871 bis Ostern 1872 war ich Hauslehrer in Leipzig. Ostern 1872 bis Ostern 1873 war ich Assistent am Polytechnikum in Karlsruhe. Ostern

Beim vorhergehenden wie bei diesem Falle wird man fragen, warum ist Fig. 111 resp. 114 der Normalpuls des Individuums? Der vorhergehende Fall verlief während der ersten Woche mit einer solchen Ruhe und Fassung, dass man anfangs an eine sehr unbedeutende Erkrankung, ja sogar an Simulation dachte.

Der *Tardo-dicrotus* nun war der Begleiter sowohl dieser anfänglichen als auch der etwa ein Jahr später wieder, wenn auch unvollkommner, eintretenden Ruhe, nachdem die Kranke monatelang vor der letzteren in grosser Aufregung gewesen war, dabei regelmässig Pulsformen analog dem in Fig. 112 wiedergegebenen Reizungspulse geführt, und nur zwischendurch, nämlich wenn sie ruhig war, wieder *Tardo-dicrotus* gehabt hatte. Bei jenem Falle also war der Puls in grösstmöglicher Ruhe, d. i. der Normalpuls für die Kranke (natürlich immer bei normaler Temperatur und Abwesenheit jeder gemeinen körperlichen Erkrankung!) vor der Pulsbeobachtung im Affekte thatsächlich bekannt und mehr als zwanzig Male unverändert beobachtet worden. Der folgende Fall, dem die Figuren 114., 115. und 116. entnommen sind, verlief aber anders und zwar so, wie die allergrösste Mehrzahl, dass man nämlich erst später, nach Wochen und Monaten erst factisch beobachten kann, wie der Normalpuls aussieht, weil sich der Kranke eben nicht eher beruhigt. Die Normalpulse dieses, sowie vieler anderer angeführter und noch anzuführender Fälle rühren daher oft aus einer viel späteren Zeit her, als diejenigen, mit welchem sie verglichen werden. Darin liegt nichts Unphysiologisches und nichts Precäres; es ist nur die offene Darlegung dessen, wie ich zu meinen Lehrsätzen gekommen bin, und ein Wegweiser in die sphygmographische Praxis. Bei ganz veralteten Fällen, und bei wie Maschinen nur äusserlich erregten Kranken kann man freilich sehen, wie der Puls sich fast immer gleich bleibt,

Fig. 1. Les Bacchus. Les différentes formes de la Bacchante. Les différentes formes du Satyre. Les différentes formes du Faune. Les différentes formes du Silène. Les différentes formes du Centaure. Les différentes formes du Centaure femelle. Les différentes formes du Centaure femelle. Les différentes formes du Centaure femelle

Fig. 117.

bildete Phase hatte, so kann die Ziffer 80 auf dem Gipfel des Affectes nicht mehr als niedrig auffallen.

Schliesslich ist noch zu verzeichnen, wie sich der genuine Tardus bei der Erregung zweiten Grades verhielt.

Aus der vorigen Abhandlung (Bd. XXV. S. 746) wissen wir, dass der gereizte Tardus eine dem Orientalpulse ähnliche Phase annimmt. Das ist die Erregung ersten Grades, oben die Reizung. Spannt sich nun die Erregung noch höher, so beobachtet man bei diesen Kranken mit tardem Normalpulse meistens nicht mehr eine sehr erhebliche Frequenzvermehrung, sondern nicht selten nur etwa dieselbe, ja sogar bisweilen herabgesetzte Frequenz. Zweifs zu und zwar als positive Erscheinung fällt bei der Erregung dieser Personen in dem zweiten Stadium ihres Affectes die merkwürdige Umwandlung der Pulsphase ins Auge, die Erscheinung des Retardatardus, den sprechendsten Bildes der Ueberwindungsfähigkeit (l. c. S. 730 ff). Fig. 118, 119. und 120., einer



Fig. 118.

Fig. 125.



Fig. 126.

20jährigen, unlängst in Wahnsinn verfallenen Dame angebracht, die sich von jedem Blicke, den man ihr zuwandte, verglimt glaubte, die in Allem, was um sie her vorging, einen Angriff auf ihre vermeintliche Gottlichkeit sah, und die Monate lang fast nie aus der höchsten innerlichen Erregung mit Zeloso-, ja bisweilen fast Mémoria-tardus heraus kam, wurden den Prozess ebenso schön, wie die Figuren 121., 122. und 123. vor An-



Fig. 127.



Fig. 128.

Abbildung 1 bis 3. Ein Weibchen, Ende Juli gefangen, mit Ephippium. Fig. 1 Kopf, Fig. 2 Postabdomen, Fig. 3 Ephippium. Fig. 4 bis 6. Ein Weibchen, Anfang August gefangen, mit Ephippium. Fig. 4 Kopf, Fig. 5 Postabdomen, Fig. 6 Ephippium. Fig. 7 bis 9. Ein Weibchen, Ende August gefangen, mit Ephippium. Fig. 7 Kopf, Fig. 8 Postabdomen, Fig. 9 Ephippium. Fig. 10 bis 12. Ein Weibchen, Anfang September gefangen, mit Ephippium. Fig. 10 Kopf, Fig. 11 Postabdomen, Fig. 12 Ephippium. Fig. 13 bis 15. Ein Weibchen, Ende September gefangen, mit Ephippium. Fig. 13 Kopf, Fig. 14 Postabdomen, Fig. 15 Ephippium. Fig. 16 bis 18. Ein Weibchen, Anfang Oktober gefangen, mit Ephippium. Fig. 16 Kopf, Fig. 17 Postabdomen, Fig. 18 Ephippium. Fig. 19 bis 21. Ein Weibchen, Ende Oktober gefangen, mit Ephippium. Fig. 19 Kopf, Fig. 20 Postabdomen, Fig. 21 Ephippium. Fig. 22 bis 24. Ein Weibchen, Anfang November gefangen, mit Ephippium. Fig. 22 Kopf, Fig. 23 Postabdomen, Fig. 24 Ephippium. Fig. 25 bis 27. Ein Weibchen, Ende November gefangen, mit Ephippium. Fig. 25 Kopf, Fig. 26 Postabdomen, Fig. 27 Ephippium. Fig. 28 bis 30. Ein Weibchen, Anfang Dezember gefangen, mit Ephippium. Fig. 28 Kopf, Fig. 29 Postabdomen, Fig. 30 Ephippium. Fig. 31 bis 33. Ein Weibchen, Ende Dezember gefangen, mit Ephippium. Fig. 31 Kopf, Fig. 32 Postabdomen, Fig. 33 Ephippium. Fig. 34 bis 36. Ein Weibchen, Anfang Januar gefangen, mit Ephippium. Fig. 34 Kopf, Fig. 35 Postabdomen, Fig. 36 Ephippium. Fig. 37 bis 39. Ein Weibchen, Ende Januar gefangen, mit Ephippium. Fig. 37 Kopf, Fig. 38 Postabdomen, Fig. 39 Ephippium. Fig. 40 bis 42. Ein Weibchen, Anfang Februar gefangen, mit Ephippium. Fig. 40 Kopf, Fig. 41 Postabdomen, Fig. 42 Ephippium. Fig. 43 bis 45. Ein Weibchen, Ende Februar gefangen, mit Ephippium. Fig. 43 Kopf, Fig. 44 Postabdomen, Fig. 45 Ephippium. Fig. 46 bis 48. Ein Weibchen, Anfang März gefangen, mit Ephippium. Fig. 46 Kopf, Fig. 47 Postabdomen, Fig. 48 Ephippium. Fig. 49 bis 51. Ein Weibchen, Ende März gefangen, mit Ephippium. Fig. 49 Kopf, Fig. 50 Postabdomen, Fig. 51 Ephippium. Fig. 52 bis 54. Ein Weibchen, Anfang April gefangen, mit Ephippium. Fig. 52 Kopf, Fig. 53 Postabdomen, Fig. 54 Ephippium. Fig. 55 bis 57. Ein Weibchen, Ende April gefangen, mit Ephippium. Fig. 55 Kopf, Fig. 56 Postabdomen, Fig. 57 Ephippium. Fig. 58 bis 60. Ein Weibchen, Anfang Mai gefangen, mit Ephippium. Fig. 58 Kopf, Fig. 59 Postabdomen, Fig. 60 Ephippium. Fig. 61 bis 63. Ein Weibchen, Ende Mai gefangen, mit Ephippium. Fig. 61 Kopf, Fig. 62 Postabdomen, Fig. 63 Ephippium. Fig. 64 bis 66. Ein Weibchen, Anfang Juni gefangen, mit Ephippium. Fig. 64 Kopf, Fig. 65 Postabdomen, Fig. 66 Ephippium. Fig. 67 bis 69. Ein Weibchen, Ende Juni gefangen, mit Ephippium. Fig. 67 Kopf, Fig. 68 Postabdomen, Fig. 69 Ephippium. Fig. 70 bis 72. Ein Weibchen, Anfang Juli gefangen, mit Ephippium. Fig. 70 Kopf, Fig. 71 Postabdomen, Fig. 72 Ephippium.

sich Fig. 108. zu Fig. 111. und 114. Aus der Thatsache nun, dass ebensowohl der Typus des gemeinen normalen Mannespulses (Fig. 115.) als auch der gemeine normale Greisenpuls nebst seinen verwandten Arten bei einem gewissen leichten Grade von Anregung da erscheint, wo die Gefässthätigkeit in der Ruhe offenbar mehr oder weniger gelähmt ist, folgt endlich auch, dass der normale Puls selber wieder das Product eines beständigen Erregungszustandes mittleren Grades ist, jenes im gesunden Organismus fort und fort bestehenden Erregungszustandes, den die Physiologie längst erkannt und als den spinalen Gefässtonus bezeichnet hat.

Pulsphänomene analog denen im Affecte sieht man, wie früher wiederholt erwähnt wurde, sehr gewöhnlich bei neuangekommenen Kranken. Männer bieten selten mehr als die Erregung ersten Grades. Dagegen zeichnet man bei Frauen während der ersten Untersuchung häufig nur tarde Phasen mit allerhand Symptomen von hoher Erregung — Zittern, Unregelmässigkeit, Ungleichheit des Pulses, stark sichtbare Respirationsbewegungen. Da zeigt sich recht, wie wahr der Volksmund die Frauen das schwächere Geschlecht genannt hat, wie tief ihre leichte Reizbarkeit und Ueberreizbarkeit in ihrer Constitution, in der Functionirung ihres Sympathicus begründet ist. Beim weiblichen Geschlechte also wird man vorsichtiger sein müssen in der Auslegung des Pulsbefundes bei den ersten Untersuchungen, und den etwaigen Tardus nicht ohne Weiteres für chronisch ansprechen dürfen, sondern häufig nur für das Zeichen einer vorübergehenden, wenn auch für den gewöhnlichen Beobachter möglicherweise gar nicht bemerkbaren Ueberreizung zu halten haben.

Im Gegensatz zu dem Vorkommen tarder Pulsphasen in hoher Erregung finden wir dieselben in zweiter Linie bei Kranken, die nichts weniger als erregt, son-

Digitized by Google

dern im hohen Grade abgespannt sind. Das sind aber nur scheinbare Gegensätze. Ich meine psychisch Gesunde, welche während einer Krankheit eine Reihe von Symptomen darbieten, die an sich denen bei einer frischen Psychose mit Depression ungemein ähnlich sind. Das sind die merkwürdigen, vorzugsweise bei zarten Constitutionen häufigen Zustände, welche wir gewohnt sind unter dem vielsagenden Namen *Catarrhus gastricus* unterzubringen.

Das erste, was uns an diesen Kranken auffällt, ist eine zwar geringe, aber doch andauernde Temperaturerniedrigung — circa 29,0—4; die genaue, in einem grossen Irrenhause an den vielen Bediensteten ja so leicht ausführbare Beobachtung der Krankheitsanfänge zeigt aber, dass diese Temperatursenkung secundär ist, sich an eine oft nur einen oder ein paar Tage dauernde Temperaturerhöhung — bis etwa 31,5 — angeschlossen hat. Das Zweite bildet die Hauptklage, nämlich die über den Kopf. Kopfschmerz ist eine Bezeichnung der krankhaften Sensationen vom Kopfe, die durchaus nicht alle von diesen Kranken zutreffend finden. Aber Eingenommensein, „der Kopf ist mir so eingenommen, dass ich ganz kurz von Gedanken bin", das ist es, was fast ein Jeder klagt, und Schwindel, den ausnahmslos alle angeben. Diese Dinge, welche sich erfahrungsmässig gewöhnlich bald wieder geben, sind dem Arzte in der Regel zu trivial, als dass er sie noch besonders in Obacht nehme. Wenn man ihnen aber genauer nachgeht, so findet man neben ihnen bei gebildeten, sich mitzutheilen fähigen Leuten, sehr gewöhnlich auch Hallucinationen der höheren Sinne, die denen bei Geisteskranken nichts nachgeben. Sie sehen im völlig wachen Zustande, vorzugsweise des Nachts, wo sie alle an Schlaflosigkeit leiden, Köpfe, Gesichter, Fratzen, Thiere, die an sie heranzukommen drohen, hören, —

von Ohrensausen und Ohrenklingen ganz abgesehen — ebensogut Stimmen, wie der gemeine Geisteskranke, haben die perversesten Geschmäcke etc. Das einzige, was sie in Ansehung dieser Sensationen von den letzteren, wiewohl auch nicht recht stichhaltig unterscheidet, ist, dass sie, wie man zu sagen pflegt, über diesen Eindrücken stehen, dass sie wissen und begreifen, es seien Täuschungen, obgleich sie nicht im Stande sind sich der erneuten Vorspiegelung derselben zu entschlagen. Die dritte Symptomengruppe ist die, nach welcher die ganze Krankheit benannt zu werden pflegt, nämlich die vom „Magen". Druck in der Herzgrube, Angst oder doch Unruhe, düstere Stimmung, wie beim Melancholischen, Appetitlosigkeit, Verstopfung u. dgl. sind hier wie dort die regelmässigsten Erscheinungen. Viertens endlich ist es die allgemeine Mattigkeit, Abgeschlagenheit und „Lähmung in allen Gliedern", welche diese Kranken oft so nachdrücklich klagen, dass man leicht geneigt ist zu glauben, sie übertreiben.

Diese das Spiegelbild einer Psychose im Kleinen darbietenden Kranken haben nun, und zwar bei ausnahmslos herabgesetzter Pulsfrequenz sehr gewöhnlich unsern *Pulsus tardus* (Vergl. diese Zeitschrift Bd. XXIV, 4. S. 415). Aber nur so lange, als sie sich in der angegebenen Weise krank fühlen, und sie erlangen mittelst Metamorphose in sehr vollkommen tricrote Phasen wieder normalen Puls, so wie sie gesund geworden sind. Da die Hauptrolle bei der Behandlung dieser Kranken offenbar die Ernährung spielt, da der erste Blick auf sie lehrt, dass sie anämisch, oft in sehr hohem Grade anämisch sind, da, wie Jeder weiss, eine roborirende Kur, namentlich die dreiste Anwendung von Wein oft überraschend schnell wieder zu Appetit und Kräften hilft, ihre Temperatur und Pulsfrequenz auf die normale Höhe bringt, und von der lästigen Schlaflosigkeit sammt den

Digitized by Google

zu allem Denken und Thun unfähig machenden Kopferscheinungen befreit: So wird es nicht unrichtig sein, wenn wir die Erscheinung des *Pulsus tardus* in diesen Fällen in Verbindung bringen mit der Inanition, mit der Verminderung und Herabsetzung von Erregungsimpulsen für die körperlichen Functionen, und mit dem Darniederliegen derjenigen geistigen Thätigkeit, welche uns im gesunden Leben in beständiger, auf- und abschwankender, den Puls bald stärker, bald schwächer tricrot machender Erregung erhält, mit dem Darniederliegen unsers Willens.

Ungleich häufiger aber ist das Vorkommen tarder Pulsphasen als stationäre Erscheinung.

1) Ganz ausnahmslos ist *Tardus planus* anzutreffen bei allen in das Senium übergetretenen, wenn nur einigermaassen ruhigen Geisteskranken; regelmässig aber kommt er schon in den sogen. climacterischen Jahren, beim Manne also vom 45. bis 60., und beim Weibe vom 40. bis 45. oder 50. Jahre unter denselben Voraussetzungen vor; häufig jedoch auch schon bei viel jüngeren Individuen, bei Frauen von etwa 30 und bei Männern von etwa 35 Jahren an, hier aber unter der Bedingung, dass sie sich in ihrer grösstmöglichen Ruhe befinden. Wenn man sich gewöhnt hat, den gemeinen *Tardus* als ein sehr ungünstiges, eine wahre Heilung ausschliessendes Symptom anzusehen, so wird man bisweilen ausserordentlich überrascht, wenn sich bei einem Individuum, das angeblich oder vielleicht auch wirklich erst seit einigen Wochen das ist, was man geisteskrank nennt, dieser Puls findet, ohne dass die übrigen Erscheinungen des Kranken zu einer so schlechten Prognose Veranlassung gegeben. Bei näherer Untersuchung aber — und eine jede exacte Krankenbeobachtung führt ja den denkenden Arzt nothwendig zu allseitigerer Prüfung und sorgfälti-

Digitized by Google

gerer Erwägung der gegebenen Verhältnisse — findet sich in solchen Fällen doch allmälig das eine oder andere ungünstige Symptom, gewöhnlich aber schon nach wenigen Wochen eine mehr als ausreichende Zahl von Krankheitserscheinungen, die man nicht anders, als die Zeichen eines lange bestandenen, tiefen körperlichen Leidens auffassen kann, wenn davon auf den ersten Blick auch vielleicht nicht viel weiter zu bemerken ist, als ein kahler Scheitel, ergrauendes Haar, oder der Verlust der Zähne. Verfrühtes Senium, verfrüht eingetretene körperliche und geistige Decrepidität, das ist die Summe der Erscheinungen, die den *Tardus communis*, wo er auch immer vorkommt, unzertrennlich begleiten.

2) Die ungeheure Mehrzahl der weiblichen Kranken bis zu circa 30, und der männlichen bis zu circa 35 Jahren hat im ruhigen Zustande, also bei möglichster Abwesenheit centraler und peripherischer Erregungsursachen unsern wohlbekannten *Tardo - dicrotus*. Dass diese Phase in den *Tardus planus* als ihren nächsten Verwandten übergeht, wissen wir bereits aus der Morphologie. Hier ist die klinische Thatsache nur hervorzuheben, die Thatsache, dass man bei fleissigen und Jahre lang fortgesetzten Untersuchungen gar nicht so selten den Uebergang des *Tardo-dicrotus* in den gemeinen *Tardus* beobachten kann. Jahre lange Untersuchungen? Schlechterdings, wer zuerst hinter die Wahrheit kommen will! Denn diese Metamorphose geschieht langsam und mit vielen Unterbrechungen, es dauert Jahre lang, bis der *Tardus communis* eine bleibende Erscheinung wird, und bis er in den *Tardo-dicrotus* bei fast unmerklichen Anlässen nicht wieder zurückfällt. Hier stossen wir also nochmals auf den *Tardus planus* als auf eine vorübergehende Phase. Es ist nämlich eine ganz allgemeine Regel, dass sich der gemeine *Tardus* bei gelinden Erregungsgraden in den *Tardo-dicrotus* verwandelt. Oben-

Digitized by Google

an steht als solche mässige Erregung ein physiologischer Zustand, nämlich die Recreation des ganzen Organismus nach der Nachtruhe, also die Morgen- und Vormittagszeit. Denn ebenso, wie der gesundo Mensch am frühen Morgen, ehe auf ihn noch irgend welche Erregungsmotive, Bewegung oder Nahrungsaufnahme, einwirkten, erhöhte Pulsfrequenz, erhöhte Celerität und eine Hinneigung zur Dicrotie in Folge von Kleinheit der ersten secundären Welle hat, gegen Abend aber im vasomotorischen Systeme relative Zeichen von Ermüdung, Frequenzherabsetzung neben vollkommener Tricrotie in Folge der Grösse der ersten secundären Welle — des längeren Ausruhens der Arterie — aufweist: Ebenso ist auch bei Kranken die Stärkung, die relative Erregung ihres sympathischen Systems am Morgen, und seine grössere Ermüdung, beziehentlich Beruhigung am Abende dadurch aufs Bestimmteste ausgesprochen, dass sie früh *Tardo-dicrotus* und Abends erst *Tardus planus* haben. Wie schön harmonirt diese physiologische Beobachtung mit jener psychiatrischen, dass der Kranke in der ersten Hälfte des Tages gewöhnlich erregt und erst in der zweiten ruhiger ist! Wir werden also, um vollkommenen *Tardus planus* zu beobachten, nicht die Vormittagszeit, sondern die Nachmittags- und Abendstunden wählen, immer natürlich so, dass nicht eine Mahlzeit kurz vorher eingenommen worden ist, da ja die Verdauung (vergl. Charakteristik des Arterienpulses S. 132) eine ähnlich abweichende Functionirung des vasomotorischen Nervenapparates setzt, wie ein geringer Grad von Fieber. Für den *Tardo-dicrotus* ist aber bei älteren Personen gerade der Vormittag die günstigste Beobachtungszeit.

Da wo nun noch *Tardo-dicrotus* eine stationäre Erscheinung ist, wo wir auch am Abend noch kaum Andeutungen von *Tardus planus* haben, versteht es sich

Digitized by Google

dem Vorhergehenden zu Folge von selber, dass dort der Frühpuls ebenfalls weniger Tardität zeigen wird, als der Abendpuls. Es kommt sogar nicht selten vor, dass jener gar keine Tardität mehr zeigt, sondern dem gemeinen unterdicroten (vgl. Fig. 4.) oder selbst normal tricroten Pulse sehr ähnlich sieht. Wo aber das der Fall ist, da liegt eine Erregung vor, die sich entweder auf der Stelle durch das übrige Verhalten als intercurrent und krankhaft zu erkennen giebt, oder die bereits als Zeichen der Rückkehr zum physiologischen Verhalten, als Vorbote der Reconvalescenz anzusehen ist. Doch bei diesen Fällen ist der *Tardo-dicrotus*, wie wir später sehen werden, schon gar keine stationäre, sondern eine vorübergehende Erscheinung.

Dass endlich der *Rotundo-* und *Monocroto-tardus* in der Ruhe nur bei Greisen vorkommt, wird nach dem, was über die Sphäre der tarden Pulsmetamorphosen niederen Ranges gesagt wurde, nur eben der Erwähnung bedürfen.

Nach dem Lebensalter spielt die nächstwichtige Rolle bei dem stehenden Vorkommen der tarden Pulsphasen die Krankheitsdauer.

Aber Krankheitsdauer, welch' misslicher Begriff! — Das Gros der zur Behandlung kommenden Geisteskranken zerfällt von diesem Gesichtspunkte aus bekanntlich in zwei Klassen. Die einen sind plötzlich, die andern allmälig krank geworden; bei jenen spricht man von einem Krankheitsausbruche, und bei diesen hört man von den Berichterstattern sehr gewöhnlich, er oder sie sei schon immer so gewesen. Das sind uns Irrenärzten sehr geläufige Dinge, die wir aber so, wie sie im Fragebogen stehen oder uns von den Angehörigen berichtet werden, aus guten Gründen nicht ohne Weiteres für baare Münze hinnehmen; denn auf das Medium, in dem sich der Kranke bewegte, auf die Einsicht und Toleranz,

Digitized by

auf die Bildung und die ganze Art der Umgebung kommt es hier hauptsächlich an. Wir suchen und finden daher bei den angeblich plötzlich Erkrankten weiter zurückliegende Krankheitsanfänge, und bei den angeblich schon sehr lange Kranken nach einem bestimmten Anfange der Krankheit, falls uns die gegenwärtige Krankheitsform dort älteren, hier jüngeren Datums zu sein scheint. Auf diese Weise führen wir einerseits viele anscheinend ganz frische Fälle auf bereits längere Zeit bestehende Erkrankungen zurück, und trennen andererseits das, was man „wirklich geisteskrank“ zu nennen sich für berechtigt hält, von habituellen Eigenthümlichkeiten und Jahre langem Unwohlsein, woran auch sehr viele andere Menschen leiden, die man doch nicht geisteskrank nennen mag.

Nachdem wir auf diese und ähnliche Weise nach unserm besten Wissen die Krankheitsdauer bestimmt, uns aus derselben im Verein mit den vergangenen und gegenwärtigen Krankheitserscheinungen ein Urtheil über den Fall gebildet haben, und nun die sphygmographische Beobachtung anstellen, so ergiebt sich:

1) dass diejenigen Fälle, welche wir für alte, Jahre lang bestandene halten mussten, tarden Puls besitzen. Damit wäre schon so gut wie Alles gesagt, was wir in Beziehung auf das von der Krankheitsdauer abhängig zu machende Vorkommen des *Pulsus tardus* zu erwähnen hätten, wenn nicht

2) auch eine grosse Anzahl, ja die grosse Mehrzahl der sogenannten frischen, — für frisch noch bei der Aufnahme gehaltenen, also meist präsumptiv noch heilbaren Fälle tarden Puls, wie die veralteten, darböten. Das sind die gar nicht so spärlichen Fälle, wo uns der Verlauf alsbald lehrt, dass sie ein längeres Kranksein hinter sich haben, und wo wir unsere Ansicht über den Beginn der Krankheit, über die bisherige Krankheits-

Digitized by Google

dauer mit dem Geständniss corrigiren müssen, uns, wie so oft, verrechnet zu haben. Die Thatsache nun, dass sehr viele von den frischen Fällen ebenfalls tarde Pulsformen führen, wird uns einen wissenschaftlichen Anhalt gewähren bei der Bestimmung der Krankheitsdauer, nöthigt uns aber vorerst die Beantwortung der Frage auf, wann bei diesen Kranken der tarde Puls entstanden ist.

Ueber diese Frage bin ich lange nicht in's Reine gekommen; denn direct beobachten lässt sich der fragliche Process in der Irrenanstalt nicht. Bei einem reichlichen Materiale kann man allerdings alle Tage beobachten, wie bei Leuten, die sich beruhigen, oder in eine mehrweniger rein erscheinende Reconvalescenz eintreten, aus der Tricrotie allmählich eine umso stabilere und umso tardere Dicrotie hervorgeht, je weniger die Besserung unterbrochen wird. Aber jene Tricrotie war nur eine Reizung, eine Erregungserscheinung, war nur die maskirte tarde Dicrotie, welche jede Stunde zum Vorschein gebracht werden kann, sowie nur die Erregungsursachen in Wegfall gebracht werden (Vergl. die vorige Abhandlung). Da nun viele solche Reconvalescenten von den Ihrigen und Leuten ihres Gleichen, die sie früher gut kannten, für völlig wiederhergestellt gehalten werden, so dass man annehmen muss, sie befinden sich in dem *Status quo ante*, wo sie Niemand für geisteskrank hielt, so ist die Vermuthung gerechtfertigt, dass sie auch chon vor ihrer Erkrankung den tarden Puls gehabt haben. Die Krankheitsform dieser anscheinend Geheilten war in der Regel Manie, die nur erst wenige Wochen bestanden, jeden beliebigen Grad erreicht hatte, und junge Leute von etwa 15—30 Jahren betraf. Hierhin gehören auch diejenigen, von denen in der vorigen Abhandlung (pag. 765.) angegeben wurde, dass sie in ihrer relativen Ruhe ganz gewöhnlich schon sehr deutlich fühl-

Digitized by

baren Dicrotismus haben. Sie gewinnen im Nachlass der Kranheitserscheinungen in der Regel sehr bald ein gefälliges, einnehmendes Aeussere, haben mit der Ablegung von Wahnvorstellungen kaum zu kämpfen, sind aber auch gewöhnlich nicht im Stande ihre früheren Hallucinationen und verkehrten Handlungen, sei es aus einer gewissen, knabenhaften Verschämtheit, sei es aus wirklichem Mangel an Klarheit, genügend und freierdings als krankhaft anzuerkennen. Ueber solche Reconvalescenten, die man in der Hoffnung auf eine vollständige Heilung, oder doch um ihre wiedergewonnene Haltung zu befestigen, in der Anstalt noch Monate lang zu belassen pflegt, erfährt man aber da, wo das schwierige Unternehmen einer genauen Nachforschung ihres Zustandes vor der Erkrankung von unparteiischer Seite her möglich und von Erfolg ist, dass sie immer, d. h. von Kindheit an absonderlich, unstät, sinnend, bei oft sehr guten Anlagen doch untüchtig in der Schule und auf der Lehre, dass sie sehr zornmüthig, unverbesserlich, Onanisten und dergleichen mehr gewesen, und mit der kommenden Reife eher schlimmer als besser geworden sind. Bei diesen scheinbar Geheilten — denn andere Kranke, an denen man die erste Entwickelung der tarden Formen studiren könnte, giebt es in der Anstalt nicht — habe ich nun aufs Eifrigste gezeichnet, anfänglich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat den Uebergang oder doch eine Annäherung zur Norm gehofft, aber bei keinem etwas Anderes gesehen, als dass der Puls unverändert blieb. Sogar bei einem sehr wohl aussehenden jungen Manne, der die Anstalt neulich, nachdem er vor zwei Jahren mit dieser zweifelhaften Genesung entlassen worden war, wieder besuchte, und sich nach Art dieser Leute recht hübsch zusammennehmen konnte, ergab die Untersuchung noch ganz dieselbe, — in diesem Momente natürlich nicht tarde, sondern schnellende und sehr

vollkommene Dicrotie, die er während seines Hierseins als Kranker bei ähnlichen Anregungen ganz regelmässig darbot. Was liegt nach diesen Erfahrungen näher als anzunehmen, dass die abweichende Functionirung des Nervenapparates, welche dem stationären Dicrotismus, der stationären tarden Dicrotie zu Grunde liegt, angesichts des von Hause aus abweichenden psychischen Verhaltens eine jenen Individuen angeborene, oder wenigstens eine schon lange Zeit vor dem Beginn ihrer Geisteskrankheit erworbene krankhafte Nervenleistung, eine wirkliche Nervenschwäche ist, die sich niemals bessert, sondern die Disposition zur Geisteskrankheit, das constitutionelle Moment abgiebt, in welchem die, je nach der Ungunst der äusseren Verhältnisse, früher oder später zum Vorschein kommende Störung der höheren geistigen Thätigkeiten ihren Boden findet?

Ist dieses richtig, so muss die Pulsbeobachtung einer Menge von Leuten, die noch nicht geisteskrank gewesen sind, es aber später werden, *Tardo-dicrotus* aufweisen. Der Zufall führte mir ein solches Individuum in die Hände.

Schon lange waren mir bei der alten und immer neuen Klage über das schlechte Wärterpersonal eine Anzahl von Wärtern und Wärterinnen psychisch verdächtig. Wir alle wissen, dass die im Dienste alt gewordenen meist auch geistig schwach geworden sind, so schwach und stumpf, dass sie zu einer eigenes Nachdenken erfordernden Beschäftigung kaum mehr brauchbar befunden werden, und im Gefühle ihrer Schwäche auch keinen ernstlichen Versuch machen, sich anderweit ein ruhigeres Brod zu verdienen. Diese haben *Pulsus tardus* oder *tardo-dicrotus* und wir schonen sie und beurtheilen sie milde, auch wenn wir dies körperliche Symptom psychischer Schwäche an ihnen nicht kennen ge-

Digitized by

lernt haben. Ein anderes ist es mit denen, die noch jung sind, und noch nicht lange Jahre hindurch unter dem Drucke der einförmigen und geistig ermüdenden, mechanisirten Lebensweise gestanden haben, welche eine grössere Irrenanstalt mit sich bringt. Dass auch unter diesen nur wenige zu guten Wärtern werden, ist eine weitere Thatsache, und sie ist, wie Niemand in Abrede stellen kann, wesentlich mit darin begründet, dass sich zu dem Dienste eines Wärters in der Irrenanstalt zu einem nicht geringen Theile Leute melden, die sich zu diesen durch ihre verhältnissmässig hohen Lohnsätze zwar lockenden, im Grunde aber doch recht misslichen Posten als zu einem *ultimum refugium* entschlossen haben, weil sie anderwärts Unglück, im Leben schon viel durchgemacht und gelitten hatten, und so im halben Bewusstsein ihrer eigenen psychischen Schwäche einen gewissen Zug nach dem Irrenhause haben. Brauche ich zu bemerken, dass diese oft ebenso körperlich wie geistig heruntergekommenen Menschen bei ihrer Untersuchung keinen normalen, sondern tarden Puls aufweisen? Ich will dieses traurige und widerwärtige Kapitel nicht weiter berühren, als es für unsern Zweck nothwendig ist; es muss aber noch ausgesprochen werden, dass sich zum Wärterdienst auch endlich Individuen drängen, und bisweilen doch nicht alle abgewiesen werden können, die mit allerhand Zeichen von Degeneration behaftet sind, oder, wie wir Deutschen sagen, bei denen die Dummheit auf dem Gesichte geschrieben steht.

Den Puls eines solchen beschränkten Menschen nun, der hier in der Zeit der Noth angenommen ward — natürlich ohne dass man sagen konnte, er sei geisteskrank oder auf dem Wege dazu — hatte ich im Sommer 1867 zu beobachten Gelegenheit. Einer kleinen Unpässlichkeit halber meldete er sich ohne jegliche Temperatursteigerung oder sonst objectiv nachweisbare Krank-

Digitized by Google

heitserscheinungen unter kläglichen Geberden ein paar Monate nach seinem Eintritte als krank; aber die sphygmographische, aus guten Gründen angestellte Untersuchung ergab einen hochgradig tarden *Pulsus dicrotus*. Am andern Tage wurde zwar eine chronische Otorrhoe bei ihm entdeckt, aber er fühlte sich wieder gesund, und bot jetzt wie die folgenden acht Tage, an denen er täglich zwei Mal gezeichnet ward, noch dieselbe Pulserscheinung, auch nach einigen Wochen noch, wo er wieder ein kleines körperliches Anliegen hatte, das ihm nach Art der Schwachsinnigen viel Sorge machte. Danach verging kein Vierteljahr, als er Zeichen von beginnender Geistesstörung, Verfolgungswahnideen u. dgl. an sich wahrnehmen liess und seinen Abgang verlangte, dem man natürlich Nichts in den Weg legte. Zwei Monate später brach bei ihm, nachdem er nirgends Arbeit gefunden und sich auf der Polizei als obdachlos gemeldet hatte, im Arbeitshause die Tobsucht aus, die ihn uns sehr bald als Kranken zuführte, dessen genauere Anamnese ergab, dass er sich schon von Kindheit an sehr absonderlich und verkehrt, ja sogar gefährlich gezeigt hatte. Er ist noch heute da, und sicher unheilbar.

Aehnliche Beispiele wird jeder erfahrene Irrenarzt kennen, und etwas Besonderes darin durchaus nicht finden. Für uns war es nur nöthig, an einem Falle wenigstens zu constatiren, dass der tarde dicrote Puls nicht erst mit und während der Geisteskrankheit im gewöhnlichen Sinne des Wortes entsteht, sondern jedenfalls vor deren Ausbruche schon angetroffen wird, und höchst wahrscheinlich schon lange Jahre vorher bestanden hat. Ebenso wie der Uebergang des *Tardo-dicrotus* in die nächste Metamorphose, in den *Tardus planus* erfahrungsmässig sehr langsam und erst im Laufe von Jahren geschieht, ebenso ist er selber ein chroni-

sches, ein constitutionelles Symptom, ein charakteristisches Symptom der neuropathischen Constitutionen.

Diese Thatsachen bilden die Brücke zu den zahlreichen Erkrankungen, auf die wir im gemeinen Leben stossen, in denen der Kenner alsbald Nervenkrankheiten verbunden mit Störung des Geistes, des Gemüthes, überhaupt der höheren geistigen Thätigkeiten, oder doch wenigstens Menschen sieht, die, wie man zu sagen pflegt, psychisch unsicher sind. Dass diese Personen so gut wie erklärte Geisteskranke unsere tarden Pulsphasen darbieten, und dass die letzte Hälfte unserer Abhandlung wesentlich mit zum Ziele hatte, auf diese Thatsache hinzuführen, wird dem denkenden Leser, der mir bis hieher gefolgt ist, nicht unerwartet kommen. Es wird der sphygmographischen Forschung der Zukunft vorbehalten bleiben, die Verbreitung der tarden Pulsphasen festzusetzen; es ist aber jetzt schon möglich und nothwendig, auf die Bedeutung hinzuweisen, welche diese Untersuchungen in Bezug auf die Erweiterung unserer gegenwärtigen psychiatrischen Anschauungen und insbesondere auf die forensische Psychiatrie in Aussicht stellen.

Digitized by Google

Beschreibung einer interessanten Hemmungsbildung des Gehirns.

Mit 3 Abbildungen.

Von

Dr. **Heinrich Schüle,**
Hülfsarzt in Illenau.

Das im Nachfolgenden beschriebene Gehirn wurde durch Hrn. Bezirksarzt *Wick* in Ettlingen an meinen Collegen Dr. *Reich* übersandt, der es mir zur Untersuchung gefälligst überliess. Hr. Bezirksarzt *Wick*, zugleich der Arzt der Verstorbenen, hatte die Güte, mir noch eingehende Krankheitsnotizen aus eigener Beobachtung sowie anamnestische Daten von deren Mutter zur Verfügung zu stellen, deren Interesse durch Zusammenhalt mit den anatomischen Untersuchungsergebnissen noch an Werth gewinnt. Ich citire dieselben fast wörtlich in der Fassung, wie Hr. Dr. *Wick* sie übersohickte.

Krankheitsgeschichte und Schilderung des psychisch-somatischen Zustandes. X., ein 24 Jahr altes Mädchen, war ein uneheliches Kind, deren Mutter zu den intelligenteren Frauen ihres Standes gehört, deren Vater aber ein verkommener Trunkenbold war, in dessen Familie Geisteskrankheit und hässliche Menschengestalten, auf niedriger Verstandesstufe stehend, vorkommen. Die Schwangerschaft der Mutter verlief

Digitized by Google

gut; das ausgetragene, neugeborene Kind war angeblich wohlgestaltet und an demselben Nichts von der Norm Abweichendes (für die Mutter!) erkennbar. Es trank an der Brust und gedieh, bis in seiner 8ten Lebenswoche zum ersten Mal sog. Gichter mit heftigen Zuckungen auftraten. Anfangs wiederholten sich die Anfälle erst nach mehrern Wochen; später kamen sie häufiger, endlich täglich 6—8 Mal. Es wird derselben noch besondere Erwähnung geschehen. — Als das Kind mit drei Jahren noch nicht laufen und sprechen konnte, schrieb die Mutter die Ursache den Krämpfen zu. Jetzt erst wurde es ihr klar, dass es mit dem Kinde nicht ganz in Ordnung sei. Bei Gehe-Versuchen bemerkte sie ein Nachhinken des linken Beins, ebenso eine Schwäche des linken Arms, dessen Handgelenk sich vorherrschend in Beugung befand, während die Finger eine sog. Vogelklaue bildeten; ebenso war eine unvollkommene Lähmung der rechten Gesichtshälfte zugegen. Indessen lernte das Kind doch einigermassen, obgleich nur in gebückter Haltung, sich fortbewegen, wenn es sich mit der rechten Hand an Gegenständen halten konnte; in spätern Jahren gelang es demselben sogar auf den Tisch zu steigen. — Die Gesichtszüge veränderten sich nach dem 3ten Jahre gleichfalls; der Gesichtsausdruck war ein entschieden blödsinniger, zeigte bald grinsende Freundlichkeit, bald planloses Hinstarren; aus dem halb geöffneten Munde hing die Zungenspitze heraus, ein ununterbrochener Strom Speichel ergoss sich über das Kinn, excoriirte dasselbe und durchnässte die Kleider. Die Verdauung war gut, die Esslust enorm, und was geniessbar war, verschlang die Kranke; dessenungeachtet war sie abgemagert. Erst im 17. Lebensjahre lernte sie Etwas sprechen, d. h. konnte sie einige für die Ihrigen enträthselbare Worte hervorbringen, z. B. Muer statt Mutter, Liet statt

Digitized by Google

Lisette, Br statt Brod. Dabei begriff sie Alles in ihre beschränkte Sphäre Gehörige, hatte namentlich ein sehr gutes Gedächtniss für Personen, für gemachte Versprechen und Beleidigungen, welche sie längere Zeit nachher oft noch zu rächen suchte. In engen Gränzen traten auch zweckmässig combinirte Bewegungen und ein elementares Handeln hervor: das Mädchen suchte Gegenstände, die vor ihm verborgen wurden, auf und verbarg sie wieder; um Esswaren, die in vermeintlich für sie unerreichbare Höhe gestellt waren, zu erhaschen, stellte sie den Fussschemel auf den Tisch und erkletterte, die Abwesenheit der Ihrigen benützend, trotz ihrer gebückten Stellung und halbseitigen Lähmung die Stelle, welche sie in den Besitz der Speisen setzte. In ihrem Benehmen liess sich eine gewisse Eitelkeit nicht verkennen; in Harn- und Stuhlentleerungen beobachtete sie Reinlichkeit. Im 19. Jahre erfolgte die Menstruation ohne besonders auffällige Erscheinungen. Dieselbe trat während 2 Jahren stark und regelmässig ein. Die Brüste entwickelten, die Geschlechtstheile und Achselgrube behaarten sich; einen besonders ausgeprägten Geschlechtstrieb will die Mutter nicht bemerkt haben. Die letzten 2 Jahre setzte die Periode aus.

Die oben schon erwähnten immer häufiger auftretenden Anfälle, welche früher den eclamptischen Anfällen der Kinder durchaus ähnlich waren, hatten nach und nach, freilich nicht ohne gewisse Eigenthümlichkeiten, den Charakter epileptischer Paroxysmen angenommen. Nicht immer, aber meist begann der Anfall mit einem Schrei, der es oft ermöglichte, die Kranke vor Ausbruch der Convulsionen zu Bett zu bringen; hierauf wurden die oberen und unteren Extremitäten für einige Zeit starr gegen den Körper angezogen, heftige Zuckungen der Glieder lösten diesen Krampf aus, Schaum trat aus dem Munde, die Zunge wurde bisweilen wund

gebissen, und ein oft stundenlanger soporöser Zustand beschloss die Scene. Häufig aber kamen im letzten Lebensjahre maniakalische Anfälle zum Vorschein, die Kranke schrie, tobte, griff die Nahekommenden an und zerstörte, was sie erreichen konnte. Ueberhaupt zerriss sie in letzter Zeit ihre Kleider, das Bett und Alles, was ihr in den Weg kam. — In einem protrahirten epileptischen Anfall trat der Tod ein, im Juli 1868. — Beigefügt muss noch werden, dass Gesichts- und Gehörssinn gut waren, und sich Nichts bemerken liess, was auf einen Mangel oder eine Schwäche der übrigen Sinne sich hätte beziehen lassen.

Untersuchung des Gehirns. Das übersandte Präparat bestand ausschliesslich aus dem Gehirn mit der überkleidenden *Pia mater*. Ueber die Schädelverhältnisse war Nichts zu eruiren; auffällige Abnormitäten müssen, da Herr Dr. *Wick*, welcher der Autopsie selbst beiwohnte, Nichts erwähnt, gefehlt haben. Auch eine feinere Untersuchung der histologischen Structur war durch die lange Aufbewahrung in wässrigem Alkohol unmöglich geworden. Dafür bot das Präparat makroskopisch so sehr vieles eines hohen Interesses Würdige, dass die genaueste Schilderung geboten ist.

Schon bei der ersten Besichtigung fällt bei der gleichen Länge beider Hemisphären (= 13,3 cm.), die sehr überwiegende Breite der linken Hemisphäre (= 6 cm.) gegenüber der rechten (= 4,8 cm.) auf. Wir lassen dabei alle Windungsverhältnisse vorerst ausser Augen. Diese Reduktion des Breitedurchmessers betrifft, wie aus Fig. 1. ersichtlich, die ganze rechte Hemisphäre, ist aber am auffälligsten gegen den Stirnlappen hin, wo, von oben gesehen, die lateralen Randcontouren in steiler Krümmung einwärts biegen, und dadurch, sowie durch das trichterförmige Abfallen der diese Stelle umgrenzenden Partieen, auf einen hier vorhandenen Defect hinweisen.

Digitized by Google

Klar tritt dies Verhältniss sofort bei der Profilansicht dieser rechten Hemisphäre hervor, Fig. 2. Die *Sylvi*'sche Spalte liegt hier zu einer breit dreieckigen Grube ausgedehnt weit geöffnet; in der Tiefe dieser nach innen sich verengenden Grube liegt und deren theilweisen Grund bildend ein 4,6 breites und 3,7 hohes Läppchen, welches an seiner freiliegenden Seite mit schwach gefurchter grauer Substanz belegt, nach vorn mit dem Stirn-, nach hinten mit dem Schläfelappen zusammenhängend sich als die blosgelegte Insel zu erkennen giebt. Die obere innere Fläche dieser letzteren ist mit Marksubstanz belegt und bildet zugleich den Boden einer queren, nach vorn bis zu 0,5 cm. klaffenden Spalte; nach innen führt diese letztere in das Mark des Stabkranzes und erweitert sich sehr rasch, indem ihre Lichtung in das Cavum des Seiten-Ventrikels übergeht. Es lässt sich auch wirklich in der Tiefe der klaffenden Spalte sehr leicht der Streifenhügel erkennen. Es communicirt mithin der Seiten-Ventrikel durch das gespaltene Markparenchym mit der trichterförmig erweiterten Grube und dadurch nach auswärts. Die Wände dieser Spalte sind mit einem sehr derben, verdickten Ependymbelag überzogen, der, wie die Betrachtung des Medianschnitts noch deutlicher zeigen wird, mit derselben Ependymbeschaffenheit im Ventrikel zusammenhängt resp. dessen Fortsetzung bildet. Am Interessantesten sind nun vor Allem die durch das beschriebene breite Klaffen der *Sylvi*'schen Spalte und die Hervordrängung der Insel bedingten Modifikationen der umgränzenden Hemisphären-Partieen. Man erkennt mühelos das *Operculum*, den Schläfe- und Stirnlappen; aber wie bedeutend sind die Veränderungen im Einzelnen! Da die modificirte *Sylvi*'sche Grube einen nach aussen sich erweiternden Trichter darstellt, so sind die durch den Stirnlappen und das

Operculum gebildeten vordern resp. obern Wand einwärts gebogen und der den dreieckigen Raum hinten begränzende Schläfelappen nach abwärts geschoben. Nur soweit die genannten Lappen am äussern Rand der Grube sich betheiligen, liegen sie im Niveau der übrigen Mantelpartieen; von diesem Rand aber fallen sie steil eingebogen einwärts (daher die Eingangs erwähnte unterbrochene Lateral-Contour). Es erhellt schon hieraus, wie bedeutend das Volumen der Lappen hiedurch reducirt sein muss; bereits das *Operculum* ist sehr stark betroffen, am stärksten aber der Stirnlappen, dessen wirkliche Ausdehnung von seinem vordern Rande bis zur Stelle seiner Einbiegung in die Vertiefung oben nur 1,7 cm., unten 2,6 misst. Auch der nach hinten und abwärts gedrängte Schläfelappen erscheint bedeutend verkümmert. Alle diese Reduktionen fallen gegenüber dem gut entwickelten Scheitel- und Hinterlappen um so grösser aus. Ausser dem Volumen und der Stellung ist aber auch die Form der genannten Lappen eine sehr geänderte. Die auffallende Plattheit der obern Hemisphärenwölbung (zum Theil wohl durch die nicht mit allen Cautelen gehandhabte Aufbewahrungsweise mit verursacht) wird verstärkt durch die eigenthümliche Configuration des Stirnlappens, der statt geschweift vielmehr steil, beinahe gerade abfallend ist, statt gegen den vorderen Rand sich verjüngend breit und plump, statt oval eher eckig contourirt ist. In seiner untern Partie ist er entschieden nach vorn sowie lateralwärts ausgebaucht. Das *Operculum* ist durch seine Verkürzung und Verkümmerung kaum mehr recht kenntlich; der Schläfelappen durch seine Verdrängung auffallend spitz und schmächtig, und im untern Segment seiner Lateralfläche durch Achsendrehung aus der Profillinie gerückt worden. — Noch muss erwähnt werden, dass die ganze Oberfläche von der *Pia* überzogen ist, die an der Umbie-

Digitized by Google

gungstelle der *Sylvi*'schen Grube mit einbiegt, die einwärts ziehenden Windungen begleitet und am Grunde der Grube die blosgelegte graue Fläche der Insel überzieht. Im Umkreis des Umbiegungsrandes selbst waren, wie mir das Präparat zur Hand kam, noch einzelne kleine Fetzchen einer derben, durchsichtigen Membran anhaftend nachweisbar gewesen.

Die Untersuchung der medialen Seite nach Anlegung eines durch den Balken vertikal geführten Schnittes bringt nun weitere Aufklärungen, Fig. 3. Der Balken ist 7 cm. lang und sehr ungleich dick; in der hintern Hälfte ist die Dicke eine entsprechende, in der vordern aber, namentlich in der Gegend des *Septum pellucidum* sehr deutlich vermindert. — Am auffälligsten ist die Configuration des Balkenknie's und des damit zusammenhängenden *Septi pellucidi*. Das Knie nämlich ist, wie aus der Fig. ersichtlich, sehr bedeutend vergrössert, 2,6 cm. hoch, 0,8 dick. Zugleich ist der Krümmungswinkel desselben ein sehr grosser, dem rechten sich stark nähernder. Dadurch nun und durch die mangelnde Einwärtsbiegung des Knie's einerseits, sowie durch die Zurückdrängung und sehr schwache Krümmung der vordern Fornixschenkel andrerseits, entsteht für das *Septum pellucidum* ein Raum, dessen abnorm grosse Weitung (Höhe = 1,3; Abstand vom Krümmungswinkel des Balkens bis zu den vorderen Fornixschenkeln = 3,2 cm.) für die spätere pathologisch-anatomische Deutung des zu Grunde liegenden Processes von Wichtigkeit wird. In dieselbe mündet nämlich (s. Fig. 3) auch die früher beschriebene von der *Sylvi*'schen Grube ausgehende und durch das Markparenchym einwärts ziehende Spalte. Ihre Wandungen sind mit demselben starren, sehr verdickten Ependymbelag überzogen, der an der äussern Oeffnung der Spalte schon zu Tage trat. Die Stamm-Ganglien (cp. str. Streifenhügel; Th. o.

Digitized by Google

Durchschnitt des Sehhügels) zeigen sich abgeflacht, der Fornix besonders in den vordern Schenkeln, aber auch am Körper dagegen sehr bedeutend verdickt.

Dieser eben aufgeführte Befund gilt nun auch für die Betrachtung der Medialseite der linken Hemisphäre. Auch hier das massiv entwickelte Balkenknie mit dem weitgeöffneten Winkel, dieselbe abnorme Erweiterung des *Ventriculus septi pellucidi*, dieselbe Verdickung des Fornix, dieselbe Abflachung des Streifenhügels. Allerdings fehlt hier die Communication des Ventrikels nach aussen, aber dafür zeigt sich dessen Höhle lateralwärts und nach vorn erweitert und gegenüber dem normalen Verhältniss sehr viel geräumiger. Auch hier überall die Ueberkleidung mit derselben derben Ependymdecke.

Dagegen bietet die laterale Seite dieser linken Hemisphäre nicht dieselben ausserordentlichen Abnormitäten wie rechts, wiewohl sie auch so noch auffallend genug ist. Eine Oeffnung oder Klaffen der *Sylvi*'schen Spalte ähnlich wie rechts ist hier nicht aufzufinden. Der vertikale und horizontale Ast ist deutlich ausgeprägt, der erstere sogar in einer bis 1,8 cm. an den vordern Stirnlappenrand hinreichenden Entwicklung. Aber wir haben trotzdem Nichts weniger als normale Verhältnisse vor uns. Vor dem vertikalen und unter dem horizontalen Ast nämlich, nach vorn durch eine gleichfalls senkrechte, nur seichtere Furche vom Stirnlappen oberflächlich geschieden gränzt sich ein beinahe viereckiger, 3,5 breiter und 2,8 hoher Lappen ab, der nach vorn mit dem Markparenchym des Stirn-, nach hinten in der Tiefe mit dem des Schläfelappens und nach innen mit dem Stabkranz zusammenhängt. Durch die Weise dieser Verbindungen, durch seine Lage zur dritten Frontalwindung, sowie durch seine Configuration, seinen Ueberzug mit grauer Substanz und deutlichen schmalen *gyri breves*

Digitized by Google

lässt er sich, obwohl vollständig im Niveau der übrigen Mantelpartieen liegend, nicht anders denn als Insel auffassen, welche demnach auch hier, ebenso wie rechts, vorgedrängt ist und zwar hier noch mehr wie dort, wo sie im Grunde jenes Kraters, also noch ziemlich weit unter dem umgebenden Niveau gelagert war. Auch der Stirnlappen bietet hier ähnliche Verhältnisse dar wie rechts. Er hat denselben steil abfallenden, wenig ausgeschweiften Umbiegungscontour, dieselbe plumpe, eckige Gestaltung, ist aber, von der Centralspalte aus gerechnet, lange nicht so stark reducirt wie rechts, wo die jähe Einwärtsbiegung statt hatte. Dessenungeachtet fällt dem Stirnlappen doch noch immer ein absolut und relativ kleines Maass zu (s. Fig. 1); namentlich zeigt die genauere Untersuchung (was auf der andern Seite so nicht möglich gewesen), dass die unterste Partie, welche am meisten die massiv-eckige Form der Profil-Ansicht bedingt, aus der mächtigen Hervortreibung jener sonst um die *Sylvi*'sche Spalte gebogenen, zur Orbitalfläche abfallenden und einwärts ziehenden Windungen, sowie aus der Hervorwölbung der sonst leicht ausgehöhlten Orbitalfläche selbst gebildet ist, wodurch zugleich jene Windungspartieen (*Gyri cruciati Val.*), die sonst von dem *solco crociforme Rolando*'s sich rückwärts in die Tiefe der *Sylvi*'schen Grube krümmen, an die Oberfläche geschoben sind. Durch dieses Verhältniss wird nun zugleich auch die freiliegende Oberflächen-Continuität zwischen unserer vorgetriebenen Insel und diesen untersten Stirnlappen-Partieen verständlich. Nach Abzug dieser bleibt aber jetzt für den Haupttheil des Stirnlappens nur eine kleine, oberhalb des verlängerten vordern Astes der *Sylvi*'schen Spalte gelegene Partie, deren Maass um so viel geringer noch ausfällt, als die Centralfurche sehr weit nach vorn gerückt ist, worüber Fig. 1 belehrt. Dieselbe Abbildung zeigt vergleichend nun

Digitized by

weiter das links zur vollen Länge entwickelte *Operculum* gegenüber dessen Verkümmerung auf der rechten Seite. Scheitel- und Hinterhauptslappen sind auch hier relativ am vollständigsten ausgebildet. Rechnen wir zu diesen günstigern Maassen nun noch die dieser Seite gleichfalls zukommende stärkere Entwicklung des Schläfelappens, wenngleich derselbe durch die herausgetretene Insel auch eine schwache Drehung und Verschiebung nach hinten und unten erlitten: so resümirt die gleich zu Anfang gefundene höhere Entwicklung der Hemisphäre dieser Seite, zugleich aber auch hier wieder die gegenüber der überwiegenden Ausbildung der drei letztgenannten Lappen karge Ausstattung des Stirnlappens.

Es liesse sich auf die bis jetzt gefundenen Ergebnisse fussend schon ein zureichender Versuch einer pathologisch-anatomischen Epicrise unternehmen, die von der Deutung unserer Untersuchung des Medianschnittes speziell der Befunde am Ventrikel, ausgehend, nicht schwierig sein dürfte. Gleichwohl ziehe ich es vor, diese abschliessende Frage erst nach Darlegung der Windungsverhältnisse abzuhandeln. Diese nämlich dürften in ihrer im vorliegenden Fall ganz einzigen Configuration noch etwas weiter unser aufmerksames Interesse beanspruchen.

Ich beginne dabei wieder mit der zuerst abgehandelten rechten Hemisphäre und zwar mit deren Medianseite*). Vor dem sehr verlängerten Knie des Balkens steigt (Fig. 3.) der *gyrus fornicatus* auf, krümmt sich um den Balken und wird namentlich gegen das Splenium hin sehr voluminös, wobei er sich nahe bis

---

*) Der Benennung der Windungen und Furchen habe ich die soeben bei *Vieweg* erscheinende Monographie von *Ecker* in Freiburg zu Grunde gelegt.

Digitized by Google

zum obern Hemisphärenrande erhebt. Nach vorne umgrenzt ihn der stellenweise auffallend seichte *sulcus calloso-marginalis*, dessen Verlauf in unserm Präparate die Eigenthümlichkeit bietet, dass er dem obern medialen Hemisphärenrand parallel bleibt und nicht sich zum letztern hinaufkrümmt. Diese Abnormität hat die Folge, dass auch kein Praecuneus abzugrenzen ist, sondern nur ein schmaler mit der medialen Seite der ersten Frontalwindung continuirlicher Windungszug den obern Gränzsaum bildet. Unmittelbar dahinter zieht die *fissura parieto-occipitalis (po)* gegen das Splenium herab, während der massige *gyrus fornicatus* um letzteres herumbiegt und in den (wahrscheinlich mit der Fornix-Verdickung zusammenhängenden) gleichfalls sehr stark entwickelten *gyrus hippocampi* übergeht. Hinter dem Splenium trifft mit der *fissura parieto-occipitalis* die vom hintern Ende der Hemisphäre gablig entspringende *fiss. calcarina Huxley* zusammen. Es wird dadurch ein deutlich abgrenzter, windungsarmer Cuneus abgeschieden. Vom Vereinigungspunkte der beiden eben genannten Furchen zieht nun aber eine sehr tiefe Furche x nach ab- und vorwärts und trennt die ganze Länge des *gyrus hippogampi* von den übrigen *Occipito*-Temporalwindungen. Diese Furche macht den *gyrus fornic.* zu einem vollständig gesonderten, continuirlichen Windungszug. Hinter derselben liegt ein ansehnlich reiches Windungsconvolut, in welchem jedoch jede genauere Scheidung durch einen bekannten Windungszug, sowie auch jegliche sichere Fährte einer Leitungsfurche fehlt. Nicht einmal der *sulcus occipito-temporalis inferior (fissura collateralis Huxley)* ist aufzufinden. Der Windungsreichthum dieser Gegend ist ein vollständig regelloser.

Gehen wir von der Medianfläche zur Convexität über, so imponirt uns auch hier das Gehirn gleich auf

den ersten Blick als ein auffallend windungsreiches. Allein bei genauerer Betrachtung hält es in derselben Weise wie eben an der Basis schwer und ist fast geradezu unmöglich, dieselben einem Schema einzuordnen. So unterliegt schon die Bestimmung der Centralspalte einiger Unsicherheit, insofern mehrere Longitudinalfurchen (siehe Fig. 2.) im verkürzten Operculum darum streiten, und wird schliesslich nur mit Wahrscheinlichkeit und nach Vergleich mit der andern Hemisphäre, wo die Windungsverhältnisse deutlicher sind, für die in Fig. 1. mit C bezeichneten Spalte entschieden. A und B entsprächen sodann den rudimentären Centralwindungen. — Vollends ganz abweichend vom normalen Verlauf ist die Anlage der Stirnwindungen. Diese, welche wieder sehr zahlreich sind, ziehen nämlich sämmtlich transversal nach dem vordern Hemisphärenrande (Fig. 2.), aber ohne nach der untern Fläche umzubiegen. Ihr Verlauf ist bald einfach, bald leicht gewunden, bald zickzackförmig gebogen. Einzelne tragen seichte Secundär-Furchen. An der *Sylvi*'schen Lücke angelangt, biegen sie einwärts und convergiren radiär gestellt gegen das vordere Ende des nach dem Ventrikel führenden Spaltes. Ein Versuch zu einer auch nur annähernden Abgrenzung in einzelne Etagen erscheint nicht durchführbar. Die vorgebauchte Orbitalfläche des Stirnlappens zeigt wohl mehrere Vertiefungen, aber ohne jede nähere Bestimmbarkeit in Furchen oder Windungen. — Die Insel, nach vorne in das Parenchym des Stirn-, nach hinten in das des Schläfelappens übergehend, zeigt andeutungsweise einige aufrecht gestellte *gyri breves*. — Der Schläfelappen, soweit er der Convexität angehört, ist wie der an der Basis gelegene Theil desselben der entschieden windungsärmste Theil des ganzen Gehirns. Deutlich ist allein der *sulcus temporalis superior* Fig. 2. t; (scissure parallèle Grat.), und auch dieser

Digitized by Google

nur zum Theil entwickelt. Bestimmt gesonderte Windungszüge sind nicht aufzufinden. — Um so windungsreicher ist dagegen wieder der Parietal- und Occipitallappen. Allein hier zeigt sich zugleich am durchgreifendsten die Unmöglichkeit einer sichern Reduction unter das typische Schema. Einigermaassen sicher ist nur die *fissura interparietalis ip*, und dies auch nur in ihrem mittlern Theile; der vordere Ursprung ist wieder ganz zweifelhaft; leidlich charakterisirt ist ferner noch der *lobulus parietalis superior* P_1; zweifellos dagegen der laterale Einschnitt der *fissura parieto-occipitalis po*, deren umsäumender Windungszug vielleicht als *gyrus occipitalis primus* O_1 (Pli de passage supérieur externe Grat.) angesprochen werden dürfte. Allein diese Aussonderungen, abgesehen von ihrer immer noch gewagten Existenz, wirken doch weiter zu keiner übersichtlichern Gruppirung der untern Parietal- und Occipitalwindungen. Die letztern sind überdies nicht mehr in der nöthigen Integrität erhalten. Nach den vielfachsten und immer misslungenen Versuchen einer schematischen Rubricirung und zwar von den verschiedensten Ausgangspunkten aus, verzichte ich auf die genauere Topographie des sehr ansehnlichen, reich abgetheilten, theilweise in zierliche Läppchen geschiedenen Windungsconvoluts. Am Umbiegungsrande der Lücke angekommen, ziehen sie plattgedrückt und radiär gestellt wie die gegenüberliegenden Stirnwindungen in zwei derben, mit Einschnitten, Erhöhungen und einem schmalen, äusserst fein gewundenen, zwischen beiden eingeschalteten Läppchen versehenen Windungszügen gegen den Grund der Lücke Fig. 2.

Gehen wir von da zur medialen Seite der linken Hemisphäre über, so bieten die Frontal- und Parietal-Partieen eine der rechten ganz analoge Bildung: auch hier steigt vor dem verlängerten, verdickten Balkenknie der gut entwickelte *Gyrus fornicatus* nach oben, durch

den auf dieser Seite viel tiefern *Sulcus calloso-marg.* nach aussen getrennt. Aber zur deutlichen Aussonderung eines *Praecuneus* kommt es hier so wenig wie rechts; die oben erwähnte Furche behält auch hier die horizontale Verlaufsrichtung bei. Schwieriger werden die Verhältnisse wieder am Occipitalstück. Es gelingt hier nicht einmal wie auf der anderen Seite einen bestimmten *Cuneus* abzutrennen, ja selbst die *fissura parieto-occip.* ist nicht ganz sicher. Am zweifellosesten ist noch die *fiss. calcarina*, die aber nicht mit der als *fiss. parieto-occip.* etwa noch anzusprechenden Vertical-Furche hinter dem *Splenium* zusammentrifft, sondern durch einen schmalen, aus dem *gyrus fornicatus* kommenden und gegen den hintern medialen Occipital-Rand ziehenden Windungszug getrennt wird. Vielleicht dürfen wir hierin die an die Oberfläche getretene, für gewöhnlich in die Tiefe gesenkte Zwickelwindung (*gyrus cunei Ecker*; pli de passage inf. int. Grat.; vgl. zur Verdeutlichung *Ecker*'s Abbildung l. c. p. 45) erkennen, wenn es anders noch angeht, in dieses Windungsgewirre Bilder normaler Verhältnisse einzutragen. Unterhalb dieser Partie wird die Anlage wieder übersichtlicher. Der *gyrus fornicatus* geht in den auch hier sehr massig entwickelten *gyrus hippocampi* über, allein hier ohne jene höchst eigenthümliche auf der rechten Seite beschriebene hintere Randfurche. Dagegen lassen sich hier die Occipito-Temporalgyri (medialis und lateralis) (*lobulus lingualis* und *fusiformis Huschke*) mit der dazwischen liegenden Collateral-Fissur mit befriedigender Deutlichkeit aussondern.

Zeigt dieses letztere Moment schon auf etwas höher entwickelte Windungsverhältnisse als an der rechten Hemisphäre, so tritt dies noch deutlicher an der gleichfalls sehr windungsreichen lateralen Seite der linken Hemisphäre hervor. Zwar die Stirnwindungen

Digitized by Google

sind auch hier in der Ausbildung noch sehr zurückgeblieben und zeigen namentlich auch noch dieselbe transversale Verlaufsrichtung ohne Umbiegung nach der Orbitalfläche, wie rechts; aber doch ist bereits der *sulcus praecentralis* f_3 vorhanden, um die bogenförmig mit der vordern Centralwindung zusammenhängende, breite und äusserst plumpe dritte Stirnwindung abzugrenzen. Die obern 2 Stirnwindungen bilden dagegen wieder ein im Ganzen schmales, continuirliches, nicht sicher zu trennendes, seicht gefurchtes Convolut. Um so deutlicher und ganz sicher ist aber hier die *Rolando*'sche Furche mit den beiden Centralwindungen, an welchen nur die Verschmälerung nach oben hin sehr auffallend ist. In relativ gleich guter Entwicklung findet sich auch der Scheitellappen mit dem mächtigen *lobulus parietalis superior* P_1 und *inferior (lobulus supra - marginalis* P_2 und *gyrus angularis* P'_2) und den scharf ausgeprägtem *sulcus interparietalis ip.* In gleicher Weise sicher ist der Uebergang des *lobul. supramarg.* in den *gyrus temporalis superior* T_1; hier sitzt zugleich auch wieder ein von der andern Hemisphäre her schon bekanntes kleines, in die *Sylvi*'sche Spalte verstecktes Läppchen mit darmähnlich atrophischen Windungen aufgelöthet. Auch der Uebergang des *gyrus angularis* in den *gyrus temporalis medius* ist deutlich, aber letzterer nur auf eine kleine Strecke nach vorn zu verfolgen. Ueberhaupt ist die vordere Partie des Schläfelappens wieder viel weiter in der Entwicklung zurückgeblieben; mit Ausnahme der eben erwähnten ordentlich markirten Ausbildung gegen die Parietalgegend hin bietet er weder lateralwärts noch auf seiner Basalfläche irgend welche genauere Charakterisirung; nicht einmal der *sulcus tempor. sup.* ist hier sicher erkennbar. Einzelne unregelmässige Einschnitte und kurze Furchen bieten das Einzige an demselben Bemerkenswerthe. — Der Hinterhauptslappen ist auch auf

dieser Seite leider zu defect, als dass sichere Ermittelungen möglich wären. Bei der Unsicherheit einer *fiss. parieto-occip.* und der schlechten Begränzung des Zwickels entbehrt selbt die unmittelbar an die Parietalwindungen gränzende Partie der verlässlichen Anhaltspunkte. Vielleicht dürfte die schmale Bogenwindung O_1, welche den an das mediane Ende der Interparietalspalte grenzenden lateralen Einschnitt umkreist, noch am ehesten als Analogon des *gyrus occipit. primus* aufgefasst werden. — Auf der vorgetriebenen Insel finden sich auch auf dieser Seite spärliche, senkrecht gestellte *gyri breves.* —

Pathologisch - anatomische Epicrise. Ich schicke derselben die auf meine Anfrage von Herrn Dr. *Wick* mir zugesandte Mittheilung aus dem Sectionsbefunde voraus:

„Was die seitliche Hirnspalte betrifft, so war dieselbe, so viel ich mich erinnern kann, durch eine von den weichen Häuten ausgehende, mit Serum gefüllte Blase, deren Inhalt, wie es schien, mit den Seitenventrikeln communicirte, geschlossen."

Mit dieser Ergänzung lässt sich der beschriebene Fall nun genetisch in folgender Weise expliciren: Die bedeutend erweiterten Ventrikelräume, die starke Verdickung des Ependym's führen mit dem weitern Befund einer aus dem Ventrikel vorgestülpten, mit Serum gefüllten Blase auf einen *Hydrocephalus internus* hin, der nach der obigen Schilderung vorwiegend das *Septum pellucidum* betroffen hatte. Die Abnormitäten und Bildungshemmungen der Hemisphären nöthigen, wenn anders sie im Zusammenhang mit diesem Erguss stehen, diesen letztern schon in die intrauterine Lebensperiode zu verlegen. Legt man dem Versuch einer noch speciellern Formulirung des genetischen Nexus zuerst die Configuration der linken Hemisphäre zu Grunde, so ist die weitere Annahme am wahrscheinlichsten, dass der

Digitized by Google

Erguss schon zu jener Periode des Fötallebens bestanden habe, als die Grosshirnbläschen bereits die Sonderung zwischen Stammlappen und Mantelregion vollzogen, und die Hemisphären nach Bedeckung des Zwischen- und Mittelhirns auch die Oberfläche des Cerebellum umfasst und nach bogenförmiger Umwachsung des Hirnstiels zur Bildung der *Fossa Sylvii* bereits geführt haben. In dieser Periode (vgl. hiefür die Abbildung bei *Reichert* Taf. XII, Fig. 44. und 45.) liegt durch die weit offene *Sylvi*'sche Spalte der Stammlappen noch frei zu Tage und verliert sich, fast in demselben Niveau liegend, beiderseits in die jetzt noch windungslose laterale Fläche des Mantels. Bei der zu dieser Zeit (etwa um die 20. Woche) ganz anfänglichen peripheren Wandverdickung existirt nun namentlich noch ein sehr geräumiger innerer Hohlraum, der sich noch weit vorwärts und abwärts erstreckt. Nehmen wir nun diesen weiten lateralen Hohlraum mit dem gleichen Erguss erfüllt an, gleichviel ob gleichzeitig oder erst nachträglich durch Communication mit der Höhle des Stammbläschens (der 3. Ventrikelhöhle), so wird als Wirkung resultiren: dass die lateralen Gebilde in ihrer embryonalen Aussenlage erhalten und speciell der hinausgedrängte Stammlappen an der Oberfläche fixirt wird, wodurch das Entgegenwachsen des Stirn- und Schläfelappens und im weitern der Verschluss der geöffneten *Sylvi*'schen Spalte gehemmt ist. Auch die Modificirung der Form des Stirnlappens in unserm Präparate erklärt sich, wenn wir die dehnende Wirkung dieser innen angesammelten Flüssigkeit in Betracht ziehen, insofern dadurch die Orbitalfläche vorgebaucht und mit dieser auch die in der *Fossa Sylvii* gelegenen Mantelfalten an die Oberfläche hinausgedrängt werden müssen. Für die rechte Hemispäre ist dann weiter noch anzunehmen, dass der Druck hier zur Loslösung des am obern Rande der *Sylvi*'schen Grube hinziehenden Wandungssaums ge-

Digitized by Google

führt habe, wodurch die innere Flüssigkeit einen Weg in's Freie fand und sich in der Eingangs beschriebenen Weise blasenartig hervorstülpte. Jedenfalls wird diese letztere Entwickelung des Processes als die Ursache der bedeutenden Verkümmerung dieser rechten Hemisphäre bezeichnet werden müssen, insofern durch den hemmenden Gegendruck der vorgestülpten Blase der Stirnlappen und das Operculum auf einer so primitiven Wachsthumsstufe zurückgehalten werden mussten.

Dürften soweit unserer Annahme die pathologisch-anatomischen Thatsachen sich befriedigend fügen, so suchen wir dagegen umsonst nach einem aufklärenden Princip über die speciellen Windungsverhältnisse in unserm Hirnpräparate. Das Schema des normalen Windungsbau's ist nur für das relativ kleinere Territorium und auch da wieder nur unter bedeutenden Modificationen beibehalten, so besonders für die Lateralfläche der linken Hemisphäre, deren Parietallappen noch die meiste Analogie mit der typischen Windungsarchitektonik bietet. Aber schon rechterseits verlässt uns bei eben derselben Partie, mit Ausnahme spärlicher Anhaltspunkte, wieder jeder bekannte Pfad in dem so reich abgetheilten Windungsconvolute; während die Schläfelappen, nicht minder eigenthümlich, gerade gegentheilig durch eine constrastirende Glattheit und Furchungsarmuth („ainsi voyons-nous . . l'homme se distinguer par la richesse du pli moyen temporal" Grat. Mémoire p. 97) einer Aufklärung widerstreben. Die Stirnlappen dann wieder streifen blos in ihrer linksseitigen untersten Partie an das Gebiet bekannter Entwicklungsformen, während die Windungsgestaltung des obern Theils und die des ganzen rechten reducirten Lappens — vollends noch in ihrem merkwürdigen transversalen Verlaufe — wiederum etwas durchaus Eigenartiges haben. Fast noch origineller als die lateralen gestaltet sich ein kritischer Rückblick

auf die medialen Hemisphären - Theile. Der Bau der Fronto-Parietalpartieen möchte noch angehen; Bildung und Verlauf des *gyrus fornicatus* mit dem *Sulc. calloso-marg.* erinnert in vielen Theilen sogar an ganz normale Verhältnisse. Aber schon das Fehlen des Praecuneus, dessen Grösse („le lobule quadrilatère est très-grand", Mémoire p. 58, und ferner ibid. p. 99: nous noterons comme signe d'élévation la grandeur du lobule quadrilatère") *Gratiolet* sogar als für das menschliche Gehirn besonders charakteristisch betont, weist wieder auf den individuell eigenthümlichen Entwicklungsmodus hin. Erhöht wird diese specifische Eigenthümlichkeit und Ausnahmestellung unseres Präparats aber ganz besonders durch das Auftreten der Furche x Fig. 3., welche oben als von dem Vereinigungspunkte der beiden medialen Hinterhaupts-Fissuren entspringend und hinter dem ganzen Verlauf des *gyrus hippocampi* herabziehend beschrieben wurde: Diese Bildung hat weder im erwachsenen noch im Fötus - Gehirn, so wenig als bei einem der bisher bekannten Primaten irgend welche Analogie. Diese Entwicklungsabnormität ist durch das nur auf eine Seite (auf die rechte) beschränkte Vorkommen noch interessanter. Aber auch die linke Hemisphäre bietet an der correspondirenden Stelle grosse, wenn auch wieder ganz eigene Abweichungen vom normalen Bau. Ich verweise dabei auf die am obigen Orte gegebene Schilderung, wo auch, falls überhaupt normale Anschauungen dorthin noch übertragbar, eine genetische Möglichkeit bereits angedeutet ist. Allein trotzdem bleiben die unsichere *Fissura parieto - occipitalis* und der schlecht abgegrenzte Zwickel bei dem auffallend grossen Windungsreichthum jener ganzen Partie nach wie vor unaufgeklärte Eigenthümlichkeiten.

Nach allem diesem möchte sich als Schlussresultat ergeben:

Digitized by Google

„dass unser vorliegendes Präparat ein Gehirn repräsentirt, welches durch einen um den ca. 5. Monat aufgetretenen *Hydrocephalus internus* aus dem Gange seiner embryonalen Entwickelung abgelenkt wurde, und fortan seinen eigenen abnormen Weg einschlug."

Klinische Rückschlüsse des Einzelnen möchte ich bei dem Mangel einer Beobachtung des Lebenden, selbst auf die eingehenden Krankheitsnotizen unseres Gewährsmannes hin, hier nicht wagen. Nur in ätiologischer Hinsicht darf vielleicht die dort speziell betonte erbliche Anlage („der Vater, ein Trunkenbold, stammt aus einer Familie, in welcher Geisteskrankheiten und hässliche Menschengestalten auf niedriger Verstandesstufe stehend vorkommen") als ein beachtenswerthes Moment festgehalten werden. In anthropologischer Hinsicht dürfte eine noch interessantere Beziehung in der mikrocephalen psychischen Ausbildung der Patientin und dem so bedeutenden Windungsreichthum des Gehirns gefunden werden: ein scheinbarer Widerstreit, der vielleicht durch die in unserem Falle so vorwiegende Beeinträchtigung der Stirnlappen (vgl. hiezu Grat. Mém. p. 93 u. 94) wieder gelöst wird. —

Ich erfülle eine liebe Pflicht, indem ich hier am Schlusse meiner Untersuchung für den vielfachen Rath und die eingehende Belehrung, mit welcher Hr. Hofrath Ecker in Freiburg dieselbe leitete, nochmals meinen treu bewahrten Dank ausspreche!

Illenau, im März 1869.

Digitized by Google

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. stellt das Präparat*) von oben gesehen in natürlicher Grösse dar.

F. *Lobus frontalis*; *O.* *Lobus occipitalis.*
S. *ramus horizontalis fiss. Sylvii.*
A. *gyrus centralis anterior*; *B.* *posterior.*
c. *sulcus centralis.*
f_2 *sulcus praecentralis.*
P_1 *lobulus parietalis superior.*
P_2 *lobulus supramarginalis* } *lobulus parietalis inferior.*
P'_2 *gyrus angularis* }
ip *sulcus interparietalis.*
T_1 *gyrus temporalis superior.*
po *fissura parieto-occipitalis.*
O_1 *gyrus occipitalis primus.*

Fig. 2. Laterale Fläche der rechten Hemisphäre.
Lc. *lobus centralis.* Die übrigen Zeichen wie in Fig. 1.

Fig. 3. Mediale Fläche der rechten Hemisphäre.
CC. *corpus callosum.* *f.* *fornix.*
cp. str. *corpus striatum*; *Th. o.* *thalamus opticus.*
Gf. *gyrus fornicatus*; *H.* *gyrus hippocampi.*
x. Die v. d. Vereinigungsstelle der *fissura parieto-occipital.* und *fiss. calcar.* abgehende und d. *gyrus hippocampi* i. sein. ganz. Verlaufe abtrennende in tiefe Furche.
cm. *sulcus calloso-marginalis.*
F_1 erste Frontalwindung; mediale Seite.
Oz. *Cuneus.*
po. *fissura parieto-occipitalis.*
oc. *fissura calcarina.*

*) Dasselbe wurde bei der Local-Versammlung in Heidelberg am 3. Mai vorgezeigt.

Digitized by Google

Fig 1.



Fig 2



Fig 3

Fig 4

Zeitschrift f Psychiatrie Bd XXVI Hft 3

Digitized by Google

Fig. 2. Taf III

Fig. A.

Fig. 1.



Fig. 3

Fig. 4.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Zur Casuistik.

Carcinomatöse Hirngeschwulst. Mit 1 Taf. — Die Mittheilung des in Nachstehendem beschriebenen Falles, der, trotz der mangelhaften Notizen über Anamnese und Krankheitsverlauf, immerhin einen Beitrag zur Casuistik der Hirngeschwülste liefert, verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. *Steudel* in Esslingen, welcher mich zur Section des Falles einlud, und die Güte hatte, mir die Veröffentlichung des Befundes zu überlassen.

Der Kranke war ein 60 Jahre alter Lampenwärter in Esslingen, über dessen früheres Verhalten nichts Näheres erhoben werden konnte. Seit etwa Mitte Juli fiel an ihm ein mürrisches, barsches, wortkarges Benehmen auf, welches allmälig in gänzliche Verschlossenheit und Sprachlosigkeit überging. Seit Anfang Juli versah er sein Geschäft nicht mehr, blieb zu Haus und lag fast den ganzen Tag gänzlich theilnahmlos und stumm im Bett. Er fiel den Seinigen besonders dadurbh zur Last, dass er gefüttert werden musste, weil er von selbst nichts ass, dass er ab und zu des Nachts aufstand und umherging, sowie endlich noch dadurch, dass er fast regelmässig seine Excremente in das Zimmer absetzte und häufig, statt zur Thür, zum Fenster hinaus gehen wollte. Er wurde für einen melancholischen Geisteskranken gehalten und Mitte Juli in das Bürgerspital verbracht. Hier zeigte er das gleiche Verhalten wie zu Haus. Meist lag er mit apathischem Gesichtsausdruck fast bewegungslos im Bett, ab und zu stand er einmal auf, ging etwas umher, wollte zum Fenster hinaus, offenbar in der Meinung, es sei die Thür. Er liess Koth und Urin regelmässig in das Zimmer, und zwar in einer Art und Weise, dass man annehmen musste, der Kranke glaube, sich auf dem Abtritt zu befinden. Er war stets stumm und reagirte auf keine Frage. Ein einziges Mal sprach er einige Worte und machte die Angabe, dass er fortwährend das „fürchterlichste"

Digitized by Google

Kopfweh habe. Er musste fortwährend gefüttert werden, da er von freien Stücken weder ass noch trank. Ausser trägem Stuhl und folgendem Schlaf war keine weitere körperliche Abnormität zu entdecken, weder locale Lähmungen, noch convulsivische Erscheinungen, noch Veränderungen am Puls. Zwei Tage vor dem Ende Juli eintretenden Tod lag Pat. fortwährend regungslos mit geschlossenen Augen im Bett, liess die Excremente unter sich gehen, nahm aber noch die dargebotene Nahrung zu sich. Puls und Respiration zeigten nichts Auffallendes. Eines Morgens fand man ihn todt.

Die Section der etwas abgemagerten, leicht ictorisch gefärbten Leiche ergab in Brust- und Unterleibshöhle keine nennenswerthen Abnormitäten. Ebenso wenig wurden nach Eröffnung der Schädelhöhle merkliche Veränderungen im Schädeldach, den Hirnhäuten der Blutvertheilung an der Oberfläche und in der Substanz des Gehirns, der Configuration des Gehirns, wahrgenommen. Nach Abtragung der Hemisphären und Eröffnung der Ventrikel fand sich eine unbedeutende Menge Serum in den Seitenventrikeln, zahlreiche, bis über Hirsekorn grosse Hydatiden in dem Plex. choroid. lateral. Das ganze linke Vorderhorn war bis an die Schenkel des Gewölbes mit einer Geschwulstmasse von gallertartigem, theils graugelblichem, theils grünlichem Aussehen erfüllt, an deren etwas wellenförmiger Oberfläche einzelne weissliche Stränge und nach vorn und innen zu zahlreiche, kleinere und grössere stark gefüllte Blutgefässe sich abhoben. Der vordere Theil des *corp. striat.* war von reichlichen, stark gefüllten Blutgefässen durchzogen. Der Hornstreifen verschwand gleichfalls in der Geschwulst, war überhaupt wenig markirt. Die linke Hälfte der vorderen Commissur war nach unten gedrängt, so dass dieselbe, statt wagrecht von links nach rechts, schräg von links unten nach rechts oben verlief. Das *Septum pellucidum*, an welchem von einem linken Blatt und einem Ventrikel nichts zu entdecken war, wurde von dem Tumor in das rechte Vorderhorn vorgebaucht (vergl die etwas schematische Abbildung), woselbst es eine gewölbte Oberfläche darbot, deren erhabenster Theil in der Ausdehnung eines Sechskreuzerstücks schmutzig verwaschen, graubraun gefärbt und von zahlreichen Gefässen durchzogen war. In der Mitte dieser verfärbten Stelle fand sich ein stecknadelkopfgrosser, leicht transparenter Punkt, von dem sich bei der Berührung mit dem Skalpellstiel die papierdünne Lage Gehirnmasse abstreifte und aus welchem dann einige Tropfen gelbliche, gallertige Flüssigkeit hervortraten. Am linken *corp. striat.* und über der Geschwulst das Ependym, besonders längs der Gefässe stark verdickt. Linker Sehnervenhügel etwas kleiner als der rechte,

Digitized by Google

beide atrophisch, ihre Oberfläche derb, von weissen Strängen überzogen, zwischen denen sich flache Grübchen befanden, so dass sie ein blatternarbiges Aussehen darboten. Sehr derbe und breite mittlere Commissur. Auf dem Durchschnitt stellte sich die Geschwulst als ein etwa wallnussgrosser Markschwamm dar, in dessen an das Gewölbe grenzender Hälfte ein festerer bindegewebiger Kern sich befand, von dem aus zahlreiche, verästelte Ausstrahlungen in die Geschwulst ausliefen. Nach aussen und vorn zu wurde die Geschwulstmasse weicher, gehirnähnlicher. Die Schnittfläche hatte ein gelblich marmorirtes, von grauweissen, transparenten Strängen durchzogenes Aussehen, ein trüber milchiger Saft liess sich von ihr abstreifen. Der ganze Tumor war, ausser an der an das Gewölbe grenzender Seite, von breiig erweichter gelblichröthlicher Gehirnmasse umgeben. Die Breite dieser erweichten Zone betrug 2 bis 6 L.

Die mikroskopische Untersuchung der Geschwulst bestätigte die nach dem makroskopischen Verhalten gestellte Diagnose und ergab ausserdem noch manche interessante Details.

In dem sowohl blos in Glycerin, als auch nach Zusatz von verdünnter Essigsäure untersuchten Krebssaft fanden sich zunächst zahlreiche grosse Krebszellen der verschiedensten Form und freie Kerne. Die Zellen waren rundlich, zugespitzt, mehrfach geschwänzt, kolben-, keulenförmig, weberschiffartig, ganglienartig, wie sie in Fig. 1 *a—p* abgebildet sind. Auffallend häufig traf man auf flaschenförmige, grosse Zellen mit längerem oder kürzerem Ausläufer (Fig. 1. *q. r.*) und auf kolbig angeschwollene Zellen mit langem Schwanz, die etwa die Gestalt der Elfenbeinzellen mit den Zahnfortsätzen hatten. Die beiden letzten Zellenformen scheinen mir aus degenerirten Primitivfasern entstanden zu sein. Es fanden sich nämlich mannigfach Primitivfasern mit einer mehr oder weniger ausgedehnten diffusen Anschwellung, welche eine fein granulirte, mit glänzenden Fettmolecülen untermischte Masse enthielt (Fig. 2 *a.*), weiter traf man auf Primitivfasern, welche in dieser diffusen Anschwellung einen deutlichen Kern zeigten (Fig. 2 *b.*), endlich war an noch anderen die Anschwellung begrenzt, hatte die flaschenförmige Gestalt und enthielt einen Kern (Fig. 2 *c.*), und dies schien mir der unmittelbare Uebergang zu der Zellenform *q.* und *r.* der Fig. 1. zu sein.

Alle Zellen zeichneten sich durch ihre ausserordentliche Blässe aus und hatten zum Theil einen mehr oder weniger granulirten Inhalt. Die Grösse und Form der Kerne variirte. Im Verhältniss zum Volumen der Zelle sehr grosse Kerne (wie Fig. 1 *m.*) fanden sich wenig, ebenso waren Zellen mit 2 oder mehr Kernen relativ selten.

Digitized by Google

Die Form der Kerne war meist rundlich oder länglich oval, mit und ohne Einkerbungen. Endlich fanden sich noch häufig degenerirte, in körnigem Zerfall begriffene Blutgefässe in dem Krebssaft (Fig. 3. *a. b. c.*) hie und da solche mit sclerosirter Wand (Fig. 3 *d.*).

Der in der Mitte durchschnittene Tumor wurde mit der ihn umschliessenden Hirnmasse in chromsauren Kali gehärtet. In der Erhärtungsflüssigkeit zerfiel die den Tumor umgebende Schicht erweichter Hirnmasse zu einem moleculären Brei und die Geschwulst liess sich nun aus ihrer Umgebung, wie aus einer Schale herausheben. Es stellte sich jetzt heraus, dass sie die Form und Grösse einer Wallnuss hatte und nach der Basis des Gehirns zu mit einer Art kurzem Stiel auf der weissen Gehirnsubstanz festsass. Die ganze Oberfläche hatte ein feinzottiges Aussehen. Mit blossem Auge erkannte man schon, dass der am frischen Durchschnitt wahrgenommene bindegewebige Kern die Geschwulst der Länge nach durchzog und nach allen Seiten hin astförmig verzweigte Ausläufer schickte, zwischen denen die eigentliche, leicht krümlich gewordene Krebsmasse sass. Durch diese zahlreichen festen Fasern und Stränge erhielt die Geschwulst eine sehr ungleiche Consistenz, welche der Anfertigung feiner Schnitte einige Schwierigkeit entgegensetzte. Doch erhielt man aus allen Regionen derselben eine genügende Anzahl gelungener Schnitte, welche mit Carmin gefärbt und mit Terpentin aufgehellt wurden. Der feste Kern der Geschwulst und dessen Ausläufer bestanden nur aus spindelförmigem Bindegewebe, in dem sich ausserordentlich grosse mit Blutkörperchen förmlich ausgestopfte Bluträume fanden. Die Begrenzung der letzteren wurde entweder durch dichter gedrängte spindelförmige Zellen gebildet oder durch festere, strangartige, gestreifte Massen (Fig. 5.). Krebsalveolen fanden sich in diesem Theil der Geschwulst nur sehr spärliche und sehr kleine. Ebenso konnte man in der, zwischen den Ausläufern dieses bindegewebigen Kernes sitzenden Krebsmasse eine alveoläre Structur nur in dem centralen Theil der Geschwulst nachweisen. Die Alveolen fanden sich in zweierlei Form. Entweder wurden sie von spindelförmigen Bindegewebzellen gebildet, die sich von den Zellen des Stroma durch ihre auffallend kleinere Gestalt unterschieden; die Septa dieser Alveolen waren durchschnittlich sehr schmal (Fig. 6.): oder die Alveolen fanden sich in einer scheinbar homogenen, leicht streifigen Grundsubstanz, in der hie und da rundliche Kerne vorkamen und von welcher die Alveolen durch sternförmig verästelte, unregelmässige Zellen abgegrenzt wurden (Fig 7.). Je näher der Peripherie zu, desto mehr verschwand die alveoläre Structur, man bekam überall nur ein Conglomerat von Zellen und

Digitized by Google

Kernen zu Gesicht, zwischen denen sich nur hie und da ein schwacher Zug spindelförmiger Bindegewebszellen entdecken liess. Höchst auffällig war das völlig unvermittelte Vorkommen von reticulärem Bindegewebe, welches sich, wie eingesprengt, an einigen Stellen vorfand. Dasselbe bot alle Abstufungen dar von der Feinheit des Reticulums der grauen Substanz des Rückenmarks bis zu gröberem, grössere Zellen führendem Gefüge, wie Fig. 4. *a.* und *b.*, und dem derben Netzwerk, wie es Fig. 4 *c.* darstellt. Da der Theil der Geschwulst, in welchem sich dieses reticuläre Gewebe befand, etwa dem Ende des *nucleus caudatus* entsprach, so war man versucht, dasselbe für eine Umwandlung des geschwänzten Kernes zu betrachten, allein es fanden sich weder normale noch degenerirte Ganglienzellen vor, welche dieser Vermuthung eine Stütze gegeben hätten. Nur an einzelnen Stellen liessen sich zwischen den gröbsten Maschen runde Kerne entdecken.

An ihrer Basis ging die Geschwulst ziemlich plötzlich in normale, weisse Gehirnsubstanz über. An dieser Stelle fand sich, dass die, hier zahlreich entwickelten Gefässe bis tief hinein in die weisse Substanz von mehrfachen Lagen spindelförmiger Bindegewebszellen umgeben waren (Fig. 8.), und es liegt nahe, in dieser Bindegewebswucherung um die Gefässe den Ausgangspunkt der Geschwulst zu sehen und sich die Entwickelung derselben so zu denken, dass sich zunächst der bindegewebige Kern bildete, und dass dieser Process (was bei dem Sitz der Bindegewebsmasse im Boden und der inneren Wand des Vorderhorns wohl denkbar ist) latent verlief, dass sich dann erst zwischen den Ausläufern des Kerns die Krebsmasse entwickelte und dass jetzt erst die Geschwulst durch Zerstörung der *corpp. striata* Dislocation des *Septum pellucidum* und der vorderen Commissur, Erscheinungen machte.

Bezüglich der Deutung der Symptome am Lebenden in Rücksicht auf den Sitz der Geschwulst möchte ich nur noch kurz auf Eines hinweisen. Bekanntlich hat man dem *corpus striatum* eine wesentliche Beziehung zu den Willensäusserungen zugeschrieben (vergl. *Schroeder van der Kolk*, Pathol. und Therap. der Geisteskrankheiten §. 9. und §. 12.). Für diese Annahme bietet der vorliegende Fall einigen Anhaltepunkt. Der Tumor sass zum Theil im vorderen Ende des *corpus striatum*. Wenn nun auch die verkehrten Willensäusserungen des Kranken (dass er zum Fenster, statt zur Thür hinaus gehen wollte, dass er auf dem Abtritt zu sein glaubte und seine Excremente in die Stube entleerte) eine verschiedene Deutung zulassen und einfach auf Sinnestäuschungen zurückgeführt werden können, so bot der Kranke doch noch andere Erscheinungen, die man als

Digitized by Google

wirkliche Alterationen des Willensvermögens anzusehen hat: ich meine die völlige Theilnahmlosigkeit für alle äusseren Vorgänge, den Mangel aller Reaction auf äussere Eindrücke, das fast bewegungslose indifferente Daliegen im Bett, das Nicht-Sprechen, endlich dass er nicht von selbst ass. Diese Erscheinungen kann man nicht blos als ein Gebundensein durch den heftigen Kopfschmerz, als innere Concentration auf diesen Schmerz, auffassen, eher ist das hie und da bemerkte Aufstehen und unruhige Umhergehen als durch den Kopfschmerz veranlasst zu betrachten; ebenso wenig aber können die Erscheinungen auf allgemeinen Hirndruck zurückgeführt werden, da der Tumor ja in den Ventrikel herein ragte und die Section weder Wassererguss in die Ventrikel noch (ausser in der nächsten Umgebung der Geschwulst) eine Hyperämie des Gehirns und seiner Häute ergab.

Der Sitz der Geschwulst im vordersten Theil des *corp. striatum* erklärt es wohl, dass in diesem Fall die sonst bei Geschwülsten des Streifenhügels so häufig beobachteten Lähmungs-Erscheinungen fehlten. Dr. *Stark* in Kennenburg.

Zur therapeutischen Casuistik. — 2. Sexuelle Verrücktheit. Traitement moral nach Leuret. Dauernde an Genesung grenzende Besserung. — Frau Sara A., etwa 34 Jahre alt, Israelitin, steht unter hereditärer Disposition zu Psychosen, ein Bruder derselben verliess vor einigen Jahren genesen die hiesige Anstalt. In guten Verhältnissen aufgewachsen, ging sie vor etwa 11 Jahren mit ihrem jetzigen Gemahl die Ehe ein, bei der mehr materielles Interesse als Neigung im Spiele gewesen zu sein scheint. Die Ehe war gerade keine glückliche. Von 2 Kindern, deren sie das letzte ohne schlimme Zufälle vor etwa 6 Jahren gebar, lebt nur noch das ältere, ein Mädchen von etwa 10 Jahren. In die Zeit des Todes ihres Kindes fällt der Ausbruch ihrer gegenwärtigen Störung, wahrscheinlich sind der Todesfall und vielleicht auch Vermögensverluste die occasionellen Momente der Erkrankung. Es scheint, dass das Leiden mit einer schweren hysterischen Neurose (Lach- und Weinkrämpfe, Neuralgien, convulsivische Zufälle) begann, die den ganzen Winter nach dem Tode des Kindes dauerte und einen Aufenthalt in Schwalbach im darauf folgenden Sommer nöthig machte. Allmälig trat eine psychische Verstimmung auf; sie wurde düster, reizbar, in sich gekehrt, zankte mit dem Manne und den Dienstboten, mied die Welt, zog sich von ihrer Familie zurück, äusserte auch dann und

Digitized by Google

wann Besorgnisse, dass man ihr nach dem Leben strebe und allerlei Intriguen gegen sie im Schilde führe.

Mehrere Jahre und wenig beachtet zogen sich diese Elemente einer melancholischen Verstimmung mit vagen Ideen der Verfolgung hin, bis etwa vor 1½ Jahren das Leiden in ein expansives Stadium trat und die Form eines erotischen Wahnsinns annahm, dessen Kernpunkt die Liebe zu einem Hausfreund K. bildete, der übrigens verheirathet war und in keiner Weise Frau A. dazu animirt hatte. Die Kranke glaubte sich wieder geliebt und trat mit dem Gegenstand ihrer Liebe in einen „sympathetischen" Rapport, womit sie die immer häufiger auftretenden Visionen ihres Geliebten und die langen zärtlichen Gespräche mit ihm bezeichnete. Sie verfiel immer mehr in sexuelle Exaltation, trug sich mit dem Gedanken, ihre Ehe aufzulösen und sich mit Herrn K. zu verbinden, vernachlässigte über einer gewählten und etwas phantastischen Toilette ihr Hauswesen gänzlich, lebte beständig in Aufregung, dass man ihr ihren Geliebten abwendig machen wolle, wobei sie besonders eine gewisse Frau S. im Verdacht hatte, und musste schliesslich im israelitischen Krankenhause untergebracht werden, wo sie 3 Monate verpflegt und am 1. Februar d. J. eines Heilversuchs wegen hieher gebracht wurde.

Frau A. bot bei ihrer Aufnahme das Bild einer vollendeten sexuellen Verrücktheit; gleichgültig gegen alle anderen Interessen, liebte sie die Einsamkeit, wo sie in beständigem sympathetischem Rapport mit dem Gegenstand ihrer Liebe, dem Gedanken der Realisirung ihrer Pläne nachhing. Sie lachte viel vor sich hin, war mit Mühe aus dem Bett zu bringen, wo sie auf Papierfetzen unablässig auf ihren Wahn Bezug habende, oft sehr confuse incohärente, abgerissene Aufzeichnungen machte. Sie unterhielt sich lebhaft mit ihren Stimmen, verkannte momentan den Arzt für ihren Geliebten und erging sich meist in schwärmerischen Ergüssen ihrer Liebe, in Befürchtungen feindlicher Machinationen, die sie ihres Glückes berauben wollten. So zerfahren wie Rede und Schriften war ihr Aeusseres, obwohl sie es an Toilettegegenständen, Seife, bunten Kleidungsstücken nicht fehlen liess und stundenlang zur Besorgung ihrer Toilette bedurfte. Der verliebte Blick, die geschraubte, gezierte Redeweise vervollständigten das Krankheitsbild. Auffallend war die Affectlosigkeit bei Contrahirung ihrer Plane, die Leichtigkeit, mit der sie sich von ihrem Wahn abbringen liess, und welche mit der Haltlosigkeit ihres ganzen Wesens, der Zerfahrenheit Incohärenz ihres Denkens, der Energielosigkeit ihres Strebens und einer gewissen Gedächtnissschwäche die Diagnose auf schon vorgeschrittene Verrücktheit stellen liessen.

Digitized by Google

Körperlich ergab die Untersuchung einen schmächtigen, äusserst zarten und abgemagerten Körper, tief halonirte Augen, grosse Anämie. Auf dem proportionirten Kopfe fand sich eine etwa thalergrosse äusserst schmerzhafte cutane Hyperästhesie auf der Schädelhöhe. Die vegetativen Organe liessen keine Störung erkennen, die zarte, kühle Haut war besonders an den Händen mit einem profusen, sehr klebrigen Schweiss bedeckt.

Zeitweise litt die Kranke an linksseitiger Intercostalneuralgie.

Die Untersuchung der Genitalien ergab einen negativen Befund, der Uterus stand ziemlich hoch, leicht antevertirt, die Menses flossen regelmässig.

Die Behandlung war zunächst auf Hebung des Marasmus und der Anämie gerichtet, was auch mittelst *Ol Jecoris* in Verbindung mit *Syrup. Chin. c. ferro* und später durch Chin. mit Eisen ziemlich gut gelang.

Schwieriger war es, die Kranke zu einer ablenkenden Arbeit und Thätigkeit, zum Umgang mit andern Kranken, zu einer Beherrschung wenigstens des nun einmal fix gewordenen Wahns zu bringen; endlich gelang es, nachdem die Ernährung gebessert, der Schlaf und Appetit geregelt und die Hallucinationen verschwunden waren, auch diese Bedingungen zu erfüllen. Es wurde, sobald sich Aeusserungen des Wahns zeigten, nach *Leuret's* Manier die Kopfdouche im warmen Bad applicirt und die Wirkung war schon das erste Mal eine wahrhaft erschütternde. Die Kranke machte alle möglichen Concessionen und entwickelte nun eine Selbstbeherrschung und verhielt sich so ruhig, geordnet, wusste ihren Wahn so trefflich zu verbergen, dass nur noch zeitweise Drohungen mit dem äusserst befürchteten Mittel nöthig waren, um sie in diesem wesentlich gebesserten Zustande zu erhalten.

Frau *A.* kehrte in ihre Familie zurück, wo sie ihre häuslichen Geschäfte wieder aufnahm und Niemand an ihr mehr etwas Krankhaftes bemerkte. Bei einem Besuch, nach Jahresfrist, fand ich sie als thätige, glückliche Hausfrau. Als ich ihren früheren Wahn berührte, wurde sie ängstlich, „sie brauche keine Douche mehr, das sei ihr Geheimniss".

Dr. *v. Krafft-Ebing.*

Digitized by Google

Literatur.

Charles Mittermaier. Ses études sur la peine de mort, la responsabilité et l'expertise médico-légales des aliénés dans les prisons et devant les tribunaux. Par *A. Brierre de Boismont*, Doct. en méd. etc. Paris, 1868. (41 S. 8.)

Diese Schrift, ein Auszug aus dem Mai-Hefte der Ann. méd.-psycholog. von 1868, schliesst sich jener Reihe von „psychologischen Studien über berühmte Männer" an, deren eine, dem verstorbenen *Guislain* gewidmete, im 24. Bde., S. 787 dies. Zeitschr. angeführt worden ist. Es muss uns freuen, die Verdienste unseres ausgezeichneten Landsmannes auch jenseits des Rheins von einem unserer Fachgenossen in hohem Grade gewürdigt zu sehen, Verdienste insbesondere, die sich ein deutscher Jurist um seine Berufswissenschaft und zugleich um die gerichtliche Psychopathologie erworben hat. Diesen Verdiensten hauptsächlich gilt der Ruhmeskranz, den der Vrf. auf das Grab des Verstorbenen legt. Denn unter allem dem, was *Mittermaier* als gelehrter Kenner des Rechts, als Rechtslehrer, als Criminalist, als Gesetzgeber, in Schrift und Idee, auf dem Katheder, in Gerichtssälen und auf der Rednertribüne für die Mitwelt und die Nachwelt Grosses geleistet hat, ist es besonders ein zweifache Richtung seiner Thätigkeit, auf welche der Vrf. seine Aufmerksamkeit richtet und deren Resultate den Ausspruch vollkommen rechtfertigen: dass Humanität der Grundzug in *M*'s Charakter gewesen ist und der einzige Gedanke, der ihn beseelte und seine Wirksamkeit leitete, der Fortschritt in Begründung und Vervollkommnung des Wohls der Staaten, der Völker und der Individuen. Die eine jener Richtungen ist die auf Beseitigung der Todesstrafe. Nachdem schon seit *Beccaria* die öffentliche Meinung für diese

Digitized by Google

wichtige Wandlung in der civilisirten Gesellschaft plaidirt hatte, verlieh *M.*'s bedeutendes Werk über diesen Gegenstand dem Verlangen nach derselben deutlicheren Ausdruck und festere Begründung. Auch wird ohne Zweifel seine Bemühung und sein Ansehn nicht wenig beigetragen haben zu dem den „Grundrechten" einverleibten Beschlusse des deutschen Parlaments zu Frankfurt a. M., mittelst dessen die Todesstrafe, ausgenommen im Falle des Kriegsrechts, in allen deutschen Ländern aufgehoben wurde, — ein Beschluss, den freilich der wiederhergestellte deutsche Bundestag überall, mit Ausnahme von drei deutschen Ländern (Nassau, Anhalt-Köthen und Dessau und Oldenburg) bald wieder beseitigte, welche Zahl neuerlich auf die vom Vrf. angegebene, auf zwei beschränkt sein wird. — Die zweite Richtung, zugleich diejenige, die uns hier besonders angeht, ist die auf den Schutz der Geisteskranken vor den Gerichten sich wendende. Wohl haben, wie der Vrf. erinnert, eine Menge der ausgezeichnetsten Juristen, deutsche, französische, englische und amerikanische, jede Gelegenheit ergriffen, mit Scharfsinn und Energie die Kranken, welche in und durch Geisteskrankheit zu Verbrechen hingerissen waren, der unverschuldeten Strafe zu entziehen: doch Keiner hat dies Streben mit solchem Fleisse, mit solcher Kenntniss und Umsicht, mit solcher Gründlichkeit und Ausdauer verfolgt, es in solcher Weise zur Aufgabe seines Lebens gemacht, wie unser berühmter Landsmann. Der Vrf. mag Recht haben, wenn er als Antrieb zu diesem Eifer den Umstand in Rechnung zieht, dass *M.* nur unfreiwillig dem Studiem der Arznei-Wissenschaft, dem er zuerst sich zugewandt, entsagt hatte und dass er stets eine grosse Vorliebe für die Naturwissenschaften bewahrte. Jedenfalls bezeugt seine unermüdliche Bemühung, sich nicht allein mit Aerzten, die dem Studium der Geisteskranken oblagen, sondern auch mit Geisteskranken selbst, die er in Asylen und Gefängnissen aufsuchte, in Beziehung zu setzen und zu erhalten, — es bezeugen nicht minder die zahlreichen schriftlichen Arbeiten *M.*'s über das Verhältniss der Rechtspflege zu den Irren, auf die der Vrf. hinweist, — es bezeugt endlich der Erfolg aller dieser Bemühungen, nämlich die Aufklärung, die *M.* über jenes Verhältniss auf dem Gebiete der Jurisprudenz verbreitet hat, wie viel Grund die psychischen Aerzte haben. *Mittermaier* als einen der thätigsten und verdientesten Mitarbeiter, Helfer und Förderer der Psychiatrie zu verehren und dem Vrf. für die Errichtung dieses ihm gewidmeten literarischen Denkmals Dank zu wissen, welchen wir ihm hier mit aller Aufrichtigkeit darbringen.

Fl.

Digitized by Google

Verhandlungen psychiatrischer Vereine.

Dritte ordentliche Sitzung des psychiatrischen Vereins der Rheinprovinz.

Anwesend waren am 14. November 1868 13 Mitglieder. — Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11½ Uhr mit einer kurzen Ansprache, in welcher er *Griesinger's* gedachte, dessen allzufrüher Tod unlängst erfolgt war, und forderte dann die Anwesenden auf, das Andenken des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen zu ehren.

Finkelnburg, Von den Anzeigen und Gegenanzeigen der Aufnahme Gemüthskranker in geschlossene Anstalten.

Der Vortragende wünscht einen Austausch der Erfahrungen über diese wichtige Frage, deren concrete Beantwortung besonders den aus dem Anstaltsleben ausgeschiedenen Irrenärzten so sehr häufig obliege. Dass nicht für alle psychisch Leidende die Aufnahme in Irrenanstalten erforderlich oder selbst nützlich sei, darüber hegt der Vortragende nach seinen Erfahrungen keinen Zweifel. Schon während seiner Wirksamkeit als Anstaltsarzt entging ihm bei allem Enthusiasmus für die wohlthätigen Leistungen der Anstalt doch nicht die Verschiedenheit ihrer Bedeutung für verschiedene Kategorien von Kranken. Für die Tobsüchtigen bedeutet die Seclusion die Erfüllung der wichtigsten Indicationen: Schutz der Umgebung, Beschränkung massloser, aufreibender Bewegungsexcesse, Ermöglichung zwangsweiser Anwendung der Kurmittel und Beruhigung durch die unabänderliche Gleichmässigkeit und Planmässigkeit der Umgebung. Der exaltirte Verrückte wird hier behütet vor der zudringlichen Neugierde und den Neckereien des Publicums; er ist ausser Lage gesetzt, Behörden und Privatpersonen mit seinen Anträgen zu belästigen und sich über deren Zurückweisung aufzuregen; der agitirte Melancholiker findet hier Schutz vor Selbstbeschädigung und vor Ver-

Digitized by Google

zweiflungsacten gegen Andere, gegen seine eigenen, theuersten Angehörigen; — der Paralytiker kann hier nicht sein Vermögen verschleudern, der willensverrückte Potator ist gezwungen, sein Gehirn vom störenden Gifte frei zu halten, welchem er zu Hause trotz sorgfältigster Ueberwachung immer wieder unterlag, u. s. w. Aber neben diesen zahlreichen Kranken, für welche auch in den Augen des Laien extra asylum nulla salus, sehen wir zunächst Andere, deren Aufenthalt in der Anstalt sich mit weniger Evidenz motivirt. Initiale Formen gesteigerter Hirnreizbarkeit, welche nicht den Grad erreicht, dass die Patienten schon unlenksam und für ihre Umgebung unmöglich würden, führt man der Anstalt zu, — nicht etwa weil man zu Hause überhaupt nicht mehr mit ihnen fertig zu werden wüsste, sondern um sie heilen zu lassen, indem man die durch solche Massregel gesetzte momentane Erregungssteigerung geringer anschlägt, als die curativen Vorzüge des dem Patienten octroyirten gehirnberuhigenden Mediums. Und die Erfahrung bestätigt ja die Richtigkeit dieser Voraussetzung. — Schmerzhaft verstimmte Kranke, wahnhaft Aengstliche, Panphobische, welche zu Hause sich nach mehrwöchentlicher oder mehrmonatlicher Behandlung nicht gebessert, werden — um keine Chancen mehr zu verlieren — der freiheitbeschränkenden Anstalt übergeben, unter deren fremdartigen, für den Uneingeweihten beklemmenden Eindrücken sie zwar zunächst heftig erschrecken, sich ängstigen und neue Kerne zu quälenden Wahnvorstellungen vor Augen gerückt erhalten, — aber wo sie doch in der richtigen ärztlichen Behandlung und Pflege unter sichernden Einrichtungen für alle möglichen Wechselphasen ihres Zustandes sich befinden. Allerdings beobachtete der Vortragende in manchen Fällen, wie die Seclusion für das Bewusstsein solcher Kranken immerfort etwas Peinliches, Beängstigendes behielt und wie insbesondere in den Anwandlungen von Präcordialangst das Gefühl der Neubeschränkung nur zur Steigerung der inneren Unruhe beitrug; aber er fand eine Compensation für diese unvermeidliche Schattenseite in den vielen Bürgschaften, welche die Anstaltsbehandlung übrigens für die Genesung solcher Kranken bot.

Schwerer schon fiel die Auffindung solcher Compensation bei Beobachtung anderer Anstaltspfleglinge, deren Zustand sich als Herabsetzung der Gemüthsreizbarkeit, als Einbusse an psychischer Empfindung und Gegenwirkung charakterisirte, — Zustände, die theils als passive Melancholien, theils als Zwischenformen zwischen letzteren und dem Schwachsinn angesprochen wurden. Bei diesen wesentlich anregungsbedürftigen Kranken soll die

Digitized by Google

Anstalt einen Ersatz bieten für den Verlust aller der mit dem Gemüthsleben tief verwachsenen Eindrücke und Anregungen der häuslichen und heimathlichen Umgebung; wird ein solcher Ersatz in unseren Anstalten immer geboten? Werden die oft so kurzen und leicht unbeachtet vorübergleitenden Momente grösserer Empfänglichkeit und gemüthlicher Zugänglichkeit in der monotonen Anstaltsumgebung zwischen Kranken und Wärter so wahrgenommen, wie dies in der Familie geschieht und unter Anleitung eines erfahrenen Irrenarztes noch mehr geschehen kann? Wird den erwachenden Wünschen, Neigungen und Antrieben der Kranken so leichte und normale, ihrer Lebensgeschichte entsprechende Gelegenheit zur Aeusserung, zur Entwickelung und richtigen Auswirkung verschafft?

Noch zweifelhafter erschien dem Vortragenden die Geeignetheit der Anstaltssphäre für manche hypochondrische Melancholiker, gegen deren psychische Versenkung in Krankheitsbilder und Grübeleien der beständige Verkehr mit anderen Leidenden und mit Krankenwärtern, sowie das Bewusstsein, Irrenanstaltsbewohner zu sein, nicht eben das förderlichste Gegenmittel zu bieten schien.

Endlich begegneten ihm wiederholte Fälle hysterischer Gemüthsverstimmung, bei welcher die Adaptirung in die Anstaltsverhältnisse so weit über's Ziel schoss, dass man bald zu expellirenden Mitteln greifen musste und die Rückgewährung in den häulichen Lebenskreis, die Wiederherstellung der Ertragungsfähigkeit für die Anforderungen des Lebens — also eine der Hauptaufgaben bei Hysterischen — nur noch mehr erschwert wurde.

Durch diese und ähnliche Beobachtungen dürften wohl Zweifel geweckt werden an der allgemeinen Gültigkeit des Vorzuges, welcher der psychiatrischen Anstaltsbehandlung in exclusiver Weise zuerkannt zu werden pflegt. Diese Zweifel fanden aber ihre positive Bestätigung erst durch das Gegenexperiment, zu dessen Anstellung der Vortragende seit dem Verlassen der Irrenanstaltsthätigkeit reichliche Gelegenheit fand. Zunächst frappirte ihn in der Privatpraxis die Bemerkung, dass viele, ja unstreitig die meisten psychischen Störungen sich im Initialstadium verlaufen und zurückbilden, ohne zum störenden Eclat und zur Anstalt zu führen. Er machte die Erfahrung, dass die umgekehrte geometrische Proportion, in welcher bekanntlich die Heilbarkeit der in Anstalten aufgenommenen Fälle zur Dauer der Krankheit steht, sich ebenso ausserhalb der Anstalt wiederhole, daher keinen Beweis für die vorzugsweisen curativen Leistungen der letzteren, — für die nothwendige Beschleunigung der Aufnahme — bilde. Er lernte Fälle kennen, wo dieselben Kranken verschiedene Anfälle ruhigen Irrseins

Digitized by Google

bald in Anstalten, bald in Privatpflege unter psychiatrischer Behandlung durchgemacht hatten und wo der Vergleich des Verlaufes nicht zu Ungunsten der Privatpflege ausfiel.

Ermuntert durch diese Erfahrungen übernahm er die private Behandlung einer Reihe auch solcher psychisch Kranker, deren Zustand nach der herrschenden Anschauung eine Anstaltsunterbringung erheischt hätte und suchte zur Klarheit darüber zu gelangen, wie weit es möglich sei, den Kranken und ihren Familien den Entschluss der Freiheitsbeschränkung zu ersparen, — eines Schrittes, über dessen sociale Bedeutung und Folgenschwere man als Privatarzt anders urtheilen lernt, als in der Anstaltspraxis. Die allgemeinen Ergebnisse dieser seit 7 Jahren an etwa 50 Kranken stattgefundenen Beobachtungen fasst der Vortragende in folgenden Punkten zusammen:

1) Für alle an psychischer Exaltation leidende Kranken ist ausser der Versetzung in eine neue stabile Umgebung auch die absolute Unterordnung unter eine sachverständige Autorität wesentliche Kurbedingung. Diese Freiheitsbeschränkung ist in Privatverhältnissen nur unter grossem Aufwande an Kosten und Mühen herstellbar und selbst dann den Kranken mindestens ebenso empfindlich, meist noch empfindlicher fühlbar, als in den Anstalten, wo das Beispiel gemeinsamer Unterordnung erleichternd wirkt.

2) Das gleiche Erforderniss wird geboten durch vorherrschende Willensaufregungen melancholischer Kranken, und zwar nicht blos dort, wo die Willensaufregung sich auf absolut verkehrte und gefährliche Handlungen richtet, sondern auch in denjenigen Fällen, wo eine active Renitenz gegen alle gegebenen Verhältnisse, eine beständige, wenn auch kleinliche Inscenirung des negirenden Affectes gegen Personen und Gegenstände der Umgebung stattfindet. Für solche von krankhaften Begehrungen und Widerstrebungen hin und her geworfene Leidende bleibt die entschiedene Einfügung in einen unabänderlichen festen Lebensrahmen — wie ihn nur die Anstaltseinrichtungen bieten — eine nothwendige Massregel.

3) Bei der einfachen psychischen Hyperästhesie, der ruhigen Melancholie einschliesslich der hypochondrischen Form, welche ihre Störungskreise lediglich innerhalb der sensitiven und vorstellenden Sphäre werfen, ist jeder schmerzlich berührende, beängstigende Eindruck möglichst zu vermeiden, und jedes Zwangsgefühl, jede Versetzung inmitten solcher Scenen des Leidens und der Entartung, wie sie in geschlossenen Anstalten

Digitized by Google

kaum zu vermeiden sind, nur in wirklichem Nothfalle über sie zu verhängen. Bei den jetzigen Einrichtungen und der mangelhaften psychiatrischen Ausbildung des ärztlichen Corps bleibt freilich für unbemittelte ruhige Melancholiker in der Regel keine andere Möglichkeit sachverständiger Behandlung und Pflege, als hinter Schloss und Riegel. Für diese bleibt ein freierer Behandlungs- und Verpflegungsmodus Postulat der Zukunft. Für Bemittelte dagegen ist die Herstellung geeigneter Verhältnisse auch in den überwiegenden Fällen nicht schwierig, wo eine vollständige Entfernung aus der gewohnten Umgebung sich erforderlich zeigt. Das schwerstwiegende Bedenken gegen die freie Etablirung ruhiger Melancholiker scheint in der Gefahr des Selbstmordes zu liegen; — aber auch in dieser Hinsicht wird der Vorzug der Anstaltspflege vielfach überschätzt. Der Vortragende hat es aus dem Munde von mehr als Einem Kranken, dass lange im Stillen gährende Selbstmordgedanken unter dem Eindrucke äusserer Präventivmassregeln erst eine activere und decidirtere Tendenz zur Verwirklichung gewonnen haben, — und noch augenblicklich behandelt er eine Dame, welche seit 18 Jahren mit Selbstmordgedanken umhergeht, aber nur einmal, während eines freiwillig gewählten Anstaltsaufenthaltes sich so weit getrieben fühlte, eine günstige Gelegenheit zu einem energischen, nur zufällig vereitelten Ausführungsversuche wahrzunehmen.

Diese psychologisch leicht erklärbare Thatsache schliesst übrigens gewiss nicht aus, dass in Fällen sehr ausgesprochenen activen Suicidaltriebes eine Versetzung in die geschlossene Anstalt nothwendig werde, in welcher letzteren immerhin die Gelegenheiten zum Verlassen des Lebens mehr beschränkt sind, als in der besthergestellten Privatwohnung.

4) Allen solchen Kranken, denen eine Hebung des Empfindens und Vorstellens zur Selbstthätigkeit noth thut, — allen denen, bei welchen eine Leere, ein Abgestorbensein des Gemüthes den Grundton der meist schon secundären Störung bildet, werden durch Behandlung in geeigneter Privatpflege mehr Chancen zur psychischen Wiederaufrichtung gewährt, als durch die Existenz in einer wie immer gut geleiteten Anstalt. In dieser Hinsicht waren die Erfahrungen des Vortragenden am prägnantesten, und sah er in einzelnen Fällen, wo die Entlassung aus Anstalten in scheinbar unheilbarem Zustande stattgefunden, noch ein vollständiges Wiederaufleben unter dem beharrlichen ruhigen Einwirken wohlwollender familialer Umgebung, welche es sich zur Aufgabe machte, jede leiseste Gemüthsregung, jedes schwache Er-

Digitized by Google

klingen der schlummernden Seelenkräfte zu belauschen und als heilsame Handhabe zu weiterer Aufweckung zu benutzen.

5) Die Erfolge nun aber der psychiatrischen Behandlung ausserhalb der Anstalten hängen nicht blos von der heutzutage noch selten anzutreffenden speciellen Sachverständigkeit der Aerzte ab, sondern wesentlich auch von der Beherrschung eines geeigneten Wartpersonales. Schon aus diesem Grunde, aber auch aus manchen anderen Rücksichten ist es wünschenswerth, dass die freie Behandlungsform stets ihren Anschluss finde an das Wirken einer gut eingerichteten Anstalt. Nur in der Vereinigung Beider unter Einem Arzte liegt die Möglichkeit gegeben, stets über hinreichende Wärterkräfte zu verfügen, deren individuelle Verwendung jederzeit den Erfordernissen der Einzelfälle accomodirt werden kann. Nur bei solchem Nebeneinanderbestehen beider ist zugleich eine volle Verwerthung der freien Behandlungsform denkbar, deren z. B. viele Zustände von intermittirendem oder remittirendem Verlaufe für gewisse Zeiträume fähig sind, während zu anderen Zeiten der geschlossene Anstaltsorganismus ihnen unentbehrlich wird. Und wenn jede Irrenanstalt einen solchen Rayon freier Schutzbefohlenen gleichsam als Verbindungsglieder mit der freien, gesunden Aussenwelt um sich versammelte, würde ihr nicht dadurch das Abschreckende der geheimnissvollen Abschliessung hinter Mauer und Gitter grossentheils benommen und das Zutrauen des hülfesuchenden Publicums erhöht, so dass auch die ersten Anfangsstadien der Psychosen zeitiger eine richtige Behandlung fänden? Bei Errichtung neuer öffentlicher Anstalten würde es nach Ueberzeugung des Vortragenden zu den wesentlichsten Gesichtspunkten gehören, auf Sicherung eines freien Departements extra muros von vornherein Bedacht zu nehmen, — sei es nun, dass fertig vorgefundene Ansiedelungen dazu benutzt, oder dass ganz neue geschaffen werden. Die Rheinprovinz befinde sich gerade jetzt in der Lage, mit freien Mitteln zur völligen Neugestaltung der Irren-Fürsorge zu schreiten, und sowie sie einst durch frühzeitige Gründung eines gut organisirten Anstaltshauses sich ausgezeichnet, so möge sie jetzt mit der Schöpfung eines freien Anstaltswesens als leuchtendes Beispiel vorangehen.

Dem Wunsche des Redners um Austausch der Erfahrungen in dieser wichtigen Sache wurde volle Gewährung.

Zunächst ergriff *Richarz* das Wort und führte in längerer Rede aus, wie es für eine gute Anstalt überhaupt keine Contraindicationen gebe. Für psychisch Kranke sei auch eine psychische Behandlung erforderlich, und weit entfernt, die nicht eigentlich psychisch, son-

Digitized by Google

dern nur Nervenkranken von der Aufnahme in die Anstalt auszuschliessen, so sei deren Anwesenheit sogar aus vielen Gründen, auch für sie selbst, wünschenswerth. Auf diese Weise würden die Asyle für Geisteskranke immer mehr den Charakter von solchen für Nervenkranke annehmen und darin sehe er das Ziel, welches man in der Folge zu erstreben habe.

Herz weist darauf hin, wie die „geschlossene Anstalt" eine Freiheit im Sinne der familiaren Behandlung durchaus nicht ausschliesse ein Gegensatz also nicht existire, und

Obernier bemerkt, dass die Entscheidung, ob geschlossene Anstalt, ob freie Behandlung in dem jemaligen einzelnen Falle getroffen werden müsse, a priori aber und in allgemeiner Fassung falsch sei. Zur Entscheidung im individuellen Falle gehöre natürlich psychiatrische Ausbildung, für deren Verbreitung in erster Linie Sorge zu tragen sei.

Brosius will bei dem Mangel durchgreifender Erfahrungen ein endgültiges Urtheil über die freie Behandlung zur Zeit nicht abgeben.

Nachdem noch *Focke* auf die national-ökonomische Seite dieser Frage aufmerksam gemacht und *Nasse* einige andere mehr praktische Punkte hervorgehoben, wurde diese Debatte vorläufig geschlossen, um bei nächster Gelegenheit von Neuem vorgenommen zu werden.

Herz, Zur Prognose der Recidive.*), Forts. — In der Fortsetzung meiner Bemerkungen zur Prognose der Recidive halte ich es für nothwendig, meine Aufstellung vom vorigen Male zu wiederholen, nämlich, dass die Heilung einer psychischen Affection mit irren Vorstellungen erst von dem Momente an zu datiren sei, wo der Kranke mit voller Bewusstheit und Ehrlichkeit sich frei geworden von den Wähnungen in seinen Vorstellungskreisen erklärt und auch in diesem retrospectiven Bewusstsein keine Lücke lässt, d. h. alle Stadien der Krankheit umfasst, und heute noch hinzuzufügen, dass sich der vernünftige Rückblick auch auf die Krankheitsursachen dem Wesen nach ausdehnen müsse. Die Exaltation der Stimmung, welche auch nach solcher gewonnenen Erkenntniss eine Zeit lang noch fortbesteht, liegt, streng genommen, schon ausser dem Bereiche der psychischen Störung, und wird dem Genesungswohlgefühle vergleichbar sein, was sich nach jeder namhaften Krankheit einstellt, und nicht mehr zur Krankheit gerechnet wird. Wenn sich dieses

*) Vgl. Bd. XXV. Heft 3.

Digitized by Google

Bewusstsein und das Frohwerden darin nicht entschieden verkündet in der Anstalt oder über kurz oder lang ausserhalb derselben, mag auch der Reconvalescent in der Logik seiner sprachlichen und schriftlichen Aeusserungen, in seiner geselligen Haltung und in seinen geschäftlichen Leistungen sich gut bewähren, so hat der Arzt jedes Mal Bedenken zu hegen, ich für meine Person negire es, dass dann das Resultat der Gesundung ein völlig erreichtes und, wie wir sagen, ein absolutes sei. Fälle dieser Art werden gewöhnlich in die Rubrik der Genesung gestellt; in der Wirklichkeit sind sie aber nur mit verkümmerter Herstellung ausgegangen, oder sie stehen in directem, wenn auch auf lange hingezogenem Uebergange zu einem neuen Paroxysmus. Mit solcher Art Verkümmerung beschliessen manche Individuen schon die erste Erkrankung; nach der zweiten ist die Zahl der mit Defect geheilten grösser; nach der dritten sind mir nur mit Defect Geheilte bekannt geworden. Für das prognostische Urtheil sind diese Verhältnisse sehr wichtig. Ich will fürerst den Versuch machen, die psychischen Zustände von Solchen zu schildern, welche die erste Erkrankung unter dem Scheine von Genesung, in Wirklichkeit jedoch nur mit Einbusse von Gesundheit, überstanden haben. Wie gesagt, das oberste Criterium bleibt mir das Krankheitsbewusstsein. Bei der speciellen Charakterisirung muss ich mehr die Erfahrungserscheinungen an ihnen im socialen Leben, als die Ergebnisse einer vollständigen ärztlichen Beobachtung zu Hülfe nehmen, da sie sich meistens ausserhalb der Anstalt befinden. — Ich kann dieselben füglich' in drei Classen eintheilen, je nachdem sie in ihrer vollen Erkrankung der Melancholie, der Tobsucht und dem strikteren Wahnsinn, also den vorwiegend irren Vorstellungen mit weniger intensiven und gleichartigen Affecte dabei, angehört haben. Die erste Classe ist die zahlreichste. Sie umfasst die Resultanten aus melancholischer Verstimmung mit starkem Affecte, mit wahnsinnig übertriebenen Selbstanklagen, hypochondrischen Quälereien, kurz, die melancholisch Aufgeregten von verschieden langer Krankheitsdauer. Bei den stärker deprimirten Melancholischen, den attoniti, habe ich den defecten Ausgang weniger häufig beobachtet. Es giebt in dieser Classe wahrhaft problematische Naturen! Einige, in der Krankheit von der hülfsbedürftigsten armseligsten Haltung, voll glänzender Versprechungen gelegentlich für den Heilungsfall, kaum einem Zwange unterworfen, sogar in der Besserung nach einigem Accordiren ohne Schwierigkeit entlassen, sie bringen der Anstalt den schlechtesten Dank. Nachher entdeckt man Intriguen aller Art, die sie unter Hypocrisie schon in der Anstalt anzuspinnen gewusst hatten, als sie sich sonst bereits vernünftig

Digitized by Google

benahmen, Freiheiten genossen, Besuche empfingen, Briefe schrieben u. s. w. Vor und bei ihrer Entlassung geben sie die Krankheit zu, legen aber auf ihre unbedingte Heilung zu grossen Nachdruck. Ausser der Anstalt, besonders unter dem Einflusse Anderer aus weltlichen Rücksichten oder aus baarem Unverstande, wird die dagewesene Krankheit erst wohl zugegeben, später aber bezweifelt, dann endlich in ihrer Bedeutung entschieden abgestritten; den lebendigen Zeugen wird aus dem Wege gegangen, der frühere Hausarzt wird abgeschafft, ehemalige Mitkranke aus derselben Stadt werden unhöflich ignorirt. Von den Mitkranken haben sie ein falsches Urtheil mit fortgenommen. Kömmt hierzu noch ungünstige Charakterartung activer Natur, nun dann kann sich auch der Anstaltsarzt freuen; er wird die Thätigkeit seines alten Clienten schon merken. Ich verlor durch einen solchen intriguanten Defecten ein Mal drei, wenn nicht vier, Kranke hintereinander! Der Arzt hat hier oft mit sich selber seine liebe Noth; nec flere, nec ridere, sed intelligere heisst es dann. Bei solchen Fällen von Abtrünnigkeit laufen freilich immer zu imputirende Motive der Absichtlichkeit, des Geizes, der Schadenfreude und noch andere, schlechtere, mit durch; denn im Grunde ist das Krankheitsbewusstsein vorhanden; aber es ist zu schwach, zu lückenhaft, es hat einen unstäten Charakter, und bewährt sich auch nicht, wie gesagt, am Verständnisse anderer Kranken. In der Confrontation mit dem Gewissensrathe, dem Arzte mit seinen Thatsachen, kann es sich wohl wiederfinden und eine Zeit lang behaupten; vor der Welt geht es wieder dahin, oder lebt auch als unklare Krankheitsfurcht weiter mit der Scheu vor Allem dem, was sich zur Zeit der Krankheit mit und neben derselben ereignete. — Eine Abart von ihnen steht der Gesundheit noch näher. Sie geben die Krankheit vollständig und nachhaltig zu, sie erfreuen sich ihrer Genesung lebhaft, lieben das Institut, bedingen sich sogar die eventuelle Wiederaufnahme aus und beurtheilen Mitkranke ziemlich richtig. Aber es giebt bei ihnen doch zeitig gewisse schwache Punkte in ihren Vorstellungen und Empfindungen, welche sie auch in dem ersten und wärmsten Exaltationsgefühle der Heilung nicht fahren lassen, und die sie auch später nicht mit völliger Klarheit ausgleichen. Um diese allgemein zu bezeichnen, will ich sagen, es sind Nebensachen, welche ihnen zu Hauptaffairen werden und denen sie ihr Sinnen und Trachten mit unverhältnissmässigem Interesse zuwenden. Laienhafte Zuthaten von Aussen kommen immer hinzu, zumal wenn ihre drängende Mittheilsamkeit missbraucht wird. Sie können unter Anderm nicht zeitig und vorurtheilsfrei genug, nicht selbstverleugnend genug, über gewisse Erlebnisse aus ihrer Krankheit und den Vor-

Digitized by Google

stadien derselben, die durchaus nicht immer Anstaltsmaassregeln, sondern ebenso gut eigene Verkehrtheiten, oft nur in einzelnen Ausdrücken bestehend, in sich begreifen, hinwegkommen, damit abschliessen, sie als vollendete Thatsachen vergessen, sie verschweigen. Sind unter diesen Erlebnissen solche, deren Verschuldung sie einigermaassen Andern aufbürden können, so thun sie dieses mit sichtlicher Vorneigung, aber nicht immer mit Consequenz, sie stellen gern exclusiv eine neue Anschuldigung an den Platz der alten. Darin gar aus ihrem kranken Verhalten hervorgehende Nothwendigkeiten zu sehen, oder menschenfreundlich zu suchen, fällt ihnen sehr schwer, es ist ihnen unnatürlich. Auch ist ihnen eigen, die gewöhnliche Discretion zu missachten, und bei ihrem oft guten Gedächtnisse, was dann dem Laien sehr imponirt, und auch als Beweis eines guten Urtheils gilt, können ihre Mittheilungen üble Folgen haben, obgleich sie diese gar nicht beabsichtigen, wohl aber zu wenig bedenken. Ihr Benehmen steht hierin im Gegensatze zu der Haltung gründlich geheilter Melancholischen, die mit vollendeter Genesung solche widerwärtige, indiscrete und persönliche Dinge aus dem Vordergrunde ihrer Nachgedanken und Empfindungen verloren haben und sich nicht leicht schwatzhafte Wiederholungen derselben gestatten. Noch weitere Unterscheidungen möchten zu sehr in's Individuelle hinführen. Die von mir beobachteten Fälle lassen sich ziemlich ungezwungen in diesen beiden Gruppen unterbringen. Im psychischen Systeme gehören die Resultanten dieser Classe zu den chronisch Exaltirten mit dadurch gesetztem abnormen Egoismus; auf der Gemüths- wie auf der intellectuellen Seite finden wir Beschränktheiten, Einseitigkeiten von pathognomonischer Bedeutung. Gewisse Vorstellungskreise drängen sich dabei unwillkürlich vor, schwer beherrscht und kaum controlirt, wenn auch ohne falschen Inhalt. Gründliche Correction durch vollendete Ausheilung findet wohl sehr selten statt. Sogenannte moralische Bemühungen in Verhaltungen, Abmahnungen, welche oft durch selbstlobende Fragen provocirt werden, nützen Nichts; sie schrecken leicht zurück, machen sie scheu und empfindlich, bessern kaum für den Augenblick. Ich werde wohl 17 Procent solcher Resultanten auf aus Melancholie Geheilte nach meinen Zahlen rechnen können. Die Frauen prävaliren.

Sehr viel günstiger ist das Zahlenverhältniss der mit Defect Geheilten aus der zweiten Classe der maniakalisch (zum ersten Male) krank Gewesenen. Ich zähle etwa 8 Procent. Hierbei ist zu bemerken, dass die nicht zu verhindernde, zu frühe Entlassung mit als Ursache der unvollkommenen Heilung anzuklagen, jedenfalls doch geschehen ist. Das ausgleichende Depressionsstadium wurde hier

Digitized by Google

nicht bis zur Vollendung abgewartet. Von ihnen erfährt die Anstalt, selbst auf Provocationen, nicht leicht Intriguen, Critiken und Indiscretionen, aber doch ein befremdliches Ignorirtwerden. Sie ist nicht vergessen, aber doch einigermaassen mystificirt. Diese Resultanten aus der Tobsucht unterhalten ein Gemisch von bedrückenden Erinnerungen an ihr eigenes Benehmen und, was vielleicht noch mehr das pathologische Element ausmacht, an erfahrene Zwangsmaassregeln, Freiheitsbeschränkungen und oft unbedeutende Verweigerungen, wovon sie nicht gerne sprechen und gesprochen haben wollen, was sie aber unvernünftig nach Dauer und Grad begrübeln. Ich will den berechtigten Erinnerungen an mögliche Ungebühr einen ganz weiten Spielraum gestatten; aber dahin fällt das Wesen der Sache nicht. Eine ganze Reihe anderer Kranken, die im Restraint- wie im No-restraint-Verfahren viel bedeutendere Vergewaltigungen zu erleiden hatten, haben das überstandene Leid wie eine Kleinigkeit vergessen, selbst wohl dem Wartepersonal mit Dank und Schmerzensgeldern gelohnt. Ich meine, auf die Grösse des Objectes der Klage kann es nicht ankommen; wir haben vielmehr den Nachdruck zu legen auf die subjective Art, sich damit zu befassen. Und da erklärt sich das chronische Dulden im Gedächtnisse, das Empfinden solcher Reminiscenzen über das entsprechende Zeitmaass hinaus, als etwas Unorganisirtes und die freilich träge, aber wesentlich falsche, weil zu allgemeine Imputation derselben auf Betheiligte und Unbetheiligte, als entschiedenen Mangel in der Function des Ueberlegens und Urtheilens — als etwas Psycho-Pathologisches. — Die zu versuchende Annahme, dass die grosse Verwirrung und Flüchtigkeit der Ideen bei Manchen im Anfange der acuten Krankheit ihr eigenes Gebahren zu schwach ins Gedächtniss kommen lasse, muss auch dem von Andern erfahrenen Gebahren zu Gute kommen, wenn auch das uns Angethane stärker von uns empfunden wird, als das von uns Ausgegangene. — Auch hier ist es merkwürdig, dass die in solcher Art nachgebliebene Aversion mit der Zeit zuweilen wachsen kann. Der Abschied war herzlich, auch folgt noch ein Brief mit einem Wort des Dankes. Aber dann hört die gute und thätige Beziehung auf und die erwähnte Mystification greift weiter und weiter Platz. Sämmtliche mir bekannte Resultanten aus dieser Classe haben der Zeit nach keine ordentliche Reconvalescenz in der Anstalt durchgemacht; sie wurden in dem noch nicht abgelaufenen Depressionsstadium fortgenommen, und sie sind darin stecken, sie sind mehr oder weniger chronisch deprimirt geblieben. Die Erlebnisse in der Krankheit waren die letzten mit starker Afficirung, die letzten wichtigen Erfahrungs-Objecte. Sie allein, oder zusammen mit

Digitized by Google

andern deprimirenden der Selbstbetrachtung, bilden feste, latente Momente des Grübelns und bleiben es sehr lange Zeit, wenn sie überhaupt ganz ausgeglichen werden.

Die dritte Classe der mit Defect geheilt Entlassenen ist wieder verhältnissmässig zahlreich vertreten. Zu ihr gehören die ursprünglich hallucinirenden Wahnsinnigen vorzugsweise. Sie sind für die Erkenntniss die interessantesten und auch die schwierigsten. Sie verhehlen, sie künsteln am meisten und leben auch am leichtesten in der Welt. Schon in der vollen Krankheit zeigten sie das geringe Krankheitsgefühl und die grösste Renitenz gegen den Titel, krank zu sein. Nur bei sehr verkehrten und schlimm zu deutenden Handlungen machten sie flüchtige Concessionen. Die Sinnestäuschungen haben an sich zu viel momentan Ueberzeugendes, als dass die Vorstellung ihrer eingebildeten Beschaffenheit dem Patienten nahe treten könne. Auch liegt das Vergessbare in ihrer sinnlichen, in ihrer physiologischen Natur. Ihre Imprägnation ist nicht geeignet für die dauernde Uebertragung auf andere Gehirnthätigkeiten; daher auch der Stimmungswechsel, der Mangel an Combinationen, die wenig stetig alterirte Motilität von den Hallucinationen aus. Die schlimmen Actionen, zu welchen sie bestimmen können, haben immer den Charakter des Plötzlichen und Abbrechenden. — Selten giebt es Hallucinanten, die sich nicht alsbald nach überstandener ersten Aufregung verschiedenen Beschäftigungen und Zerstreuungen zuwenden können. Das discrete Verbergen der inneren Vorgänge ist ihnen gleichsam natürlich. Geht es ihnen noch besser, so treten sie meist mit ganz eigenthümlicher Unbefangenheit in's gesellige Leben der Anstalt und machen auch bald alle Ansprüche an den Verkehr mit der Welt. Die Hinweisungen auf ihre Krankheit benutzen sie geschickt zur Simulation und dreisten Negation, namentlich, wenn sie besondere Zwecke im Auge haben. Sie besonders haben etwas Blindes für ihr eigenes Thun und treten sehr zuversichtlich und, wenn es sein muss, auch intriguant auf. Durch sogenannte Zerstreuungen werden sie in der That kräftig von der Hingabe an ihre Wahnvorstellungen abgezogen und sie können darin ohne Schaden viel vertragen. Schliesslich gestaltet sich ihr äusseres Leben ganz so, wie das gesunder Menschen, und sie werden entlassen. Was restirt nun noch von Krankheit bei den Defecten? Es ist mir nicht leicht, darüber etwas Positives beizubringen. Auch ich habe von ihnen Einige in die Rubrik der gesund Entlassenen gestellt, die es nach meiner Ueberzeugung auf spätere Erfahrung nicht gewesen sind. Sie selber behaupten es freilich, und die Angehörigen rapportiren ganz günstig. Allein die Art, wie sie in der Verkennung ihrer Mitkranken beharren,

Digitized by Google

obgleich deren Zustand sich offenbar genug machte, die Naivität, mit welcher sie im bürgerlichen Leben auftreten, ihre Ansprüche an Rechte, wobei die Gesundheit von Hause aus eine *conditio qua non* sein sollte, das Stillschweigen, was sie über ihren freiern wahren Zustand beobachten — und was nicht blos Absicht ist — neben sonstiger Geschwätzigkeit, der nachbleibende Mangel an Pietät — ein Charakteristicon für Hallucinanten — an Dankbarkeit auch für das Haus, wo sie doch ihre angebliche Gesundheit wiedergefunden haben: Dieses und noch Anderes bei ihnen ist nicht der Ausdruck der Genesung mit dem geretteten vollen Krankheitsbewusstsein und stimmt auch nicht mit dem Verhalten Derjenigen überein, welche einen ähnlichen Zustand glücklich und gänzlich überstanden haben. Ist es möglich, dass sie weiter halluciniren, ohne dass die pathologische Störung aus dem alsdann angenommenen geringen, chronisch gewordenen Grade herauszutreten braucht? Mir fehlt darin für jetzt die Erfahrung. — Von den unter anderer Ausdrucksweise specifisch Wahnsinnigen primären Erkrankens habe ich etwa acht Fälle, meist in Verbindung mit Depression, beobachtet; aber davon bis jetzt nur einen mit annähernder Heilung kennen gelernt. Diesen Fall habe ich bereits oben bei den Melancholischen in Anrechnung gebracht.

Eine Aeusserung des Redners, dass er nach einer 3. Erkrankung eine völlige Genesung überhaupt nicht mehr beobachtet habe, rief einen ganzen Sturm entgegenstehender Beobachtungen hervor, welche die sämmtlichen anwesenden Anstaltsärzte berichten konnten. Doch betraf dies fast ausnahmslos Fälle von Tobsucht, wo selbst zahlreiche Recidive ohne besondere Folgen für die psychische Integrität überstanden wurden, während dasselbe bei der Melancholie sehr selten ist.

L. Besser, Mittheilungnn über die histologischen Verhältnisse des Cerebellum und Andeutungen über die Natur seiner Functionen.

Es ist bekannt, dass die histologischen Verhältnisse des Cerebellum durch ihre Einfachheit ausgezeichnet sind. *Kölliker* sagt: „Das Cerebellum zeigt in Bezug auf die Vertheilung der Elementartheile einfache Verhältnisse."

In der *Medulla spinalis*, im Cerebrum, vor Allem in der *Medulla oblongata* begegnen wir einem Grade von Kreuzung und Verschlingung der Nervenbahnen, wie solcher verwickelter und ausgedehnter kaum gedacht werden kann. Im Cerebellum dagegen haben wir, *corp. dentat.* und Decke des IV. Ventrikels ausgenommen, nur weisse Fasermassen, die in ausnahmslos geraden Bahnen nach den grauen, peripherischen Bahnen hinstreichen. Diese Peripherie selbst

Digitized by Google

nun, in eine innere, sogen. rostfarbene und eine äussere, graue Schicht getrennt, bietet relativ sehr einfache Verhältnisse dar. Sie kann leicht begriffen werden, wenn man ihre Entwickelung an Neugeborenen verfolgt. Hier besteht diese peripher gelegene Masse des Cerebell. aus einer Schicht von Glia-Gebilden, die sich in Bezug auf die Dichtigkeit ihrer Kerne zu differenziren beginnt. Ich muss bezüglich dieses genetisch-histologischen Vorgangs auf die Abbildung verweisen, die auf Taf. VII. unter Nr. A. und B. im dritten Hefte des 36. Bandes von *Virchow's* Archiv veröffentlicht worden ist. Ebendaselbst habe ich des Näheren das Auswachsen dieser Glia-Gebilde und die Umbildung derselben in die persistenten Nerven-Gewebe-Theile geschildert*). Ich mache hier nur auf den einen Umstand aufmerksam, dass bei den Neugeborenen die für das Cerebellum so charakteristischen, grossen sogen. *Purkinje'*schen Zellen noch nicht vorhanden sind. Man findet an der Stelle, die sie später zeigt, wohl eine Summe dicht- und ballonförmig gelagerter kleinster zelliger Gebilde, aber nichts, was als Nervenzelle angesprochen werden könnte.

Auf das weitere histologische Detail bei diesen Vorgängen jetzt einzugehen, ist hier nicht der Ort. Lassen Sie mich nur die Thatsache betonen, dass der neugeborene Mensch in der Rinde seines Cerebellums noch keine Nervenzellen trägt.

Die Architektonik der Rinde, sagte ich oben, liesse sich aus deren Histogenese leicht verstehen. Ich führe deshalb nur noch an, dass die Glia-Kerne schichtenweise mehr und mehr verschwinden und nach aussen von der rostfarbenen Schicht lagerweise sich vermindern. Die äusserste dünne Schicht bildet sich zu der *membrana limitans externa* um.

Die innere, später rostfarbene oder Körner-Schicht erhält ihr Ansehn und ihren Charakter durch die Masse und Dichtheit der Glia-Kerne. Wo im Erwachsenen viel Nervenfasern durch diese Körner-Schicht treten, erscheint dieselbe heller, wo, wie in den Furchen, zwischen den Blättchen dieselben sparsamer durchtreten, dunkler. Die graue äussere Schicht wird das Terrain für die Entwickelung der Zellen und ihrer Fortsätze. — Ausser ihnen findet sich daselbst nur noch das schwammartige, stützende Bindegewebe und eine dichte

*) Ich sehe mich veranlasst, hier zu erwähnen, dass im 4. Heft des III. (1868) Jahrgangs des *Max Schulze'*schen Archivs für mikroskopische Anatomie durch Dr. *Arndt* in allen wesentlichen Punkten jene meine das Nervengewebe betr. histo-genetischen Angaben bestätigt worden sind.

Digitized by Google

Capillargefäss-Masse mit dem ihm zugehörenden Stromgebiet grösserer Gefässe. Ich leugne auf das Positivste, dass ausser jenen Nervengewebs-Elementen hier noch irgend welche andere zellige Elemente von entschieden nervöser Natur vorkommen, wie das unter Anderen auch *Deiters* annimmt.

Ich weiss recht wohl, dass ab und zu eine *Purkinje*'sche Zelle peripherisch hinaus von ihrem Terrain gerückt sein kann, allein Nervenzellen anderen Charakters finden sich in der grauen Schicht nicht. Ich glaube, die dahin gehenden Behauptungen anderer Beobachter auf jene meist im Anfang des äusseren Drittheiles dieser Schicht sich vorfindenden handartigen Ausbreitungen, Verdickungen oder Flächen-Gestaltungen von in der Theilung begriffenen Ausläufern beziehen zu sollen, die wohl das Ansehen multipolarer Zellen vortäuschen können.

Die Frage, ob noch Lymph- oder sonstige Safträume für den Verkehr zwischen Blutmasse und den zu ernährenden Elementen vorkommen, vermag ich nicht weiter zu erörtern. Schliesslich glaube ich, über die Architektonik des Cerebellum Folgendes mit Bestimmtheit aussprechen zu dürfen.

Von dem Marke her streichen in dichten parallelen Strängen die markhaltigen Nervenfasern, lösen sich in der rostfarbigen, der Körnerschicht nach garbenartiger Ausbreitung — wahrscheinlich in vorwiegend dichotomischer Theilung — auf und treten in den einfachsten Richtungen, so dass dies Bild eine verworrene, netzartige Lagerung der Nervenfasern zeigt, mit ihrem Axencylinder an die grossen Zellen.

Nach der *Cohnheim-Gerlach*'schen Gold-Methode gefertigte Präparate geben gerade über diese letztgeschilderte Nerven-Ausbreitung die instructivsten Bilder.

Die grossen Zellen endlich greifen polypenarmartig, wie *Stilling* es bezeichnete, in die graue Masse mit ihren Ausläufern hinein, um sich daselbst zu anostomosiren. Die Theilungen der Ausläufer gehen unter spitzen Winkeln vor sich, wo es sich um eine Vergrösserung, eine Erweiterung ihrer Bahn handelt, dagegen unter rechten, wo deren feinste Endglieder anastomosiren. Diese letzten, feinsten, zu Anastomosen werdenden Enden der Ausläufer sitzen also auf ihren Vorästchen gerade so auf, wie *Deiters* das im III. Cap. seines posthumen Werkes bezüglich der centralen Ganglienzelle angiebt.

Ich kann Ihnen, meine Herren, es nicht zumuthen, mir in das Detail dieser histologischen Verhältnisse zu folgen. Ich muss Sie bitten, mich die Resultate positiv aussprechen lassen zu dürfen, mir

Digitized by Google

des Rechts jeder mir entgegentretenden Kritik natürlich vollständig bewusst.

Die negativen Resultate meiner Beobachtungen nochmals auszusprechen, so bietet die graue Rinde des Cerebellums keine zweite Art von Nervenzellen dar, und findet sich in der grauen Schicht kein zweites System von Nervenfasern, und lässt sich keine Rückläufigkeit nervöser Bahnen annehmen, es fehlt somit in der grauen Rindenschicht des Cerebellums jedes weitere nervöse Element, mit dem eine Verbindung der grossen Zellen und ihrer Ausläufern gedacht werden könnte.

Die histologische Forschung fordert die Annahme, dass in der Anastomisirung der Ausläufer die Architektonik der Rinde sich vollzieht, die centripetalen Nervenbahnen in ihr somit ihr Ende finden.

Nach meinen ungefähren Schätzungen — von einem Auszählen kann selbstverständlich nicht die Rede sein — ist immer je eine Nervenzelle mit ca. 25—30 ihrer Nachbarzellen durch ihre Ausläufer verbunden.

Die Anastomosen-Frage der Nervenzellen, meine Herren, ist eine nicht neue. — *Rud. Wagner* und seine Schüler haben, meines Wissens nach, zuerst Anastomosen zwischen menschlichen Nervenzellen beobachtet. Andere sind ihnen gefolgt, Andere haben die Richtigkeit dieser Beobachtung geleugnet. *Kölliker* hat sie stets und bis auf heute als eine unerwiesene Thatsache geleugnet. Trotzdem aber — und das scheint mir bei dem Gewicht einer Stimme wie der *Kölliker's* von Bedeutung — sagt er in der neuesten Auflage seiner Gewebe-Lehre: „Ein Zusammenhang der verästelten Zellen-Ausläufer verschiedener Zellen unter einander wird zwar durch keine Thatsache bewiesen, ist jedoch in hohem Grade wahrscheinlich und bietet, wie mir scheint, eine solche Annahme die einfachste Lösung des Räthsels dieser ungemein zahlreichen Ausläufer und zugleich die beste Erklärung der grossen Leitungsfähigkeit der grauen Substanz und der Reflexe."

Die beiden hauptsächlichsten Conclusionen der bisherigen histologischen Betrachtungen waren:

1) „der neugeborene Mensch trägt in der Rindenschicht seines Kleinhirns noch keine Nervenzellen" und

2) „die Anastomosirung der Ausläufer der grossen Nervenzellen in der grauen Rindenschicht des Kleinhirns bildet bei dem erwachsenen Menschen die periphere Endigungsweise der Nervenbahn."

Der erste der beiden Sätze hat für metaphysische und speculative Forschungen kein Interesse, und wo und soweit sich irren-

Digitized by Google

ärztliches Interesse diesen Studien zuwendet, ist die betreffende Conclusion von keinem Belang. Denn, ob die autonome Seele früher oder später sich der Vorgänge in den menschlichen nervösen Centralorganen bemächtigt, ist nicht von grosser Wesentlichkeit.

Nur diejenige psychologische Richtung dagegen, die ohne exactes Studium der physiologisch verfolgbaren Phänomene keine Hypothese will, für sie ist immerhin jeder, auch der kleinste Beitrag von Interesse, der nerven-physiologische Vorgänge betrifft.

Es ist wohl zweifellos anzunehmen, dass im neugeborenen Menschen ein grosser Theil willkürlich motorischer, sowie sensueller und sensitiver Vorgänge noch auf keine Weise sich constatiren lässt. Der neugeborene Mensch ist zwar mit den Einrichtungen ausgestattet, riechen, sehen, schmecken, hören, tasten zu lernen und ein Gefühl seiner Muskelbewegungen — um dem 6. Sinne seine Anwartschaft und Ebenbürtigkeit nicht streitig machen zu wollen — zu erhalten, aber er sieht, riecht, hört, schmeckt und tastet noch nicht und hat noch keinen Muskelsinn. Die Spiritualisten basiren auf der Fähigkeit, das Alles zu lernen, die Annahme einer autonomen Seele. Diese Frage ist hierin nicht zu verfolgen.

Der histologische Anatom sieht die Entwickelung der nervösen Gewebe mit diesem Lernen der Sinne zusammenfallen. Das Eine besteht nicht ohne das Andere. Die Erscheinungen sind synchronisch. Man wird sie sich nicht, die eine durch die andere bedingt, vorstellen können.

Die erste auslösende Kraft, ein Reiz, ein Einfluss der Aussenwelt, findet im Neugeborenen peripher gelegene nervöse Apparate, die ihre durch diese Reize erlittenen Veränderungen in der Richtung der nervösen Centren Nervenbahnen mitzutheilen vermögen. Unter dem Einfluss dieser weiter getragenen Veränderungen gestaltet sich die Entwickelung des centralen Nervengewebes. Ohne jene äusseren Reize bilden sich die nervösen Elemente der Centren nicht aus. So weit meine Untersuchungen über den Entwicklungszustand des Nervengewebes im Neugeborenen mir ein Urtheil zu fällen erlauben, musste ich betonen, dass fertiges Gewebe neben unfertigem besteht, dass man vollkommen ausgebildete polyklone Nervenzellen unter Körpern findet, die ganz offenbar im Begriff sind, sich zu nervösen Zellen zu entwickeln und dass im Allgemeinen nach der Peripherie des Grosshirns hin das unreifere, nach der *Medulla oblongata* hin das reifere, fertigere Nervengewebe sich findet.

Speciell zu den Verhältnissen des Kleinhirns zurück, so ist fest zu halten, dass dasselbe in Neugeborenen noch nicht zu fungiren

Digitized by Google

vermag. Es kann dasselbe also bei allen durch Automatie ausgelösten Bewegungen des Neugeborenen nicht in Frage stehen. Herzschlag, peristaltische Bewegungen des Darmes, Athmung, die Bewegung der Assimilationsorgane gehen vor sich und müssen unabhängig sein von den Functionen des Cerebellum.

Es könnte wohl kaum eine interessantere, lockendere Aufgabe gedacht werden, als die Cerebellen todter Kinder altersweise von Monat zu Monat zu untersuchen, resp. die histologischen Befunde mit den Fertigkeiten dieser Kinder zu vergleichen. Wenn man nun die Kleinhirn-Nervenzellen und ihre Ausläufer resp. Anastomosen erst bei Kindern fertig entwickelt fände, die laufen könnten oder die auf irgend eine Weise das Vorhandensein eines Gemeingefühls bekundeten oder in gewisser Weise auf äussere Reize geordnet reagirten! Doch das sollen ja nur Andeutungen sein, Andeutungen, die nicht erlaubt sein würden, wenn es sich nicht um ein Gebiet handelte, das fast ausnahmslos noch mit Hypothesen angebaut wird.

Meine zweite Conclusion hiess: In den grossen Nervenzellen des Kleinhirns und deren anastomosirenden Ausläufern ist die Architektonik der Nerven-Apparate der grauen Rinden-Schicht vollzogen.

Es widerspricht das allen bisherigen Anschauungen, und läuft namentlich unseren Vorstellungen von den Reflexen zuwider. Ja diese Reflexe! Sollten wir uns in unseren neuro-physiologischen Anschauungen, wo uns jeder auch nur etwas plausible Gedanke eine so süsse Speise, ein so verlockendes Gericht ist, mit dieser Reflextheorie etwas zu leicht vertrauend befreundet haben! Sagt doch der jetzt als Professor der Physiologie nach der Schweiz berufene Dr. *L. Hermann*, gewiss ein Vertreter exactester wissenschaftlicher Richtung, in seinem Grundriss der Physiologie bei der Besprechung des „Reflexes im weitesten Sinne", wobei die Spannkräfte einer Ganglienzelle, ausgelöst durch die freigewordenen Kräfte der einen erregten Faser, selbst wiederum die Spannkräfte der anderen frei machen: „Die Ganglienzelle würde hier keine wesentlich andere Rolle spielen, als irgend ein Stück der einfach leitenden Nervenfaser."

Wozu da aber, meine Herren, noch die Einschaltung einer vielarmigen Nervenzelle, wenn sie nur ein einfacher Leiter ist!

Den Nervenreflex, ausgezeichnet durch seine Eigenschaft, ohne Einfluss des menschlichen Willens (wenn auch immer begleitet von der menschlichen Empfindung), auf centripedale Bahnen geleitete Reize auf centrifugale zu übertragen, wird uns durch die Einschaltung multipolarer Nervenzellen nicht begreiflicher. Gewiss mit Recht sagt *Hermann*, die Zelle wäre dann nicht mehr, als eine ein-

Digitized by Google

fache leitende Nervenfaser. Der so scharf blickende *Deiters* trägt durch alle seine Betrachtungen über die Functionen der Nervenzellen die Hypothese, an den Zellenleib tretende, von motorischen Bahnen kommende Reize könnten in der Zelle gleichsam transformirt und z. B. als sensibele von den letzten Enden der Zellausläufer weiter getragen werden. Er spricht deshalb von Nervenbahnen ersten und zweiten Grades, niederer und höherer Ordnung. Es wird mir gewiss nicht leicht, einem *Deiters* entgegenzutreten. Aber ich leugne nicht, dass ich mich zu einer solchen Anschauung des neuro-physiologischen Geschehens nun und nimmer bekennen kann. Was in aller Welt kann uns die Annahme gestatten, dass der Zellenleib mit seinen Ausläufern einen auf motorischer Bahn übermittelten Reiz sofort zu einem Vorgange des Empfindens werden lassen könne! Es ist hart für alle neurologischen Forschungen, mit den besten Hypothesen immer so unfruchtbar vor den Thatsachen zu stehen, aber mir scheint das einfache: „Ich weiss nicht", dann immer noch vorzuziehen zu sein vor Erklärungen, die in aller übrigen Physiologie keine Stütze haben.

Vermag — um zu unseren Betrachtungen bez. des Kleinhirns zurückzukehren — die Thatsache, dass die zu dem Cerebellum tretenden Nervenbahnen in der grauen Rindenschicht und da speciell in der Anostomosirung der Nervenzellen-Ausläufer ihr Ende erreichen, unsere Vorstellungen über die Functionen des Cerebellums zu beeinflussen?

Unsere jetzigen Anschauungen von der Bedeutung der grauen Massen in der *medulla spin.*, der *medulla oblong.* und den Theilen bis über den pons hinauf, einigen sich wesentlich in der Annahme, dass diese grauen Massen, diese Nervenkerne, diese Oliven und Neben-Oliven Stationen sind, die centripetale Nervenfaserzüge auf ihrem centralen Laufe machen. Stationen, ausgestattet mit automatischem Charakter.

Die bisher geläufige Annahme hält diese Stationen für die rechten Auslösungs-Stätten der Reflexe und geht fast ausschliesslich davon aus, dass hier histologische Verbindungen zwischen motorischen und sensiblen Bahnen stattfinden, Verbindungen, die, dass ich sage, die Continuität im Fortschreiten der neuro-physiologen Vorgänge vermitteln und ermöglichen. Von *Schröder van der Kolk* an bis *Deiters* sind von allen namhaften Forschern darüber die verschiedensten Vermuthungen aufgestellt worden. Niemand gab sie für mehr als Hypothese. Niemand hatte je irgend etwas von solch einer Verbindung gesehen. Bei dem unabweisbaren Verlangen der menschlichen Natur aber, sich Thatsachen — und als solche tritt Jedem

Digitized by Google

das Zurückziehen der Hand von der stechenden Nadel entgegen — zu erklären, blieb es nicht aus, sich dies reflectorische Geschehen eben zu analysiren. Jeder nahm dabei die Zellen-Ausläufer zu Hülfe. Gab es ja doch gar keinen anderen Gewebe-Theil. Hier, schien es, musste der Angelpunkt liegen.

Mir scheint vor Allem die ganz colossale Schwierigkeit constatirt werden zu müssen, die schon bei dem blossen Reden über diese Dinge uns von allen Seiten umgiebt.

Wir wollen von Reflexen sprechen, wollen uns Vorgänge erklären, die wir ohne das Nervengewebe nicht zu Stande kommen sehen und haben doch absolut keine Ahnung von der Veränderung, die ein Lichtstrahl im opticus hervorbringt. Wir reden von motorischen und sensiblen Bahnen und haben auch keine Ahnung davon, warum die peripheren Geschmacksnerven eben den Geschmack, die des olfactorius den Geruch empfinden.

Jede Specifität eines Sinnesreizes trägt der uns gleich erscheinende Axencylinder nach den Centren. Und doch können alle diese verschiedenen Reize ohne eine Verschiedenheit bei dem Leitungsvorgang central nicht percipirt werden. Es würde absolut undenkbar sein, verschiedene Sinneseindrücke zu erhalten, wenn der dieselbe centripedal leitende Nerv in durchaus gleicher Weise verändert würde. In jeder Nervenfaser müssen demnach, wenn sie verschiedene Reize erhält, auch verschiedene Veränderungen vor sich gehen. Das muss festgehalten werden. Wenn auch noch ohne alle Ahnung über die Natur einer solchen Verschiedenheit, müssen wir und dürfen wir sie postuliren.

Wie können wir aber darüber hinaus einen Schritt gehen! Die Untersuchungen, ob der thätige oder ruhende Nerv ernährt wird, ob er Wärme abgiebt, ob und welche chemische Ausscheidungen in ihm vorgehen, sind weit entfernt, abgeschlossen zu sein.

Dürfen wir aber da sagen, in der Nerven-Zelle wird eine ankommende Bewegung modificirt, umgebildet, ihre Specificität verändert? Dürfen wir das namentlich, ohne dass wir auch nur irgend wo annähernd einen Anhaltepunkt dafür haben, dass die Ausläufer einer Zelle sich wieder zu einer weiterleitenden Bahn sammeln, wie das *Max Schulze* als wohl noch am ersten plausibel darstellt?

Bei allen diesen ringsum uns umgebenden Unsicherheiten und Dunkelheiten scheint mir es geboten, absolut streng die Grenzen stets vor Augen zu haben, die wir unserm Vorstellen gestatten dürfen. Wir haben

1) verschiedene von aussen kommende Reize,

Digitized by Google

2) dem entsprechend verschiedene Veränderungen in den centripedal leitenden Nerven-Bahnen,
3) Veränderungen in den Nerven-Zellen, entsprechend den ihnen zugeleiteten Reizen,
4) Reactionen des Körpers auf die vorgegangenen Reize.

Wann sind diese Reactionen einfach reflectorische, wann automatische, wann automatische und empfundene, wann bewusste und anscheinend willkürlich inscenirte?

Es ist klar, dass unsere Anschauungen wesentlich erweitert, unseren Vorstellungen eine wesentliche Directive gegeben werden würde, wenn wir Gewissheit erlangten über das histologische Schicksal der Nerven-Zellen-Ausläufer.

Deiters sagt, jene grauen Massen, jene Zellen-Regionen, — vordere und hintere Hörner, graue Commissuren, Nervenkerne, graue Kreuzungen — kommen nur da vor, wo die directen Bahnen centripetaler Fasern Abweichungen ihres Weges erleiden und ein Theil derselben eine selbstständige Endigung findet.

Um diese selbstständige Endigung wird sich's uns vor Allem handeln müssen. Was heisst das in histologischem Sinne? Wir kennen ja eben diesen Charakter dieser Stationen noch nicht. *Deiters* giebt uns, — abgesehen von seiner, wie ein rother Faden, seine sonst so unschätzbaren Untersuchungen durchziehenden Theorie von dem II. System von Axen-Cylindern (die ihren Ursprung auf den Enden der Ausläufer haben sollen) — die klarsten Darstellungen über das anatomische Schema, in dem wir jene Stationen zu suchen haben.

Der histologische Character bleibt dunkel. Vermag jene meine Darstellung vom Anastomosen-Verlauf in der Kleinhirnrinde denselben zu erhellen?

Anastomosiren jene Zellen der Kleinhirnrinde, so steht wenigstens nach dem in diesen Fragen maassgebenden Urtheilen von *Deiters* der Annahme nichts entgegen, dass auch andere Stationen anostomosiren; denn nach *Deiters* ist das Kleinhirn eben auch nur eine Station, von dem Bahnen höherer Ordnung nach dem Cerebrum gehen.

Sei dem aber auch nicht so — und ich muss es leugnen — so ist es jeden Falles von der höchsten Wichtigkeit für alle grauen Massen, wenn wir in der grauen Rindenschicht des relativ so grossen Kleinhirns die Nervenbahnen in der Anastomose limitirt finden. *Deiters* sagt: „Das Cerebellum ist durch Vermittelung beider Oliven und durch einige andere graue Massen mit bestimmten Faserzügen in Verbindung gebracht. Es sind diese Faserzüge theils alle an der

Digitized by Google

Pyramiden-Kreuzung theilnehmenden und ein grosser Theil der Hinter- und Seitenstränge" und betont, wie bei der Besprechung aller grauen Massen, so auch hier, dass man sich dieselben nicht so scharf umgrenzt denken solle, da offenbar Alles darauf hindeute, alle möglichen Verbindungen herzustellen. „So sieht man, schliesst er, — — in der medull. oblong. — — Stationen, in denen durch Veränderung der Strombahn, vielleicht mehr noch durch Verbindung verschieden functionirender Massen die Möglichkeit einer gewissen Selbstständigkeit der Function begründet wird."

Und in der That, es braucht, getragen von einer grossen Anzahl anatomischer Thatsachen, die Ansicht wohl keiner anderen den Vorzug zu lassen, dass jene Durchkreuzungen, jene Bogen- und Winkelzüge ihren Grund in den Combinationen haben, die die verschiedensten Fasergebiete mit einander eingehen müssen, wenn von einem Zusammengreifen der neuro-physiologischen Vorgänge die Rede sein soll, wie wir solchen bei dem Functioniren einer Reihe von automatischer und regulatorischer Apparate kennen, also eben „in den Verbindungen verschiedener functionirender Massen".

So dürften wir vielleicht — ich brauche nicht erst zu sagen, mit welcher Reserve und mit welchem Zögern auf diesem Gebiete man solche Sachen auspricht — zwischen dem 3. und 4. Punkt, in die ich eben unsere Vorstellungen einschränken zu müssen glaubte, noch den einschieben:

3. a. „Die Functionen der Nervenzellen lösen sich aus, wenn ihre Ausläufer sich anastomosiren."

Das Rückenmark, das verlängerte Mark, das Kleinhirn, der bulbus rachiticus zeigen uns in ihren grauen Massen, ihren grauen Hörnern, ihren Nervenkernen etc. Regionen zum Zweck der Combinationen verschiedener Faserzüge, verschiedener Stromgebiete, wie *Deiters* sagt. Ihre physiologische Natur ist die reflectorischer und automatischer Thätigkeiten. Nur immer je gewisse Theile der grossen und weiten Faserbahnen sind hier verbunden, vollziehen hier ihre „unter bestimmten Umständen allein zur Geltung kommenden" spezifischen Functionen.

Hier Stationen einzelner Stromgebiete. Im Cerebrum die Combination aller?

Zum Schlusse referirte *Brosius* über die diesjährige Naturforscher-Versammlung zu Dresden und speciell über die Thätigkeit der psychiatrischen Section. Die nächste Versammlung wurde auf den 5. Juni 1869 anberaumt und die Sitzung gegen 3 Uhr Nachmittags geschlossen. Dem Beschlusse der letzten Versammlung entsprechend,

Digitized by Google

schloss sich der Sitzung ein gemeinsames Mittagsmahl an, welches die Mitglieder bis zum spāten Abend zusammenhielt.

Hier ergriff *Richarz* die Gelegenheit, noch einmal auf *Griesinger* zurückzukommen und in tiefgefühlten Worten die Verdienste des Verstorbenen um die Psychiatrie hervorzuheben und seinen frühen Tod zu beklagen. Wie im Beginn der Sitzung durch Erheben von den Sitzen, so feierte die Versammlung jetzt das Andenken des Hingeschiedenen durch das Leeren eines Glases in tiefem Schweigen.

Dr. *Pelman*, Secretair.

Bericht über die sechste ordentliche Versammlung des psychiatrischen Vereines zu Berlin, am 15. März 1869.

Anwesend waren die Herren Collegen: *Boettger*, *Brutzer*, *von Gellhorn*, *Grell*, *Kahlbaum*, *Laehr*, *Levinstein*, *Schroeter*.

Nach Begrüssung der Versammlung durch den Vorsitzenden und der Mittheilung desselben, dass leider der Secretair am Kommen durch plötzliche Erkrankung verhindert sei, berichtete

Laehr, Ueber die Wirkung der Senfbäder gegen Psychosen.

Neuerdings sind von Frankreich aus so anerkennende Berichte über die Wirkung der Senfbäder in Psychosen erschienen, die unmittelbare Einwirkung des Senfes auf das peripherische Nerven- und capillare Gefässsystem in den verschiedensten Krankheiten ist so sichtbar und wir sind so oft in der Lage, uns nach Unterstützung durch Heilmittel umzusehen, namentlich äusserlich einwirkender, dass es nahe lag, vorerst controllirende Versuche mit allgemeinen Senfbädern anzustellen.

Die Bereitungsweise des Senfbades erfordert manche Vorsichtsmassregeln, um so mehr, als die Versuche bei einigem Umfange nicht gerade zu den billigen gehören, da die ℥ des gepulverten Senfmehles $1\frac{1}{2} - 2\frac{1}{4}$ Sgr. kostet. Der wirksame Bestandtheil des Senfes, das ätherische Senföl, präexistirt nicht in den Senfkörnern, sondern wird erst durch die Einwirkung des Wassers gebildet (wie Bittermandelöl aus Emulsin und Amygdalin in Gegenwart von Wasser-Myosin). Da das Senföl sehr flüchtig ist, so wirkt es am kräftigsten, wenn man es erst kurz vor der Verwendung zu Pulver mahlt, noch

Digitized by Google

besser, stösst. Bei grösseren Quantitäten ist das aber schwer durchführbar und nur die Nähe von grossen Städten, wie Berlin, macht es möglich, dass man bei den Droguisten beliebige Quantitäten frisch gemahlen zu jeder Zeit haben und in steinernen Kruken mit gleichem Deckel auf mehrere Tage ohne erheblichen Verlust aufbewahren kann.

Da das Senföl sich in kaltem Wasser am besten löst, so macht man in der beim Senfteige gebräuchlichen Weise Pulver mit kaltem Wasser zu einem Teige an und vertheilt dann denselben sorgfältig in dem Badewasser. Wer dies Geschäft ausführt, muss seine Augen hüten, da ohne diese Vorsicht die Augen zu brennen und zu thränen anfangen. Auch dem Kranken ist nach seinem Einsteigen ins Bad zu diesem Zwecke ein nassgemachtes Tuch über die Wanne vorzubreiten.

Was die Quantität betrifft, so kann man stets mit 90 Grm. *plv. sinapis* beginnen. Unter dieser Quantität trat keine Wirkung ein. Mit ihr auch nur bei Wenigen. Wo keine eintritt, steigt man bei dem nächsten Bade um 30 Grm., bis Wirkung d. h. Brennen oder Röthung der Haut erfolgt. Mit dieser Quantität fährt man dann so lange fort, bis eine Verstärkung wieder nothwendig wird. Bis jetzt ist in unserer Anstalt das Maas von 270 Grmm. nicht überschritten worden, bei einer Dame trat nur erst mit dieser Quantität eine wahrnehmbare Wirkung ein. Die Dauer des Bades ist sehr verschieden. So gut wie nach Senfpflastern bei der verschiedenen Empfindlichkeit der Haut die Zeit bis zur Wirkung sich von 5 Minuten bis auf ½ Stunden ausdehnt, so auch beim Bade. Unter ½ Stunde trat die Wirkung selten ein, die Kranken haben sich aber auch bis ca. 1 Stunde darin aufgehalten. Die französischen Collegen berichten von einem Frösteln, welches den Badenden befalle und dann eine Indication zum Heraussteigen aus dem Bade abgebe. Hier ist in 3 Fällen dies Frösteln eingetreten, in 2 Fallen, nachdem die Kranken längere Zeit im Bade gewesen waren und sich mehrere Male die Brause auf den Kopf hatten geben lassen, so dass dies die Ursache des Fröstelns sein konnte. Nur bei einer sehr sensiblen Dame mit hysterischer Grundlage der Psychose ist auch ohne Brause dies Frösteln der Regel nach eingetreten, wenn sie ca. ½ Stunde im Bade war.

Die Wirkung des Bades beginnt damit, dass sich an einzelnen feineren Stellen der Haut, an den *nates*, am *scrotum*, an der Kniekehle, am Ellbogen, am Halse Brennen einstellt. Am Halse kann dazu beitragen, wenn das Senfmehl nicht sorgfältig genug unter das Wasser gemengt ist und einzelnes an der Oberfläche schwimmt. Dies specifische Brennen verliert sich allmälig bei schwacher Dosis,

Digitized by Google

auch wenn man im Bade bleibt, es verbreitet sich jedoch bei stärkerer, die Haut wird allgemeiner geröthet, das Gesicht namentlich empfindet das Gefühl von Hitze und Brennen, wogegen das Bestreichen mit frischem kalten Wasser vermittelst eines Schwammes wohlthut, die Haut wird schmerzhaft, wenn man mit kaltem Wasser die gerötheten Stellen braust, schmerzhafter, als dies bei gewöhnlichen Bädern der Fall ist. Nachdem der Kranke sich abgetrocknet hat oder abgetrocknet ist, hat er gewöhnlich das Gefühl meist behaglicher Wärme. Untersuchungen der Pulsfrequenz und der Hauttemperatur vermittels des Thermometers, welche vor, während und 1 Stunde lang nach dem Bade angestellt wurden, haben bisher kein Resultat ergeben, welches nicht auch bei den einfachen warmen Bädern erfolgt wäre. ½ Stunde nach dem Bade sank das Thermometer um ca. 1° C., um 1 Stunde nach demselben wieder dieselbe Höhe wie vor dem Bade einzunehmen.

Bei der Verschiedenheit der wirksamen Bestandtheile des Senfes je nach dem Standorte, bei der Flüchtigkeit des Senföles und daher der Schwierigkeit, Bäder bei gleicher Quantität des Pulvers auch von gleicher Kraft herzustellen, bei der Unsicherheit, ob jedes Bad auch mit gleicher Sorgfalt vorbereitet wird, bei Berücksichtigung des Umstandes, dass das Senfpulver sich an einzelnen Körpertheilen anhängt und dann nicht eine gleichmässige Einwirkung auf die ganze Hautfläche stattfindet, wurde eine Mischung von Senföl in Spiritus verschrieben und zwar folgende:

Rec. *Ol Sinap.* 2,0 (℥ß) Spir. 23,0 (℥ j Scr.).

Damit haben wir Aerzte an uns selbst experimentirt. Mit der Hälfte der Quantität war wenig Wirkung wahrnehmbar, mit ¾ derselben trat an den feineren Hautstellen hier und da eigenthümliches empfindliches Brennen ein, welches aber im Bade noch verschwand, mit der ganzen Quantität ein vermehrtes mit Hitzegefühl im Gesichte und zwar der Art, dass diese Quantität etwa die Wirksamkeit wie das Pulver in dem Quantum von 90 Grmm. bei denen hatte, bei welchen überhaupt eine solche eintrat. Ein wohlthuendes Gefühl behaglicher Wärme ward darnach empfunden. So ansprechend nun auch diese Form, unter welcher das Mittel angewendet wird, in der That auch ist, so ist doch der Preis um so höher, da es 8¼ Sgr. kostet. Eine Verschiedenheit der Wirkung betreffs der Form der Anwendung macht sich insofern bemerkbar, als bei der Auflösung das eigenthümliche Brennen der Haut zuerst und oft ohne entsprechende Hyperämie der Haut eintrat, bei der Anwendung in Pulverform der Regel nach zuerst eine Hyperämie, locale oder allgemeine, sich bemerkbar machte.

Digitized by Google

Was nun die Krankheitsformen anbetrifft, in welchen die allgemeinen Senfbäder Anwendung fanden, so wurden vorläufig diejenigen leichteren Formen ausgeschlossen, in denen durch den Eintritt in die Anstalt die Genesung begann und in gleichmässiger Weise fortschritt. Es kamen vorzugsweise diejenigen Krankheiten an die Reihe, welche chronisch verliefen, auch innerhalb der Anstalt Exacerbationen machten und in denen andere Heilmittel schon mannigfach im Stiche gelassen hatten. Von ihnen mussten wir diejenigen Patienten ausschliessen oder mit den Bädern aussetzen, welche überhaupt so unruhig waren, dass sie sich nicht gleichmässig im Bade erhalten liessen, ferner diejenigen welche trotz der Warnungen sich die Augen mit Badewasser auswuschen und endlich diejenigen, bei welchen das oft sehr unangenehme Brennen zu neuen Wahnvorstellungen Veranlassung gab. Es waren dies immerhin nur Wenige. Wir haben bisher 447 Bäder und zwar bei 12 Patientinnen angewendet. Die grösste Zahl der Bäder bei einer Patientin betrug 41, die geringste 4.

Aus der Anwendung der allgemeinen Senfbäder in den vorliegenden Fällen haben sich während des vergangenen halben Jahres folgende Schlüsse ziehen lassen:

1. Die Form der Anwendung geschieht entweder in gepulvertem schwarzen Senf oder durch eine Auflösung des Senföles in Spiritus.
2. Die Pulverform wirkt mehr auf ein Zustandekommen der Hyperämie, die Auflösung auf ein solches der Hyperästhesie ein.
3. Die durchschnittliche Dose des Pulvers betrug für ein Bad 180 Grmm. Unter 90 Grmm. trat keine Wirkuug ein, die höchste Dose war 270 Grmm.

   In der Auflösung wurden 2 Gramm. Senföl mit 23,0 Grmm. Spiritus vermischt, die Hälfte davon gleich Anfangs sorgfältig mit dem Bade vermischt und die 2te Hälfte, in zwei Absätzen oder mit einem Male später zugegossen und rasch untergebreitet. Das Brennen der Haut erneuerte sich dabei, verschwand aber wieder.
4. Ein Fall wirklicher Genesung oder auch nur auffallender Veränderung des Krankheitsverlaufes ist nicht wahrgenommen worden.
5. In den meisten Fällen verspürten die Kranken, welche darüber Auskunft geben konnten, nach dem Bade ein Gefühl behaglicher Wärme, welche ca. ¼ Stunde andauerte.
6. In Fällen von Psychosen, denen Hysterie zu Grunde lag, behaupteten die Kranken nach mehrmaligem Gebrauche sich

Digitized by Google

wohler zu fühlen und waren es auch. Aber nach längerem Gebrauch stellten sich die alten Leiden wieder ein und man muss annehmen, dass nur die Neuheit des Mittels einen psychischen Einfluss wie andere Mittel ausübte.

7. Wiederholt wurde jedoch in Fällen von chronischer Melancholie mit zeitweiser Unruhe und in Fällen chronischer maniakalischer Aufregung auf mehrere Stunden Ruhe hervorgerufen, in jener auch mehrere Male bei Anwendung zur Abendzeit Schlaf herbeigeführt, der weder bei einfachen warmen Bädern noch ohne dieselben vorher eingetreten war.
8. Der Zustand der Ernährung, auf welchen Französische Beobachter besonderen Werth gelegt haben, hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit gehabt, nur dass in einzelnen Fällen von Trockenheit und Abschilferung der Haut bei langsam wieder verstreichender Hautfalte eine sichtbare Einwirkung gar nicht oder nur schwer zu Stande kam.

Die in Schweizerhof ermittelten Erfolge entsprachen daher nicht den einzelnen überschwänglichen Lobpreisungen einzelner Französischer Collegen, am besonnensten ist noch das Urtheil *Laurent's*. Das Mittel dürfte aber doch zu denen gehören, zu welchem man gern seine Zuflucht nimmt, wenn es sich darum handelt, Jemandem vorübergehend mehr Ruhe zu verschaffen und wenn andere Mittel uns im Stiche lassen.

In geringeren Quantitäten warmen Bädern zugesetzt, mag es bei häufiger Benutzung deren Wirksamkeit erhöhen, ohne dass dieselbe als locale augenblicklich hervortritt, wie man ja bei habitueller Kälte der Füsse im Einpudern von Senfmehl in die Strümpfe ein erhebliches Mittel kennt', das weder Jucken noch Röthe bewirkt und doch allmälig jene Beschwerde beseitigt.

Hinderniss für die allgemeinere Anwendung der Senfbäder wird immerhin nicht blos die Kostspieligkeit, sondern auch die Verschiedenartigkeit der Einwirkung sein, die sich nicht blos durch die Form der Psychose erklären lässt.

Dr. *Brutzer* fügt den vorliegenden Mittheilungen hinzu, dass er in 6 Fällen von Melanch. und Manie Senfbäder mit je 3 Pfd. angewendet habe, aber ohne Erfolg zu sehen.

Dr. *Kahlbaum*, Beiträge zur klinischen Erweiterung der psychischen Symptomatologie.

Der Vortragende geht von der bekannten Thatsache aus, dass sich bestimmte Arten und Weisen des Urtheilens und Sprechens bei den einzelnen wie bei verschiedenen Geisteskranken oft wiederho-

Digitized by Google

len, und glaubt schliessen zu dürfen, dass in diesen scheinbar so regellosen Abweichungen bestimmte Normen des krankhaften Ablaufs der Denkprocesse enthalten sind. Das Studium dieser Abweichungen und das Aufsuchen bestimmter Normen müsse interessante Aufschlüsse über die Genesis des gesunden Denkens und auch für die klinische Beurtheilung des einzelnen Krankheitsfalles geben.

Esquirol war der erste bedeutende Forscher, der die psychopathische Symptomatologie in klinisch - empirischer Weise wissenschaftlich angebaut hat, indem er aus der grossen Zahl der psychischen Krankheitssymptome zwei Einzelerscheinungen herausgriff, die er mit dem jetzt so geläufigen Namen: „Hallucination" und „Illusion" zuerst fixirte.

Der Vortragende stellt nun den charakteristischen Unterschied zwischen Hallucination und Illusion dahin fest, dass die Hallucinationen Störungen in dem sinnlichen Bewusstwerden der Denkobjecte sind; die Illusionen dagegen Störungen in der Beurtheilung derselben — und eröffnet somit zwei Hauptgruppen in der Unterscheidung der intellectuellen Symptome: 1) die Sinnesdelirien oder Hallucinationen, 2) die Urtheilsdelirien — unter denen die Illusionen nur eine Gruppe bilden.

Die Urtheilsdelirien will der Vortragende zum besonderen Thema seiner Besprechung wählen. — Das Wort Illusion in seiner ursprünglichen und auch populären Bedeutung bezieht sich, wie der Vortragende schon an Beispielen von *Esquirol* nachweist, nicht nur auf sinnliche Objecte, sondern wird auch für die schöngefärbte Beurtheilung von abstracten Verhältnissen gebraucht. — Charakteristisch ist es dabei, dass der Sprachgebrauch dem Worte Illusion den Nebenbegriff einer heiteren schönfärbenden Stimmung und eines gewissen Optimismus in der Beurtheilung beilegt. Da nun aber auch dasselbe Symptom (d. h. das Beeinflusstwerden des Urtheils durch die Stimmung) auch bei trüber Stimmung auftritt, wo dann Alles schlechter, trauriger und schwärzer erscheint, so empfiehlt der Vortragende für letzteres den Namen „Delusion" einzuführen und als Totalnamen für die ganze Classe der Illusionen und Delusionen den Namen „Lusion" zu gebrauchen.

Unter Lusionen versteht also der Vortragende falsche Urtheile, bei denen die Fälschung, der Irrthum auf dem Hineindrängen der Stimmung, der Gemüthsbeschaffenheit in die Urtheilsthätigkeit beruht.

Als ganz verschieden hiervon führt der Vortragende eine zweite Gruppe von solchen Urtheilen oder Urtheilsdelirien auf, bei denen die Fälschung auf dem Mangel des zur Bildung eines richtigen Ur-

Digitized by Google

theils nöthigen logischen Bestandtheile beruht. Hierzu gehören besonders die bei Geistesschwachen vorkommenden falschen Urtheile, die sich auf eine Verwechslung in der Benennung der Dinge (besonders der Personen- und Zeitangaben) zurückführen lassen. Der Vortragende schlägt für dieses Symptom den Namen: „Dissermination" oder „Vernennung" vor. Bemerkenswerth ist hierbei, dass in der falschen Benennung der Dinge doch wieder analoge Begriffe und Namen gewählt werden; also statt der Personen- wieder Personennamen, statt der Tage wieder Tage etc. — In einer dritten Form der Urtheilsdelirien, die der Vortragende aufstellt, wird auch diese Analogie nicht mehr beobachtet. Der Kranke bringt bunt durcheinander gleichsam zufällig zusammengewürfelt Worte und Begriffe in ein gegenseitiges Verhältniss und in die Form eines Satzes, die den realen Verhältnissen nach ganz unzusammengehörig sind. Dies sind die vom Vortragenden sogenannten Disjecturen oder Denkverwürfelungen.

Diese eben mitgetheilten Formen des krankhaften Denkens (so schliesst der Vortragende) haben mit einander den Charakter gemein, dass der Inhalt oder das Subject des Urtheils durch eine momentane Veranlassung gegeben ist und dass bei demselben Kranken die betreffenden Formen der Urtheilsstörungen im Laufe der Zeit sich auf die verschiedensten Objecte erstrecken, wie sie gerade zufällig in den Bereich des Kranken gerathen. Dadurch unterscheiden sich diese Urtheilsdefecte von einer anderen Classe der Urtheilsstörungen, für welche die „fixe Idee" als Paradigma gilt. Die Urtheilsdelirien zerfallen also in zwei Hauptgruppen, erstens momentane, zweitens stabile Urtheilsstörungen. Letztere bleiben diesmal unbesprochen.

Dr. *Schroeter*, Fälle von intermittirender und akuter Melancholie.

1. *Fall von intermittirender Melancholie.* — Frau *S.*, frei von hereditärer Anlage zu psychischer Erkrankung, war früher niemals erheblich krank gewesen, hatte eine gute Schulbildung genossen und sich regelmässig entwickelt. Seit April 1865, mit 27 Jahren verheirathet, wurde sie im März 1866 von einem Knaben leicht entbunden, den sie bis Mitte Juli, ohne Nachtheil für ihre Gesundheit, stillte. Am 25. August starb das Kind, und seitdem soll sich bei der Pat. eine geistige Störung bemerkbar gemacht haben, die sich Anfangs als Theilnahmlosigkeit und Gemüthsdepression äusserte. Sie machte sich selbst grundlose Vorwürfe, dass sie das Kind vernachlässigt und dadurch seinen Tod verschuldet habe. Bald folgten die Aeusserungen, dass sie überhaupt ihre Wirthschaft schlecht geführt

Digitized by Google

habe, dass sie unfähig sei, Etwas zu leisten, dass sie das Unglück ihrer Familie sei, die sie ruinire und so fort. Schlaflosigkeit und Unruhe traten hinzu, und die zeitweiligen Aeusserungen von Lebensüberdruss legten die Befürchtungen eines Selbstmordes nahe.

Die Kranke wurde am 27. October desselben Jahres in das Asyl aufgenommen.

Der Status praesens bietet Folgendes dar: Der Körper ist mittelgross, gut und gleichmässig entwickelt, seine Bewegungen geschehen ziemlich rasch und unbehindert. Der Kopf ist symmetrisch, mässig dolichocephal, das Schädeldach erscheint mehr flach. Die Kopfhaut ist gut verschieblich, ohne Narben und mit reichem dunklen Haarwuchse versehen. Der Gesichtstheil ist ovalrund, orthognath, die Stirn niedrig, beinahe senkrecht, zeigt leichte Perpendicularrunzeln an der Nasenwurzel. Ohrmuschel und äusserer Gehörgang normal. Auf dem fahlen Gesicht ist der Ausdruck der Angst ausgeprägt, der Blick ist scheu ausweichend, der Lidschlag erfolgt selten, das Auge ist mattglänzend, fast wie bethränt. Die Pupillen sind unter mittelweit, sonst gleich und reagiren gut. Die sichtbaren Schleimhäute blassroth. Die Zähne fast vollständig und gesund. Die Zunge wird langsam, weit und nicht zitternd hervorgestreckt, ist nicht belegt. Stimme etwas belegt, leicht nasal, Sprache langsam, aber gut artikulirt. Die Brustorgane sind gesund. Der Pulsschlag meist mit der Frequenz von 60—72, Puls mit ziemlich hoher Welle, zeichnet bei Anwendung des *Marey*'schen Sphygmographen tardo-quatricrote Curven. Körpertemperatur normal. Zu den Zeiten grösserer Aufregung stieg die Pulsfrequenz auf 120 und mehr Schläge, die Temperatur war aber dann nicht zu messen.

Anfangs stöhnte die Kranke viel und laut, rang die Hände, lief im Zimmer umher, kratzte sich blutig, wollte nicht essen, liess sich aber mit Mühe dazu bewegen. Zuweilen äusserte sie: „ich kann doch nicht mehr gesund werden, ich bin zu schlecht, ich bin von Gott abgefallen, ich habe mit Vorsatz nicht mehr gearbeitet, ich bin der erste Mensch, der von Gott abgefallen ist; ich habe meinen Kopf verloren, es geht mir zu schlecht, ich kann nicht mehr existiren, ich möchte zu gern in den Himmel.“ Darauf sprach sie, wieder einmal ruhiger geworden, lispelnd Gebete. Forderte sie etwas, so wurde die Forderung ins Unendliche fort wiederholt. In der Aufregung schlug und biss sie die Pflegerinnen, die sie ankleiden wollten und zerriss ihnen die Kleider, schimpfte auf sie, trat heftig mit den Füssen auf, rieb den Kopf an der Wand oder Thür, verunreinigte sich oft. Zuweilen steigerte sich die Angst bis zu Selbstmordversuchen, sie suchte sich mit dem Taschentuch, dann mit den Strümpfen zu

Digitized by Google

erwürgen, wollte sich die Pulsadern aufschneiden, sich verbrennen, verschluckte den Trauring. — Diese Zeiten grosser Unruhe und Angst kamen am Tage, wie mitten in der Nacht, wechselten mit solchen der Ruhe, in denen sie apathisch war, oft dem Zustande des Stupor nahe kam, wobei die Pulsfrequenz oft auf 50 Schläge sank, aber sie doch richtig, wenn auch ungern, antwortete. Ungern äusserte sie sich über ihre Krankheitserscheinungen, oder suchte sie zu verhehlen. Nur einmal rückte sie mit dem Geständnisse heraus, dass sie Das oder Jenes thun müsse, „weil es ihr geheissen werde." — Allmälig nahm die Zeit der Ruhe und zugleich auch der geistigen Klarheit zu, jedoch so, dass gegen Weihnachten sich regelmässige Intermissionen von Ruhe und Unruhe, Tag um Tag wechselnd einstellten. Chinin wurde einige Wochen hindurch, anscheinend mit gutem Erfolge gebraucht, aber nur eine Zeit lang, — und das ist bei unserer Pat. besonders hervorzuheben: jedes neue Medicament, jede neue psychische Einwirkung hatte nur für den Anfang günstigen Erfolg, um nach einiger Zeit, trotz Steigerung, ganz wirkungslos zu werden.

Diese Intermissionen nun, die fortan während des ganzen Verlaufes der Krankheit, freilich mit sehr verschiedener Intensität und Dauer der einzelnen Stadien in die Erscheinung traten, boten ein ganz überraschendes Bild dem Beobachter dar. Und eben dieser Wechsel der psychischen Erscheinungen, so scharf und eigenthümlich ausgeprägt, erfordert nähere Darlegung.

Das körperliche Befinden war jetzt bei guter Verdauung und allmälig regelmässig gewordener Menstruation ein befriedigendes. Selbstmordversuche kamen nicht mehr vor. Hallucinationen des Gehörs vollständig in Abrede gestellt, waren nicht sicher nachweisbar. Die Angst und Unruhe aber war an den schlechten Tagen oft auf's Höchste gesteigert. Schon am frühesten Morgen, selbst mitten in der Nacht, stand dann die Kranke wiederholt auf, um im Zimmer herum zu laufen, fing laut an zu singen, laut und verworren zu sprechen, selbst zu schreien. Sie sprach mit tiefer, hohler Stimme, ander Male waren es mehr knurrende Laute, oder die Worte wurden mehr wie gekaut, wie mit krampfartiger Spannung der Kaumuskeln ausgestossen, oft sprach sie mit Epiphoren, wie z. B. „und ziehe da quam und knacke qua quam" u. s. f., oder wiederholte in Einem fort dasselbe Sätzchen, wie z. B. „die Heidnersche Mühle", oder, „sehen Sie mich nicht an, lassen Sie mich in Ruhe" u. s. w. Daneben wurden allerhand Erinnerungen vorgebracht, z. B. Stücke aus Leichenreden, die sie mit dem Pathos des geistlichen Vortrags sprach. Am Tage lief sie stundenlang, ohne Ermüdung zu zeigen,

auf dem Corridor umher, oder aus einem Zimmer ins andere, oder draussen im Garten hastig auf und ab; bald schweigsam, aber wenigstens die Zahnreihen gegen einander reibend, bald für sich hinmurmelnd, bald in obiger Weise laut redend, selbst singend. Sie kam vor Unruhe nur flüchtig zum Genusse der Mahlzeiten, und wurde grob und ausfällig gegen die Pflegerin, wenn sie dazu genöthigt wurde, riss an ihren Kleidern, zeigte sich sinnlich erregt. Zu andern Zeiten legte sie sich im Garten an die unreinsten Stellen, oft in der wunderbarsten Haltung der Extremitäten, in dumpfes Hinbrüten versunken, oder sie wollte bei brennender Mittagssonne am liebsten im Sande wühlen, bewarf ihr ungeordnetes Haar mit Sand, setzte sich sogar in ihren Koth, den sie zuweilen, trotz aller dagegen versuchten Mittel, nur abgab, wenn sie den Augenblick gerade für günstig hielt, um damit Schmutzerei zu machen, ja sie versuchte sogar, ihn zu verzehren; deshalb erschien sie auch häufig im Smutzrock. Gegen jede Berührung ihres Körpers zeigte sie sich höchst empfindlich und entzog sich derselben rasch. Sie verbat sich sogar, sie anzusehen. Auch gegen Licht zeigte sie sich sehr empfindlich, kniff die Augenlider meist etwas zusammen, hielt oft die Hand vor die Augen, und in ihrem Zimmer baute sie die Sophakissen auf dem davorstehenden Tische gegen das Fenster auf, selbst an trüben Tagen. Dabei fehlte ihr jedoch niemals die Aufmerksamkeit für die Vorgänge in ihrer Umgebung, einer Unterredung mit ihr wich sie aber aus.

Aber gerade wenn die Kranke von Angst und Unruhe am heftigsten herumgeworfen wurde, wenn sie im Aeussern ganz verwildert erschien, forderte sie mit angstvoll, schmerzlichem Gesichtsausdruck mit scheu ausweichendem Blicke, dazwischen die Zähne über einander reibend oder mit der Zunge Speichel im Munde zusammenziehend — da forderte sie dringend im schweren Krankheitsbewusstsein ein Mittel zur Hülfe: „ach, schaffen Sie mir doch ein Mittel, dass ich gesund werde, ach, können Sie mir denn gar nicht helfen, können Sie mir keinen Rath geben?“

So verlief der unruhige Tag. So sahen wir die Kranke gestern, und heute — welche überraschende Erscheinung — sehen wir die junge Frau, ziemlich blühend aussehend, sauber gekleidet, mit andern Damen im Freien sich ergehen, oder unter ihnen sitzend, unbefangen lachen und scherzen, auch verständig bei Darlegung eines gut erhaltenen Gedächtnisses, über ernstere Dinge ihre Meinung abgeben, selbst gute Kritik üben, so auch im Winter über die wöchentlichen Vorträge, die sie an den ruhigen Tagen besuchte. Zum

Digitized by Google

Arbeiten war sie freilich auch dann nur selten aufgelegt, dagegen las sie gern Zeitungen und Zeitschriften.

Der freie Tag trat gleich am Morgen als reine Intermission ein, und Monate lang zeigte sich dieser schroffe Wechsel der Krankheits-Erscheinungen Tag um Tag in derselben Gestalt. — Wenn nun endlich eine Zeit folgte, wo die unruhigen Tage immer milder und milder wurden, da schien der sichere Weg zur Heilung eingeschlagen zu sein. Jetzt trat auch bei der Patientin das Verlangen nach den Ihrigen heftiger hervor und sie äusserte: „wenn ich mich recht zusammen nehme, wird es vielleicht gehen, aber ich nehme mich hier schon zusammen, wie ich nur immer kann." Auf Andrängen der Angehörigen und mit Rücksicht auf ihre Mittel, begab sie sich mehrmals versuchsweise zu ihnen; aber gar zu rasch lief die ruhige Zeit hier und auch sonst ab, meist schon nach acht, höchstens nach vierzehn Tagen musste die Pat wieder ins Asyl zurückkehren. Sie kam gern wieder, im vollen Bewusstsein ihres Krankheitszustandes, wenn ihr die „angstvollen Gefühle", wie sie sich äusserte, keine Ruhe mehr liessen. Und jetzt traten Angst und Unruhe an den unruhigen Tagen wieder um so lauter in die Erscheinung, allmälig traten an die Stelle der reinen Intermissionen blosse Remissionen, so dass die freie Zeit erst nach allmäligem Schwinden der Angst und Unruhe am Nachmittag eintrat. Ja sie wurde immer kürzer und undeutlicher, kam hin und wieder sogar erst am dritten Tage.

So war der Verlauf im letzten Halb - Jahre, wo sich auch die freiern Perioden leider weniger häufig und nur für kürzere Zeiten einstellten, obgleich hier die erheblich besser gewordene Stellung des Mannes ein begünstigendes Moment abgeben konnte, denn Pat. war durch die Nachricht davon sichtlich erfreut worden.

Wenn die Patientin demnach in ihrem Befinden in der letzten Zeit eher Rückschritte gemacht hat, so verlor sie doch kaum an intellectueller Kraft. Die Prognose bleibt zweifelhaft, im günstigsten Falle aber ist auf eine längere Dauer der Krankheit zu rechnen. — Besonders mit Rücksicht hierauf, und weil die Pat. hier sich mit allen Verhältnissen eingelebt hat, von einer Veränderung aller äussern Verhältnisse aber, bei ihrer Empfänglichkeit für alles Neue, günstige Bedingungen für den weitern Krankheitsverlauf noch gehofft werden konnten, und weil endlich auch die Behandlung in der Familie, nach mehrfachen Versuchen, als einen weitern günstigen Verlauf nicht befördernd sich herausgestellt hatte, — wurde eine Umsiedelung vorgeschlagen und Ende October von dem Manne nach einer Prov.-Anstalt bewerkstelligt.

Therapeutisch sind die verschiedensten Mittel in Anwendung

Digitized by Google

gezogen, doch immer nur mit anfänglichem Erfolge. Am meisten noch milderten kalte Ueberschläge auf den Kopf, die nicht immer geduldet wurden, allgemeine warme Bäder von 27° R. und meist ½stündiger Dauer mit Brause, die Unruhe. Die Bäder wurden die ganze Zeit hindurch regelmässig einen Tag um den andern, auch sonst noch ausnahmsweise, wenn es nöthig schien, gebraucht. Einige Male wurden bei gesteigerter Unruhe, begleitet von geröthetem und wärmeren Gesicht und injicirten Augenbindehäuten, 12 trockne Schröpfköpfe im Nacken mit Vortheil applicirt. Beim Eintritt des regelmässigen Wechsels wurde, wie oben erwähnt, längere Zeit Chinin gereicht, an dessen Stelle dann auch Kali arsenicos. solut. für längere Zeit trat. Später wurde empirisch, *Tct. semin. Strychni* gegeben, weil damals die Melancholie einen mehr passiven Charakter zeigte. Eine günstige Einwirkung davon schien anfangs unverkennbar, blieb aber schon nach einigen Wochen aus.

Inzwischen waren schon als Hülfsmittel subcutane Injectionen von Morph. hydrochl. (in 2 Glycer. und 1 Aq. gelöst) herangezogen. Diese wurden nun allabendlich gegen 9 Uhr, meist am Oberarme, vorgenommen — am Tage nützten sie gar Nichts, — und hatten dann, in entsprechender Dosis angewendet, wenigstens die Wirkung, dass Pat., auch wenn sie in der Nacht nicht schlafen konnte, doch ruhig lag. Es wurde mit Dosen von 0,008 Grm. rasch zu 0,01 und 0,015 steigend begonnen, aber erst bei 0,02 und 0,03, die mehrere Wochen hindurch angewendet wurden, war der Erfolg auch für die unruhigen Tage ein auffällig sichtbarer. Nach 14tägiger Abwesenheit der Pat. im Mai 1868, beginnt der weniger günstige Sommer. Die Wirkung der subcutanen Morphium-Injectionen, auch in gesteigerter Dosis, war vorüber. Gegen Mitte Juni wurde den bekannten Indicationen des Mittels gemäss, mit Kal bromat. (7,5 : 180,0 Grmm.), zunächst 2 Mal täglich 1 Esslöffel, der Anfang gemacht. Bei allmäliger Steigerung wurden zuletzt längere Zeit, früh und Abends, 2 Esslöffel einer Solution von 12,0 : 180,0 gereicht. Dieses Mittel hatte zwar eine, aber doch entschieden die geringste Einwirkung von allen andern, auch muss es beschuldigt werden, den sonst kräftigen Appetit der Pat. nach 8wöchentlichem Gebrauche verdorben zu haben. Rheum beseitigte den Uebelstand. Ganz zuletzt endlich wurden die bisher regelmässig angewendeten warmen Bäder durch Bäder von Senfmehl 90,0 Grmm. zu einem Bade von 27° R. und ½-stündiger Dauer, wieder mit zunächst gutem Erfolge vertauscht.

Der vorgetragene Krankheitsfall wurde als intermittirende Melancholie bezeichnet. Der Grundzug schmerzlich psychischer Depression ist der Kr. an die Stirn geschrieben. Jedenfalls ist aber

Digitized by Google

der im Bezug auf Intensität in unregelmässigen Perioden hervortretende, fast 1½ Jahr lang vorhandene und Monate hindurch scharf ausgesprochene Wechsel von einem ausgeprägt kranken und einem gesundheitsgemässen Tage, hier im Verlaufe der Melancholie, das sie näher Bezeichnende. Perioden traten freilich auf, die ein verwischteres Bild davon gaben, so besonders im Anfang und am Ende der Beobachtung. Berücksichtigung verdient auch die Stellvertretung einzelner unruhiger Tage im Verlaufe der activen Melancholie durch Tage, an denen die Pat. das Bild der *melanch. attonita* darbot.

Schon oben wurde der grossen Empfänglichkeit der Kr. für neue Eindrücke Erwähnung gethan; es wurde erwähnt, wie jedes neue Heilmittel für den Anfang stets günstig wirkte, es wurde erwähnt, wie jede neue Anregung von Aussen den Willen der Pat. auf einige Zeit zu stärken vermochte. Für den ersten Punkt liegen zahlreiche Beweise in der angeführten Therapie vor, für den letztern führe ich von zahlreichen andern nur den einen Fall an. An einem unruhigen Tage und gerade zu einer Zeit, wo diese sehr schlimm waren, wo die Kr. ganz verwildert einherging, wurde ihr der beabsichtigte Besuch des Mannes angezeigt, zugleich aber die Unmöglichkeit angedeutet, dass sie ihn in dieser Verfassung sprechen könne. Rasch sich baden lassen und ankleiden, war der Erfolg eines schnell gefassten Entschlusses. Und wirklich vermochte sie dann ziemlich frei und unbefangen, fast wie an den guten Tagen, mit ihrem Manne ein Paar Stunden zu verplaudern. Diese Erscheinungen nun, glaube ich, auf eine hysterische Grundlage bei der Pat. zurückführen zu müssen. Darauf muss auch zum Theil die Hyperästhesie des Gefühls und des Gesichtssinnes bezogen werden, so weit diese von Wahnvorstellungen nicht abhängig ist.

2. Fall von *Melancholia attonita acuta*. — *Wolff R.*, fast 13 Jahre alt, Sohn eines jüdischen Kaufmanns aus der Nachbarschaft, war angeblich früher immer gesund gewesen. Ebenso wird hereditäre Anlage zu psychischer Krankheit in Abrede gestellt. Der Knabe besuchte vom 10. Jahre ab die Schule zu Potsdam und vor Kurzem siedelte er auf eine Berliner Schule über. Er war fleissig und brachte immer gute Zeugnisse nach Hause. Im Uebrigen zeigte er wenig Gemüth, war ein dreihäriger Junge, wie der Vater sagt.

Am 18. November vorigen Jahres soll er plötzlich erkrankt sein. Der Lehrer gab ihm in der Schule ein Paar Ohrfeigen und die Mitschüler neckten ihn nachher deshalb. Er kam erregt und mit ganz verändertem Wesen aus der Schule nach Hause, nannte die Tante sogar ein böses Weib, ein Hexe, die ihn beim Lehrer angeschwärzt

Digitized by Google

habe; wozu natürlich gar kein Grund vorlag. Er blieb unthätig, in sich versunken und jammerte nur leise, schlief wenig, nahm geringen Antheil an den Mahlzeiten. Am 20. nahm in der Vater nach Hause.

Der *stat. praes.* bietet kurz Folgendes: Der Knabe sieht schwächlich und bleich aus, bei sonst regelmässigem Körperbau. Seine Körperhaltung ist schlaff, mit zu Boden geneigtem Kopfe. Die Bewewungen der Extremitäten erfolgen zögernd. Der Schädel zeigt eine gute und gleichmässige Bildung. Das Gesicht mit dem Ausdrucke von Schmerz und grosser Angst. Auge matt, Blick ausweichend, die obern Augenlidern etwas herabgesunken, bei häufigerem Lidschlage. Schlaffe, zum Weinen verzogene Gesichtszüge. Die Pupillen weit, gleich, reagiren träge. Zunge etwas belegt, wird zitternd, aber gerade, wenn auch nur wenig hervorgestreckt. Stimme etwas nasal. Sprache nörgelnd und gedehnt. Brustorgane gesund. Starkes Herzklopfen. Puls 120 Schläge im Stehen, ziemlich voll und regelmässig. Kopf höher temperirt. — Ganz unter der Herrschaft einer gedrückten Stimmung, verräth der Kr. in seinem äussern Verhalten grosse Angst und Unruhe. Er lässt sich nur ungern und mit Aeusserung von Furcht untersuchen. Dem Vater folgt er auf Schritt und Tritt, setzt sich nur mit ihm und steht mit ihm auf, ja drängt sich an denselben an, wenn er aufsteht oder eine Gehbewegung macht. Dabei jammert er mit weinerlicher Stimme: „ach, lieber Vater, ach, lieber Vater!“ Auf ruhiges Zureden giebt er endlich sehr zögernd und immer thränenlos weinend einzelne, kurze und richtige Antworten über einige Zustände seines Körpers. Die Sinne fungiren angeblich normal, auch Schmerzen im Kopfe oder in anderen Körpertheilen werden in Abrede gestellt. Zeitweise aber drückt er die obere Bauchgegend, wie zur Beseitigung dort befindlicher unangenehmer Gefühle.

Der Knabe soll zu Bett liegen, kalte Umschläge auf den Kopf und Senfteige an die Waden erhalten. Neben Anordnung einer milden, reizlosen Diät, werden dem Vater die nöthigen Rathschläge für eine psychische Behandlung ertheilt, so weit diese überhaupt in der Familie möglich ist.

In der folgenden Nacht schläft Pat., wenn er auch mehrmals aufwacht, doch ziemlich gut, ist aber vom frühesten Morgen ab nicht mehr im Bette zu halten. Er bleibt dann stumm, scheinbar theilnahmslos und in sich versunken, den Blick an den Boden geheftet, am Ofen oder in einer Ecke stehen, bleibt aber nicht allein im Zimmer, sondern läuft mehr trippelnd und in grosser Angst, die sonst nicht von ihm gehörten Ausrufe: „Ach lieber Vater, ach lie-

Digitized by Google

bes Mutterchen“ ausstossend, ihnen nach, sobald diese das Zimmer verlassen. Hin und wieder ruft er: „was ist?“ Er geniesst den ganzen Tag über nur wenig, und nur von dem für ihn von den Mahlzeiten her stehen Gebliebenen. Am 22. Befinden i. G. unverändert, immer noch im Zustande des Stupor, ängstlich gedrückt, lässt sich auf Nichts ein. Zunge noch unrein, speichelt viel, presst noch zuweilen die Magengegend mit der Hand. Wünscht einmal leise nach vielen Fragen der Angehörigen, Medicin. *Acid. Halleri.* Am 23. stürzt er einmal, bei sonst unverändertem Befinden, ganz unvermuthet auf eine ruhig dasitzende ältere Schwester los und versetzt ihr ein Paar derbe Schläge. Am nächsten Tage traten Schwankungen im psychischen Befinden zum Guten ein. Die Pupillen sind noch erweitert, Puls 96 im Sitzen, Stirn noch etwas wärmer. Erst am 25. zeigt sich eine nun gleichmässig fortschreitende Besserung, so dass am 26. die Krankheitserscheinungen geschwunden sind. Er hat einen heitern und freien Gesichtsausdruck erlangt, giebt rasche und gute Antworten, verkehrt freundlich mit seinen Geschwistern. Pupillen und Temperatur normal. Puls 84 im Stehen. Vom folgenden Tage ab hilft er mit im Geschäft, ist heiter und unbefangen. Der Appetit zeigt sich sehr stark. Er leitet die Entstehung der überstandenen Krankheit auch von jenen Ohrfeigen ab, gesteht aber, dass dieselben nicht gerade etwas so sehr Ueberraschendes für ihn hatten oder zu Ungewöhnliches waren. Sonst weiss er von seinem Benehmen während der Krankheit Nichts mehr. Er blieb zu seiner Stärkung auf dem Lande bei den Eltern, die freilich nicht das richtige Verständniss für seinen Zustand hatten.

Am 6. Jan. 1869 tratt ein Rückfall auf mehrere Tage ein, der ganz ähnliche Erscheinungen wie der frühere Anfall darbot. Der Knabe hatte sich bei einer Landparthie stark dem Genusse der Spirituosen ergeben und wurde sehr aufgeregt, als er die Zügel auf der Heimfahrt nicht führen durfte. Dyspeptische Erscheinungen sollten schon vorausgegangen sein und bestanden noch. Die Kur wurde der bestehenden Indication gemäss mit einem Brechmittel eröffnet, sonst aber Eingriffe in den Krankheitsverlauf, etwa durch Morphium - Injection, vermieden. Diesmal verspürte der Pat. unbehagliche Gefühle in dem rechten Hypochondrium, das er oft mit dem Arme drückte. Am 13. Jan. waren bereits alle Krankheitserscheinungen geschwunden und wieder normales psychisches Verhalten vorhanden. Die auch diesmal sehr weiten Pupillen waren ebenfalls zum Mittel zurückgekehrt. Der Knabe kräftigte sich auf dem Lande bei sehr guter Verdauung. Ende Februar wurde er nach ausserhalb zu verständigen Leuten in ein Geschäft gebracht und die Nachrichten über sein Befinden lauten dauernd günstig.

Digitized by Google

Wir haben hier einen Fall von *Melancholia acuta* vor uns, der ziemlich gut das Bild der *attonita* giebt, und der bei einem sehr jugendlichen, nicht erblich prädisponirten Individuum und plötzlich durch eine psychische Erregung losbricht, während eine Prädisposition durch geistige Ueberanstrengung gegeben war. Von jeher kein Freund von Bewegung im Freien, war nämlich der Knabe jetzt ganz Stubenhocker geworden, da er kürzlich auf eine andere Schule übergesiedelt, grosse Schwächen „im Jüdischen" gezeigt hatte, das auf der früheren Schule vernachlässigt war. Seine Ehrgeiz wollte aber rasch die Lücken ausgefüllt und schon Ostern zur Confirmation sich reif sehen. So prädisponirt, reichte eine an sich unbedeutende Gelegenheitsursache hin, eine psychische Störung herbeizuführen.

Bemerkenswerth ist der akute Ablauf der Krankheit, etwa innerhalb einer Woche, der ohne besondere Eingriffe geschah. Bemerkenswerth die auch beim Recidiv beobachtete gleichmässige bedeutende Erweiterung beider Pupillen, neben beschleunigtem Pulse und erhöhter Kopftemperatur. Ersteres Symptom spricht mit der vermehrten Speichelabsonderung für eine starke Mitbetheiligung des *n. sympath.*, selbst wenn wir die nicht ganz zweifellose Einwirkung dieses Nerven auf das Herz ausser dem Spiele lassen wollten. Bemerkenswerth die plötzliche motorische Action am 23. November mit Hinblick auf die gerichtliche Psychiatrie. Bemerkenswerth endlich ist der Eintritt eines Recidives kaum sechs Wochen nachher, als Zeichen dafür, dass die Reizbarkeit des Gehirns noch nicht so vollkommen erloschen war, um bei einer durch Alkoholgenuss gesetzten Hyperämie desselben einen Verdruss unschädlich zu machen, wie er hier durch Verweigerung eines Wunsches entstand. Freilich musste der Erfahrung gemäss bei dem akuten Verlaufe der Krankheit und dem raschen Uebergange in den gesundheitsgemässen Zustand, die Möglichkeit eines Rückfalles um so mehr in's Auge gefasst werden, aber günstigere Bedingungen hätten hier unzweifelhaft bestanden, wenn der Knabe in einer besseren Atmosphäre, wie sie ein wohlgeordnetes Anstaltsleben bietet, noch längere Zeit nach dem Ablaufe der Krankheit sich befunden haben würde, wo ein Gastricismus leicht beseitigt und Schädlichkeiten leichter abgehalten werden konnten.

Laehr, Irrthümer der Diagnose in Psychosen.

Die Mittheilungen hierüber beziehen sich nicht auf solche diagnostische Irrthümer, welche auf Mangelhaftigkeit der gegenwärtigen Kenntnisse in unserer Disciplin beruhen oder nur erst durch den Leichenbefund ermittelt werden, sondern betreffen solche Kranke,

Digitized by Google

welche, ehe man sie der Anstalt zur weiteren ärztlichen Behandlung anvertraute, als an anderen Krankheiten leidend behandelt und in Folge dessen in dem Verlaufe ihrer Krankheit geschädigt wurden. Es fehlt ihnen daher nicht an historischem und therapeutischem Interesse. So häufig dies nun Anstaltsärzten begegnet, so hat doch jede Anstalt ihr besonderes individuelles Gepräge und macht deshalb ihre besondern Erfahrungen. Die Anstalt des Vortragenden hat es nur mit weiblichen Kranken zu thun, welche aus den gebildeten Classen sich einer mehr oder minderen Wohlhabenheit erfreuen, um so eher Anstalten scheuen und durchgängig von tüchtigen Aerzten, zumeist auch von klinischen Lehrern, vorher berathen worden sind. Solche Wahrnehmungen unterstützen in nicht geringem Grade das Verlangen, dass sämmtliche Universitäten mit selbstständigen Lehrstühlen versehen werden. Zu Grunde liegt die Aufnahmeziffer von 436 weiblichen Kranken.

Die Irrthümer der Diagnose beruhten vorzugsweise darauf, dass die Psychose als Reflex eines peripherischen Körperleidens angesehen wurde, während das letztere nur als ein Symptom des Central-Nervenleidens betrachtet oder nur in ätiologischer Beziehung zu dem letzteren gedacht werden konnte. In einigen wenigen Fällen war als Gehirnleiden eine Verhärtung oder Erweichung der Gehirnmasse, oder wenn jüngere Personen erkrankten, Meningeal- oder Gehirntuberculose als physisches Substrat der psychischen Störung angegeben, während eine Psychose unter den verschiedensten Formen aber ohne jene schwere pathologisch-anatomische Grundlage vorlag.

Einer Frauen-Abtheilung, welche sich aus den gebildeten Ständen ergänzt, werden die meisten Fälle als gynäkologische übergeben. Allerdings haben wir über die Bedeutung der weiblichen Genitalien in Psychosen interessante und belehrende Mittheilungen erhalten und in der That muss unsere Aufmerksamkeit schon dadurch darauf hingelenkt werden, dass gerade Mädchen in den Entwickelungsjahren nicht selten von primären Formen der psychischen Krankheit ergriffen werden, obgleich kein Fall vorkam, in welchem nicht unzweckmässige psychische Einwirkungen an der Entstehung der Psychose concurrirten. Die grössere Zahl der betreffenden Kranken war von Gynäcologen ärztlich untersucht und längere Zeit behandelt worden, die Psychose hatte sich trotzdem verschlimmert und zur Uebersiedelung in die Anstalt geführt. Abnormitäten der verschiedensten Art waren allerdings an den Genitalien constatirt, aber die psychische Behandlung durch den Hinblick auf jene in den Hintergrund gestellt worden. Wenn man nun erwägt, dass gerade Functionsstörungen anderer Organe, namentlich des Verdauungsapparates, Gefässsystemes

Digitized by Google

und der Geschlechtsfunctionen zu den häufigsten Erscheinungen der akuten Periode einer Geistesstörung gehören und dass gerade in dieser die Berücksichtigung der Gehirnerscheinungen wesentlich den Verlauf der Psychose beeinflusst, dass Anämie ein häufiger Begleiter ist und anderweitige örtliche Erscheinungen im Sexualapparate zur Folge hat, dass nymphomanische Zustände sich häufig dabei geltend machen, sich aber in Worten und Handlungen nur zuweilen äussern, in den bei weitem zahlreicheren noch so viel Kraft vorhanden ist, um die Kundgebungen der Nymphomanie verschleiern zu können, und dadurch noch stärker die Gehirnenergie aufreiben, so dürfte dies um so mehr gegen eine unterschiedslose manuelle Untersuchung und örtliche Behandlung der inneren Geschlechtsorgane Bedenken erwecken. Selbst die Wahrnehmung, dass Leiden innerer Sexualorgane vorhanden sein können, welche sich nur der Untersuchung durch das Speculum kund geben, während die sogen. rationellen Erscheinungen fehlen, so dass eifrige Beobachter sich zu dem Ausspruch berechtigt halten, dass jeder Fall von psychischer Störung bei Frauen zur Untersuchung durch das Speculum berechtige und dass selbst zu diesem Zwecke das Hymen nicht zu schonen sei, dürfte in dieser Consequenz in den bei weitem meisten Fällen mehr Schaden als Nutzen herbeiführen. Sei schon in der Privatpraxis grosse Vorsicht nöthig und die manuelle Untersuchung nur in einzelnen Fällen gerechtfertigt, so sei diese Vorsicht um so mehr in der Anstaltspraxis geboten, in welcher diese unterschiedslosen Untersuchungen durch die Kenntnissnahme anderer Patienten und des zu ihrer Hülfe nothwendigen Personales noch besondere Rücksicht erheischen. Unter jenen 436 Fällen führten nur drei die Pflicht herbei, eine Consultation mit bewährten Gynäkologen zu veranlassen, weil die Patientinnen andauernd über das an und für sich ja nicht seltene Gefühl von Drängen nach dem Schosse klagten, schwanger zu sein oder einen Vorfall des Uterus zu haben behaupteten oder im letzteren Falle auch wirklich Pessarien trugen. Alle 3 Fälle betrafen ältere Frauen. Aber weder Schwangerschaft noch Vorfall konnten constatirt werden, das Pessarium wurde entfernt, auf jene Angaben fernerhin kein Gewicht gelegt und es verschwand die Neigung über die abnormen Sensationen zu sprechen, während nach anderer Richtung hin die psychische Störung sich geltend machte. Von jenen 3 Patientinnen litt die eine an Hysterie, die andere an Melancholie als einem Stadium periodischer Manie und die dritte an chronischer Manie. Häufig verschwanden die Krankheitszustände der Genitalien ohne örtliche Behandlung derselben mit dem Ausgange der Psychose in Genesung, aber nie hat der Vortragende weder in

Digitized by Google

der Anstalts- noch Privatpraxis die Wahrnehmung gemacht, dass nur mit Beseitigung eines örtlichen Leidens an den Genitalien durch manuelle Behandlung eine Psychose beseitigt worden wäre. Wohl sah er jenes schwinden, aber nicht diese. Die psychische Behandlung erwies sich immer als der hauptsächlichere Factor der Behandlung.

Die nächsthäufigste Form, unter welcher Kranke zugeführt wurden, war die des Herzleidens als wesentlicher Grundlage der Psychose. Dies geschah unter 436 Fällen 42 Mal. In der Regel sollte der linke Ventrikel „etwas" erweitert sein. Machte schon diese Bezeichnung die Angabe bedenklich, so geschah dies noch mehr durch die Form der psychischen Störung, welche 29 Mal als Melancholie und 13 Mal als hysterisches Irrsein sich geltend machte. Physikalisch liessen sich nur 2 Mal Klappenfehler mit entsprechenden Grössenverhältnissen nachweisen und in beiden Fällen trat Genesung von der Psychose ein, obwohl natürlich das Herzleiden unverändert blieb und nur die Befürchtung einer leichteren Wiederkehr jenes Uebels erweckte. Immerhin ist seit Jahren diese Befüchtung nicht erfüllt worden.

In dritter Reihe stellten sich — unter 436 Fällen 16 Mal — diejenigen Kranken, bei denen die Psychose durch angebliche Magenleiden maskirt wurde. Meist waren sie Monate, selbst Jahre lang daran behandelt worden. Nach dieser Richtung hatte sich allmälig die Aufmerksamkeit der Kranken wie der Umgebung concentrirt. Je mehr die Behandlung und demgemäss die Diät die Beseitigung dieses Leidens bezweckte, den Organismus schwächte statt stärkte, um so mehr war der Psychose Vorschub geleistet worden. In 2 Fällen war ein perforirendes Magengeschwür „mit Sicherheit" constatirt worden, in dem einen hatte sich die Angst vor dem „Geschwür" zur hochgradigen Nahrungsverweigerung gesteigert und die Kranke zum Skelett abgemagert. Unter solchen Umständen tritt namentlich in den ersten Tagen der Aufnahme eines Patienten die Nothwendigkeit für den Anstaltsarzt recht hervor, mit Besonnenheit, Vor- und Umsicht die Kur einer Patientin einzuleiten, deren bisherige Umgebung nicht genug zur Enthaltsamkeit von Nahrung ermahnt zu haben sich vorwirft. Zum Glück genügen gerade hierbei mehrere Tage, um den Thatbestand festzustellen. In einem Falle waren die verschiedensten Kurmethoden 10 Jahre lang gegen ein angebliches Magenleiden ausgeführt worden, bis sie zum Glück durch einen Anfall von Tobsucht ihr Ende erreichten, denn die Kranke kam in die Anstalt, genas, hat sich verheirathet, 5 Kinder geboren und ist mit Ausnahme eines nicht langen Recidivs, in welcher auch der Magen wieder eine Rolle in den Vorstellungen spielte, nie wieder krank gewesen.

Digitized by Google

In einzelnen Fällen, in denen der Krankheitssitz in peripherische Organe verlegt wurde, verdient ein Fall Erwähnung, wo die Patientin in ihren Anfällen von Präcordialangst über abnorme Sensationen der Zunge klagte, ihre volle Aufmerksamkeit darauf concentrirte und die Aerzte verleitete, den an mehreren Stellen allerdings hervortretenden Papillen eine wesentliche Bedeutung für das Krankheitsbild zuzuschreiben. Ihre im Uebrigen zusammenhängenden Reden bei den doch immer nur zeitweisen Besuchen des Haus- und consultirenden Arztes liessen die übrigen Erscheinungen psychischer Veränderung in den Hintergrund treten, obgleich Physiognomie, Blick, Färbung der Haut, Zustand der Ernährung, Theilnamlosigkeit gegen andere Verhältnisse wohl dazu berechtigt hätten, das Unwesentliche der so in den Vordergrund sich drängenden und muthmaasslich erst künstlich dazu angeregten Erscheinung zu documentiren. In der Anstalt trat sie nach mehreren Wochen in den Hintergrund, theils weil sie nicht besonders beachtet wurde, theils weil sich inzwischen die Gemüthserregung und -Erregbarkeit minderte. In einem andern Falle war die Grundlage der anfänglichen Melancholie, späteren Tobsucht, in einer circumscripten Anästhesie der Haut gefunden worden. Ein *Empl. cauthar.* bei dem Uebergange von jener zu dieser auf die betreffende Stelle gelegt ward als eine zauberhaft schnelle Beseitigung der Krankheit gerühmt und bewundert, bis nach einigen Tagen maniakalische Aeusserungen der Dankbarkeit gegen den betreffenden Arzt den raschen Erfolg in Zweifel stellten und die Hülfe der Krankenanstalt erforderlich machten. Es sei hierbei des Vortrages unseres verehrten Prof. *Jaksch* bei der Naturforscher - Versammlung in Carlsbad gedacht, der das Wesen der Geistesstörung in partiellen Analgesien suchte und, wenn der Ort derselben oft mühsam gefunden war, von überraschenden Heilungen berichten konnte.

Ein noch mehrstündiger geselliger Verkehr folgte der aufgehobenen Sitzung. Nächste am 15. Juni.

Bericht über die zweite südwestdeutsche Localversammlung von Irrenärzten in Heidelberg.

Zu der von Dr. *Dick* berufenen Localversammlung hatten am 3. und 4. Mai sich folgende Collegen eingefunden:

Dr. *Brenzinger* von Pforzheim, Dr. *Brosius* von Bendorf, Dr. *Cramer* von Solothurn, Dr. *Dick* von Klingenmünster, Dr. *Fischer* von Pforzheim, Dr. *Gräser* von Eichberg, Dr. *Gutsch* von Bruchsal, D. *Haeser* von Hofheim, Dr. *Kirn* von Illenau, Dr. *Landerer* jun. von Göppingen, Dr. *Loechner* von Klingenmünster, Dr. *Moos* von Heidelberg, Dr. *Neumann* von Illenau, Dr. *Reissner* von Hofheim, Dr. *Roller* sen. von

Digitized by Google

Illenau, Dr. *Rühle* von Cannstadt, Dr. *Schüle* von Illenau, Dr. *Sehrt* von Hofheim, Dr. *Stark* von Kennenburg, Dr. *Zeller* von Winnenthal, Dr. *A. Zeller* von Winnenthal.

Nach einer Begrüssung der Versammlung durch Dir. *Dick* wurde zur Wahl des Vorsitzenden geschritten und auf dessen Vorschlag Dr. *Gräser* dazu bestimmt. Zu Schriftführern wurden gewählt: Assistenzarzt *Landerer* von Göppingen und Hülfsarzt *Neumann* von Illenau.

Die I. Sitzung wurde eröffnet den 3. Mai, Nachmittags 3 Uhr, durch einen Vortrag von Dr. *Schüle*, Ueber eine Hemmungsbildung des Gehirns, den er anderweitig veröffentlichen wird*).

Dr. *Cramer* bemerkt einen analogen Fall aus der Schweiz, wo es sich auch nur um eine blossliegende Insel gehandelt haben könne.

Dr. *Stark*, Ueber Speichelfluss bei Geisteskranken ohne Localaffection.

Den Resultaten der Experimente von *Ludwig* und *Bernard*, wonach bei Reizung des *facialis* der Speichel dünn, schaumig, bei solcher des *sympathicus* derselbe dickflüssig, zähe werde, entspreche der Befund dreier Fälle seiner Beobachtung:

1) die durch eine *Trigeminus*-Neuralgie regelmässig eingeleitete Erregung eines Blödsinnigen war stets mit Production eines reichlichen, zähen, fadenziehenden Speichels verbunden;

2) ein melancholisches Mädchen mit Sexualleiden und Menstrualstörung producirte stets viel zähen Speichel;

3) ein Kranker mit *delir. acut.* litt an Speichelfluss und zwar producirte er dünnen, schaumigen Speichel. Die Section ergab eine Compression und Abplattung des *facialis* in der *med.*, linkerseits durch ein linksseitiges *aneurysma* der *a. vertebralis*.

Er sagt, bei dem Speichelfluss Geisteskranker und ohne Localaffection lässt sich aus der Beschaffenheit des Speichels ein Schluss auf die Erkrankung entsprechender Nervengebiete — *facial.* oder *trigeminus* — ziehen.

Dr. *Kirn* über periodische Psychosen.

Es gehe mit jeder psychischen Erregung allemal ein somatischer pathologischer Zustand einher, da sich in den verschiedensten Innervationsstörungen — Secretions-, Sensibilitäts-Ernährungsanomalien — Neuralgien besonders äussern können. Er weist besonders auf die dauernde Constanz in der Erscheinungsform hin, dass jeder folgende Anfall immer wieder das photographisch-treue Abbild des vorhergehenden gebe.

---

*) cf. Ztschrft. Heft 3. S. 300.

Digitized by Google

Zeller berichtet von einem Fall, wo in 7jährigen Perioden die Melancholie in ganz derselben Erscheinungsform sich immer wiederholte.

Gräser bezweifelt das constante Zusammentreffen von Neuralgie und Manie; die Neuralgie wird gewiss oft hineinexaminirt.

Cramer begrüsst die Illenauer Bestrebungen nach Präcision der Krankheitsformen, da man mit der alten Terminologie nicht zur genauen Erkenntniss komme.

Zeller bedauert, dass gewisse Bezeichnungen, Namen, die früheren Aerzten bedeutsam, wesentlich geschienen haben, jetzt obsolet geworden seien; er spricht von dem *metaschematismus*, der besonders bei hysteriformen Erkrankungen bei Einem und demselben Individuum oft zu constatiren sei; er erinnert dabei an den Einfluss der Erinnerung an früher gehabte Erkrankungen auf Neuentstehung eines analogen Leidens.

Schüle führt Erfahrungen aus Illenau an, die den Erörterungen von *Stark* entgegenstehen, dessen Schlüsse ihm nicht für alle Fälle zutreffend erscheinen.

An den Schluss der Sitzung, der gegen 6 Uhr erfolgte, reihte sich ein gemeinschaftlicher Spaziergang auf das Schloss.

Am 4. Mai, Morgens 9 Uhr, wurde durch Dr. *Gräser* die 2te Sitzung eröffnet.

Roller schlägt vor, im Herbst dieses Jahres eine zweite Versammlung in Stuttgart abzuhalten.

Dick meint dagegen, zu häufige Versammlungen verdünnen Inhalt und Zahl der Kommenden; auch der allgemeinen Versammlung in Insbruck würden wohl Mitglieder entzogen werden.

Nach längerer Debatte wird beschlossen, im Herbst dieses Jahres eine Versammlung in Stuttgart abzuhalten. Auf die Tages-Ordnung für dieselbe werden gesetzt: die Folie raisonante auf Vorschlag *Dick's*, und auf Vorschlag *Zeller's* in zweiter Linie die verminderte Zurechnungsfähigkeit; das Referat über diese übernimmt *Zeller*; das über jene *Schüle* von Illenau.

Auf der Tagesordnung für die 2te Sitzung referirt Dr. *Dick* über die Internationale Irrenstatistik.

Die Commission, die das Project zu einer internationalen Statistik ausarbeitete, in Paris bei Gelegenheit der Weltausstellung, will vor der definitiven Herausgabe desselben das Urtheil der Versammlung über dasselbe hören. Nun hat der Verein schweizerischer Irrenärzte unten stehende Abänderungsvorschläge des „Projet de Statistique" an die Pariser Commission einzusenden beschlossen.*)

*) Der Verein schweizerischer Irrenärzte hat in seiner Sitzung

Digitized by Google

Dick möchte Monomanie festgehalten haben mit 2 Unterformen: M. mit Exaltation und M. mit Depression; zweifelt an der Berech-

---

vom 8. März 1869 in Zürich folgende Abänderungsvorschläge des Projet de Statistique an die betreffende Commission einzusenden beschlossen.

Allgemeiner Theil. Formen der Seelenstörung.

I. Folie simple. 1. Mania. a. Mania acuta. b. Mania chronica. c. Mania periodica. d. Mania hysterica.

2. Melancholia. Lypemania. a. Melanch. simplex, vera. b. Melanch. activa s. agitans. c. Melanch. transitoria. d. Melanch. chronica. e. Melanch. cum stupore. f. Melanch. hypochondriaca.

3. Folie circulaire.

4. Monomanie in der Bedeutung unseres Wahnsinns als Uebergangsstadium in Verrücktheit.

5. Demence consecutive avec agitation et sans.

II. Delirium acutum.

III. Folie mit und aus Epilepsie.

IV. Folie senile.

V. Démence organique, d. h. Blödsinn aus Heerderkrankung des Gehirns.

VI. Folie paralytique.

VII. Idiotie, leichtere und schwerere Form.

VIII. Cretinisme, leichtere und schwerere Form.

IX. Formes mal déterminées. Autres formes.

X. Delirium tremens.

XI. Délire des maladies aigues. Délire traumatique.

XII. Epilepsie sans alienation mentale.

Tab. I. Zur Rubrik der Entlassenen gehört als Ergänzung „ungebessert entlassen.“ Unter ungebessert verstehen wir den Zustand, wenn ein Kranker in demselben Stadium der Krankheit entlassen wird, in dem er Aufnahme fand oder in einem noch tiefern.

Tab. II. Angenommen. Tab. III. Gestrichen. Tab. IV. Ergänzt mit der Rubrik „Geschieden.“ Tab. V—VII. Unverändert angenommen. Tab. VIII. Gestrichen. Tab. IX. Unter „directer Erblichkeit“ möchten wir nur die Fälle verstehen, bei denen Geisteskrankheit des Vaters, der Mutter oder der Grosseltern vorausging.

Ihr gegenüber stellen wir die „indirecte“, wenn Geisteskrankheit bei Onkel oder Tante vorausging. Weitere Verwandtschaftsgrade sollen nicht berücksichtigt werden.

Nach der Erblichkeit folgt „individuelle Anlage.“ Diese ist: a. Angeboren. b. Erworben. Sonst unveränderte Annahme.

Digitized by Google

tigung des *delir. acutum* als einer typischen Form; vermisst in den Schweizer Vorschlägen zwei entschieden typische Formen: 1) primären Blödsinn; 2) einfache Verwirrtheit, wie solche primär, heilbar, ohne prononcirte Stimmung erscheint. Hauptfehler der Tabelle sei auch, dass Idiotie und Cretinismus in ihnen auch mitlaufe, was doch ein eigenes Gebiet sei, getrennt von dem der psychischen Krankheitsformen, eigene Bearbeiter erfordernd. Weiter solle man nur nicht die Ausfüllung der Tabellen für jedes Jahr verlangen; nur nach

---

Tab. X. angenommen. Tab. XI. Ergänzt mit der Rubrik „Sectirer, Dissidenten." Tab. XII—XIV. angenommen. Tab. XV. ergänzt mit: a. Alter der Rückfälligen. b. Bildungsgrad. c. Eheliche Verhältnisse. d. Vermögensverhältnisse. 1) bemittelte. 2) unbemittelte. 3) unterstützt. e. Dauer der Behandlung der früheren Anfälle.

Tab. XVI—XVIII. angenommen. Tab. XIX. gestrichen. Tab. XX. angenommen.

Die die „Geheilten" betreffenden Tabellen wünschen wir vermehrt mit folgenden Rubriken: 1) Bildungsgrad der Geheilten; 2) Vermögensverhältnisse; 3) Stand.

Tab. XXI—XXIII. angenommen.

Die die „Gestorbenen" betreffenden Tabellen wünschen wir vermehrt mit: „Krankheitsdauer der Gestorbenen", d. h. Dauer der Psychose vor und nach der Aufnahme in die Anstalt.

Tab. XXIV. und XXV. ergänzt mit: „Infectionskrankheiten." Tab. XXVI—XXVIII. angenommen. Tab. XXIX. Statt der langen Tabelle nur: Arbeiter, productive und unproductive. Nicht-Arbeiter, Arbeitsverweigerer und unfähig zum Arbeiten.

Die medicinisch - statistischen Tabellen sollen vermehrt werden mit einer Tabelle der mit mechan. Zwang Behandelten. a. Ursache der Anwendung des mechan. Zwangs. b. Art des Zwangs: Jacke, Handschuhe, Gürtel. c. Dauer der Anwendung.

Die administrativen Tabellen mit folgenden Rubriken zu ergänzen: 1) Staats- oder Privat-, Heil- oder Pflege-Anstalt (gemischte); 2) Zahl des ärztlichen und des Wartpersonals; 3) Angabe des zur Anstalt gehörigen Territoriums in Gärten, Gütern, Liegenschaften. 4) Einnahmen: a. aus Capitalien, b. aus Liegenschaften, c. aus Kostgeldern, d. aus Arbeitserträgnissen der Kranken. 5) Staatsbeitrag. 6) Ausgaben. 7) Kosten eines Kranken im Allgemeinen. 8) Kosten eines Kranken nach Abzug der Verpflegungstaxe.

NB. Es soll am Aussenrande jeder Tabelle ein zweifingerbreiter Rand für Bemerkungen freigelassen werden.

Alles Uebrige angenommen.

Digitized by Google

bestimmten grösseren Zeiträumen solle man uns die Bearbeitung der Tabellen auflegen.

Nach längerer Debatte beschliesst die Versammlnng, die Schweizer Vorschläge für Tab. I. en bloc anzunehmen, für die Entlassungen die Rubriken: gebessert, ungebessert, geheilt, festzusetzen und Selbstmord unter die Rubrik: Todesarten, hereinzunehmen.

Tabelle II. nach dem Schweizer Vorgang angenommen, mit Statuirung der Unheilbarkeit nach wenigstens 3jähriger Dauer.

Tabelle III. wird gestrichen.

Tabelle IV. nach dem Schweizer Vorschag angenommen.

Tabelle V., VI. und VII. werden angenommen.

Tabelle VIII. wird gestrichen.

Tabelle IX. nach den Schweizer Vorschlägen angenommen mit Statuirung der erblichen Anlage: 1) durch Geisteskrankheiten; 2) durch Neurosen; 3) durch Familieneigenthümlichkeiten. Eine Trennung der individuellen Anlage in Unterarten wird verworfen.

Tabelle X. wird angenommen; womöglich Angabe der Procente zur Gesammtpopulation.

Tabelle XI. acceptirt nach der Schweizer Fassung.

Tabelle XII. bis XIV. werden angenommen.

Tabelle XV. in der Schweizer Fassung acceptirt; unter ehelichen Verhältnissen sind Civilstandsverhältnisse gemeint.

Sämmtliche Tabellen bis Schluss werden nach den Schweizerischen Vorschlägen auf Antrag *Dick's* en bloc angenommen.

Schluss der Versammlung um 1 Uhr.

Dr. *G. Landerer* in Göppingen, Secretair.

Digitized by Google

Kleinere Mittheilungen.

Gesetzliche Bestimmungen in Frankreich und England. — Amer. Journ. of Ins. Nr. 3. und 4. Vol. XXIII. enthalten vorzugsweise Referate der Ansichten *Falret's* über Moral insanity. Zugleich werden mehrere Fälle von Geistesstörung zweifelhafter Natur mitgetheilt und über die verkehrte Art richterlicher Beurtheilung Klage geführt. Es heisst in den betreffenden Artikeln:

Die beiden vorliegenden Criminalprocesse werfen ein trauriges Licht auf die gesetzlichen Bestimmungen über die Strafbarkeit Geisteskranker.

Der Richter habe in seinem Resumé die Jury darauf aufmerksam zu machen, dass für ihre Beurtheilung es einzig und allein auf die Frage ankomme, ob der Betreffende sich seines Verbrechens als solchen bewusst sei, oder nicht. Solle ein Geisteskranker von den gesetzmässigen Folgen seines Verbrechens befreit werden, so müsse der bündigste Nachweis geliefert werden, dass sein Geisteszustand zur Zeit der That ihn unfähig machte, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Liesse man dies ausser Acht, so trete vollständige Gesetzlosigkeit ein. Aerzte hätten oft Theorien über Geistesstörung, die die ganze menschliche Gesellschaft zu Grunde richten würden, wenn sie zur Geltung kämen. Wie wäre es möglich, dass Aerzte ein bestimmtes Urtheil abgeben könnten, wenn sie einen solchen Kranken 2 oder 3 Mal gesehen und gesprochen hätten, ja wie wäre es möglich, dass sie behaupten könnten, der Betreffende sei schon vor 4 Monaten geisteskrank gewesen?"

Unter dem Eindrucke solcher Darstellung erkannte die Jury die Angeklagten für schuldig und verurtheilte sie zum Tode.

Die Verurtheilung wurde vollstreckt.

In England und Amerika sind dieselben Gesetze, wie im 17ten Jahrhundert, noch geltend.

Digitized by Google

Hale, der grosse englische Jurist, nach dessen Grundsätzen bis zum heutigen Tage in England gerichtet wird, sagt kurz gefasst Folgendes:

Die Geistesstörung sei entweder partiell oder allgemein. Verbrechen, die in den sog. lucidis interval. begangen werden, sind strafbar, und überhaupt entschuldigt Geistesstörung nur dann, wenn sie in einem so hohen Grade vorhanden ist, dass der Betreffende nicht mehr weiss, ob er gegen das Gesetz handelt oder nicht. Melancholie, sagt er ferner, ist eine partielle Störung und schliesst die Unzurechnungsfähigkeit nicht aus; hat ein Geisteskranker noch den Verstand eines normal entwickelten 14jährigen Kindes, so ist er als zurechnungsfähig zu betrachten.

Die amerikanischen Aerzte beklagen, dass in unseren Zeiten noch solche Ansichten herrschen können, warnen aber entschieden vor der Einmischung der Aerzte in diese Angelegenheit, und zwar aus dem Grunde (?), weil dann leicht alle Verbrechen für unschuldig erklärt werden könnten (!). Die Frage über Zurechnungsfähigkeit in Fällen von Geistesstörung sei keine Frage, die man an dem Lichte psychologischer Theorien zu beantworten im Stande sei, sie sei eine rein praktische Frage und als solche müsste man sie der Jury zur Entscheidung überlassen, ohne sich an gesetzliche Bestimmungen oder an ärztliche Abstractionen zu kehren.

Dr. *Hasse.*

Ueber die Beziehung und Stellung des Mondes und seiner Phasen zu Geisteskrankheit und Epilepsie — hat Prof. *Cesare Lombroso* nochmals ein Jahr lang sorgfältige Beobachtungen anstellen und das Ergebniss derselben in der Riv. clin. von 1868 niederlegen zu sollen geglaubt; von beiden findet der, welcher sich noch dafür interessirt, einen sehr genauen Abriss in *Schmidt's* Jahrb. Jahrg. 1869, Nr. 1, S. 82, obgleich der Ref. selbst mit Recht die Mühe für eine sehr unfruchtbare und das von dem Verf. als ein bedeutendes begrüsste Resultat als ein irrthümliches betrachtet. Dass man in unserer schreibseligen Zeit nicht Alles gelesen und im Gedächtnisse haben kann, was über ein Thema, über welches man eben nachdenkt, bereits gedacht und geschrieben worden, ist wohl erklärlich; man würde sonst, je mehr man sich umsieht, um so mehr sich überzeugen, dass viel Neues in den alten Büchern steht, und der Vf. würde dabei gefunden haben, dass einer seiner deutschen Collegen die gleiche Materie bereits bearbeitete und anscheinend fallen liess (s. *Koster*, im 16. Bde. dieser Ztschrft. Heft 4. und 6. und 18. Bd. 5. Heft). Man könnte daraus schliessen, dass wir auch in der Psy-

Digitized by Google

chiatrie noch immer in jenem Anfangsstadium der Wissenschaft stehen, welches durch die Unsicherheit, wohin die Beachtung ihre Aufmerksamkeit richten soll, gekennzeichnet ist. Auffallen kann es aber, dass der Vf. diesen Gegenstand beharrlicher Untersuchungen noch werth gefunden hat, nachdem er alles, was die exacte Naturforschung über den Einfluss des Mondes auf die Erde festzustellen vermochte, auf die wenigen Thatsachen beschränkt fand, die sich in dem Einfluss auf Ebbe und Fluth, der geringen Einwirkung auf die Magnetnadel und in der Einwirkung des von ihm reflectirten Lichtes auf die Silbersalze zeigen. Und doch hat der Vf. hierbei noch eine Art des Einflusses übersehen, auf welche Schreiber dieses bereits an einem anderen Orte aufmerksam gemacht hat und der zu seinem Thema in enger Beziehung steht: den Einfluss des Mondes auf die Beschaffenheit, — die Helle und Dunkelheit unserer Erdnächte. Hierin gerade und nur hierin wird die Ursache der nicht wegzuläugnenden Erscheinung zu suchen sein, dass sich die Exacerbation der Exaltationszustände bei Geisteskranken sehr oft und zuweilen bei Epileptischen die Krampfanfälle um die Zeit des Vollmonds häufen. Selbst der gesunde Mensch schläft bekanntlich unruhiger und loser bei künstlichem und bei Mondlicht, wie viel mehr muss dies nicht den Schlaf bei einem Menschen beunruhigen, dessen ganzes Nervensystem sich dauernd in krankhafter Erregbarkeit befindet. Oft habe ich diese Vollmondparoxysmen allein durch Abhaltung des Mondlichtes mittelst dichter Verschliessung der Fenster abzuwehren vermocht. Auch habe ich dort der Beobachtung an einem Epileptischen erwähnt, der wegen gleichzeitiger heftiger Tobsucht in einer Zelle isolirt werden musste; zufällig war eine solche gewählt, die ihrer Lage wegen selbst am Tage nur mässig erhellt war. Trat dieser Kranke nach Beruhigung des Paroxysmus in den Corridor hinaus, so wurde er in dem Augenblicke von einem epileptischen Anfalle ergriffen, da er sich gegen das helle Fenster des Corridors wendete. *Fl.*

Ländliche Colonie Zschadras bei Colditz im Königr. Sachsen. — Sie ist in Deutschland die zweite, mit arbeitskräftigen ruhigen Geisteskranken bevölkerte landwirthschaftliche Einrichtung, nachdem zuerst die Heil- und Eflege-Anstalt zu Hildesheim sich mit einer solchen (Einum) versehen und dieser Versuch sich bereits seit mehreren Jahren bewährt hat. Eine Beschreibung der ersteren, nach Entstehung, Umfang u. s. w., hat Dr. *Voppel*, Director der Landes-Anstalt zu Colditz, in der Ztschrft.: „Irrenfreund" (1868 Nr. 11. und 12.) niedergelegt. Ihm gelang es, im Auftrage seiner Behörde, in

Digitized by Google

unmittelbarer Nähe der Anstalt, auf 20 Minuten Entfernung, ein kleines und ein grösseres Landgut, mit einem Gesammt-Areal von 66 Acker (1 Acker = 2½ preuss. Morgen) zum Preise von 38,000 Thlr. zu acquiriren. Hier hofft derselbe die ursprünglich von ihm dafür in Aussicht genommenen 10 pCt. der Anstalts-Bevölkerung unterzubringen, — also mit Verdoppelung der anderwärts angenommnnen Verhältniss-Zahl der hiezu geeigneten Kranken: ohne Zweifel, weil die Nähe der Anstalt keine zu grosse Aengstlichkeit bei der Auswahl gebietet, da sich ungeeignete Kranke leicht und schnell in jene zurückversetzen lassen. Dennoch wird auf die Unterbringung von etwa 70 Kranken zu rechnen sein, die hier vorzugsweise mit ländlichen Arbeiten beschäftigt werden sollen. Diese Nähe gestattet auch, die Beköstigung der Kranken von der Anstalt aus zu beschaffen. — Asyle, deren Insassen sich hauptsächlich aus einer ländlichen Bevölkerung recrutiren, werden wohl thun, jede Gelegenheit zur Nachahmung dieses Vorgangs zu suchen und zu benutzen, besonders wenn ihnen nicht an sich ein bedeutendes Areal für Beschäftigung mit landwirthschaftlichen Arbeiten zur Verfügung steht. Aber auch solche, die in diesem Besitze sind, werden auf diese Weise eine Verbesserung gewinnen. Nicht als ob sich dabei eine grosse Ermässigung der Verpflegungskosten erwarten liesse: denn eine solche scheint auch dieser neueste wohlgelungene Versuch nicht zu versprechen, da zu den Betriebskosten die Zinsen des Kauf-Capitals hinzukommen. Dagegen wird allerdings die jetzt so nachdrücklich und sogar geflissentlich betonte Forderung: dem individuellen Freiheitsbedürfnisse der Kranken alle irgend zulässige Befriedigung zu gewähren, auf diesem Wege genügt werden, und es kann die unveränderte Dichtigkeit der Anstaltsbevölkerung auch das physische Wohl der Kranken wenigstens auf so lange fördern, als die Ueberfüllung der Central-Anstalt nicht von Neuem eintritt, was sicherlich selten ausbleiben wird. Auf diesen Gewinn legt Herr Dir. *Voppel* den hauptsächlichsten Werth. Fl.

Wechselfieber im Wochenbette — consecutives Kindbetterinfieber — Heilung. (El Siglo medico Nr. 699, 1867.) — *E.* trat am 31sten April in das Gebärhaus von Madrid ein. Sie war 22 Jahre alt, ledig, Erstgebärende, nervöser, delikater Constitution, übrigens gut gebaut. Sie hatte ihre Regeln im 16. Jahre bekommen, blieb aber immer schlecht menstruirt, sowohl in Betreff der Quantität als auch der Qualität des Menstrualblutes, — es verliefen stets lange Zwischenräume bis sie wieder einmal menstruirte, mit einem Worte, sie war chlorotisch. Als sich ihre Schwangerschaft mit Sicherheit heraus-

Digitized by Google

stellte, waren bereits 16 Monate verlaufen, ohne dass sie menstruirte. Als sie ins Gebärhaus kam, klagte sie über Müdigkeit, Beschwerde im Gehen oder beim Treppensteigen, Herzklopfen, Magenweh, schlechte Verdauung, Oedem der Fussknöchel, hatte gedunsenes Gesicht — lauter Zeichen, die hinlänglich für anämischen oder hydrämischen Zustand sprachen. Am 20. Mai kam sie mit einem lebenden kräftigen Mädchen nieder, dessen Zustand durchaus nicht dem der Mutter entsprach. Die drei ersten Tage nach der Geburt verliefen ganz regelmässig; allein am vierten Tage störte den Verlauf des Wochenbetts in Folge von Ueberladung mit Orangen, ein eintägiges Wechselfieber, deutlich charakterisirt durch seine drei Stadien der Kälte, der Hitze und des Schweisses mit darauf folgender Apyrexie. Der dritte Anfall endete mit Uebergang in ein continuirliches Fieber, das vollkommen den Charakter einer *febris puerperalis* annahm. Der Frost, welcher dem dritten Anfalle vorausging, war intensiver und dauernder, continuirlich, nicht intermittirend, sondern mit deutlicher Fieber-Reaction bei frequentem, kleinem, unterdrückbarem Pulse, feuchter Hitze, Blässe und Entstellung des Gesichtes, mit leichter Röthung der Wangengegend, traurigem Gesichte, eingesunkenen, mit blauen Ringen umgebenen Augen, flottirenden Nasenflügeln, keuchende, häufige Respiration, synchronisch mit dem Pulsschlage, Gleichgültigkeit gegen ihren Zustand, Sinken der Kräfte, bedeutende Verminderung des Lochienflusses ohne völlige Unterdrückung. Letzterer nahm dabei noch einen widerlicheren Geruch an, als der gewöhnliche schon an und für sich hat, endlich leichte Fieberremission von 8 bis 11 Uhr Morgens, wo die Verschlimmerung eintrat. Während der Remission verminderte sich der Durst, sowie auch die Hitze; die Zunge blieb immer feucht, breit und war mit einem weisslichen Belage bedeckt. Nebenbei bestand seit dem vierten Tage leichter galliger Durchfall, der stets mässig blieb. Verordnet wurden Reisschleim mit Gerstenwasser — 8 Gr. *Sulph. chinin.* in zwei Dosen von 4 Uhr Morgens bis 10 Uhr z. n. Am zweiten Tage dieser ärztlichen Behandlung waren die Anfälle stärker und ausgesprochener, doch waren die Remissionen erkennbarer — weitere drei Dosen des Chinin-Salzes in gleichem Zeitraume, die folgende Fieberbewegung war weniger intensiv und andauernd, — die Remission länger. Die Verordnung ging fort zu antitypischem und neurosthenischen Zwecke. Am sechsten Tage blieb das Fieber ganz aus, die Kranke was reconvalescent und verlangte am 7. Juni ihre Entlassung, um sich zu Hause noch vollends zu erholen.

Epicrise. Es beweist dieser Fall, dass Menstruation keine conditio sine qua non zur Conception sei und zur völligen Fecun-

Digitized by Google

dation. Nebenbei drängt sich die Frage vor, ob lymphatische Temperamente, delikate Constitutionen, Bleichsucht, ein anämisch-hydrämischer Zustand während der Gestation überhaupt, ob physiologische oder pathologische Bedingungen, welche den materiellen Säftezustand einer Schwangeren verarmen machen, zum Kindbettfieber prädisponiren? Wir getrauen uns nicht, die Frage positiv zu entscheiden, glauben aber sicher, dass derartige Individuen zu gewissen Puerperal-Krankheiten, wie z. B. leucophlegmasia alba dolens, zur Ansteckung bei contagiösen Kindbettfiebern und zu Neuro-Typosen prädisponirt sind, ja dass sich im vorliegenden Falle genannte Zustände combiniren können.

Der Metritis intermittens puerperalis, der febris intermittens puerperalis, metrotyposis puerperarum, metrophlebitis puerperarum intermittens, des intermittirenden Kindbettfiebers etc. erwähnen die Compendienschreiber und haben sie mit pathologisch-therapeutischem Zubehör in die nosologischen Bahnen aufgenommen und die Nosologen haben ihnen Familienrechte zugestanden, Monographen der intermittentes haben sie in historisch-geographischem Zusammenhange aufgeführt, ihre unwiderlegbaren Ansprüche haben jedoch die Casuistik sicher gestellt. Wir haben versucht in einer kleinen Epicrise über voranstehenden Fall die practische Seite dieser Krankheit hervorzuheben. Den ersten sicheren Fall haben wir bei *Gregor Horst* gefunden, in dessen Observ. XIII. Tertiana notha in puerpera, tandem in ventris tumorem et abscessum circa inguina desinens l. l. p. 6. 1625. *Georg Wolfgang Wedel* giebt folgenden Fall: Eine Adelige abortirte im Sommer 1670 und verfiel noch während der Lochien in eine tertiana, deren Paroxysmen bald anticipirten, bald postponirten. Sie begannen mit Schüttelfrost, Rückenschmerzen, Hüsteln und häufigen Eructationen. Während der Hitzperiode zeigte sich schmerzhafter Druck im Unterleibe, convulsive Bewegungen im Kopfe, am Kinne, in den Extremitäten, dabei Irrereden und Lipothymien. Der Anfall dauerte 8 Stunden, worauf die Kranke sich wieder ganz wohl befand. Sie wurde durch Abführ-, Fieber- und Uterin-Mittel geheilt. *J. B. Cortesius* erzählt (Misc. med. Decad. II. Messan. 1625. 2° X.) eine febris tertiana puerperae funesta.

Richard Morton hat folgende Beobachtung aufgezeichnet: Dieselbe betraf die Frau des Kaufmann *Thornburg*, die drei Tage nach ihrer Entbindung von schmerzhaften Krämpfen und so heftigen Erbrechen befallen wurde, ut longuore ac suffocatione inde confecta, illico animam efflatura videretur. Aegra summe languebat, madore frigido perfundebatur, strangulatione fere suffocabatur, totum abdomen diris doloribus torquebatur, urina vero multum tincta et con-

Digitized by Google

tentis saturata, . . unde febrile fermentum sub horum symptomatum larva detitescere suspicabar. Laudanum und China stellten die Kranke wieder her.

Ferrari giebt (in *Torti's* therap. special libr. IV. c. I.) einen Fall an: *A. Bucciolani* wurde in den ersten Schwangerschafts-Monaten von Intermittens befallen und durch China geheilt. Kurz nach ihrer Entbindung trat das Fieber wieder ein und mit ihm blieben die Lochien aus. Die Rinde stellte den Lochienfluss und die Kranke wieder her.

Einen Fall von schnell durch China geheilten Puerperal-Wechselfieber theilt auch *Schellhammer* mit.

Strack berichtet: Drei Tage nach der Niederkunft bekam im September 1752 eine 38 Jahre alte Frau Bangigkeit, schweren Athem und Furcht. Diese Zufälle schienen von eingetretener Milch herzurühren. Nach einigen Tagen wieder Bangigkeit, Schrecken, Zuschnüren des Halses, heller, wässriger Urin. Die Zufälle wurden noch übler bei reichlichem Wochenflusse. Bei diesen Zufällen hatte die Kranke Ekel vor Fleisch, bittern Mund, copiösen Schweiss. Der Urin machte nach den Anfällen röthlichen Bodensatz. Die Rinde stellte die Kranke her.

J. Schlegel bringt in *G. Schlegel's* Materialien etc. 4. Sammlg. Jena 1804 einen Fall von intermittirendem Kindbettfieber, das zuerst täglich 5 Anfälle machte und dann in tertiana überging. Während der Frostperiode kam gar kein Ausfluss aus den Genitalien, zur Zeit der Hitze etwas wässriger, während des Schweisses dagegen schleimiger.

Jac. Grainger erzählt von der Holländer Herbstfieber-Epidemie aus dem Jahre 1748, dass bei einer Wöchnerin, welche am Wechselfieber litt, nach unterdrückten Lochien leucophlegmasia hinterblieb.

Max Stell will in Ungarn Kindbetterinnen vor anderen an galligten, remittirenden und intermittirenden Fieber leidend gesehen haben. In T. II. s. ratio medend. cap. IX. p. 60 sagt er sub febr. puerperal. Unam alteramve loculentior febris agressa est, quae remitit. primo, dein etiam intermisit.

Wochenwechselfieber, — oder kaltes Kindbetterinfieber bespricht auch *Ostian*, der in seinen Beobachtungen, welche vorzüglich Krankheiten der Frauenzimmer betreffen (Tübingen 1787, S. 2). Auch lesen wir von einem bösartigen Wechselfieber bei einer Kindbetterin durch grosse Gaben von China geheilt. Durch *Jos. Kämpf* in *Struve's* Triumpf der Heilkunst. 2. Bd. II. S. 3.

Doublet spricht in seinem Werke über Kindbettfieber gleichfalls

Digitized by Google

von Wechselfiebern, welche zu Vaugirard häufig bei Wöchnerinnen vorkamen. Nach *Nadherni* kamen 1818 im Leitmerizer Kreis Böhmens Quotidianfieber bei Wöchnerinnen vor. (Beobacht. und Abhdlg. österr. Aerzte. Bd. 5. Wien 1825). Auch *Hachmann* theilt mit, dass in der Ritzebüttler Epidemie vom Jahre 1826 die Wöchnerinnen häufig vom herrschenden Sommerfieber heimgesucht worden. Ebenso wurden in der Ettenheimer vom Jahre 1824/25 nach *Schneider's* Angabe 3 Wöchnerinnen vom Fieber ergriffen. Endlich im Jahre 1827, während der Epidemie, die in Frankenthal und Umgegend herrschte, erkrankten die Wöchnerinnen am Wechselfieber (vergl. *André* Geographie Rheinbayerns).

Rud. Fischer zu Fulnek in Mähren beobachtete ein merkwürdiges Puerperalfieber, complicirt mit encephalitis, oophoritis, phlegmasia alba dolens (Oesterr. Jahrb. 1841.)

Sehr werthvolle Mittheilungen machte ferner Prof. Dr. *Quadrat* zu Prag in der österr. Wochenschr. 1841, Nr. 30—31 vom wirklichen und scheinbaren Wechselfieber.

Ueber die intermittirenden Puerperalfieber bei kürzlich Entbundenen hat auch Dr. *Bossu* Fälle angegeben (Journ. des connaiss. medico-chirurgic. Juni 1843).

Zwei Fälle intermittirenden Puerperalfiebers von *Canuto* zu Cotignola beobachtet, nahm die Gaz. méd. de Paris 1838, p. 232 aus dem Bullet. delle Science med. di Bologna auf. Ausserdem gaben Beobachtungen *Brera* in Annotaz. di med. pract. Vol. II. cap. I. spec. 2, dann *Puccinotti* in s. storia delle febbri intermittent. Vol. I. p. IV. cap. 11 u. s. w.

Cederschjöld's Bericht aus dem Gebärhause von Stockholm (Bd. 11. 1827 und Bd. 12. 1832) brachte ähnliches, — endlich kamen bei der Wechselfieber-Epidemie in Kiew, welche *Brshesinsky* beobachtete, einige Fälle von febris intermittens puerperarum anticipans vor.

Erwägt man, dass Schwangerschaft und Entbindung eigenthümliche Zustände und Acte im weiblichen Organismus sind, — dass das hierbei betheiligte Organ während und nach der Geburt in ganz besondere Phasen organischer Veränderung gezogen wird, so begreift man leicht, dass die intermittirende metritis puerperarum gegen die vulgaris wesentliche Modificationen bieten müsse. Erstens ist das Circulationsverhältniss ein wesentlich verschiedenes, indem sich zur Ernährung der Frucht ein eigenthümliches Zwischenorgan, die Placenta, angelegert hat, welche nach ihrer Austreibung eine besondere Rückbildung im Unterleib- und Beckengefäss-Systeme bedingt. Wir stossen auf ganz ungewöhnlichen Venenreichthum und grosse

Digitized by Google

Blutansammlung. Der Lochienfluss hat die physiologische Bedeutung, das vorige Verhältniss wieder herzustellen. Der Uterus selbst wurde zweitens zur Durchmachung der Schwangerschaftsperiode, Austreibung der Frucht durch und durch organisch verändert: sein Volumen nimmt zu, seine Wandungen verdicken sich, — seine Muskeln gelangen zu ungewöhnlicher Entwickelung, um zu kräftigen Contractionen befähigt zu werden, seine Schleimhäute verdicken sich, um durch gesteigerte Secretionen den Blutreichthum, nachdem er zur Ernährung der Frucht überflüssig geworden, ableiten zu helfen. Alle diese Zustände, von ursprünglich physiologischer Bedeutung, sind ganz geeignet, unter Einwirkung schädlicher Einflüsse, pathologisches Gepräge anzunehmen und pathische Theilnahme in benachbarten Regionen zu erregen, wodurch sich der Krankheitsheerd weiter ausdehnt, als bei metritis etc. vulgaris; dass bei so tiefen Eingriffen in das Gefässleben des weiblichen Organismus die Gesammtheit desselben zu Fieberbewegungen aufgefordert wird, ist von selbst in die Augen fallend, und der Kreis der Local- und Fieber-Symptome muss sich nothwendig bedeutend erweitern. Dieser organisch-physiologisch veränderte Zustand der Gebärmutter ist es nun, welcher hier bei der metrit. interm. puerp. die Resultate der Nosogenese modificirt, während letztere selbst in ihrem primären Grunde mit jener der vulgaris zusammenfällt. Wegen des erhöhten Muskellebens im Uterus ist auch das Rückenmark in den Sacralnerven zu höherem Einfluss gehoben (die Geburt selbst ist excitomotorischer Act). Der Hauptsitz der Krankheit bildet die innere Uterin-Schleimhaut die Peritonealumhüllungen mit Einschluss der annexen Tuben, Ovarien etc. . . er verbreitet sich auch auf weitere Regionen des Bauchfells, die Intestinalschleimhaut, den unteren Theil des Rückenmarks, auch auf Brust und Gehirn, was um so erklärlicher wird, wenn man die Vorgänge beim Lactationsgeschäfte in Anschlag bringt.

Die Anfälle in regelmässigen Typen werden vermittelt durch die genau typischen elektro-lytischen Entladungen auf die interessirten Localitäten, vermöge deren vasomotorischen, trophischen und motorischen Nerven-Radien. So ist hinlänglich klar, wie gleichzeitig vaskulöse und neurotische Thätigkeiten in ganz regelmässigen Intervallen intermittiren können; denn zur neurotypischen Ansammlung und Entladung wird biologisch genau gleiches Zeitmaass erheischt.

Ullersperger.

Ueber Irrenpflege in Frankreich. — *Bouchard* berichtigt die falschen Aeusserungen, die von Zeitungen und von Richtern gegen die Psychiatrie und ihre Vertreter ausgestossen werden, die allenthalben

Digitized by Google

die gesetzlichen Bestimmungen und besonders das Gesetz von 1838 übertreten sehen, die fürchten, dass jeder Angeklagte für geisteskrank erklärt werde u. s. f. Zuzugeben sei allerdings, dass die ärztlichen Gutachten oft ohne Sachkenntniss abgefasst seien, denn von fünfzig Aerzten sei nur einer ein durchgebildeter Irrenarzt. Deshalb müsse der Staat Lehrstühle für Psychiatrie errichten und den Studirenden Zutritt zu den Anstalten gewähren. Aber damit seien die Gegner nicht einverstanden, weil Vermehrung der Zahl wissenschaftlich gebildeter Irrenärzte die Gefahr vergrössere; einem einzigen Irrenarzte zu entwischen sei schon schwierig genug. Nach längerer Erörterung über die Frage: was ist Geisteskrankheit, schliesst Verf.: der Geisteskranke kann ein gefährlicher Mensch sein; aber vor Allem ist er ein kranker Mensch. Nach beiden Richtungen hin muss er ins Auge gefasst werden. Das gilt besonders von den auf dem Lande herumstreichenden Irren. Das Gefängniss passt nicht für gefährliche und unheilbare Irre; es wird für gefährliche und heilbare Irre verderblich sein, unausstehlich aber für ungefährliche Irre, heilbare wie unheilbare. Für die Unheilbaren sind Anstalten einzurichten, die zwischen Armenhäusern und Heil-Anstalten stehen, damit sie entsprechend, aber billiger gepflegt werden können, und den der Heilung günstigen Fällen nicht den Platz verkürzen. — Im Uebrigen ist für die Irren entweder das système famial oder syst. colonial oder syst. nosomial zu empfehlen. Mehr als ¾ der sequestrirten Irren (meist sich herumtreibende oder arme), sind auf Ansuchen öffentlicher Behörden übergeführt. Die Totalsumme der Geisteskranken betrug in Frankreich im Jahre 1861 84,214, nämlich 31,054 in Anstalten und 53,160 ausserhalb (darunter 41,000 Idioten und Cretins). Im Jahre 1851 kam 1 Irrer auf 796 Einwohner und im Jahre 1861 1 Irrer auf 444 Einwohner.

Gesetzliche Regelung des Irrenwesens ist nothwendig, denn das Gesetz von 1838 lässt eine Lücke und die Königl. Verfügung vom 18. Dec. 1839 ist von einem zu beschränkten Gesichtskreise aus gegeben. Verf. nimmt in Frankreich 103 Irren-Anstalten an (61 öffentliche, 42 private); von den öffentlichen gehört nur eine dem Staate (Charenton), 41 den Departements und 19 sind mit andern Krankenhäusern verbunden. 25 Anstalten gehören Privatleuten und 17 sind Eigenthum von relig. Genossenschaften. Verf. fordert für jedes Departement wenigstens eine öffentliche Anstalt..

1. Jan. 1835 waren in Irren-Anstalten 15,539 Geisteskranke,
1. - 1861 - - - 30,239 -

also 1835 kam 1 Irrer in Behandlung auf 3000 Einw.,
1861 - 1 - - - - 1200 -

Digitized by Google

1835 fanden 3947 Aufnahmen statt.
1860 - 10,785 - -

Aufgeregte Zeiten geben keine hervorragende Krankheitsursache ab, denn 1847 wurden 7686 in öffentlichen und Privatanstalten aufgenommen,

1848 . 7341,
1849 . 7536. Dagegen
1851 . 8593, und vollends
1852 . 9782.

1860 gab es in allen französischen Anstalten 4499 für heilbar gehaltene Individuen und 20,648 unheilbare (ausser Idioten). In einer grossen Zahl von Fällen ist die verzögerte Ueberführung der Kranken in die Anstalt von Seiten der Angehörigen an dem ungünstigen Verhältnisse Schuld. Deshalb geben viele Privat-Heilanstalten bessere Heil-Resultate, weil ihnen der intelligentere Theil der Bevölkerung die Kranken zuschickt.

1861 waren von 30,239 Geisteskranken 22,496 in öffentlichen und 7743 in Privat-Anstalten. — Nur der 5. Theil sämmtlicher Irren trägt die Kosten für seine Behandlung, und vier Fünftel werden ganz oder zum Theil vom Staate, Communen u. s. w. unterhalten. Und zwar kostet jeder Kranke täglich 70 Cent. bis 1 Fr. 85 Cent., und in St. Anne bei Paris wenigstens 1 Fr. 50 Cent. Der Satz von 70 Cent. gilt nur da, wo die Arbeit der Kranken mitbezahlen hilft, die für sie zugleich so sehr heilsam ist. Der jährliche Aufwand für die Irrenverpflegung beträgt nur wenig unter 9 Millionen und dazu geben die Familien wenig mehr als 550,000 Frcs. (*Bouchard, Ch.*, La question des aliénés et la loi de 1838. Gaz. hebd. 1868. Nr. 41. 43.) Dr. *Schroeter.*

Aus Brake, — Schriftstücke aus dem Jahre 1803 geben das erste Zeugniss, dass die Fürstin Paulina entschlossen war, ein Asyl für die unglücklichen Irren des Landes herzustellen. Ein Schreiben ihrer Hand beauftragt den obersten Medicinalbeamten und den Baumeister, den Plan in Erwägung zu ziehen, „die Burg zu Horn in eine Irrenanstalt zu verwandeln.“ Der Mangel eines Gartens lässt ihn fallen, wie auch noch einige andere Pläne, wovon die Acten erzählen. Der Rückfall des gräflichen Schlosses Brake nach dem Ableben der durchlauchtigen Aebtissin Gräfin Charlotte Clementine zur Lippe (18. Mai 1804) an das Fürstenhaus lenkt die Blicke der Fürstin auf dieses, und sofort wird darüber verhandelt, einen Flügel des Schlosses, das Marstallgebäude, das Orangeriehaus und die Gärtnerwohnung zu einer Irren-Anstalt einzurichten, wo fast

Digitized by Google

immer eigenhändige Schreiben der Fürstin die Iniative ergreifen und die „Ideen" an die Hand geben. Mit der Klärung der Ideen, Prüfung der Pläne, Arrondirung des Gebiets, Ausbau der Häuser, Anschaffung des Inventars, Anstellung der Beamten, Entwurf der Instructionen verstrichen nun mehrere Jahre; aber schon 1811, also mitten unter den Stürmen, die über das grosse Vaterland noch dahin brausen, ist das Kind geboren, die jetzige Anstalt, die Frucht des Geistes und des Herzens einer edlen Frau, dem Nichts fehlt, als der Name der Mutter, dass es Zeugniss gebe von einer ächt landesmütterlichen Liebesthat.

Also in erster Reihe waren es Häuser und Hof, Garten und Feld, was die Fürstin aus dem Ihrigen, aus dem landesherrlichen Vermögen, schenkte. Selbst die Erweiterung der Anstalt wurde vorgesehen und Bestimmungen erlassen, dass von den zur herrschaftlichen Justizbeamten-Wohnung vorläufig überwiesenen Baumhöfen, Garten- und Feldstücken des Schlosses Brake Weiteres zu dem Zwecke disponibel bleiben solle. — Den Anfang des Anstaltsfonds bildete eine Schenkung der durchlauchtigen Gräfin zur Lippe in Cleve (1600 Thlr.), der Erlös aus dem Inventar des Schlosses zu Brake, aus der Verpachtung der künftigen Anstalt überwiesenen Grundstücke und aus einer allgemeinen Landescollecte, die auf der Fürstin „Aufforderung und Bitte an alle guten und wohlthätigen Bewohner des Landes" vom 30. October 1803 ins Leben trat.

Der Ertrag dieser Collecte war ca. 2000 Thlr., die mit dem was die Fürstin selbst geschenkt hatte, die Einrichtung des Hauses deckte.

Um diese Zeit wurde von der Fürstin auch eine „Tontine" zum Besten der Anstalt ins Leben gerufen: die Ausgabe von hundert Actien à 50 Thaler mit jährlicher Ausloosung. Davon wurden einige wenige der Anstalt geschenkt, der Rest, nach vorausgegangener Ausloosung, 49 Stück, im Jahre 1821 aus dem bereits gebildeten Anstaltsfonds zurückbezahlt.

Später traf die Fürstin Bestimmungen, dass anderweites landesherrliches Vermögen, die Lippstädter Domanial Gefälle, für die Unterhaltung des Irrenhauses überwiesen und die Ueberschüsse derselben zu einem Fonds für die Anstalt gesammelt würden, der das Fortbestehen derselben ein für alle Mal auch bei voraussichtlicher Erweiterung sichere, ohne dass eine Besteuerung der Unterthanen eintrete. In diesem Sinne der Hohen Stifterin sind die Fonds der Anstalt vom Hohen Fürstenhause, unter Zurückweisung versucherischen Ansinnens von einflussreicher Seite her, gepflegt und ver-

Digitized by Google

waltet und kürzlich auch, dem Vernehmen nach, mit dem Vorbehalte von „Stiftungsfonds“ auf die Landkasse überwiesen.

Dieser Fonds hat es möglich gemacht, dass bis zum Jahre 1847 die Armen und weniger Bemittelten ganz unentgeltlich verpflegt wurden und an bedürftige Irren ausserhalb der Anstalt Unterstützungen bis zum Betrage von 300 Thlrn. im Jahre Gesammt-Summe des Aufwandes gezahlt werden konnten. Er hat es ferner ermöglicht, die zeitgemässen Reformen und Neubauten der Anstalt herzustellen, wie sie jetzt dastehen, und sichert noch heute die Fortexistenz der Anstalt ohne Zuschüsse der Landeskasse, also ohne Landessteuern, wenn die Verhältnisse nicht wesentlich sich ändern.

Mit wahrer Freude erfüllen die Kundgebungen der Fürstin in den Acten, wie dieselbe ihre Befriedigung und fortwährende Theilnahme an der Entwickelung des Instituts ausdrückt, die ersten Genesungen begrässt, und Einzelheiten der inneren Verwaltung wahrnimmt und fördert. Im Jahre 1818 wird die Trennung der Unheilbaren von den Heilbaren besprochen und 1820 steht eine getrennte Pflegeanstalt unter derselben Leitung und Verwaltung mit der nun isolirten Heilanstalt da, ein System, das erst viele Jahre später Wissenschaft und Praxis als das richtigste und bewährteste erklärten und einführten.

Während Waldeck, Bückeburg und andere Kleinstaaten heute noch keine Anstalt haben und ihre armen Irren contractlich Privatunternehmern zur Pflege gegen hohe Kosten überweisen, besitzt Lippe nun schon seit 58 Jahren eine auf die humansten Principien gegründete und organisirte Anstalt.

Es ist eine segensreiche Folge der einsichtsvollen und humanen Führung dieser Angelegenheit durch die Fürstin Paulina, dass von den Irren des Landes so viele (etwa $\frac{2}{3}$ sämmtlicher Irren) Verpflegung im Asyle finden. Nur wenige kleine Gemeinwesen (die freien Städte und Kreise der Rheinprovinz), übertreffen darin die hiesigen Verhältnisse, aber fast alle deutschen Anstalten haben weit höhere Verpflegungssätze, die für die Armen entweder aus der Staats- resp. Provincial-Casse oder durch Communalsteuer aufgebracht werden müssen.

Seit der Gründung der Anstalt sind bis zum 1. Januar d. J. 756 Kranke aufgenommen und verpflegt, 421 davon haben ihre Genesung und Besserung gefunden für immer. Häufige Recidive geben die unverhältnissmässige Summe. — Andern ist oft 30 bis 40 Jahre lang, durch Pflege und Wohnung im sichern Hafen das Unglück erleichtert. Ueber 120 befinden sich gegenwärtig noch in der Anstalt. (Lippe'scher Volksbote 1869. Nr. 8.) Dr. *M.*

Digitized by Google

Aus Hamburg. — Der Jahresbericht über die Verwaltung des Allg. Krankenhauses zu Hamburg vom Jahre 1868 ist von einem solchen über die Irrenanstalt Friedrichsberg und die in jenem ersteren noch verbliebene Irrenstation von deren Dirigenten, Herrn Dr. *Reye* begleitet. Während die letztere am Schlusse des Jahres noch einen Bestand von 90 männlichen und 168 weiblichen, zusammen 286 Kranke zählte, war der Bestand des seit vier Jahren der Benutzung übergebenen, ursprünglich für 240 Kranke bestimmten Asyl Friedrichsberg am 1. Jan. 1869 bereits auf 190 Männer und 184 Fr., zusammen 374 Kranke gestiegen, „womit die Anstalt wohl die äusserste Grenze ihrer Aufnahmsfähigkeit erreicht hat": — abermals ein Beweis, dass die Asyle, je besser eingerichtet, um so mehr das wirkliche Bedürfniss der Unterbringung von Kranken zu Tage treten lassen, und dass es sich daher stets straft, wenn dieses Bedürfniss von vorn herein zu enge bemessen worden ist. Indessen kommt hiebei in Betracht, dass der Ueberfüllung der Irrenstation des Allg. Krankenhauses durch Uebersiedelung einer beträchtlichen Anzahl Kranker nach Friedrichsberg abgeholfen werden musste. Der Bericht findet es daher dringend nöthig, demnächst für die Unterbringung derjenigen Irren, welche des kostspieligen Apparates eines guten Asyls nicht bedürfen, durch die Herstellung eines Siechenhauses Sorge zu tragen. Die Bewegung war demnach in beiden Abtheilungen eine sehr starke. Aus der Irrenstation wurden entlassen 95, 82 M. (die Mehrzahl an *Delir. trem.* leidend) und 13 Fr., gebessert 9, ungeheilt und transferirt 54 (42 M., 12 Fr.), und es starben 89. Diese Zahlen sind in der Gesammtsumme aller aus der Irrenstation und aus Friedrichsberg Entlassenen, welche der Bericht nicht scheidet, enthalten; sie beträgt 407, darunter 99 an *Delir. trem.* leidend. Davon waren genesen 53, gebessert 71, ungeheilt 71, gestorben 100. Tod durch Erhängen bei 2 langjährigen Pfleglingen. — Der Berichterstatter meldet, dass sich das vollständig durchgeführte zwanglose System dauernd bewährt hat und tritt ziemlich scharf gegen die Zweifler an der ausnahmslosen Anwendbarkeit desselben auf.

Ausgaben in Friedrichsberg 196,435 Mark, darunter Gehälter 13,178, Löhne 20,888, Nahrungsmittel 94,763, Wasser 1,987, Feuerung 13,831, Beleuchtung 6,919, Medicamente 1,185, Unterhaltung der Gebäude 12,561, Vergnügungen 2,483. Vom Bestande Ende 1868 374 (190 M. und 184 Fr.), wovon 1. Cl. 11 (6 M., 5 Fr.), 2. Cl. 26 (16 M. und 10 Fr.); 3. Cl. 18 (10 M., 8 Fr.); 4. Cl. 319 158 M., 161 Fr.), von den letzteren 255 unentgeltlich. Ausserdem

Digitized by Google

an Beamten 9 M. und 5 Fr., an Pflegepersonal 52 (28 M. und 24 Fr.), an Dienstboten 24 (15 M. 9 Fr.)

Fl.

Aerztlicher Bericht über die Irrenanstalt in Lübeck von 1864 bis 1868. S. 10.

Ohne No-restraint als Princip aufzustellen, hat Dr. *Eschenburg* doch seit 2 Jahren keine Zwangsmittel in Anwendung gebracht. Anfang 1864 war Bestand 56 (21 M., 32 Fr.), dazu kamen 1864 16 (10 M, 6 Fr.), 1865 20 (12 M., 8 Fr.), 1866 17 (6 M, 11 Fr.), 1867 23 (10 M., 13 Fr.), 1868 21 (12 M., 9 Fr.), in Summa 89 (46 M. und 43 Fr.). Entlassen genesen 21 (8 M. 13 Fr.), geb. 29 (11 M., 18 Fr.), ungeheilt 16 (14 M., 2 Fr.), gestorben 21 (12 M, 9 Fr.), an Selbstmord 1. Es blieben 58 (25 M. und 33 Fr.) als Bestand. Senator *Hach*, dem die Anstalt ihre Reorganisation verdankt, ist leider gestorben.

In Graz — verblieben von 1867 in der Anstalt für Steyermark 196 (94 M., 102 Fr.), aufgenommen 1868 110 (59 M., 51 Fr.), entlassen geheilt 37 (21 M., 16 Fr.), geb. 23 (6 M., 17 Fr.), ungeb. 2 (1 M., 1 Fr.), nach Anstalten 3 M., gest. 39 (24 M., 15 Fr.), blieb Ende 1868 202 (98 M., 104 Fr.). Hinzugefügt sind einige Fälle, wo das Erlöschen der Psychose wider Erwarten rasch erfolgte, und mikroskopische Befunde. Gerühmt wird, dass die Aufnahmsbewilligung ganz in die Hände des Directors gelegt ist. Ein Kranker wurde 63 Tage hindurch mit Sonde gefüttert. Augenblicklich leiden 3 M. und 1 Fr. an Sitophobie. Vom Restraint wird nur in den geringsten Fällen Gebrauch gemacht. Als Verf. 1847 bei *Conolly* war, musste ein Tobender von den Wärtern mit Schürzen und Handtüchern an Händen und Füssen gebunden nach der Isolirkammer befördert werden. (Jahresber. über die Landes-Irrenanstalt Steyermarks vom J. 1868. Von Dr. *Lang*. Graz, 1869. S. 22.)

Allerheiligen-Hospital in Breslau, Abth. für Geisteskranke — umfasst 6 Zimmer und 32 Isolirzellen mit 74 Betten und hat 1867 252 (155 M. und 97 Fr.) verpflegt. Aerztlicher Vorstand vom August an Prof. Dr. *Neumann*. Es litten an Melancholie 26 (15 M., 11 Fr.), geheilt entl. 6 (3 M, 3 Fr.), ungeh. entl. 13 (7 M., 6 Fr.), übertragen 7 (5 M., 2 Fr.); an Manie 61 (31 M., 30 Fr.), geh. 6 (4 M., 2 Fr.), ungeh. 31 (14 M., 17 Fr.), übertragen 24 (13 M., 11 Fr.); an Dementia 32 (14 M. 18 Fr.), entl. 19 (7 M., 12 Fr.), übertragen 13 (7 M., 6 Fr.), an Epil. mit Geisteszerrüttung 5 (1 M., 4 Fr.)

Digitized by Google

übertragen 3 W.; an Dem paral. 10 M., entl. 1 M., gest. 4 M., übertragen 5 M. (Stat. Ber. über d. Krankenhaus zu Allerh. in Breslau f. 1867. Breslau 1868.) *L.*

Aus den Berichten über die Irrenanstalten Dänemarks vom Jahre 1866. — 1) Heilanstalt Vordingborg auf Seeland für die Dänischen Inseln, von Professor *Jensen*. Bestand am 1. Januar 1866 138 (71 M., 67 Fr.); Zugang während des Jahres 1866 112 (43 M., 69 Fr.), behandelt während des Jahres 1866 250 (114 M., 136 Fr.), Abgang während des Jahres 1866 107 (51 M., 56 Fr.). Bestand ult. December 1866 143 (63 M., 80 Fr.).

Der Bevölkerungs-Zahl der dänischen Inseln entsprechend, waren Seeland vertreten mit 47,6 pCt, Fühnen 16,8 pCt., Lolland mit 6,8 pCt. — Das Hauptcontingent aller Neuaufgenommenen lieferten die Altersklassen 21—25 Jahre 33 pCt., demnächst von 36—40 Jahren 11 pCt, der bürgerlichen Stellung nach die dienende Classe und die kleinsten Grundbesitzer 18 pCt. — Der Krankheitsform nach waren bei den Neuaufgenommenen die Melancholie vertreten mit 52,6 pCt., die Manie mit 27,6 pCt., und zwar erstere vorwiegend, bei Weibern 59 pCt. gegen 41 pCt. bei Männern. — Von den 112 Neuaufgenommenen waren 8 Recidive früher geheilt Entlassener (7,1 pCt.), von diesen fast die doppelte Anzahl Weiber. — Es wurden geheilt von den anwesenden Kranken im Laufe des Jahres 21,6 pCt., es starben 6 pCt.

Wie in den meisten Heilanstalten ist auch hier der Zudrang der Weiber bei weitem stärker gewesen, als der der Männer, ein Umstand, der wohl darin seinen Grund haben muss, dass die Weiber überall leichter erkranken und ungleich schwerer in privaten Verhältnissen zu belassen sind, als die Männer, und dass man ferner aus falschem Vorurtheile sich leichter entschliesst, eine Frau der Heilanstalt zu übergeben, als einen Mann, um dessen amtliche resp. sociale Stellung nicht zu gefährden, so dass letztere meist erst als unheilbar den Anstalten zugeführt werden.

Bei der stets wachsenden Krankenzahl der höchstens auf 160 Plätze berechneten Anstalt ist die Direction derselben sehr eifrig, jedoch bis jetzt vergeblich bemüht gewesen, den bereits seit 1861 beabsichtigten Bau einer Pflegeanstalt in unmittelbarer Nähe der Heilanstalt bei dem Justizministerium weiter zu fördern und dieses auch besonders aus dem Grunde, weil die Communen sich bitter darüber beklagen, ihre sehr störenden und gemeingefährlichen Kranken nicht sogleich und oft überall nicht abliefern zu dürfen an die

Digitized by Google

Irrenanstalt, weil letztere als Heilanstalt Kranke mit keiner Aussicht auf Genesung, ihren Statuten gemäss, stets abweist

2) St. Hans Hospital, Heil- und Pflegeanstalt in Bidstrupgaard für die Commune Kopenhagen, von Prof. *Steenberg*.

Bestand am 1. Januar 1866 464 (195 M., 269 Fr.), Zugang während des Jahres 1866 152 (66 M., 86 Fr.), anwesend während des Jahres 1866 616 (261 M., 355 Fr.), Abgang während des Jahres 1866 106 (45 M., 61 Fr.), Bestand ult. December 1866 510 (216 M, 294 Fr.).

Mit der höchsten Ziffer stehen unter den Neuaufgenommenen die Altersclassen von 26—30 Jahren, demnächst von 36—40 Jahren, beide mit 13,8 pCt. Es waren erkrankt an Melancholie 37,5 pCt., an Manie 10,5 pCt. und waren unter diesen 15,1 pCt. Wiederaufnahmen, bei denen wiederum die Weiber in der doppelten Anzahl vertreten waren. — Unter den ätiologischen Momenten steht, wie überall, die Familienanlage obenan mit 23,4 pCt., demnächst kommt die Trunksucht mit 15,1 pCt. — Von allen Anwesenden waren 27,6 pCt. nicht zu beschäftigen, welche Ziffer bei den unheilbaren Weibern aber stieg bis auf 45 pCt. — Unheilbare störende Männer lassen sich ungleich leichter an eine bestimmte, mechanische Lebensweise gewöhnen als Weiber derselben Gattung, die durch ihre Turbulenz, ihre Widersetzlichkeit, ihre Streitsucht und ihr Schreien meist jede Schranke der Ordnung durchbrechen. — Es genasen von den Anwesenden in der Heilanstalt (dem Kurhause) 23,4 pCt., es starben von allen Anwesenden 5,8 pCt.

Diese ungünstige Heilungsziffer findet ihre Erklärung hauptsächlich in dem Umstande, dass sehr viele heilbare Fälle vor ihrer Genesung aus Bistrupgaard in die Anstalten von Jütland und die Inseln versetzt werden, weil sie, in der Residenz erkrankt, bis zur Eruirung ihrer Heimathsrechte in Bistrupgaard nur einen temporären Aufenthalt gefunden.

Wegen der stets wachsenden Krankenzahl sind auch für Bistrupgaard von der Direction bestimmte Vorschläge zu einer Verbesserung und gleichzeitigen Erweiterung der Anstalt bei dem Kopenhagener Magistrate eingereicht.

Ein grösseres Fest wurde am 1. August 1866 unter starker Betheiligung von Freunden in der Anstalt abgehalten, in Veranlassung des 100jährigen Bestehens des St. Hans Hospital, früher *Claudi Rosset*'s Stiftelse.

3) Heil- und Pflege-Anstalt Aarhuus für Jütland, von Professor *Selmer*.

Bestand am 1. Januar 1866 375 (194 M., 181 Fr.), Zugang wäh-

Digitized by Google

rend des Jahres 1866 139 (70 M, 69 Fr.), anwesend während des Jahres 1866 514 (264 M., 250 Fr.), Abgang während des Jahres 1866 125 (66 M., 59 Fr.), Bestand ult. December 1866 389 (198 M., 191 Fr.).

Am stärksten vertreten unter den Neuaufgenommenen war die Altersklasse von 36—40 Jahren mit 17,9 pCt., demnächst von 31 bis 35 Jahren mit 15,8 pCt.; im Recidiv waren erkrankt 11,5 pCt. — In der Aetiologie stand die Familienanlage obenan mit 45,3 pCt., demnächst kam die religiöse Schwärmerei mit 6,7 pCt. — Der Krankheitsform nach waren aufgenommen an Melancholie 38,1 pCt., an Manie 31,6 pCt., von der ersteren fast die doppelte Anzahl Weiber. — Es genasen 7,7 pCt. aller Anwesenden; es starben 5,6 pCt.. Für die Behandlung der Epilepsie wird das Bromkalium nach dortigen Erfahrungen als ein werthvolles Mittel empfohlen; die Anfälle traten während des Gebrauches seltener ein und äusserte das Mittel in der Dosis bis 3,75 *pro die*, selbst Monate hindurch fortgebraucht, keine nachtheiligen Nebenwirkungen. (Aus Bibliothek for Läger.)

Dr. *Henningsen*.

England. — Anfangs November l. J. hatte die feierliche Grundsteinlegung Statt des ersten Metropolitan District Asylums zu Leavesden, in Gegenwart des *Earl von Devon*, jenes von *Verulam*, des Bischofs von Rochester, Dr. *Bruver's* und einer grossen Anzahl von Theilnehmern.

Die Lage ist reizend, ungefähr 4 Meilen von Watford und 1½ Meile von der Kings's Langley Station an der Londoner und Nordwestbahn. Die Natur bietet alles, was in Bezug auf Salubrität wünschenswerth erscheint, und die Pavillons sind in der Art construirt, dass sie die bestmöglichste Ventilation ermöglichen. Nebenan stossen 76 Acres Gartengrund und solcher für Gemüsse-Pflanzung. Die Südseite ist für den ärztlichen und anderweitigen Dienst bestimmt, — das Centrum für die Vorrathskammern, — der äusserste Nordflügel für Wäsche und die Ingenieurabtheilung, Küchen- und Verwaltungslocale zwischen sich aufnehmend. Von hier laufen 10 Schuh breite Gänge aus nach der männlichen und nach der weiblichen Abtheilung, welche auch bestimmte Arbeitszimmer enthalten, den beiden Geschlechtern entsprechend. Es kann hier für 2000 Personen gekocht werden, — Wasser ist in Fülle vorhanden, auch ein Wasser-Reservoir für den Fall von Feuersbrunst; vollständige Drainir-Einrichtung. Der Unrath zur Gartenverwendung.

Jedes Wohnzimmer hat planmässig 105′ Länge, 36′ Breite und 14′ Höhe mit herrlicher Aussicht. Nebenan befinden sich Abthei-

Digitized by Google

lungen für Wärterinnen, Waschplätze, Badzimmer, Spülkammern. Obendarüber befinden sich die Schlafzimmer und die Separat-Zimmer, wovon Lüftung und jede hygienische Rücksicht musterhaft werden soll. Der Bau-Contract ist auf 83,900 Pfund festgestellt, mit Einrichtung auf 128,000 Pfund geschätzt. Die 5 Pavillons für Männer werden für 700 eingerichtet — die 6 für Weiber für 860 an der Zahl. (The Lancet Nr. XIX. 7. Nov. 1868. S. 622.)

Eine Gefahr, in der Psychiatrik bisher unbekannt. — Ein Pariser Arzt ward zu einem jungen Idioten gerufen, welcher über Halsweh und Schlingbeschwerden klagte. Der Arzt machte grosse Anstrengung, um ihm den Mund zu öffnen, sich vom Halszustande zu überzeugen und darauf seine Verordnungen zu begründen. Als er des anderen Tages seinen mit Angina tonsillaris behafteten Kranken besuchen wollte, bekam er vom Portier den Bescheid, er sei im Spital Necker „an Wasserscheu" gestorben. Wie sehr war dieser Arzt der Gefahr ausgesetzt, von seinem Kranken gebissen zu werden und dadurch eine Inoculation des Wuthgiftes zu erleiden.

Ullersperger.

Nekrolog Loewenhardt's. — *Emil Loewenhardt*, aus einer ärztlichen Familie, — denn der Vater ist nicht nur ein gesuchter praktischer Arzt, sondern auch schriftstellerisch thätig und hat 3 seiner Söhne zu tüchtigen Aerzten herangebildet, von denen der älteste leider schon vor einigen Jahren starb, der 2te der eben Verschiedene ist, — wurde am 2. Juni 1827 in Prenzlau geboren, ging 1847 auf die Universität nach Berlin, Ostern 1849 nach Halle, wo er am 15ten December 1851 promovirte und als Dissertation „De pathologia annorum climactericorum" schrieb. Er vollendete 1852 das Staatsexamen, nahm an der Bekämpfung der Cholera in seiner Vaterstadt Theil, fungirte kurze Zeit im Städtchen Zehden als praktischer Arzt und trat Ostern 1853 als Hülfsarzt an das Danziger, vom Prof. Dr. *Götz* geleitete, städtische Lazareth. Ein Jahr später begann er in Halle seine psychiatrische Laufbahn als Assistent der dortigen Anstalt unter der anregenden Leitung *Damerow's*, rückte nach dem Weggange seines Schwagers *Vorster* zum 2ten Arzte vor, habilitirte sich an der Universität am 24. Januar 1855 mit dem Aufsatze „De tracheotomia contra epilepsiam adhibenda" und hielt klinische Vorträge über Psychiatrie mit Demonstrationen an Kranken in der Anstalt. In dieser Zeit verband er sich auch zu glücklicher Ehe mit der Tochter des verstorbenen Berghauptmanns *Brassert*, siedelte 1859 als dirigirender Arzt der Privatanstalt nach Kennenburg in Würtemberg über, folgte 1862 dem Rufe als dirigirender Arzt der Irrenanstalt Münster-

Digitized by Google

lingen in der Schweiz, wurde zum Director der im Neubau der Vollendung nahen Irrenanstalt Königslutter in Braunschweig designirt, und benutzte die ihm noch bis zu deren Eröffnung gelassene Zeit, um sich unter *Schultze* in Bonn und unter *Virchow* in Berlin mit der mikroskopischen Anatomie des Gehirnes zu beschäftigen. Ende 1863 trug sich ihm die Gelegenheit entgegen, rascher in die praktische Wirksamkeit wieder einzutreten, indem er einen Ruf als Medicinalrath und Director der Irrenheilanstalt Sachsenberg nach Schwerin annahm. Hier, der ersten neuerbauten Heilanstalt in Deutschland, die immer ein Vorort deutcher Psychiatrie geblieben ist, hatte er endlich den Wirkungskreis gefunden, in welchem er sich befriedigt fühlte. Eifer und strenge Pflichterfüllung erwarben ihm das Vertrauen seiner Behörde, des Publikums und der Aerzte des Landes. Manchen schon vorbereiteten Reformen ebnete er dort den Weg. Eine zweite Anstalt, gleichzeitig als klinische, sollte bei Rostock gebaut, eine neue Blöden-Anstalt bei Schwerin, in der Nähe des Sachsenberges, gegründet werden. Da trat das Jahr 1866 hindernd ein und verschob die Ausführung.

Vor ca. 1 Jahr begannen seine körperlichen Leiden, welche im April d. J. seinen Tod herbeiführten. Eine schleichende Carditis, welche Erweiterung beider Herzhöhlen, Brigth'sche Nieren und endlich Wassersucht zur Folge hatte, machte unter qualvollen Beschwerden, die er als Held ertrug, seinem Leben ein Ende. Er hinterliess eine Wittwe und vier kleine Kinder, die er zärtlich liebte.

Gleich wissenschaftlich als praktisch durchgebildet, von einer fast peinlichen Gewissenhaftigkeit sowohl in seinen wissenschaftlichen Arbeiten als in den Verhältnissen des bürgerlichen Lebens, mit einem feinen Verständnisse für die inneren Seelenvorgänge Anderer, der inneren Gemüthserregbarkeit durch grosse Willenskraft entgegenarbeitend, so dass man die tiefste Gemüthsbewegung an ihm oft nur durch Blässe des Gesichts und Zucken einzelner Muskeln wahrnehmen konnte, bescheiden und doch sicher seinen Weg fortschreitend, Feind jeder Phrase, scharfer Kritiker aller Hypothese, innig und zart in der Freundschaft, schlagfertig in Worten und mit der Feder war er als Leiter einer der hervorragendsten Anstalten besonders berufen, an der Entwickelung der deutschen Psychiatrie Theil zu nehmen. Die Zeit schien in seiner geistigen Entwickelung gekommen, sich reger daran zu betheiligen. Seine Arbeiten, die er in dieser Zeitschrift niederlegte, „Selbstmorde in der Heilanstalt Sachsenberg"*), „Ueber eine Form

*) Allg Zeitschr. f. Psych. Th. XXIV. S. 265.

Digitized by Google

von Manie mit tiefer Temperatursenkung"*), „Zählung der Geisteskranken im Grossh. Meckl.-Schwerin"**), zeugen von seiner Gründlichkeit, seiner psychiatrischen Reife, seiner Gewissenhaftigkeit und einfachen Schreibweise; seine Betheiligung an der psychiatrischen Bewegung der letzten Jahre zeugt von seiner geistigen Schärfe. Viele Pläne lagen ihm vor. Er schrieb von seinem Krankenbette aus: „Wenn ich nur besser arbeiten könnte! Ich habe so viele Sachen fertig bis zur letzten Ueberarbeitung, dass es mir leid thut, so still sitzen zu müssen!" Ein Lehrbuch der Psychiatrie für praktische Aerzte, welches er begonnen, würde voraussichtlich von grossem Werthe geworden sein. Nur das wollte er darin aufnehmen, was fest begründet war. Begonnen war eine Arbeit „über den Bau der Corticalis des grossen Gehirnes", „Histologisches und Pathologisches über die *Ganglia semilunaria*", „eine Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung des Gehirns", „Mittheilungen von interessanten Krankheitsgeschichten mit genauen Sectionsbefunden" u. s. w. Alle diese Pläne, deren Vollendung zu erwarten sein Mannesalter berechtigte, sind unvollendet geblieben.

An einem herrlichen Frühlingstage — die Sonne leuchtete hell auf den ernsten Zug — begleiteten ihn seine Freunde und Angehörigen, denen er so viel, seine Kranken, denen er Alles war, zur letzten Ruhestätte. Unter die ernsten Trauerweisen mischte sich auf den Wegen, die er so oft allein und in anregenden Gesprächen mit Anderen gepilgert, der Gesang zahlreicher, vor kurzem zum Norden zurückgekehrter Singvögel. Seitwärts der Wege prangten an den noch unbelaubten Bäumen die ersten Blüthen; über dem Grabe, neben welchem eine erst vier Wochen vorher frühzeitig verstorbene Schwägerin ruht, breitete sich weithin eine Trauereesche aus, unter der er nun als der erste Director der Anstalt, der zur irdischen Ruhe einging, auf dem Anstaltskirchhofe begraben liegt. Die Aerzte Schwerin's haben ihm einen einfachen Grabstein gesetzt, unter dem nunmehr ein College ruht, der sich mit klarer Erkenntniss der nothwendigen Bedingungen zu seinem Berufe vorbereitet hatte, in einer seiner und der Disciplin würdigen Weise für ihn arbeitete und eines ehrenvollen Andenkens sicher ist. *L.*

---

*) l. c. Th. XXV. S. 685.

**) l. c. Th. XXIII. Suppl.

Digitized by Google

Einladung.

Der Verein deutscher Irren-Aerzte wird seine diesjährige Zusammenkunft zu Insbruck, im Anschluss an die daselbst abzuhaltende Versammlung der deutschen Natur-Forscher und Aerzte, im September d. J. abhalten. Mit dem Bemerken, dass Tag und Stunde der Vereins-Sitzung am ersten Tage der letztgedachten Versammlung von dem Vorstande des Vereins festgestellt und zur Kenntniss der Mitglieder gebracht werden wird, ladet Unterzeichneter die Letzteren hierdurch zu der diesjährigen statutenmässigen Vereinigung ergebenst ein. Neben Abwickelung der laufenden Arbeiten ist als neuer Gegenstand auf die Tages-Ordnung ein Antrag über den Instanzenzug gerichtsärztlicher Gutachten in Fällen zweifelhafter Psychose gestellt.

Asyl Schweizerhof, Juni 1869.

Im Auftrage des Vorstandes
Dr. *H. Laehr*,
Secretair.

Personal-Nachrichten.

Geh. Rath Dr. *Flemming* zu Schwerin ist zum Ehren-Mitgliede des Vereins für Psychiatrie und forensische Psychologie in Wien gewählt worden.

Dr. *Koeppe*, Director der Prov.-Irrenanstalt zu Halle hat sich an der Universität für das Fach der Psychiatrie habilitirt und hält psychiatrische Klinik.

Dr. *B. Fiedler*, Arzt der Irrenpflege-Anstalt in Dömitz, früher Assistenzarzt der Heilanstalt Sachsenberg, ist am 3. Juni gestorben, ein fleissiger Botaniker, der im Gebiete der Pilzkunde schriftstellerischen Ruf erworben hat.

Inhalt.

Seite

Beobachtungen über den Puls bei Geisteskranken. V. Mit Holzschn. Von Dr. *O. J. B. Wolff* 273

Beschreibung einer interessanten Hemmungsbildung des Gehirns. Mit 3 Abbildungen. Von Dr. *H. Schüle* 300

Casuistik.

Carcinomat. Hirngeschwulst. Mit 1 Tafel. Von Dr. *Stark* . 321

Zur therap. Casuistik. 2. Sexuelle Verrücktheit. Traitement moral nach *Leuret*. Dauernde an Genesung grenzende Besserung. Von Dr. *v. Krafft-Ebing* 326

Literatur.

Charles Mittermaier. Ses études sur la peine de mort, la responsabilité etc. Par *A. Brierre de Boismont.* — von *Fl.* 329

Verhandlungen psychiatrischer Vereine.

3. ordentl. Sitzung des psychiatr. Vereins der Rheinprovinz 331

Finkelnburg, Aufnahme Gemüthskr. in geschloss. Anstalten 331

Herz, Zur Prognose der Recidive (Fortsetz.) 337

Besser, Mittheilungen üb. d. histol. Verhältnisse d. Cerebell. 343

7. ordentl. Sitzung des Berliner psychiatr. Vereins . . . 353

Laehr, Ueber die Wirkung der Senfbäder gegen Psychosen 353

Kahlbaum, Beitr. z. klin. Erweiterg. der psych. Symptomat. 357

Schroeter, Fälle von intermitt. und akuter Melancholie . 359

Laehr, Irrthümer der Diagnose in Psychosen 368

2. Südwestdeutsche Lokalversammlung von Irrenärzten in Heidelberg 372

Schüle, Ueber eine Hemmungsbildung des Gehirns . . . 373

Stark, Ueber Speichelfluss bei Geisteskr. ohne Localaffect 373

Kirn, Ueber periodische Psychosen 373

Dick, Uber internationale Irrenstatistik 374

Kleinere Mittheilungen.

Gesetzliche Bestimmungen in Frankr. und England. — Ueber die Beziehg. u. Stellg. d. Mondes u. seiner Phasen. — Zur Geisteskrankheit und Epilepsie. — Ländliche Colonie Zschadras bei Colditz im Königr. Sachsen. — Wechselfieber im Wochenbette. — Ueber Irrenpflege in Frankreich. — Aus Brake. — Aus Hamburg. — Aerztl. Bericht üb. d. Irrenanstalt Lübeck. — In Graz. — Allerh. Hospital in Breslau, Abth. f. Geisteskr. — Aus d. Bericht. üb. d. Irrenanstalten Dänemarks. — Aus England. — Nekrolog *Löwenhardt's* . 378

Einladung 399

Personal-Nachrichten 399

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin

Digitized by Google

Ein Beitrag zur Casuistik der Enostosen des Clivus bei Geisteskranken.

Von

Dr. **Friedr. Karl Stahl,**

Director der Kreisirrenanstalt Karthaus Prühl.

Mit 5 Abbildungen.

Es bedarf nach meinem eigenen, inneren Gefühle wohl der Entschuldigung, wenn ich Aufzeichnungen dem Drucke übergebe, die wegen zu spärlicher Anzahl anatomischen Materials noch nicht zu maassgebenden Folgerungen berechtigen. Allein ich glaube dieses Vergehen durch meine Absicht, gewandtere und glücklichere Forscher auf höchst interessante und in der Folge gewiss auch dankbarere Studien hinlenken zu wollen, um ein Bedeutendes herabzumildern. Ja, ich hege sogar das Bewusstsein, dass das Wenige, was ich hier mittheile, nicht absolut werthlos sei.

Mit dem Abwarten reicheren Stoffes hat es eben auch seine eigenthümliche Bewandtniss. Die lebenden Objecte meiner Begehrlichkeit sehe ich stets um mich herumwandeln, mit dem sündhaften Gedanken, sie einstens, je eher desto lieber, für mein specielles anatomisches Interesse verwerthen zu dürfen, und doch stösst mir andererseits, bei meinen vorgerückten Lebensjahren, die immer wiederkehrende Besorgniss auf, dass sie leicht mich selbst überdauern könnten. Aus diesem letzteren

Digitized by Google

Grunde habe ich, eigentlich in sanguinischer Aufwallung der Ungeduld, mich entschlossen, vorläufig zu bieten, was ich bis heute mein nenne, und verspreche sehr gern, bei eventuellen Sterbefällen die Bekanntgabe weiterer Erfahrungen und Forschungen auf diesem Gebiete nicht lange vorzuenthalten.

Meine vorliegenden Untersuchungen beschränken sich vorherrschend auf einen bestimmten Abschnitt des Tribasilarbeins, nämlich auf die Region vom Hinterhauptsloche bis zur Sattellehne, und zwar nur auf dessen innere, mit dem Centralorgane in unmittelbarem Contacte sich befindliche Fläche.

Betrachtet man den horizontal aufgesägten Schädel von innen, so sieht man ein vom Firste der Sattellehne anfangendes, nach unten in die Breite sich ausdehnendes Knochenstück herabsteigen, welches in seiner mittleren Fläche eine mehr oder minder vertiefte, hohlleistenähnliche Rinne zeigt und mit jenen beiden Gelenktheilen enge verschmolzen ist, die nach rechts und links auseinanderweichend den vorderen Halbkreis des grossen Hinterhauptloches bilden und beiderseitig durch die Process. anonym. in hügeligen Erhebungen enden.

Das ganze Terrain wird nach vorn und oben durch die Grube für die Glandula pituitaria, an den Seiten durch die Incisura jugularis und die Felsenbeine, nach hinten und unten endlich durch das Foramen magnum occipitale begrenzt.

Somit habe ich ausschliesslich den Clivus zur Grundlage dieser Untersuchungen gewählt.

Auf der oben beschriebenen kleinen Knochenstrecke der Schädelbasis nun, welche durchgehends von der Dura mater überzogen wird, sind höchst wichtige Theile des Centralorganes situirt, nämlich der Pons Varolii, welcher auf der Lehne des Türkensattels und dem Clivus

Digitized by Google

ruht und dann, unmittelbar mit dem Pons verbunden, die *Medulla oblongata*, welche unterhalb des *Foramen magnum occipitis* mit dem weiteren Verlaufe des Rückenmarks im engsten Contiguitätsverhältnisse steht.

Die Wichtigkeit dieser Organe wird hier speciell durch den Umstand gesteigert, dass sie die Ursprungsstellen sämmtlicher (mit Ausnahme der ersten 4) Gehirnnervenpaare in sich fassen, deren Verlauf auf gleicher Bodenfläche sich fortbewegt, und es sind demnach der *Trigeminus*, *Abducens*, *Facialis*, *Acusticus*, *Glossopharyngeus*, *Vagus*, *Accessorius Willisii* und *Hypoglossus*, welche auf diesem kleinen Terrain pathologischen Influenzen unterworfen sein können.

Ich habe mich jedoch bei diesen Studien vorzüglich mit pathologischen Erscheinungen am Knochen beschäftigt und mein wärmstes Interesse haben die am Clivus aufgefundenen Auswüchse erregt, auf die ich hauptsächlich durch *Virchow*'s „Untersuchungen über die Entwicklung des Schädelgrundes" geführt wurde, woselbst er hervorhebt, dass er diese Excrescenzen ganz überwiegend bei Geisteskranken und zwar bei Frauen gefunden habe*). Er erwähnt nämlich unter der Rubrik: „Ecchondrosen des Clivus" zweier weiblicher Individuen**), wovon das Eine an Melancholie mit Prosopalgie, das Andere an Tobsucht gelitten und bei welchen beiden die Obduction cystenförmige, mit Exostosen des Clivus in Verbindung stehende Geschwülste (Schleimgeschwulst des Clivus), ergab.

Nach *Virchow*'s Beobachtungen ist die Clivus-Fläche des Hinterhauptbeines fast immer glatt, und zeigt höchstens in der Mitte eine kleine Grube, den Markgruben entsprechend, welche sich an der hinteren Fläche der Wirbelkörper finden und den Knochengefässen dienen.

---

*) a. a. O. p. 59. **) a. a. O. p. 55. u. 56.

Digitized by Google

Die Clivus-Fläche des Keilbeins ist dagegen fast immer rauh, uneben, höckerig, so dass sie häufig wie cariös aussieht*).

Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Schädeln unbekannter Individuen, die ich im anatomischen Museum zu München besichtigte, hatte gleichfalls das Ergebniss, dass die Clivus-Fläche hinter der Spheno-occipital-Synchondrose ohne Ausnahme glatt geformt war, vor derselben aber häufig Rauhigkeiten oder selbst Prominenzen unbedeutenden Grades zu entdecken waren, während Exostosen von beträchtlicherer Entwickelung gar nicht aufgefunden werden konnten. Man ist deshalb berechtigt, diese zu den seltenen Erscheinungen zu rechnen und nach meinen Erfahrungen steigert sich ihre Seltenheit mit der weiteren Entfernung von der Sattellehne bis gegen das *Foramen magnum occipitale* hin.

Bei jenen Schädeln, die in hiesiger Irrenanstalt einer näheren Untersuchung unterworfen wurden und die sämmtlich geistesgestörten Individuen angehörten, sind mir, abgesehen von der Stellung, Neigung oder dem Winkelmaasse des Clivus, sehr beträchtliche Abweichungen in Bezug auf Form, Länge und Breite desselben aufgefallen und es finden hier Differenzen von ziemlicher Bedeutung statt. So liegt mir ein Schädelskelet vor, an welchem die Breite des Clivus-Knochens in seiner Mitte 8 Pariser Linien, unmittelbar vor dem *Proc. anonym.* 10 Linien beträgt, während an einem anderen die Mitte 13, die letzterwähnte Stelle 18 Linien der Breite misst. An Ersterem bildet überdies der Clivus eine tiefe schmale Rinne, die an beiden Seiten, dem ganzen Verlaufe nach, von leistenartigen Knochenwülsten eingefasst wird, während an dem Anderen die Aushöhlung eine sehr seichte, breite Hohlkehle darstellt. Diese morphologischen Dif-

*) a. a. O. p. 17.

Digitized by Google

ferenzen liegen jedoch dem Zwecke dieser Studien zu ferne, um sie eingehender zu berühren.

Hingegen wende ich mich sogleich der Betrachtung dessen zu, worauf ich meine besondere Aufmerksamkeit verwendete. — Ich glaube die pathologischen Producte, um die es sich in concreto handelt, nach ihren anatomischen Fundorten in zweierlei Arten abtheilen zu dürfen, nämlich in Ecchondrosen, welche ich von der Höhe des Türkensattels bis an die hintere Grenze der Sphenooccipitalsynchondrose antraf, und in Osteoide, die in der Clivus-Hohlkehle bis zum Hinterhauptsloche aufgefunden wurden.

Während die erste Bezeichnung die Auswüchse auf ursprünglichem Knorpelboden, dem Deckknorpel (*Virchow*) und dem Knorpel zwischen Keil- und Hinterhauptsbein in sich begreift, die letztere Bezeichnung dem Knochenboden des *os basilare* älterer Benennung*) entspricht, dürfte jedoch für beide Arten der Excrescenzen zusammengenommen, der Terminus-„Enostosen“**), da sie beide in die Innenräume des Schädels hineinragen, gerechtfertigt erscheinen.

Ecchondrosen, bei Geisteskranken, auf der Höhe der Sattellehne und an ihrem hinteren Abfalle fand ich mehrfach in mässiger Prominenz, wie sie jedoch *Virchow* als keineswegs abnorm erklärt. Nur zwei Präparate stehen mir zu Gebote, in welchen auffälligerweise das zu-

---

*) Unter allen Kopfknochen verknöchert dieser Grundtheil zuerst, unmittelbar nach ihm der Körper des Keilbeins (*Hyrtl*), während die Knorpellage zwischen diesen beiden erst im 18—20sten Jahre, der Deckknorpel des *Dorsum ephippii* meist zwischem 2—3ten Lebensjahre verknöchert, obwohl *Virchow* Residuen dieses Deckknorpels ausnahmsweise bei einem 13jährigen Mädchen noch vorgefunden hat (a. a. O. Taf. VI. Fig. 13).

**) *Rokitansky*, Handbuch der speciellen pathologischen Anatomie. Wien, 1844.

Digitized by Google

rückgeschlagene Blatt des ehemaligen Deckknorpels in verknöchertem Zustande sich nach hinten herabsenkt, in einer sehr scharfkantigen unterhöhlten Querlinie von der Clivusfläche sich abhebt, an beiden Seiten flügelförmig in die *Proc. clinodei posteriores* übergeht und in der Mitte, der frühesten Ossificationsstelle, eine starke Krümmung nach rückwärts macht. Das eine dieser Präparate gehörte einem blödsinnigen, an chronischer Hydrocephalie verendeten, das andere einem an epileptischen Anfällen verstorbenen Pfleglinge.

Weiter nach hinten und abwärts, gegen die *Synchondrosis sphenooccipitalis* hin, fand ich Ecchondrosen in viel ausgeprägterer Grösse und Form, meist an der unteren Grenze der verknöcherten Knorpelfuge, oder in deren Umgebung situirt und, diese schienen bezüglich ihrer Entstehung, der *Virchow*'schen Erklärungsweise*) vollkommen entsprechend, aus dem ehemaligen Knorpel hervorgewachsen und in Verbindung mit dem normalen Knochen des Grundbeins ossificirt zu sein, eine Erklärungsweise, womit auch die Erfahrungen *Schuh*'s**), wonach sich derlei Auswüchse so häufig in der Nähe und Umgebung von Gelenken bilden, übereinstimmen.

An einem meiner Präparate, bei einem 70jährigen Manne ferner, zeigte sich an der Spitze der Ecchondrose, deren Basis den Umfang einer durchschnittenen Erbse erreichte, noch ein beträchtliches Knorpelstück, so dass dieser Auswuchs im Sinne *Virchow*'s als *Exostosis cartilaginea* zu bezeichnen wäre***), und endlich kamen mir stachelige oder auch breitere, flache Exostosen an den früheren Knorpelfugen des Hinterhauptbeines, am *Tuber-*

*) a. a. O. p. 53.

**) Dr. *Franz Schuh*, Pathologie und Therapie der Pseudoplasmen. Wien, 1854.

***) Dieses Knorpelstück wurde leider in der Folge durch Ungeschicklichkeit abgebrochen.

Digitized by Google

culum innominatum beiderseits bei Schädeln Geisteskranker ebenfalls zu Gesicht.

Ausser diesen, sämmlich der Classe der Ecchondrosen angehörigen, Producten fand ich aber auch einmal zahlreiche Osteoide, die ihren Sitz am Basilarstücke hatten, und zwar unterhalb der Sphenooccipitalsynchondrose, auf der sonst ebenen Rinne desselben bis zum *Foramen magnum occipitis* sich erstreckend. Ich sah sie vorherrschend halbkugelförmig, mit glatter Oberfläche und breiter Basis auf dem Knochen fest aufsitzend, mit ihm verschmolzen, von der Grösse einer halben Erbse oder Linse, aber auch bis zum Umfange von Hanfkörnern oder selbst bis zur griesartigen Rauhigkeit herab; einzelne derselben warzenförmig, an ihren Rändern vom Knochen osteophytartig abgegrenzt. Diese ganze Musterkarte*) von Enostosen fand ich bei einem 45jährigen Manne in folgender Art verbreitet: Auf der Sphenooccipitalsynchondrose, in deren Mittellinie, befindet sich eine längliche, von vorn nach hinten laufende, leistenartige, wiewohl niedrige Ecchondrose, welche dem Verlaufe der *Arteria basilaris* entspricht; am linken Rande des Clivus, unterhalb der Synchondrose, eine rundliche, oben rauhe, linsengrosse Enostose, welche die Bahn des *Nervus trigeminus* berührt; ungefähr 3 Linien unter ihr, dem Nervenbündel des *Facialis* anlagernd, ein kleines Osteoid, während an derselben Seite, hart an den Ursprungsstellen des *Glossopharyngeus* und *Accessorius Willisii* zwei nahe aneinandersitzende Knochenknöpfchen (Osteophyte) sich befinden. Rechterseits auf dem Clivus entdeckt man zahlreiche, diffuse, griesliche, sowie an der untersten Abdachung desselben, zwischen seinen Gelenktheilen und dem vorderen Rande des *Foramen occipitale*, unregelmässig herumgelagerte, seichte, warzenähnliche

*) Siehe Abbildung 5.

Digitized by Google

Unebenheiten. Der frühere Besitzer dieses Schädels, der bereits dem secundären Blödsinn verfallen war, litt am mimischen Gesichtskrampfe und überhaupt an sehr ex- und intensiven Motilitätsstörungen.

Unter den ecchondrotischen Producten haben zwei meiner Präparate durch ihre anatomische Situirung ein besonderes klinisches Interesse erweckt. Der eine Fall betraf einen 72jährigen, an Apoplexia verstorbenen Mann. Bei ihm sass, nicht in der Mitte, sondern am linken Seitenrande des Clivus, hinter der Sphenooccipitalsynchondrose eine knöcherne Erhebung, deren Basis beiläufig den Umfang einer durchschnittenen Erbse ergab und an deren Höhe eine circa 1½‴ emporragende Knorpelspitze sich befestigte (*Exostosis cartilaginea*). Die Lage derselben entspricht genau jener Stelle, welche der *Nervus trigeminus* berührt, indem er nach links einen Zweig an das *Ganglion Gasseri* abzugeben pflegt. Der einstmalige Eigenthümer dieses Schädels litt an einer physiognomischen Abnormität, nämlich an einer verzogenen Nase in Folge einer Contractur des *Musculus compressor nasi sinistr.* und überdies an einer vom II. Aste des Quintus abhängigen Neurose, einem ebenso heftigen als lästigen Nieskrampfe.

Der zweite Fall betraf eine 59jährige Frau mit auffallend plagiocephaler Schädelconfiguration. Die Ecchondrose beginnt mit breiter Leiste 9‴ unter der Sattellehne, gleichfalls hinter der verknöcherten Knorpelfuge des Keilbeins, steigt pyramidenförmig nach aufwärts und endet mit ihrer breiten, scharfen Spitze circa 4‴ unter der Mitte der Sattellehne. Sie hat fast das Aussehen eines triangelartig, auf dem Clivus aufgelagerten zweiten, kleineren Ephippiums, und wenn auch die Stellung der Spitze der *Arteria basilaris* zur Unterlage dient, so wird doch von ihren seitlichen Schenkeln, namentlich links,

*) Siehe Abbildung 3.

ebenfalls der Verlauf des *Trigeminus* augenscheinlich berührt und belästigt. Die ehemalige Besitzerin dieses Schädels litt an einer, vom III. Aste des Quintus abzuleitenden, physiognomischen Abnormität, nämlich an einer Contractur des *Musculus pterygoideus externus*, worüber ich in der Folge des Weiteren berichten werde.

Wenn ich nun mit dieser skizzenhaften Darstellung dreier Präparate vorläufig andeuten wollte, dass ich zwischen diesen, die Basis des *Pons* und verlängerten Markes, dann die Bahnen der meisten Gehirnnervenpaare berührenden Enostosen und einigen während des Krankheitsverlaufes auffälligen neurotischen Symptomen einen physiologischen Zusammenhang vermuthe, wird es sich unter ausführlicherer Verzeichnung der übrigen, gleichzeitigen, pathologischen Läsionen des Schädels oder Gehirns ergeben, dass die geistige Störung, wie auch *Virchow* (p. 59 a. a. O.) behauptet, neben diesen Enostosen stets noch anderer morphologischer Abnormitäten zu ihrer Motivirung bedurfte. Hierbei will ich jedoch erwähnen, dass ich die *Dura mater* von den Enostosen niemals durchbohrt und auch niemals die *Virchow*'sche Schleimgeschwulst als Appendix von Ecchondrosen aufgefunden habe. Ebenso negativ blieben meine, übrigens nur makroskopisch angestellten Forschungen nach pathologischen Ergebnissen an den betreffenden Nervenstämmen, der *Medulla oblongata* oder dem *Pons Varolii*. Ich darf aber auch nicht verschweigen, dass ich mich einer sehr exacten Untersuchung dieser Regionen aus dem Grunde nicht immer rühmen kann, weil die hier in Betracht kommenden anatomischen Fragen sich oft erst nachträglich, bei näherer Würdigung der Abnormitäten am Schädelskelete aufwarfen.

Das Material zu den nachstehenden Mittheilungen habe ich fast ausschliesslich aus der Abtheilung der Unheilbaren hiesiger Kreis-Irrenanstalt, aus der soge-

Digitized by Google

nannten Blödenabtheilung, entnommen. Hier nämlich, am Sammelorte der abgelaufenen Seelenstörungen finden sich entschieden die meisten durch ihre Auffälligkeit zum Studium anregenden Erscheinungen, und hier liefert vorzüglich die Physiognomik im weitesten Sinne des Wortes die ergiebigste Ausbeute. Namentlich aber können hier die mannichfachsten Anomalien im Bereiche des Motilitätsapparates, die in frischen Fällen, auf der sogenannten Heilabtheilung, meist nur vorübergehend, gleichsam im Sprunge zu erhaschen sind, wegen ihrer Stabilität mit ungleich grösserer Ruhe der Forschung unterworfen werden. So zum Beispiele: Gesichtsausdruck und Gesichtsentstellung, Sprache und Sprechweise, Gang und Bewegungen, Beschäftigungstriebe u. s. w.

Unter dem Reichthume an derartigen anziehenden Erscheinungen fiel mein Augenmerk mit Vorliebe auf spastische Zustände und ein in neuerer Zeit von mir angelegtes Photographie-Album bietet bereits eine zwar noch kleine, jedoch auserlesene Galerie hieher bezüglicher Fälle. So z. B. das Porträt eines vorübergehend schiefhalsigen blödsinnigen Jünglings, das eines an ständiger Contractur der beiden linken *Musculi zygomatici* leidenden hysteromanischen Mädchens, das eines von mimischem Gesichtskrampfe befallenen älteren Mannes, und endlich die Photographieen zweier, hier ausführlicher zu gedenkenden, an Contractur des *Musculus pterygoideus externus*, dem „verbogenen Gesichte“ leidender Individuen. Es wären demnach in dieser meiner Sammlung spastische Anomalien auf den Bahnen des *Nervus accessorius Willisii*, des Facialis und des III. Astes des *Trigeminus* repräsentirt. Dem letzterwähnten „verbogenen Gesichte“ aber erlaube ich mir, wegen seiner unläugbaren Analogie mit dem Klumpfusse einen, wie ich glaube, bezeichnenderen Namen beilegen zu dürfen und

Digitized by Google

mit ihm beginne ich die Vorführung meines klinischen Materials.

I.

Die *Facies vara* (das Klumpgesicht).

Das Charakteristische dieser Physiognomie beruht in einer mehr oder minder ausgeprägten Beugung der äusseren Unterkiefer-Contour nach rechts oder links, so dass das Antlitz bei höher entwickelten Graden, à face betrachtet, nahezu eine sichelartige Curve bildet, die bei Bewegung der *Maxilla inferior*, beim Kauen, Sprechen, oder selbst im apathischen Zustande des Kranken, bei halbgeöffnetem Munde, eine noch deutlichere Ausprägung erleidet.

Sie wird hauptsächlich durch Contractur des *Musculus pterygoideus externus*, welcher die Seitenbewegungen des Unterkiefers vermittelt, bedingt; jedoch werden auch anderweitige im mastikatorischen Apparate situirte Muskeln, z. B. der *Masseter* und wohl auch der *Temporalis*, wenngleich in geringerem Maasse in Mitleidenschaft gezogen. Die Sprache ist hiebei weniger behindert, jedoch kaut der Kranke meist auf der gesunden Seite, was durch frühzeitigere Abnutzung des Kiefers dieser Seite an einem Schädelskelete sich bestätigt.

Uebrigens tritt das Leiden nicht in allen Fällen als isolirte Krampfform in die Erscheinung, sondern kann nach meiner Erfahrung auch gleichzeitig mit andern spastischen Muskelaffectionen des Gesichts beobachtet werden, z. B. mit *Strabismus* und, ebenso scheint es analog, anderen Contracturen, dem Klumpfusse, Schiefhalse, Schielauge u. s. w. nur als vorübergehendes, allmälig wieder verschwindendes Leiden auftauchen zu können,

*) S. Abbildung 1.

Digitized by Google

wie ich dies an einem epileptischen Kranken hiesiger Anstalt jedesmal nach sehr heftigen Paroxysmen zu erweisen Gelegenheit finde.

Meines Wissens ist die Deformität, die ich mit dem Terminus: „*Facies vara*“ bezeichne, in der Literatur nirgends erwähnt, und ihre nähere Würdigung lässt vor Allem eine allenfallsige Verwechselung mit der *Stromeyer*schen*) „*Scoliosis faciei*“, trotz der frappanten Aehnlichkeit der Vorstellungen, welche unsere beiderseitigen Taufnamen für das hier gedachte Krankheitsbild zu erregen im Stande wären, nicht befürchten. Denn die *Stromeyer*sche Gesichtsverkrümmung bezieht sich auf Muskelcontracturen anderer Regionen, des Sternocleidomastoideus und Trapezius, sowie auf Anomalien in andern Nervenbahnen, in der des *Accessorius Willisii*. Dieses von *Romberg***) unter dem Namen „*Caput obstipum spasticum*“ aufgeführte Leiden hat mit der Verkrümmung des Gesichts nach den Bahnen des dritten Astes des *Nervus trigeminus* kaum irgend eine physiognomische Aehnlichkeit. Letztere Deformität dürfte möglicher Weise an die Mimik des *Trismus* erinnern, wenn man sich diesen nur einseitig und nur auf vereinzelte Muskeln beschränkt vorstellen könnte, und wenn es nicht die Erfahrung lehrte, dass beim *Trismus* am häufigsten die Nerven der Heber des Unterkiefers, die *Nervi masseter. et temporal.* den Herd der Affection bilden, während die der Seitwärtsbeuger, die *Nervi pterygoidei* nur selten und am seltensten die der Abwärtszieher, die *Nervi mylohyoid.* und *digastric.* betheiligt sind. Als Hauptmoment der differentiellen Diagnostik aber ist hervorzuheben, dass Contracturen auf den Bahnen des III. Astes des

*) Beiträge zur operativen Orthopädik. Hannover, 1838. *Casper's* Wochenschrift, 1837.

**) Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen.

Digitized by Google

Quintus die Gesichtssymmetrie in horizontaler, Contracturen auf den Bahnen des II. *Trigeminus*-Astes, dann des *Facialis* und *Accessorius Willisii* hingegen in vertikaler Richtung zu stören pflegen.

Durch *Ludwig Fick*'s Experimental-Untersuchungen über die Ursachen der Knochenformen*), welcher mittelst der Durchschneidung der Kaumuskeln an einer jungen Ziege auf traumatischem Wege eine wahre Kreuzschnabelgestaltung producirte**), wurde meine Aufmerksamkeit zunächst auf die Aehnlichkeit dieses chirurgischen Productes mit der hier in Rede stehenden, menschlichen Gesichtsverbiegung gelenkt und, wenn auch *Fick*'s Folgerungen aus diesen Experimenten hier, wo es sich nicht um traumatische, sondern um rein physiologische Erscheinungen handelt, nicht weiter in Betracht kommen, so hat mir doch das Experiment, an und für sich, die anatomische Erklärung des „Klumpgesichts", in Betreff der hiebei betheiligten Muskelpartieen bedeutend erleichtert.

Die Contractur des *Pterygoideus externus* scheint übrigens nicht zu den grösseren Seltenheiten zu gehören. Ich selbst habe sie an 7 Individuen (4 Männern, 3 Frauen) zu beobachten Gelegenheit gehabt. Hiervon waren 5 (4 Männer, 1 Frau) entschieden geistesgestört und meiner Untersuchung mehr oder minder zugänglich, während zwei Frauen, welche, obwohl geistig gesund, dennoch Familien angehörten, in denen Seelenkrankheiten einheimisch waren, jeder näheren Untersuchung sich entzogen.

Ueber die Genesis der Deformität herrscht begreiflicher Weise ein schweres Dunkel. Es gelang mir nicht einmal zu ermitteln, wann sie den Angehörigen an ihren Kranken zuerst auffällig wurde, und dies kann mich um

---

*) Ueber die Ursachen der Knochenformen. Göttingen, 1857.

**) Siehe Abbildung 2.

Digitized by Google

so weniger in Erstaunen setzen, da selbst die vollkommen entwickelte Missgestaltung des Gesichts auch der Aufmerksamkeit so vieler anderer Personen entgeht. Ob nun bei den betroffenen Individuen intensive Erscheinungen fötaler, oder in frühsten Lebensjahren abgelaufener pathologischer Processe im Gehirn oder seiner Basis beobachtet worden sind, und ob die bei morphologischen Störungen so selten fehlenden klonischen Krämpfe, Convulsionen u. s. w. sich eingestellt hatten, konnte ich niemals erfahren. Uebrigens scheint die Contractur in den meisten Fällen, wenn auch schon früher angedeutet, doch erst mit den vorschreitenden Jünglingsjahren sich mehr und mehr bemerkbar gemacht zu haben.

Bei einer im Asyle zu Carthaus verstorbenen Frau, welche an einer sehr entstellenden Contractur des *Musc. pterygoideus* gelitten hatte, fand ich neben einer beträchtlichen, den *Nervus quintus* in seinem Verlaufe berührenden Ecchondrose am Clivus des Tribasilarbeins zugleich eine ausgeprägte Plagiocephalie, welch' letztere Configuration ich auch an einzelnen lebenden Individuen dieser Categorie entdeckte. Ich halte mich demnach für wohl berechtigt, mir in der Mehrzahl der Fälle eine extensivere Bildungsanomalie des Kopfes mit ihren häufigen Consequenzen, partieller Gehirnatrophie und hydropischen Ergüssen im kindlichen Alter vorzustellen.

Ganz gleiche Zustände finden sich auch bei anderen congenitalen Muskelcontracturen, z. B. dem Schielauge, Schiefhalse, Klumpfusse, der Wirbelverkrümmung u. s. w. und, während diese anerkanntermaassen so vielfach als Attribute der Idiotie oder des Cretinismus und überhaupt in einem gewissen Connexus zu den angeborenen Blödsinnsformen erscheinen, dürfte man sich wohl auch versucht fühlen, die Contractur des *Pterygoideus externus* als ein Anzeichen der Disposition zu geistiger Störung zu deuten.

Digitized by Google

Was nun den Befund unmittelbar an der Contractur betrifft, so ist dieser bei dem einzigen zur Section gelangten Individuum sehr negativ ausgefallen. Namentlich konnten am Unterkieferknochen, ausser der vorwiegenden Abnutzung der Alveolarränder der gesunden Seite keine bemerkenswerthen Anomalien aufgefunden werden, obwohl man am ganzen Kopfskelete das „verbogene Gesicht“ noch deutlich zu erkennen im Stande ist. Eine Abnormität der Knochenform war übrigens kaum zu erwarten, da auch nach *Stromeyer*'s Beobachtungen selbst nach 50jährigem Bestande von Contracturen, mit Ausnahme einer fast unmerklichen Verdickung oder Verkürzung, keine auffallenden Veränderungen am Knochen vorgefunden zu werden pflegen.

Es ist selbstverständlich, dass die Charaktere der geistigen Störungen, womit die einzelnen Inhaber dieses Klumpgesichts behaftet sind, in grösster Verschiedenheit erscheinen und die nun folgenden Detailbeschreibungen werden dies bestätigen. Ich beginne hierbei mit jenem Falle, dessen Geschichte durch den Tod und die Leichenöffnung als abgeschlossen zu betrachten ist, und füge die Schilderung der übrigen hieher gehörigen Individuen, deren Untersuchung nicht in gleichem Grade erschöpfend sein konnte, der Reihe nach bei, ohne die Frage über allenfallsige Enostosen des Clivus bei Letzteren, welche eine klare Anschauung der Physiognomie am Lebenden bieten sollen, zu berühren.

Fall I. (Abbildung 3.).

Facies vara mit Ecchondrose des Clivus.

Elise Deisch, Chirurgentochter, 59 Jahre alt, starb, nachdem sie viele Jahre im sogenannten Pfründhofe der Stadt Regensburg und seit 11 Jahren in hiesiger Anstalt verpflegt worden war, in letzterer am 20. September 1863.

Sie war von kleiner Statur, mit einem sogleich in die Augen

fallenden Schiefschädel und, wie dies bei Plagiocephalien so häufig beobachtet wird, mit einer merklichen Kyphose behaftet, hatte alte Gesichtszüge, eine Unterkieferverschiebung, in Folge von Contractur des *Musculus pterygoideus externus*, von rechts nach links, lichtblonde Haare und graue Augen, zeigte im Umgange in der Regel ein freundliches, gutmüthiges Benehmen, und arbeitete sehr fleissig im Hause; wurde aber hiebei durch Einsprache sehr leicht erzürnt und beleidigt, worauf sie nach Umständen lärmend räsonnirte und schimpfte.

Ihre Umgebung und Lage fasste sie theilweise richtig auf; hielt sich aber für eine hohe Persönlichkeit, der man alle Ehre anthun müsse, und wenn man einmal vergass, sie zu grüssen, steigerte sich ihr Aerger nicht selten zu tobsüchtiger Agitation.

Von Täuschungen des Gehörs wurde sie oft und peinlich gequält und conversirte dann mit den vermeintlichen Stimmen in lautem, zankendem Ton.

Mehrmals wurde sie von heftigen, apoplectiformen, einige Stunden dauernden Zufällen ergriffen.

Am 9. August 1863 entdeckte man die Entwickelung einer sehr umfangreichen Phlegmone am linken Unterschenkel, die in brandige Zerstörung überging und in Folge deren sie unter den Erscheinungen der Pyämie verstarb.

Während wir nun vorerst die Sectionsergebnisse lediglich im Auszuge mittheilen, werden wir die knöchernen Schädeltheile nachträglich genauer zu beschreiben nicht ermangeln.

Aeusseres: Körper sehr abgemagert, Oedem der Hände und Füsse, sowie des ganzen rechten Schenkels; am Kreuzbein und linken Trochanter brandiger *Decubitus*, an der Mitte der linken Darmbeinfläche ein wallnussgrosses Lipom, das Zellgewebe des linken Unterschenkels brandig zerstört und verjaucht, theilweise auch die Muskeln desselben gangränös zerfallen.

Schädelinhalt: Die *Dura mater* blutleer; an der Falx starke Knochenanlagerungen, zum Theil von der Grösse eines Sechsers: die inneren Häute verdickt und ebenfalls Knochensplitter enthaltend; die graue Substanz sehr blass; die Medullarsubstanz ödematös; die Ventrikel hydropisch sehr erweitert (*Hydrocephalus externus* und *internus*); das linke Hinterhorn und die ganze Grosshirnhälfte dieser Seite länger als rechterseits, und zwar der Asymmetrie des Schädels hierdurch entsprechend.

Brust: Beide Lungen stark adhärirt, emphysematös; Herz normal; am aufsteigenden Theile der *Aorta* und am Bogen mehrere Kalkplatten.

Unterleib: Milz sehr klein; Muskatnussleber, an der Oberfläche

Digitized by Google

der linken Niere einzelne, erbsengrosse, tuberkelähnliche Knötchen; im Magen einige Ecchymosen; am Grunde des Uterus zwei haselnussgrosse Fibroide.

Schädelmaasse.

Vom rechten *Tuber frontale* bis zur grössten Ausbuchtung des Scheitelbeins 4″ 11‴, linkerseits 5″ 5‴ (Differenz 6‴). Vom rechten *tuber frontale* bis zur höchsten Occipitalwölbung 4″ 10‴, linkerseits 5″ 3‴ (Differenz 5‴). Höhenmaass vom äussern Gehörgange bis zur Berührungsstelle der Kranz- und Pfeilnaht rechterseits 6″ 3‴, linkerseits 6″ 5‴ (Differenz 2‴).

Die hier angeführten Maasse erweisen die sehr beträchtliche Asymmetrie des Schädels, der sich in seiner ganzen Configuration als ein brachy-plagiocephaler darstellt.

Von hinten und oben betrachtet, sieht man die vollkommnere Verschmelzung des rechten Stirn- und Scheitelbeins mittels Synostosis des ganzen Verlaufes der diesseitigen Kranznahthälfte, während dieselbe Naht linkerseits in limböser Ausprägung vorhanden ist. Nach dieser letzteren Hälfte hin ist daher der Schädel in Quere und Länge umfangreicher entwickelt; die Stirnbeintuberosität, Scheitel-Schläfen- und Hinterhauptswölbung treten stärker hervor und auch die Binnenräume sind namhaft erweitert. Die Pfeilnaht dacht sich schon im vordern Dritttheile nach unten ab, obwohl sie fast durchgehends grosszackig erhalten ist, trägt hierdurch zur Charakteristik des Kurzschädels bei und zieht sich, die ungleichen Hälften markirend, von der linken nach der rechten Seite bis zur Vereinigungsstelle mit der wohlconservirten Lambdanaht hin.

Im Profil ist rechterseits auch das Schläfenbein mit dem Scheitelbeine intensiv verschmolzen und fehlen Schuppen- und Sphenoidalnaht, welche linkerseits vollständig ausgeprägt vorhanden sind.

An der Basis des Schädels ist die rechte Hälfte im Vergleiche zur linken ebenfalls bedeutend verkümmert, zeigt aber ein enormes *Foramen jugulare*, welches links sehr verengt erscheint.

Von vorn betrachtet zeigt sich die linke Schädelhälfte bis zur Schläfengrube herab nicht blos gewölbter, grösser, sondern auch, von der Mittellinie der Calvaria beginnend, auffallend höher und das ganze Gesichtsskelet ist von rechts nach links verschoben, was durch linksseitige Neigung der Nasenbeine und des Unterkiefers hervorgebracht wird.

Interessant sind die in einzelnen Knochenpartieen vorhandenen tieferen Eindrücke von Muskeln. So ist, bei hoher Wölbung der linken Schläfegegend, die rechte *Regio temporalis* nicht blos abgeflacht, sondern sie bildet sogar eine der Lage des Schläfemuskels

Digitized by Google

entsprechende, wahrhaft nischenartige Vertiefung und, die Verkümmerung des Schädelumfanges dieser Seite erstreckt sich so weit nach rückwärts, dass sie eine hintere Plagiocephalie erzeugt und zwar ohne halbseitige Synostose der Lambdanaht, wie diese *secundum regulam* zu erwarten wäre. Ferner findet sich am linken Nasenbeine, durch den *Margo infraorbitalis* begrenzt, eine breite und tiefe Rinne, die Lagerstätte des *Musculus compressor* und des *Levator alae nasi*, wodurch die erwähnte Schiefzerrung der Nasenknochen bedingt zu sein scheint, während am rechten Nasenbeine die regelmässige Wölbung erhalten ist.

Am Unterkieferknochen ist jedoch, trotz seiner auch noch am Skelete merklichen Schiefrichtung und der zu Lebzeiten ausgeprägten Contractur des *Musculus pterygoideus externus*, eine Asymmetrie, einseitige Verkürzung oder Verdickung nicht zu bemerken. Dagegen erscheint die linke Unterkieferhälfte dadurch höher, dass die rechte Hälfte fast vollkommen zahnlos und der Alveolarrand dieser Seite bedeutend geschwunden ist.

Die Innenverhältnisse des Schädels entsprechen den äusserlich bemerkbaren Asymmetrien durchgehends. Der rechte kleine Keilbeinflügel, welcher, wie der linke, mit dem Stirnbeine innig verwachsen ist, zieht sich schief nach rechts und vorn, ebenso die das Hinterhauptbein durchschneidende Kante der *Lineae cruciatae*, und sämmtliche Nischen für die Gehirnlagen sind rechterseits kleiner. Namentlich verlaufen die Felsenbeine in sehr diverser Richtung. Während das linke regelmässig eine schiefe Linie von vorn nach hinten und abwärts bildet, beschreibt das rechte eine fast halbmondförmige Krümmung und beengt hierdurch die Mittelhirnlage in hohem Grade. An der Innenfläche des Basilarbeins *(Clivus Blumenbachii)*, hinter der vollständig verknöcherten Vereinigungsstelle mit dem Keilbeine *(synchondr. sphenooccipitalis)* befindet sich eine circa 2‴ breite, 3‴ lange und schaufelförmig nach vorn auslaufende Exostose (s. Abbildung 3.), wodurch gleichsam ein zweiter Türkensattel, en miniature, gebildet wird.

An diesem Individuum ergeben sich nun im Rückblicke auf die Leichenbefunde folgende beachtenswerthe Momente:

1) Die schon bei Lebzeiten durch Plagiocephalie und Kyphose diagnostisch erhebbare, congenitale, halbseitige Atrophie des Gehirns ist ausser Zweifel gesetzt.

2) Der Unterkieferknochen zeigt zwar, trotz des

Digitized by Google

langjährigen Bestandes der Contractur des *Pterygoideus externus* im Allgemeinen keine pathologischen Residuen; allein der auffällig intensivere Schwund des zahnlosen Alveolar-Randes der rechten Seite ist insofern bemerkenswerth, als sich hieraus auf den vorherrschenden Gebrauch dieser Seite beim Kauen mit ziemlicher Sicherheit schliessen lässt.

3) Ein denkwürdiger Fund endlich ist die beträchtliche Exostose an der Innenfläche des Basilarbeins, aus der im concreten Falle die Läsion des auf seiner Bahn berührten *Nervus trigeminus* und die mit ihr im Causalnexus gedachte Contractur des *Pterygoideus externus* ihre Erklärung finden dürften*).

Fall II. (Abbildung 1.).

Jacob Kirsch von Grünthal, Kgl. Bezirksamts Stadtamhof, lediger Söldnerssohn, wurde den 15. Juli 1863 in die Anstalt aufgenommen, nachdem er schon seit ungefähr 7 Jahren an Geisteskrankheit gelitten hatte, deren Beginn man in die Zeit der ihm ungünstigen Vermögenstheilung zwischen Aeltern und Kindern zurückversetzte.

Er ist 28 Jahre alt, von mittlerer Körpergrösse. Sein Gesichtsausdruck lässt die Secudärform des Blödsinns nicht verkennen. Ueber den früheren Verlauf des Leidens fehlen alle Nachrichten. Man hielt ihn in der Heimath für einen Simulanten, und dies findet allerdings einige Entschuldigung darin, dass er unter oberflächlicher Beobachtung eines Laien den Eindruck eines Possenreissers zu machen geeignet ist. Er zeigt nämlich eine fabelhafte Agilität, fährt in rasender Eile von einer Ecke des Zimmers in die andere, greift nach allen glänzenden Gegenständen, die er an Personen wahrnimmt,

*) *Romberg* und *Bell* fanden Aehnliches bei mastikatorischer Lähmung.

Digitized by Google

z. B. Ringen, Uhrketten, ja sogar den Stiefeln, mit einer Hast und Begierde, als ob er sie gewaltsam sich aneignen wollte, obwohl er sie kaum berührt; pfeifft dabei Bruchstücke von Melodien, verlangt tausenderlei Dinge, ohne Rücksicht auf Gewährung oder Nichtgewährung mit gleichgültiger Miene, giebt auf keine Frage Antwort und versetzt, bei unverkennbarer Unabsichtlichkeit seine Umgebung nicht selten durch seine ständige Unruhe in Furcht und Schrecken.

Die deshalb angeordnete Isolirung hatte zwar die Folge, dass er seine Sprünge und Grimassen mässigte, dagegen aber der Onanie sich ergab, seine Kleider zerriss und höchst unreinlich wurde. Man hielt es sonach für zweckmässiger, ihn, unter Beschränkung mittelst einer Jacke, der Gesellschaft der übrigen blödsinnigen Pfleglinge zurückzugeben, und nachdem er im Verlaufe der Beobachtung nebst seiner Unheilbarkeit auch als ungefährlich sich erwiesen hatte, wurde er, wegen Ueberfüllung der Anstalt, in die Heimath (unweit Regensburg) beurlaubt.

Sein Porträt (Abb. 1.), ist sehr wohl gelungen und zeigt die auffällige Krümmung der Gesichts-Contour von links nach rechts. Diese Krümmung gewinnt noch mehr an Ausprägung, wenn der Kranke Kaubewegungen macht, spricht, oder auch mit geöffneter Mundspalte, in sich selbst versunken, in einer Ecke sitzt. In letzter Situation zieht sich die Mundspalte sehr entschieden nach rechts und aufwärts, so dass neben der Contractur des *Pterygoideus externus*, welche den ganzen Unterkiefer nach dieser Seite lenkt, auch der *Levator labii superioris* in Mitleidenschaft begriffen zu sein scheint. Weniger lässt sich die Betheiligung des Schläfemuskels ermitteln, indem die Auf- und Niederbewegung des Kiefers beim Kauen auf beiden Seiten, obwohl der Kranke vorherr-

Digitized by Google

schend die krampffreie Seite bewegt, mit ziemlich gleicher Fertigkeit von Statten geht.

Der dichte Haarwuchs des Kranken und die gespannte, derbe Kopfschwarte verhindern die Möglichkeit einer manuellen Exploration der Schädelnähte, und es ist hierdurch die Sicherheit der Diagnose, betreffs allenfallsigen Vorhandenseins von Asymmetrien, empfindlich gestört. Allein die habituelle, wenn auch unbedeutende Schiefstellung des Rumpfes, die beim Photographiren zum Zwecke klarerer Gesichtscopie sorgfältig corrigirt wurde, lässt allerdings auch plagiocephale Schädelverhältnisse vermuthen, indem bei Plagiocephalien erfahrungsgemäss sehr häufig auch Schiefstellungen des Rumpfes beobachtet zu werden pflegen.

Eine gleiche Unsicherheit der Diagnose tritt uns bezüglich der anatomischen Läsionen des Unterkieferknochens selbst entgegen. Es scheint zwar, als ob die rechte Hälfte desselben etwas verkürzt sei, und diese Abweichung in den Dimensionen wäre auch die einzige Anomalie, die nach den Erfahrungen *Stromeyer*'s (Beiträge zur operativen Orthopädik), trotz halbhundertjähriger Andauer von Contracturen an den Knochen aufgefunden werden könnte; allein bei der Schwierigkeit der Messungen am lebenden Individuum und, bei der wahrscheinlich doch nur geringen Differenz, müssen wir den Beweis ihres Vorhandenseins unbedingt schuldig bleiben.

Die Kiefergelenke endlich dürften, da alle Bewegungen in denselben ungehindert von Statten gehen, als völlig intact angenommen werden.

Fall III.

Josef Stoiber, 32 Jahre alt, seit dem 19. Juli 1866 Pflegling unseres Asyls, hat eine mikrocephale Schädelconfiguration. Besondere Abnormitäten an den Nähten

Digitized by Google

und Kopfknochen sind durch manuelle Untersuchung nicht zu entdecken. Sein geistiger Zustand gehört noch nicht dem vollen Blödsinne an und der Kranke ist noch zeitweise zu Arbeiten mancherlei Art verwendbar. Er leidet an epileptischen Anfällen mit nachfolgenden Agitationszuständen. Seine Gesichtsverkrümmung tritt nach mehrmals einanderfolgenden oder heftigeren Paroxysmen viel deutlicher zu Tage und, dies gewinnt dadurch ein erhöhtes Interesse, dass er gleichzeitig an Strabismus leidet, der, je nach Zahl und Heftigkeit der epileptischen Anfälle, in gleichem Maasse mit der Contractur des *Pterygoideus externus* ausgeprägter erscheint. Mit diesem Falle wäre denn die Vermuthung gerechtfertigt, dass auch die Contractur des *Pterygoideus*, analog anderen Krampfformen, wie Klumpfuss, Schiefhals, Schielauge u. s. w. als vorübergehendes Leiden auftreten könne*), und es kann hier wohl angenommen werden, dass mindestens während der epileptischen Anfälle auch die centrale Bahn des *Quintus* sich betheilige, da mehrerlei Muskelcontractionen (wenngleich vorübergehend) in der Richtung seiner Austrahlung auftauchen, während bei sämmtlichen Individuen, welche an isolirt bestehender Contractur des *Pterygoideus externus* leiden, die peripherische Bahn, Schädelgrundfläche und Gehirnbasis lädirt zu sein scheinen. Und letzteres ist im Falle I. durch die aufgefundene Knochenexostose am Basilarbeine thatsächlich nachgewiesen.

Fall IV.

N. N., ein Mann in den vierziger Jahren, Kanzlist im Bureau einer höheren Behörde in Bayreuth, meinem früheren Berufsorte, starb bald nach meiner amtlichen

---

*) Dr. *Ludwig Schlager*, Vorträge über Erkenntniss und Behandlung der Geistesstörungen. S. 120.

Digitized by Google

Versetzung von dort und ich musste deshalb auf seine Leichenöffnung leider verzichten. Seine Störung äusserte sich in einer tiefen melancholischen Verstimmung mit peinlichen Gehörshallucinationen. Er hielt sich beständig von seinen zahlreichen Collegen für verspottet und verhöhnt, versah jedoch seine Functionen dessenohngeachtet bis zur letzten tödtlichen, mir unbekannten Krankheit, ununterbrochen fort.

Die Contractur des *Musculus pterygoideus* war bei ihm in demselben Maasse, wie im vorerwähnten Falle, ausgeprägt und ebenso zeigte er auch Schiefverhältnisse des Schädels, Plagiocephalie, und leichte Wirbelskoliose, die selbst dem Laien auffielen.

Es lag demnach dieser Gesichtsdeformität gleichfalls eine angeborene, einseitige Gehirnatrophie zu Grunde, in welcher wir auch die congenitale Disposition zur geistigen Störung vermuthen.

Fall V.

Dieser Fall betrifft einen jungen, geistig sehr begabten, etwa 25jährigen Gelehrten mit Verkrümmung des Unterkiefers von rechts nach links.

Kurz vorher, ehe ich ihn kennen lernte, war er von einem mehrmonatlichen Tobsuchtsanfalle genesen, ist aber nun mit vollstem Eifer wieder in der Fortsetzung seiner Studien begriffen. Ob auch bei ihm plagiocephale Schädelconfiguration vorhanden sei, weiss ich nicht anzugeben, da ich ihn aus Discretion nicht näher untersuchen konnte.

Mehrfache später wieder eingetretene, obwohl vorübergegangene Gemüthsverstimmungen erweisen übrigens, dass seine derzeitige Genesung die Gefahr eines Rückfalles in ausgesprochene geistige Störung nicht ausschliesst.

Digitized by Google

II.

Exostosis cartilaginea.

Nieskrampf mit Contractur des *Musculus compressor nasi.*

Bei nachstehendem Krankheitsbilde spielt, wie bei den vorerwähnten Fällen von Contractur des *Musculus pterygoideus externus*, gleichfalls der *Nervus trigeminus* eine wichtige Rolle. Hier ergab der anatomische Befund eine *Exostosis cartilaginea*, genau an jener Stelle des Clivus, an welcher der *Nervus quintus* einen Zweig an das *Ganglion Gasseri* absendet und, während der Nieskrampf unter dem Einflusse dieses Nerven gedacht werden muss, scheint die Contractur des *Musculus compressor nasi* durch Reflexwirkung auf den *Nervus facialis* hervorgebracht zu sein.

Ehe ich jedoch zur ausführlichen Schilderung dieses Falles schreite, bemerke ich in Kürze, dass der Nieskrampf (*Ptarmus*, *sternutatio convulsiva*) nach *Romberg**) eine der selteneren Convulsionen und von den Nerven des exspiratorischen Muskelapparates abhängig ist.

Romberg erwähnt hierbei, dass er bei einer von vierzigjährigem Nieskrampfe befallenen Frau eine krankhafte Veränderung des Neurilems des III. Quintus-Astes vor seinem Austritte aus dem Schädel aufgefunden hat; nimmt jedoch ausser dem Quintus auch noch andere Stätten des Reflexreizes an, z. B. Uterin- und Intestinalnerven. Nach ihm findet sich diese Krampfform bei Hysterischen, bei Helminthiasis (als Parallele mit dem *Pruritus nasalis* der Kinder) und beim Keuchhusten, wobei sie in gleicher Ordnung und Frequenz, wie die Anfälle des Keuchhustens beobachtet wurde.

L. R., Bauer, soll sich stets der Völlerei ergeben haben und schon seit langer Zeit vorherrschend von der Wahnidee befangen

---

*) a. a. O. p. 359.

Digitized by Google

gewesen sein, sein Vetter trachte ihm nach dem Leben. Da er nun, um diesem Vetter das Praevenire zu spielen, ihn zu erschiessen Anstalt machte, wurde er den 13. Juli 1862 in unser Asyl verbracht, woselbst er am 7. Mai 1867 in seinem siebenzigsten Lebensalter verstarb.

Er war von grosser, kräftiger Gestalt und wohlgenährt. Sein Gesicht trug schon die Spuren des Alters; es war sehr faltig. Er zeigte ein mässiges Ectropium der unteren Augenlider und eine chronische Blennorrhoe der *Conjunctiva palpebrarum*. Seine Nasenspitze war auffallend nach rechts herübergezogen, und dies verlieh seiner Physiognomie einen komischen Ausdruck.

Nach seiner Aufnahme war er sehr agitirt, litt namentlich des Nachts an Visionen und Gehörstäuschungen und wurde erst im Verlaufe einiger Wochen etwas ruhiger; jedoch schlief er nie anhaltend, plauderte auch bei Tage immerwährend vor sich hin, und befand sich stets in halblauter, delirienartiger Verwirrung. Er kam nicht selten mit Anderen in thätlichen Conflict, vernachlässigte sein Aeusseres vollständig, hielt sich zu allen Zeiten höchst unreinlich und konnte füglich schon jetzt in die Gesellschaft der Blödsinnigen eingereiht werden.

Er hatte aber auch ein Uebel an sich, das ihn seinen Leidensgefährten ganz unmöglich machte. Er litt nämlich sehr häufig und ohne Unterschied der Tageszeit an einem Nieskrampfe, dessen Intensität unter allen Umständen seine schleunigste Isolirung erforderte. Das krampfhafte Niesen wiederholte sich mindestens 20 bis 30 Mal in einem Paroxysmus, wobei der Kranke einen colossalen Katzennebel um sich verbreitete und seine ganze Umgebung mit Speichel und Schleim besudelte, welche Secrete durch die unfläthige Gewohnheit des „Schmalzlerschnupfens“ an Eckelhaftigkeit gewannen. Wurde er von dieser Sternutation bei Tische befallen, so musste man ihn, um nicht den Appetit der übrigen Tischgenossen augenblicklich zu vernichten, schnellstens entfernen und des Nachts war man längst genöthigt, ihn allein schlafen zu lassen, nachdem er einmal von seinen, dem gutmüthigsten Schlage angehörigen Bettnachbarn, weil er sie mit seinem spanischen Nebel aus dem Schlafe aufgeschreckt hatte, mit Prügeln traktirt und von dem Wartpersonal nur mit grösster Mühe von weiteren Misshandlungen durch Versetzung in die Einsamkeit gerettet worden war. Wenn er aber auch, was selten geschah, einmal wegen seiner Nieskrämpfe von Niemanden angefeindet wurde, so suchte er sogleich selbst gegen den Nächsten, Besten Gewaltthätigkeiten auszuüben, indem er in der Meinung lebte, dass ihm das Ungemach von fremdem Einflusse zugefügt werde.

Digitized by Google

Anfangs April 1867 bemerkte man an ihm häufig vorübergehendes Zucken der rechten Seite der Oberlippe, einen schwerfälligeren Gang, Verschlimmerung seiner Blepharitis, einen gewissen Grad von Schlafsucht, und am 15. Mai fiel er, nachdem er vorher die Arme auf den Tisch gelegt und den Kopf schlummernd darauf gestützt hatte, plötzlich vom Sitze auf den Fussboden herunter, wobei er sich die Haut der Stirn und des äusseren Augenwinkels linkerseits verletzte. Beim Aufrichten ergab es sich, dass er von Apoplexie betroffen war. Er konnte nicht mehr gehen. Es erschien die rechte Körperhälfte paralysirt. Sein Bewusstsein war, obwohl nicht ganz aufgehoben, doch sehr getrübt. Er konnte die an ihn gestellten Fragen nicht beantworten, bemühte sich jedoch zu sprechen und verfiel hierbei in lallende, unverständliche Articulationen. Die Athmung ging etwas schneller und mit einiger Anstrengung von Statten. Zu Bette gebracht, schloss er die Augen, zeigte starke Lichtscheu und öffnete die Lider nach Verdunkelung des Zimmers nur momentan. Später wurde auch das Kauen und Schlingen erschwert. Er wälzte die einzelnen Bissen lange Zeit im Munde herum, konnte in der Folge nur flüssige Nahrung und Hachis geniessen, deglutirte selbst diese Substanzen nur mit vieler Mühe und starb endlich unter stetiger Abnahme der Kräfte und des Bewusstseins am 27. Mai 1867 Nachts 1 Uhr.

Der Obductionsbefund ergiebt ausser einer handtellergrossen Decubitusröthe am Kreuzbein folgende Anomalien:

Schädelconfiguration makro-plagiocephal. Die Nähte sind trotz des hohen Alters, namentlich die Kranz- und Pfeilnaht, sehr limbös. Die Abdachungsstelle der letzteren, welche sehr frühzeitig beginnt, ist bis zum Eintritt in die Lambdanaht mehr oder minder durch Alterssynostosie verschmolzen. Nach vorn mündet die Sagittalnaht in nach rechts abgeschweifter Richtung in die *Sutura coronalis*, wodurch sich ein leicht asymmetrisches Verhältniss bildet. Die grosse Fontanellgegend ist blasenförmig aufgetrieben. Ebenso die Mittelpartie der Scheitelbeine, was am linken *Tuber parietale*, im Vergleiche zur rechten, etwas verengten Schädelhälfte besonders hervortritt. Die *Calvaria* ist wegen ausgebreiteter Verwachsung mit der *Dura* sehr schwer abnehmbar, mässig dick und sklerosirt. Letztere sehr blutreich, faltig, theilweise an der Innenwand der *Calvaria* in Rudimenten anklebend. Der *Sinus longitudinalis* enthält eine Menge schwarzen, coagulirten Blutes. Die linke Hälfte der *Dura* ist mit der, fast schwartenartig verdickten *Arachnoidea* verwachsen und muss mit einiger Mühe von ihr abpräparirt werden. Nach Entfernung derselben entdeckt man eine auf der *Pia mater* lie-

Digitized by Google

gende Meningealapoplexie von enormer Ausdehnung. Sie deckt die ganze linke Hemisphäre, von der Mitte des Stirnbeins beginnend, bis zur *Linea cruciata*, wo diese die beiden Schädelhälften scheidet, sich erstreckend, und zieht sich sogar einige Linien weit in die Schädelgruben hinein. Das Extravasat ist theils flüssig, theils in grossen Klumpen coagulirt. Nach seiner Hinwegnahme zeigt sich die *Pia* wenig verdickt und leicht von der Gehirnoberfläche ablösbar. An der rechten Hemisphäre sind *Arachnoidea* und *Pia* unverletzt; jedoch etwas getrübt und mit wässerigem, milchweissen, mancher Orten auch mit gelatinösem Exsudate ausgefüllt. An der Gehirnoberfläche bemerkt man Schwund der vorderen Lappen, sowie an der übrigen Convexität der Hemisphären mehrere eingesunkene Stellen vom Umfange eines halben Guldenstücks bis zu Thalergrösse; vorzüglich aber erscheint die vom Extravasate betroffene Gehirnhälfte auffallend geschwunden, abgeflacht und die *Gyri* dieser Regionen wie abgeschliffen. Die graue Substanz ist sehr blass, die weisse ödematös, mit sehr weiten und zahlreichen Gefässöffnungen versehen. Die grossen Gehirnhöhlen sind nach vorn und hinten stark extrudirt, mit Wasser gefüllt; das rechte Hinterhorn länger, als das linke; das *Ependyma* verdickt, *Fornix* und *Corpus callosum* ziemlich erweicht. Die übrigen Hirnhöhlen gleichfalls erweitert. Das Kleinhirn sehr weich. In der Schädelbasis befindet sich eine Menge wässerig, blutiger Flüssigkeit.

In den übrigen Körperhöhlen ergab die Section mit Ausnahme einer Verknöcherung der *Valvula mitralis* und einer grossen Quantität Gallensteine nichts erwähnenswerthes.

Messung und nähere Betrachtung des Schädelskelets liefern folgende Abnormitäten:

Von der Nasenspitze bis zum gewölbtesten Theile des Hinterhauptbeines, welcher hier auf die linke Seite fällt (hintere Plagiocephalie) 7″ 6‴.

Von der Nasenspitze bis zur entsprechenden Region der rechten Hälfte des Hinterhauptbeines 6″ 11‴.

Vom linken *Tuber frontale* zur stärksten Wölbung des Hinterhauptbeines rechter Hälfte 6″ 5‴.

Von der Wölbung des einen Schläfenbeins zu der des andern 5″ 3‴, Von der *Protuberantia ossis bregmatis* der einen Seite zu der der anderen 5″ 8‴.

Von der äusseren Fläche eines *Processus mastoideus* zum andern 4″ 8‴. Von der äusseren Seite des einen Jochbogens zum anderen 5″.

Der Schädel von oben betrachtet fällt im Allgemeinen durch

Digitized by Google

seine Breitendimensionen auf. Die sämmtlichen Nähte sind trotz des hohen Alters grosszackig entwickelt. Die Pfeilnaht bildet an ihrer Mündung in die Kranznaht, wie bereits erwähnt, eine schwache Bogenkrümmung nach rechts und es ist schon hierin die beträchtliche Erweiterung der linken Schädelräume, welche am Hinterkopfe vorzüglich ausgesprochen ist, angedeutet. An der Abdachungsstelle der Pfeilnaht bemerkt man eine ca. ½" nach abwärts sich erstreckende Altersynostosie. Vom Dreieck der Lambdanaht anfangend ist die linke Schädelhälfte im Verhältnisse zur rechten um ein Bedeutendes herausgewölbt, so dass schon von oben betrachtet die hintere Plagiocephalie in die Augen springt.

Bei Anschauung des Kopfes von vorn wird man ebenfalls von den grossen Breitedimensionen des Gesichts überrascht. Der linke Oberkieferknochen ist durch Schwund der Alveolarfortsätze bei Verlust sämmtlicher Zähne dieser Seite, weniger entwickelt als der rechte, in welchem sich noch ein Zahn befindet. Jochbein und Jochbogen sind sehr stark ausgebildet. Die Nasenwurzel ist sehr breit; sie misst über 1" und übertrifft daher die gewöhnliche Breite um 3—4'''. Auch die Augenhöhlen sind sehr in die Breite gezogen und der Querdurchmesser, welcher 1" 5''' beträgt, übertrifft den Höhendurchmesser von 1" 3''' um 2'''. Der Stirnknochen fällt nicht minder durch seine Breite auf. Dieselbe beträgt an den Vereinigungsstellen mit den Keilbeinflügeln und Scheitelbeinen 4" 8'''. Die Protuberanzen des Stirnbeins sind wenig markirt.

Die Seitenansicht des Schädels ergiebt nach beiden Hälften wesentliche Verschiedenheiten; namentlich ist das *Tuber parietale* und die grösste Wölbung des Scheitelbeins, sowie die des Hinterhauptbeins links auffallend mehr nach hinten geschoben, als auf der rechten Seite. Diese hintere Plagiocephalie gründet sich aber nicht, wie gewöhnlich, auf einseitige Verschmelzung der Lambdanaht, welche hier durchgehends in grossen Limben und hie und da mit Zwickelknochen untermischt angezeichnet ist, sondern durch vollständige Synostosis der Mastoidealnaht der rechten Seite, welche linkerseits noch grosszackig ausgeprägt erscheint.

Von unten betrachtet imponirt aber wieder die grosse Breite des Schädels. Es stehen nämlich die unteren Spitzen der *Processus mastoidei* 4" 7''' von einander. Der linke ist bedeutend kürzer als der rechte. Auch zeigt sich hier, wie bei der Ansicht von vorn, der gänzliche Schwund des linken Alveolarprocesses in Folge von Zahnlosigkeit, während der rechte noch theilweise erhalten ist.

Die Betrachtung des inneren Schädels zeigt für die Lage der linken Gehirnhälfte durchaus grössere Räume und Vertiefungen. An

Stelle der *Protuberantia occipitalis interna* befindet sich eine tiefe, rautenförmige 1" 4‴ lange und 11‴ breite Einsenkung, und am linken Rande des *Os basilare* ungefähr 5‴ von der Sattellehne entfernt und hart hinter der vollkommen ossificirten *Synchondrosis sphenooccipitalis* endeckt man eine circa erbsengrosse Ecchondrose, auf deren Spitze ein leicht ablösliches Knorpelstückchen sich anheftet. Der Auswuchs entspricht bezüglich seiner Lage genau jener Stelle, an welcher der *Nervus trigeminus* einen Zweig an das *Ganglion Gasseri* abzugeben pflegt.

Dieser Fall charakterisirt sich nun in kurzer Zusammenfassung in folgender Weise:

Es besteht auch hier eine morphologische Störung desGehirns, und zwar zeigt sich die rechte Hälfte atrophirt, während die linke in ihrem hinteren Lappen vorherrschend entwickelt erscheint. Das Vorhandensein einer sehr limbösen Mastoidealnaht dieser Seite, welche rechts vollständig mangelt, und wodurch eine hintere Plagiocephalie eigener Art gebildet wird, giebt schon in der Configuration des Schädels hiezu die diagnostische Andeutung. Sämmtliche in so hohem Alter noch durchgehends grosszackigen Nähte und der beträchtliche Umfang des Schädels im Allgemeinen, lassen überdies auf den Ablauf eines in der Jugend bestandenen chronischen Wasserkopfes mit ziemlicher Sicherheit schliessen. Die Differenz in der Entwickelung der Gehirnhälften ist hier eine sehr ergiebige, indem die beiden Längenmaasse von der Nasenspitze und dem *Tuber frontale* bis zur grössten Wölbung des Hinterhauptbeins linkerseits, die rechte Schädelhälfte um 7‴ und 6‴ übertreffen, und in diesen Verhältnissen wäre somit auch die Disposition zur geistigen Erkrankung theilweise gegeben.

Der sehr intensive, die bessere Existenz des Kranken in der Anstalt manichfach beeinträchtigende Nieskrampf dürfte durch die aufgefundene Knochenexostose am linken Rande des Basilarbeins, als in der Bahn des *Nervus trigeminus* liegend, seine Erklärung finden, wäh-

Digitized by Google

rend die Contractur des *Musculus compressor nasi* rechterseits als eine Reflexwirkung auf den *Nervus facialis* aufzufassen ist.

Die geistige Störung selbst aber ist hauptsächlich als Folge der so evident ausgeprägten Alters-Atrophie des Gehirns zu betrachten und es erregt ein ganz besonderes Interesse, dass gerade die vorherrschend entwickelte linke Gehirnhälfte, woselbst sich der weitverbreitete apoplectische Herd, die schwartenartige Verdikkung der *Arachnoidea* u. s. w. vorfanden, überwiegend vom Schwunde betroffen waren.

III.

Zahlreiche, diffuse Enostosen des Clivus.

Mimischer Gesichtskrampf mit manichfachen anderweitigen Motilitätsstörungen.

(Abbildung 4 und 5.)

Auf den verschiedenen Abtheilungen der Irren-Anstalten befindet sich in der Regel eine nicht unbeträchtliche Anzahl sogenannter Grimassiers, die Verzerrungen der Gesichtsmuskeln von grösserer oder geringerer Intensität zur Schau tragen. Die mimischen Erscheinungen sind jedoch meist vorübergehend und theils von augenblicklichen Stimmungen, Angst, Zorn u. s. w., theils von dem momentanen Vorstellungsinhalte der Kranken abhängig. Jene Form des mimischen Gesichtskrampfes, wie sie in den Nervenpathologien von *Romberg*, *Leubuscher*, *Hasse* etc. abgehandelt ist, dürfte sich wohl auch bei Geisteskranken seltener vorfinden.

Der nachstehende Fall zeichnet sich aber im Zusammenhalte mit diesen Schilderungen dadurch besonders aus, dass der Krampf beiderseitig bestand und, dass er selbst im Schlafe noch fortdauerte. Seine Wirkung hatte die Furchen und Gruben im Gesicht bleibend ver-

Digitized by Google

tieft. Es waren ausser dem *Nervus facialis* nicht blos die Bahnen des III. Quintus-Astes, sondern auch Cervical- und Spinal-Nerven betheiligt und beim Leichenbefunde ergab sich eine ganze Musterkarte von Clivus-Enostosen, deren Lagerung den Ursprungsstellen der verschiedensten Gehirnnervenpaare entsprach.

Die Gefahr einer Verwechselung des Krankheitsbildes mit der Chorea kann hier kaum in Betracht kommen, da das paroxysmenweise Auftreten derselben vollkommen fehlte. Dagegen erinnern mancherlei Erscheinungen an eine wahrscheinliche Complication mit *Paralysis agitans*.

Anton Haupt aus Pfreimd, wurde am 3. Januar 1866, 43 Jahre alt, in hiesige Anstalt verbracht. Er hat in der Jugend tüchtige Geistesgaben an den Tag gelegt, lernte später das Bäckerhandwerk, übte dasselbe lange Zeit als Geselle in Wien aus und kehrte von dort, woselbst er die Revolution mitgemacht hatte, im Jahre 1849 mit den abenteuerlichsten demokratischen Ideen behaftet in seine Heimath zurück. Hier traf er seine Familie in einer verzweifelten Situation. Es waren nämlich mehr oder minder sämmtliche Glieder derselben dem Wahnsinne verfallen. Der Vater, früher Maurer, dann längere Zeit Gensdarm, hatte sich nach seiner Verehelichung als Seifensieder ansässig gemacht, kam jedoch in seinen Vermögensverhältnissen gänzlich herunter, wurde hierauf von Grössenwahnsinn ergriffen, ergab sich dem Müssiggange und behauptete, dass er noch ein grosser Mann von Macht und Reichthum werde; zugleich sagte er sich mit allen den Seinen von der katholischen Kirche los, und ergab sich mit ihnen einem selbsterdachten eigenthümlichen Kultus, der hauptsächlich in Tag- und Nachtgebeten um Rache gegen die Bewohner seiner Heimath und alle seine Feinde bestand. Mutter, mehrere Söhne und eine blödsinnige Schwester waren mit dem Vater

Digitized by Google

von gleichem Hasse gegen ihre Umgebung beseelt und führten alle Handlungen des Wahnsinns mit ihm in gleichem Eifer aus. Da kam zum Ueberfluss noch *Anton* aus Wien zurück und vermehrte die Corruption der Familie mit der Behauptung, dass er mit einer Princessin des Fürsten *Windischgrätz* verlobt sei und alle seine Angehörigen demnächst in den glänzendsten Equipagen nach Wien abgeholt würden. Trotz der Armuth und Brodlosigkeit der Familie wurde von ihr jede Unterstützung von Seiten der Gemeinde mit Hochmuth zurückgewiesen. Die Polizeibehörde schritt inzwischen „wegen Arbeitsscheu" strafend ein und nach und nach wurde jedes Glied der Familie mit Arbeitshausstrafe belegt. Nach dem endlichen Tode des Vaters erklärte sich *Anton* für das Oberhaupt seiner Familie und beging, von dieser immer treulich unterstützt, die crassesten Thorheiten, bis man schliesslich auf die Maassregel verfiel, Geschwister und Mutter in einzelnen Arrestlokalen zu trennen und hierdurch ihre „Verschwörung" mit einem Male zu neutralisiren. *Anton* kam bei dieser Gelegenheit am unglücklichsten weg. Er wurde Jahre lang in ein Lokal eingesperrt, in welches niemals ein Lichtstrahl eindringen konnte. Während dieser ganzen Zeit hatte er nur ein einziges Hemde im Gebrauch, bestund sein Lager nur aus spärlichem, auf dem Fussboden ausgestreuten Stroh und war seine Nahrung so äusserst dürftig, dass er, wie es in seiner grässlichen Chronik lautet, sinnenschwach, kränklich und elend geworden war.

Seine Figur ist mittelgross, gracil, von geringer Muskulatur, die Haut erdfahl, etwas gelblich, das Gesicht voller Runzeln, vorzüglich sind die horizontalen Stirnrunzeln sehr tief ausgeprägt. Die Pupillen sind sehr gross, die rechte etwas grösser als die linke. Die Farbe der Iris ist grau und zeigt häufig einen Wechsel zwischen dunkleren und helleren Nüancen. Die Augen

Digitized by Google

sind in steter Bewegung; selbst beim Anreden scheint der Kranke unfähig zu sein, den Blick auch nur einen Moment auf den Sprecher zu fixiren, er schweift vielmehr stets mit ängstlicher Ungeduld umher, und dieselbe Beweglichkeit theilt sein ganzer Körper, indem der Kranke nicht im Stande ist, ruhig stehen zu bleiben, sondern fortwährend Fuss, Hand und Kopf bewegen muss. Die Versuche, mit ihm eine Unterhaltung anzuknüpfen, scheitern vollständig an seiner eintönigen Antwort. Er erwiedert auf jede Frage nämlich: „gut, sehr gut" und begleitet diese Worte mit einem höchst blöden Lachen, welches seine Physiognomie mit ihren herumvagirenden Augäpfeln zu einer wahrhaft scheusslichen Fratze umgestaltet. Seine Wünsche drückt er, wie ein Kind, durch einfache Benennung des desiderirten Gegenstandes aus. Uebrigens verhält er sich in Gesellschaft seiner Leidensgenossen friedfertig, obwohl in steter unruhiger Wanderung. Er ist bereits, wie aus dem Gesagten erhellt, dem Blödsinne verfallen, entspricht aber nicht dem Bilde der *Paralysis generalis*, wie man nach den von aussen eingelaufenen Mittheilungen über seinen angeblich früher aufgetretenen Grössenwahn erwartet hatte. Seine körperliche Schwäche, die sich überdies schon in den ersten Monaten seines Aufenthalts dahier sehr bedeutend gebessert hat, scheint vielmehr als eine Nachwirkung langjähriger Verwahrlosung, wenn nicht Misshandlung aufgefasst werden zu müssen.

Seine Schädelconfiguration gehört der *Makrocephalie* an. Der Umfang des Kopfes zeigt nämlich im Ganzen ziemlich ergiebige Dimensionen und es lassen sich bei genauer Exploration desselben die Nähte mancher Orten deutlich (wohlerhalten) durchfühlen, sodass ein in der Jugend abgelaufener hydrocephalischer Process mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann. An der Fontanelle ist eine blasige Erhebung bemerkbar. Am

Digitized by Google

Hinterhaupte tritt uns eine auffällige Asymmetrie entgegen. Die linke Hälfte desselben ist um ca. 5‴ mehr hervorgewölbt, als die rechte. Die grösste Wölbung desselben fällt überhaupt fast unmittelbar unter die Vereinigung dieses Knochens mit den Scheitelbeinen und zwischen ihr und der *Protuberantia occipitalis externa* findet sich eine beiläufig zollbreite, querlaufende, 3″ lange Vertiefung. Sehr entwickelt sind ausserdem die Schläfenbeinwölbungen und es beträgt die Dimension von einer zur andern 5″7‴, so dass hierdurch der Kopf eine ausgeprägt rundliche Form erhält.

Die Grimassen des Kranken durchzucken blitzähnlich den ganzen Bereich der Gesichtsmuskeln und werden sogar von den komischsten Bewegungen der Arme und Beine accompagnirt. Es ist eben ein Complex von Bewegungen zu beobachten, der sowohl auf den Bahnen des *Nervus facialis*, des *Trigeminus (pars minor)*, des *Oculomotorius*, des *Accessorius Willisii*, als auch auf den Bahnen der Cervical- und Spinal-Nerven abwechselnd zu spielen scheint.

Der Kranke zieht beständig die Stirn- und Hinterhauptmuskeln auf und nieder, blinzelt mit den Augenlidern, rollt den *Bulbus* hin und her, macht öfters Kaubewegungen, drückt Kiefer und Lippen aneinander, wirft den Kopf bald gegen die rechte, bald gegen die linke Schulter, begleitet diese Gesten mit zwecklosen Arm- und Handbewegungen, indem er schnell nach Kopf und Gesicht greift, bald auf dem Bauche mit den Fingern spielt und hiebei einen zappeligen Schritt einschlägt, der dazwischen wieder von grösseren Sprüngen (Hüpfen) oder ruhigem Gange unterbrochen wird. Seine Wirbelsäule ist etwas scoliotisch nach rechts verkrümmt. Des Nachts dauern die Bewegungen in den Gesichtsmuskeln auch im Schlafe fort, während die Bewegungen der Ex-

Digitized by Google

tremitäten mit Ausnahme zeitweiser Zuckungen in den Armen sistiren.

Anfangs Februar 1868 bemerkte man zuerst das Vorhandensein hydropischer Erscheinungen, Oedem der Augenlider und Handrücken. Diese Erscheinungen mehrten und steigerten sich rasch. Es bildete sich hiebei Hydrothorax aus und nach mehrtägiger heftiger Athemnoth starb der Kranke am 25. Februar, nachdem sich schon mehrere Wochen vorher Lähmungserscheinungen der Sphincteren des Afters und der Blase eingestellt hatten.

Die Leichenöffnung ergab in Kürze folgenden Befund: Der Leichnam trägt äusserlich die Anzeichen allgemeiner Hydropsie. Die Schädelconfiguration gehört in die Categorie der Makrocephalen. Die Nähte sind sämmtlich limbös. Die *Calvaria* ist sehr dünnwandig, stellenweise mit der *Dura* verwachsen. In den Subarachnoidealräumen befindet sich starker Wassererguss. Die Gehirnsubstanz ist ödematös. Die Seitenventrikel sind nach vorn und hinten sehr erweitert und ihre Umgebung, namentlich *Corpus callosum* und *Fornix* hydropisch erweicht. In der dritten Hirnhöhle fehlt die mittlere *Commissur* vollständig. Dritter und vierter Ventrikel enthalten ebenfalls reichliches Wasser. Die Pleurasäcke sind mit wässerigem Exsudate gefüllt, die Lungen ödematös. Das Herz ist abnorm klein, der Klappenapparat normal. In der Bauchhöhle ebenfalls reichliches Wasser. Am *Pylorus* zeigt sich eine circuläre starke Injection. Die Unterleibsorgane sind ohne wesentliche Veränderung. Im Rückenmarke ist die *Dura* blass, die *Pia* sehr gefässreich, wässerig durchfeuchtet; die Substanz selbst weich, in der Gegend des 3. bis 4. Brustwirbels eine breiig zerfliessende Stelle.

Digitized by Google

Untersuchung des Schädelskelets.

Schädelmaasse.

Von der Nasenspitze bis zum gewölbtesten Theile des Hinterhauptbeins, welcher hier auf die linke Hälfte dieses Knochens fällt, 7″ 1‴.

Von der Nasenspitze bis zur *Protuberantia occipitalis* 6″ 5‴.

Von der stärksten Wölbung des Stirnbeins bis zur stärksten Wölbung des Hinterhauptbeins 6″ 7‴.

Von der stärksten Wölbung des Stirnbeins bis zur *Protuberantia occipitalis* 6″ 4‴.

Von der Wölbung des einen Schläfenbeins zu der des andern 5″ 5‴.

Von der *Protuberantia ossis bregmatis* der einen Seite zu der anderen 5″.

Von der äusseren Fläche eines *Processus mastoideus* zu der des andern 4″ 10‴.

Von der äusseren Seite des einen Jochbeins zu der des anderen 5″ 1‴.

Vom äusseren Gehörgange bis zur Scheitelhöhe 4″ 5‴.

Der Schädel von oben betrachtet zeigt eine fast rundliche Form, wobei jedoch die linke Hälfte durch Ausbuchtung dieser Seite des Hinterhauptbeins nach hinten etwas verlängert erscheint. Die Differenz beträgt im Vergleiche zur rechten Seite 4‴.

Von vorn betrachtet ergeben sich die Stirnbeinhöcker beinahe ganz verstrichen. Das Stirnbein ist an seiner Berührungsstelle mit der Nasenwurzel von starken hyperostotischen Wülsten abgegrenzt, welche sich bis in die Hälfte der Supraorbitalränder hinüberziehen. Die Augenhöhlen sind sehr in die Breite gezogen. Der Querdurchmesser derselben (1″ 6‴) übertrifft den Höhendurchmesser (1″ 2‴) um 4‴.

Im linken Profile tritt die halbseitige Rückwölbung

Digitized by Google

des *Os occipitis* sehr deutlich in die Augen, was auch bei Betrachtung des Schädels von hinten der Fall ist. Die Abdachung der Scheitelbeine findet man schon 2‴ über dem Dreiecke der Lambdanaht vollständig synostosirt und letztere mit kleinen Zwickelknochen durchsetzt.

An der unteren Fläche ist nichts Abnormes zu entdecken, jedoch ist das *Foramen jugulare* rechterseits um ein Bedeutendes grösser als links.

Die Betrachtung des Schädels nach innen ergiebt die oben erwähnte Asymmetrie des Hinterhauptbeins am klarsten, indem für die Lage des hinteren Lappens des linken Grosshirns eine breite tiefe Nische, für die des rechten eine seichte, mindestens um die Hälfte kleinere Nische sich vorfindet.

Am interessantesten aber erscheinen die Befunde am Clivus (s. Abbildung 5).

In der Mittellinie der Sphenooccipitalsynchondrose befindet sich eine circa 2‴ lange, schmale, von vorn nach hinten verlaufende, leistenartige, ziemlich niedrige Ecchondrose, der Richtung der Basilararterie entsprechend; am linken Rande des im Allgemeinen sehr breiten und flachen Clivus, unterhalb der Synchondrose eine länglich runde, oben rauhe Enostose von der Grösse einer grossen Linse bis halben Erbse, welche die Bahn des *Nervus trigeminus* berührt, ungefähr 3‴ unter ihr, dem Nervenbündel des *Facialis* anlagernd ein kleines Osteoid, während an derselber Seite, an den Ursprungsstellen des *Glossopharyngeus* und *Accessorius Willisii* zwei nahe aneinandersitzende Knochenknöpfchen (Osteophyte) sich befinden. Rechterseits am Clivus entdeckt man von vorn nach hinten zahlreiche diffuse, zum Theil griesliche, sowie an der hintersten Abdachung desselben, zwischen seinen Gelenktheilen und dem vorderen Rande des *Foramen occipitale* unregelmässig herumgelagerte, mehr oder minder seichte, warzenähnliche Unebenheiten.

Digitized by Google

Ueber die prognostische Bedeutung der erblichen Anlage im Irresein.

Von

Dr. **v. Krafft-Ebing,**
z. Z. in Baden-Baden.

Eine der practisch wichtigen und wissenschaftlich noch nicht genügend bearbeiteten Fragen scheint mir die, inwieweit die Abstammung von seelengestörten Vorfahren die Prognose in einem vorliegenden Fall von Irresein trübt oder günstiger gestaltet. Bekanntlich sprechen die neueren wissenschaftlichen Erfahrungen*) dafür, dass die erblichen Fälle *ceteris paribus* eine günstigere Vorhersage gestatten, als die nicht erblichen, während doch sonst in der Pathologie die Erblichkeit als *mali ominis*

---

*) Vgl. die werhvolle Arbeit von *Jung*, Allg. Zeitschr. f. Psych. XXI. S. 642; darnach wurden entlassen von 1010 hereditären Fällen:

geheilt 467 (224 M. i. c. 45,5 pCt.; 243 W. 46,9 pCt.),
gebessert 85 (43 M. i. c. 8,7 pCt.; 42 W. 8,1 pCt.),
ungebessert 342 (165 M. i. c. 33,5 pCt.; 177 W. 34,1 pCt.),
es starben 116 (60 M. i. c. 12,2 pCt.; 56 W. 10,8 pCt.);

von 2511 nicht hereditären Fällen:

geheilt 966 (38,47 pCt.), gebessert 222 (8,8 pCt.),
ungebessert 897 (35,7 pCt.), starben 426 (16,9 pCt.),

s. f. Statistik der Heilanstalt Illenau, Carlsruhe 1866. S. XXX. und Tabelle XXIV.

Digitized by Google

gilt und ältere Praktiker in Gutachten über den Anstalten zu übergebende Kranke gerade aus der etwa vorhandenen Erblichkeit der Störung eine ungünstige Vorhersage ableiten.

Für beide Annahmen finden sich in der Erfahrung Belege. Schon ein flüchtiger Ueberblick des Krankheitsverlaufes der erblich disponirten Kranken einer grösseren Anstalt zeigt die grössten Verschiedenheiten, im einen Fall eine überraschend schnelle, fast plötzliche und günstige Lösung der Krankheit, im andern hat das Leiden einen von vornherein durchaus schlimmen, secundären Charakter, einen progressiven Verlauf bis zu den äussersten Gränzen psychischer Entartung, der aller Bemühungen der Therapie spottet.

Offenbar ist der durchaus differente klinische Verlauf derartiger, mit dem ätiologischen Moment der Heredität belasteter Fälle darin begründet, dass der gemeinsame ätiologische Factor in sehr ungleichem Grad einwirkte, im einen Fall etwa nur eine geringere Widerstandskraft, eine grössere Vulnerabilität des psychischen Organs erzeugte (einfache hereditäre Prädisposition, locus minoris resistentiae), während er im andern schon ab ovo auf die ursprüngliche Organisation des Gehirns bestimmend wirkte, damit eine durchaus pathologische Entwickelung des Seelenlebens herbeiführte, so dass sich der endlich ausgebrochene Wahnsinn nur als das letzte Glied der psychopathischen Kette deuten lässt (constitutionelle Heredität, hereditäre Entartung, folie héréditaire). Diesen Voraussetzungen entspricht durchaus die Erfahrung, denn sie lehrt, dass die hereditäre Disposition ebenso gut ganz latent bleiben, als in einer von der frühsten Jugend anhebenden durchaus vom normalen Typus abweichenden Entwickelung des Seelenlebens sich äussern kann.

Diese quantitativ ungleiche Belastung mit dem here-

Digitized by Google

ditären Factor kann aber unmöglich für die Prognose gleichgültig sein, sie drängt zur Vorsicht nicht schlechthin das Moment der Erblichkeit bei der Erörterung ihres Einflusses auf die Prognose zur Geltung zu bringen und die Fälle, wo sie sich in einer einfachen Prädisposition erschöpft mit denen, wo schon früh ein Krankheitszustand sich aus ihr herausbildet, zusammenzuwerfen — im Gegentheil sie möglichst aus diesem Gesichtspunkt in Gruppen zu sondern, für jede einzelne den Krankheitsausgang zu ermitteln und so einen Rückschluss auf den prognostischen Einfluss des ganz ungleichmässig sie belastenden hereditären Moments gewinnen zu können. — Es lassen sich überhaupt verschiedene Gesichtspunkte aufstellen, von denen aus eine Behandlung der Frage, inwieweit die Erblichkeit einen prognostischen Einfluss gewinnen kann, möglich wäre: ein pathologisch-anatomischer, indem wir etwa unter der Einwirkung des hereditären Factors zu Stande gekommene Anomalien der Schädelbildung, des Gehirns, sowie der gesammten Constitution festzustellen suchen und sie den Fällen gegenüberstellen, in welchen jener zu keinen derartigen Abweichungen vom physiologischen Typus geführt hat; ein anthropologischer, indem wir untersuchen, welche besondere physische und psychische Krankheitszustände der Ascendenz belastend bei der Zeugung der Nachkommenschaft einwirkten und uns so einen Maassstab für die Beurtheilung schaffen; endlich ein symptomatologisch-klinischer, indem wir entweder den gesammten bisherigen psychischen Entwicklungsgang, die gesammte Pathogenese eines vorliegenden hereditären Falls ermitteln und daraus ermessen, wie weit im Vorleben ein hereditärer Einfluss belastend und bestimmend auf das Individuum einwirkte; oder indem wir das fertige Krankheitsbild nehmen und nach empirischen Zeichen desselben forschen, die auf das be-

Digitized by Google

sondere ätiologische Moment hindeuten und Anhaltspunkte für die Prognose abgeben könnten.

Leider zeigt sofort die Kritik, dass weder auf dem pathologisch-anatomischen nach dem anthropologischen Weg mit dem dürftigen Material das zur Zeit noch die Wissenschaft in dieser Hinsicht bietet, eine Erreichung des Ziels möglich erscheint; späteren Forschungen muss es aufbehalten bleiben, das kostbare Material für eine bessere Einsicht in den so dunklen Process einer erblichen Uebertragung von Krankheiten von der Ascendenz auf die Descendenz zu gewinnen.

Die Verwerthung des vorliegenden pathologisch-anatomischen Materials ist nicht möglich, weil, wenn auch in gewissen prägnanten Fällen anatomisch offenbar bestehende Störungen in der Bildung des Schädels, der äusseren Sinnesorgane, des Gehirns, der Ernährung der nervösen Centralapparate durch constitutionelle Anomalien der Blutbildung etc. als anatomische Substrate der hereditären psychopathischen Constitution angesprochen werden müssen, in anderen zahlreicheren Fällen diese Ernährungs- und Organisationsstörungen so fein und nur hypothetisch annehmbar sind, dass sie einer exacten Verwerthung nicht zugänglich erscheinen. Auch die anthropologische Ermittelung, welche psychisch-physische Eigenthümlichkeiten der Erzeuger zusammenwirkten, um die Descendenz mit dem Gewicht der Heredität zu belasten und wie weit die Wirkung von der Ursache abhängig sei, erscheint zur Lösung der Frage, woher es komme, dass der hereditäre Einfluss bald ein unbedeutender, bald ein deletärer sei, nicht ausreichend; denn eines Theils kennen wir noch nicht genau alle die pathologischen Zustände, welche einer Vererbung fähig sind, noch weniger die Formen ihrer Vererbung (directe oder transformirte) und deren Gesetze, andern Theils sind die physischen und psychischen Constitutionsverhältnisse

der Ascendenz oft nicht mit wünschenswerther Genauigkeit zu ermitteln, tritt oft der Atavismus hier störend ein und wird das anthropologische Fundamentalgesetz der Vererbung vielfach durch Interferenz in seiner Wirkung unklar gemacht. Dass in der Verschiedenheit der anthropologischen Bedingungen der Erzeuger nicht ein Maassstab für die Schwere der hereditären Belastung der Nachkommenschaft gegeben sein kann, lehrt die Erfahrung, indem sie Fälle vorführt, wo z. B. auf ganz geringfügige neuro- oder psychopathische Zustände der Ascedenz in erblicher Uebertragung die schwersten Psychosen mit oft durchaus degenerativem, progressiv deletärem Typus bei der Descendenz entstehen, während andererseits von schwer durchseuchten und psychisch entarteten Vorfahren, durch Interferenz günstiger anderweitiger Bedingungen, nur geringfügige Dispositionen und gutartige Psychosen übertragen werden können.

So bleibt nur der symptomatologisch-klinische Weg übrig, die Heranziehung des gesammten Vorlebens und psychischen Entwicklungsgangs eines der Psychose verfallenen Individuums, um daraus zu ermitteln, inwieweit eine stärkere oder schwächere hereditäre Belastung und Durchseuchung vorliege, und so den Einfluss dieses in verschiedenen Fällen ganz ungleichmässig sich geltend machenden Moments in Bezug auf Krankheitsverlauf und Prognose festzustellen.

Einen Versuch zur Lösung dieser Aufgabe sollen die nachfolgenden Zeilen bilden.

Die letzte angedeutete Frage, ob sich im individuellen Krankheitsbild Eigenthümlichkeiten finden lassen, die, von dem specifischen ätiologischen Moment abhängig, eine Verwerthung für die Prognose gestatten möchten, scheint mir noch nicht spruchreif und führt so in das Gebiet der speciellen Diagnostik, dass sie nur gelegentlich hier berührt werden kann.

Digitized by Google

Morel (traité des malad. ment. p. 519) hat sich schon mit dieser Frage beschäftigt und führt als charakteristische Kennzeichen seiner folie héréditaire — Plötzlichkeit des Ausbruchs der Störung, Geringfügigkeit der Gelegenheitsursache, grössere Periodicität in der Ablösung und Remission der Symptomreihen, Plötzlichkeit des Zurücktretens der Psychose, grosse Neigung zum systematischen Ausbau der Wahnideen, instinctive schlimme Strebungen und Handlungen bei scheinbar intacter Intelligenz etc. auf.

Endlich sollen die Formen der folie raisonnante, folie morale, folie sans délire, die sog. Monomanieen überaus häufig gerade bei hereditär disponirten Individuen sich finden. Wir werden auf diese Bemerkungen zurückkommen.

Eine Vorbemerkung scheint mir noch geboten, bevor ich die Resultate meiner Untersuchungen, inwieweit das gesammte Vorleben einen Anhaltspunkt für die Schwere der hereditären Belastung und deren etwaigen Einfluss auf die Prognose des Falls abgeben könne, mittheile, nämlich die Frage, ob bei der Annahme eines erblichen Einflusses auf die Nachkommenschaft nur auf die psychischen Krankheiten der Ascendenz im engeren Sinn Rücksicht zu nehmen sei, oder nicht vielmehr auch die verschiedensten sonstigen Hirn- und Nervenkrankheiten, auffallende Excentricitäten, moralische Depravationen und Anomalien des Charakters etc. der Erzeuger, sowie Psychosen bei sonstigen Blutsverwandten als mögliche Ursachen und Belege für eine erbliche Uebertragung mit herangezogen werden müssen.

Obwohl es mir nach eingehenden Untersuchungen der Stammbäume vieler Hunderte von Kranken feststeht, dass sämmtliche Hirn- und allgemeinen Nervenkrankheiten vom Gesichtspunkt der Heredität aus eine zusammengehörige Familie bilden und durch die verschie-

Digitized by Google

denartigsten Transformationen hindurch sich gegenseitig erzeugen können, schien es mir gleichwohl zur Gewinnung eines möglichst reinen Materials passend, nur solche Fälle der folgenden Untersuchung zu Grund zu legen, in welchen eine Abstammung in directer Linie von psychisch Gestörten oder gestört Gewesenen durchaus constatirt war. Das durch diese Beschränkung freilich decimirte, aber zuverlässige Material besteht aus 292 Krankheitsfällen (174 Männer, 118 Weiber), die in Bezug auf ihr Vorleben in Gruppen gesondert und deren Krankheitsverlauf und Ausgang dann ermittelt wurde.

Eine solche, ursprünglich zu einem ganz anderen, nämlich zu einem forensischen Zwecke unternommene Durchforschung der Vita anteacta, dieser hereditären Erkrankungsfälle, liess ihre Unterbringung in 3 Categorieen zweckmässig erscheinen.

A. Fälle, bei denen zwar die directe Abstammung von Seelengestörten feststand, aber im ganzen bisherigen Lebensgang sich nichts psychisch Abnormes auffinden liess, das auf eine Geltendmachung des hereditär-psychopathischen Factors hätte bezogen werden können — latente heredit. Prädisposition.

B. Fälle, in welchen im früheren Leben zeitweise oder dauernd hervorgetretene neuro- und psychopathische Erscheinungen auf ein Fortwirken des mit der Geburt übertragenen hereditären Factors und auf eine Beeinflussung der psychischen Entwickelung durch diesen schliessen lassen — offen zu Tage tretende hereditäre Prädisposition bis zu elementaren psychischen Störungen.

Die auf Rechnung des hereditären psycho-neuropathischen Einflusses kommenden, die später aufgetretene Psychose vorbereitenden oder ihren Eintritt vermittelnden Functionsanomalien derartiger Individuen sind sehr variabel.

Bei vielen äussert sich die hereditäre psychopathi-

Digitized by Google

sche Anlage vorwiegend in der sensiblen Nervensphäre, die sich dadurch als *locus minoris resistentiae* kundgibt. Solche Menschen zeigen oft schon in ihrer ganzen Constitution die äusseren Merkmale einer solchen Anlage. Sie sind meist zartgebaut, von feinem Teint, lymphatischer Constitution, in der Jugend vielfach mit scrophulösen Beschwerden behaftet, später zur Tuberculose disponirt. Ihr Blick hat, besonders bei weiblichen Individuen, jenes eigenthümliche Schwimmende, Schmachtende, dessen diagnostische Bedeutung von *Griesinger* schon hervorgehoben wurde. Eine bedeutende Erregbarkeit des gesammten Nervensystems findet sich bei den meisten derartigen Individuen, eine grosse Neigung zu Mitempfindungen und Irradiationen auf ausgedehnte Nervengebiete, wenn sie von Funktionsstörungen in irgend einem Theil des Nervenapparats befallen werden. So deliriren sie bei geringen fieberhaften Erkrankungen besonders leicht, schon in der Dentitionsperiode zeigte sich eine grosse Nervosität und Convulsibilität. Die Pubertätsperiode tritt im Allgemeinen früher bei solchen Personen ein, verläuft unter mancherlei nervösen Verstimmungen und psychischen elementaren Störungen. Früh und mächtig regt sich der Geschlechtstrieb und führt zu vielen sexuellen Verirrungen, besonders Onanie. Bei weiblichen Individuen zeigen sich mit dem erstmaligen Eintritt der *Menses* Neuralgieen, dabei lebhafte Irradiationen auf die verschiedensten Nervenprovinzen, Erscheinungen von Hysterie, *status nervosus* etc., welche mit dem jeweiligen Wiedereintritt der *Menses* wieder mehr weniger sich geltend machen.

Häufig fand ich bei solchen hereditär disponirten Frauenzimmern von der Pubertäts-Periode anhebende Zustände tiefer constitutioneller Anämie und Chlorose, die allen therapeutischen Eingriffen trotzten und bis ins reifere Alter fortbestanden. Andere solche Hereditarier

bieten eine auffallend entwickelte Phantasie bei wenig entwickelten intellectuellen Anlagen. Sie sind dann jene träumerischen, phantastischen Menschen, die in Künstlerkreisen nicht so selten sind, Menschen von grosser Sinnlichkeit, die dann grob zu Tage tritt und sich in sexuellem Excess geltend macht oder in veredelter vergeistigter Form bis zur religiösen Schwärmerei und Mysticismus äussert. Bei anderen ist es die Gemüthssphäre, die auffallende Erscheinungen bietet — Leute von grosser Emotivität oder umgekehrt erschreckender Gemüthsstumpfheit, von grosser Reizbarkeit, Neigung zu Affekten, die leicht pathologische Form annehmen und lange nachwirken. Viele derartige Menschen werden durch auf sie einwirkende äussere Einflüsse tiefer und nachhaltiger erschüttert als normale Durchschnittsmenschen, erfahren dadurch leicht nachhaltige an Gemüthskrankheit schon anstreifende Gemüthsbewegungen und zeigen vielfach einen völligen Mangel jener inneren Harmonie und Willens- und Gemüthsstärke, die nothwendig ist, um die Dissonanzen und Schwierigkeiten des socialen Lebens zu überwinden.

Aber auch sonderbare Präoccupationen, grundlose Verstimmungen, Neigung zu Selbstmord und andere krankhafte Antriebe finden sich zeitweise bei solchen Individuen.

Wieder bei anderen zeigt die Totalität des psychischen Lebens bemerkenswerthe Abnormitäten des Entwickelungsgangs und der Ausbildung.

Die Typen dieser Gruppe begegnen uns unendlich häufig im socialen Leben.

Bald sind es früh auftretende, stehend gewordene abnorme Stimmungen, Leidenschaften und Strebungen, die derartige Menschen auffallend erscheinen lassen und ihrem ganzen Wesen ein fremdartiges sonderbares Gepräge aufdrücken, bald ist es die Einseitigkeit gewisser

Digitized by Google

Begabungen und Willensrichtungen bei Stumpfheit und Unfähigkeit für die meisten übrigen des gewöhnlichen Lebens, bald das Excessive gewisser Stimmungen, die Verschrobenheit gewisser Gedanken- und Gefühlsrichtungen, die solche Leute vor der grossen Mehrzahl der anderen Menschen auszeichnen und ihnen einen pathologischen Typus verleihen.

In die Categorie dieser überaus zahlreich in der Gesellschaft vertretenen Menschen gehören jene Individuen, die man als excentrisch, überspannt bezeichnet, gewisse Sonderlinge, Misanthropen, politische und religiöse Schwärmer, Projectenmacher und Weltreformatoren, barokke Künstlergenies, Menschen von excessiver Begabung für ein eng umgrenztes Gebiet der Kunst und Wissenschaft bei Sterilität und Inaktivität für alles Uebrige, was ausserhalb ihres beschränkten Ideenkreises liegt.

Endlich Leute von auffallenden Charaktereigenthümlichkeiten, früh sich geltend gemacht habenden Leidenschaften und moralischen Gebrechen, sonderbaren und vielfach bedenklichen ethischen und rechtlichen Anschauungen und Grundsätzen.

Auch der gesammte Entwickelungsgang bei solchen Hereditariern zeigt, abgesehen vom Inhalt des Ich, häufig ein pathologisches Gepräge, indem die geistige Entwickelung entweder eine überaus rasche, glänzende ist (frühreife Kinder, Wunderkinder), um dann plötzlich und dauernd auf einer gewissen Stufe stehen zu bleiben, oder äusserst langsam und mühsam sich vollzieht und kaum die Stufe der Entwickelung eines psychischen Durchschnittsmenschen endlich erreicht.

Solche Abnormitäten der Stimmung, der Gefühle, Strebungen, Excentricitäten und Paradoxien der Urtheile, Motive, Anschauungen finden sich bei einer grossen Zahl von Hereditariern, vereiteln vielfach den

Digitized by Google

Zusammenhang zwischen psychopathischer Praedisposition und Psychose und wirken nachweisbar oft bestimmend und vorbereitend auf deren Ausbruch, indem die Einseitigkeit oder Schwäche der intellectuellen Ausbildung, die Verschrobenheit der Gefühle und Strebungen, stehende Neigungen, Leidenschaften, Charakterfehler den günstigen Boden für ein occasionelles Moment bilden oder durch sich selbst, in fortschreitender Ausbildung der krankhaften Anlage endlich in wirkliches Irresein überführen.

C. Als 3te Gruppe heben sich von den vorigen jene Individuen ab, bei denen der hereditäre Einfluss sich offenbar nicht in einer latenten Prädisposition erschöpft oder in elementaren psychischen Anomalien äussert, sondern ab ovo sich solche Abnormitäten in der psychischen Anlage und Entwicklung kund geben, dass die Vermuthung einer congenitalen psychischen Erkrankung nahe liegt, die sich in einzelnen Fällen durch sorgfältige Analyse auch mit Evidenz nachweisen lässt. Dass es angeborene hereditär bedingte Schwach- und Blödsinnszustände giebt, wird wohl von Jedermann zugestanden, weniger leicht aber, dass es moralische Idioten von Geburt giebt, bei welchen trotz leidlicher (aber immer beschränkter und dem Schwachsinn sich nähernder Intelligenz), das Gefühls- und Triebleben vorzugsweise von einem deletären Einfluss getroffen ist und die Gesammtpersönlichkeit, den Charakter des Menschen von vornherein zur moralischen Entartung prädestinirt. Die Erörterung dieser tief in die wichtigsten Lebensinteressen eingreifenden Streitfrage gehört nicht hier her, ich beschränke mich auf die Bemerkung, dass ich fast ausnahmslos in solchen Fällen von congenitaler progressiver psychischer Entartung, moral insanity, Schwachsinn mit perversen Trieben eine hereditäre Basis gefunden habe.

Solche von dem Beginne ihrer psychischen Ent-

Digitized by Google

wicklung an abnorm sich verhaltende, hereditär disponirte Fälle bilden das Material der dritten Gruppe. Sie fallen theils in die Rubrik der moral insanity, theils in die des congenitalen hereditären, stationären oder progressiven Schwach- und Blödsinns.

Prüfen wir nun, wie sich die Heilbarkeitsverhältnisse der in diese 3 Categorien geschiedenen, offenbar in sehr verschiedenem Grad mit dem Gewicht der Heredität belasteten Krankheitsfälle gestalten.

Als Fälle von Genesung wurden nur solche genommen, bei welchen eine complete restitutio ad integrum bei der Entlassung und im ferneren Leben sich herausstellte, als Fälle von Besserung nur solche, in welchen die Störung auf die frühere Krankheitsanlage plus dem Defect, den jene setzte, zurückging oder die psychische Leistungsfähigkeit eine dauernde Besserung erfahren hatte.

Von diesem Gesichtspunkt aus ergaben sich folgende Zahlenverhältnisse:

Für Gruppe A. (67 Männer 26 Frauen);
genesen:
Männer 39 (58,4 pCt.), Frauen 15 (57,7 pCt.);
gebessert:
Männer 9 (13,2 pCt.), Frauen 5 (19,2 pCt.);
ungebessert:
Männer 19 (28,4 pCt.), Frauen 6 (23 pCt.);

Für Gruppe B. (87 Männer, 84 Frauen);
genesen:
Männer 14 (16,1 pCt.), Frauen 11 (13,2 pCt.);
gebessert:
Männer 20 (23,0 pCt.), Frauen 15 (17,8 pCt.);
ungebessert:
Männer 53 (60,9 pCt.), Frauen 58 (69,0 pCt.);

Digitized by Google

Für Gruppe C. (20 Männer, 8 Frauen);

genesen:

Männer 0 —, Frauen 0 —;

gebessert:

Männer 2 (10 pCt.), Frauen 0 —;

ungebessert:

Männer 18 (90 pCt.), Frauen 8 (100 pCt.).

Ich möchte den Zahlen dieser Tabelle durchaus keinen absoluten Werth bezüglich der Heilbarkeit des hereditären Irreseins beimessen — dazu ist das Material, über welches ich verfügen konnte, zu klein — aber einen relativen Werth dürften diese Zahlenverhältnisse beanspruchen und darthun, dass die Prognose sich ganz verschieden gestaltet, je nachdem die hereditäre Belastung eine grössere oder geringere ist, und dass die abstrakte Verwerthung des hereditären Moments für die Prognose ganz unzuverlässig ist.

Dies zeigt sich sofort, wenn wir die Zahlenwerthe der verschiedenen Verlaufscategorieen der einzelnen Gruppen mit einander zusammenstellen. Es ergaben sich darnach:

Genesungen:

in Categorie A. M. 39 (58,4 pCt.), Fr. 15 (57,7 pCt.);
B. M. 14 (16,1 pCt.), Fr. 11 (13,2 pCt.);
C. M. — (0 pCt.), Fr. — (0 pCt..

Besserungen:

in Categorie A. M. 9 (13,2 pCt.), Fr. 5 (19,2 pCt.);
B. M. 20 (23,0 pCt.), Fr. 15 (17,8 pCt.);
C. M. 2 (10,0 pCt.), Fr. — (0 pCt.);

bleiben ungebessert:

in Categorie A. M. 19 (28,4 pCt.), Fr. 6 (23,0 pCt.);
B. M. 53 (60,9 pCt.), Fr. 58 (69.0 pCt.);
C. M. 18 (90,0 pCt.), Fr. 8 (100 pCt.).

Die Heilbarkeit steht somit *ceteris paribus* im umgekehrten Verhältniss zur Stärke der hereditären Belastung.

Digitized by Google

Ihr Procentsatz übersteigt in A, der Gruppe der unter bloser latenter Prädisposition stehenden Fälle allerdings um ein Namhaftes den der nicht hereditären, fällt aber schon in B. weit unter die Durchschnittsziffer der Heilbarkeit in nicht erblichen Fällen und wird in C. geradezu Null.

Die Aufstellung des Satzes, dass eine nachgewiesene erbliche Anlage an und für sich ein günstiges prognostisches Moment bilde, ist demnach nicht haltbar, denn sie passt nur für eine gewisse Zahl der hereditär disponirten Fälle, die Heredität wird geradezu *mali ominis*, wo ihr Einfluss eine constitutionelle Bedeutung gewinnt und auf den physischen und psychischen Entwicklungsgang einwirkt; je mehr und früher sich dieser hereditär constitutionelle Einfluss geltend macht, um so trüber gestaltet sich die Prognose und in den höchsten Graden schon ab ovo einwirkender hereditärer Belastung wird sie so hoffnungslos, wie bei irgend einer durch pathologisch-anatomische Veränderungen und Entartungen im Hirn bedingten Psychose (hérédité morbide progressive).

Nur aus der individuellen, nicht abstracten Verwerthung des dann prognostisch allerdings erheblich in's Gewicht fallenden hereditären Moments, lässt sich somit ein Einblick in den zu erwartenden Krankheitsverlauf gewinnen. Dieser hängt wesentlich von dem Gewicht der hereditären Belastung ab, das im Einzelfall sehr variirt und nur aus der Heranziehung und Analyse der gesammten früheren psychischen Entwickelung, des ganzen früheren Lebensgangs des Individuums erschlossen werden kann.

Die bedeutende Zahl der Besserungen in den Fällen der Gruppe B., gegenüber A., lässt sich am einfachsten wohl dahin deuten, dass die intercurrirende Psychose bei starker psychopathischer Anlage wohl bis auf diese zurückgebildet werden kann, aber meist dann einen wei-

Digitized by Google

teren Defect hinterlässt, der sich zur ursprünglichen psychopathischen Anlage hinzusummirt.

Es wäre ein wesentlicher Gewinn und eine werthvolle Erweiterung der Arbeit von *Jung*, wenn Jemand sich der Mühe unterziehen wollte, mit einem grösseren Material, als dem Verf. zu Gebote stand, die absolute Heilbarkeitsziffer der nach dem Gesichtspunkt der differenten hereditären Belastung geschiedenen Fälle in den verschiedenen Categorieen zu bestimmen, ein Versuch, für den meine an Zahl zu geringen Fälle nicht ausreichten, um ein anderes als ein relatives Verhältniss zu gewinnen. Möchten die vorstehenden Untersuchungen, wenigstens eine Anregung zu einer derartigen zwar mühsamen, aber in ihren Resultaten bedeutungsvollen Arbeit bilden!

Bezüglich der oben berührten Frage, ob im gegebenen klinischen Befund, den Krankheitserscheinungen des Einzelfalls sich Züge auffinden lassen, die auf das specifische ätiologische Moment hindeutend, eine Verwerthung für die Prognose gestatten, möchte ich mich bei dem kleinen Material, das mir vorliegt, auf wenige Bemerkungen beschränken.

Bekanntlich hat *Morel* vielfach Versuche gemacht, charakteristische klinische Merkmale für die hereditären Krankheitsfälle aufzufinden und nach dem Ergebniss seiner Forschungen sich berechtigt geglaubt, eine folie héréditaire als nosologisches und ätiologisches Genus aufzustellen. Schon *Leubuscher**) hat die Frage aufgeworfen, ob das hereditäre Irresein nicht pathognomische diagnostische Kennzeichen besitze und fand, dass die Periodicität ein Moment sei, das besonders der hereditären Seelenstörung zukomme, und es hat nicht an neue-

*) Remarks on the hereditary transmission of insanity. — Journal of psychol. med. 1848. April. p. 264.

Digitized by Google

ren Forschern gefehlt [*Westphal*]*), die sich in bejahendem Sinne dieser Frage gegenüber ausgesprochen haben, während *Jung* in seiner Eingangs erwähnten Arbeit (Allg. Zeitschr. f. Psych. XXIII. Heft 3. p. 222) zu entgegengesetzten Anschauungen kommt.

Offenbar ist diese Frage noch nicht spruchreif und bedarf neuer eingehender Untersuchungen. Wahrscheinlich gelten die von *Morel* und *Westphal* aufgestellten pathognomischen Criterien nur für eine gewisse Zahl der hereditären Fälle, besonders diejenigen, in welchen das hereditäre Moment früh eine constitutionelle Bedeutung gewonnen, die ganze Persönlichkeit durchseucht und zur Degeneration gebracht hat (folie héréditaire im engeren Sinne, dégénérencence morbide progressive), während sie bei den Fällen fehlen, wo der hereditäre Factor sich in der latenten einfachen Prädisposition erschöpfte.

Eine in dieser Richtung angestellte Durchmusterung meiner Fälle bestätigt einigermaassen die Richtigkeit dieser Voraussetzung.

Bei der Gruppe A., die auch gerade die günstigsten Heilresultate darbietet, findet sich nichts in Verlauf und Genese, was von denen nicht hereditärer Fälle abweichend wäre; meist sind es Fälle einfacher Manie und Melancholie mit gewöhnlichem Krankheitsbild und Verlauf. Nur der auf geringfügige Anlässe meist erfolgende Ausbruch der Psychose, sowie die Anamnese, verrathen die latente Prädisposition. Periodische Formen finden sich bei den Weibern keine, bei den Männern dagegen 3 Fälle von *Mania periodica* und einer von maniakalischer folie raisonnante (4,4 pCt.), die sämmtlich ungeheilt bleiben.

In der Gruppe B. im Allgemeinen Krankheitsform im Verlauf wie bei A. Nur ist der Ausbruch der Stö-

*) Allg. Zeitschr. f. Psych. XXI. S. 410.

ized by Google

rung ein meist plötzlicher, ebenso plötzlich oft das Abschneiden des Paroxysmus, die occasionellen Momente noch geringfügiger und auf die stärkere Prädisposition, das labile Gleichgewicht der Seelenkräfte, in dem sich die Betheiligten befinden, hindeutend. In ungünstigen Fällen zeigt sich ein auffallend rapider Verlauf zu secundären Stadien, häufiger auch Wahnvorstellungen, die erfahrungsgemäss eine schlechte Prognose geben und auf eine verschrobene Persönlichkeit von Haus aus schliessen lassen (electromagnetischer und sexueller Verfolgungswahn, hypochondrische verzwickte und ungeheuerliche Wahnvorstellungen mit grossem Hang zu raisonnirendem und systematisirendem Ausbau und Verknüpfung). Auffallend häufiger werden aber schon die periodischen Störungen. Periodische Manie tritt bei Männern 5 Mal (5,7 pCt.), bei Frauen 4 Mal (5,7 pCt.), meist mit raisonnirendem Anstrich auf, ferner finden sich bei den Männern zwei Fälle von primärer Verrücktheit.

In Gruppe C. finden sich endlich vorzugsweise Zustände, die prognostisch ebenso übel angeschrieben sind als schwer in die gewöhnlichen nosologischen Formen des Irreseins einzuordnen. Es sind vorzugsweise jene auf gesammter Degeneration des ganzen psychischen Menschen beruhenden, deshalb proteusartigen, fratzenhaften Zerrbilder psychopathischer Zustände, welche den Vorwurf der *Morel*'schen degenerativen Typen bilden und denen allerdings jene Merkmale zukommen, die er für seine *folie héréditaire* aufstellt.

Unter den Männern finden sich zahlreiche Fälle von primärer unmerklich aus ab ovo bestehenden Verkehrtheiten der ganzen Individualität hervorgegangener Verrücktheit (6 Fälle) meist mit ganz abenteuerlichen, aller Logik baaren Wahnvorstellungen; mehrere mit progressiv psychischer Entartung, Erscheinungen von *moral insanity* und perversen instinctiven Handlungen (Sodomie); 2mal

Digitized by Google

ferner periodische maniakalische Exaltation (11,6 pCt.), wie auch häufig bei den Fällen dieser Gruppe eine gewisse Periodicität im Auftreten einzelner Symptomengruppen. Mehrere zeichnen sich aus durch ein rapides Versinken in Blödsinn, nachdem die Psychose einmal zum vollen Ausbruch gekommen ist, ferner durch ganz abrupte, aller logischen Combination entbehrende Wahnvorstellungen, sowie ganz perverse Triebe.

Bei den Frauen fand sich einmal von frühestem Leben an bestehende *moral insanity*, 2mal periodisch maniakalische *folie raisonnante* (25 pCt.).

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass in dem Maasse, als das Gewicht der hereditären Belastung und Durchseuchung zunimmt, die Psychose sich vom gewöhnlichen reinen, gutartigen Typus entfernt und fratzenhafte Zerrbilder der ganzen Persönlichkeit, Paradoxes und Ungewöhnliches in Verlauf und Inhalt annimmt, das von erfahrungsmässig ungünstiger Prognose ist und allerdings ausgeprägtere Fälle derart von nicht hereditären, mehr parasitisch am psychischen Menschen verlaufenden Psychosen zu sondern scheint.

Besonders gilt dies für die periodischen und raisonnirenden Störungen und jene psychopathischen Zustände der ganzen Persönlichkeit, welche man unter dem Namen der *moral insanity* zu bezeichnen gewohnt ist.

Sollte die anerkannt schlechte Prognose dieser Zustände, besonders der periodischen (*mania periodica*, *folie circulaire*), deren Heilbarkeit überhaupt sehr zweifelhaft ist, nicht vielleicht darin begründet sein, dass sie der Ausdruck einer hereditären psychischen Entartung sind, die höchstens der Prophylaxe im Allgemeinen, aber nicht der Therapie im individuellen Fall mehr zugänglich sein kann.

Weitere Beobachtungen mögen erweisen, ob die

Digitized by

and Matthew (Chapters 1–2). Manuscripts containing only the Gospel of Matthew are also rare. Besides Codex 28, only Codex 1424 contains the Gospel of Matthew alone. Codex 1424 is a manuscript of the 14th century, which contains the Gospel of Matthew (1r–134v) and the Gospel of Luke (135r–222v). Codex 28 is a manuscript of the 12th century, which contains the Gospel of Matthew (1r–151v) and the Gospel of Mark (152r–204v). Codex 28 is the oldest manuscript containing the Gospel of Matthew alone.

Codex 28 and Codex 1424 have the same textual character in the Gospel of Matthew. Codex 28 and Codex 1424 are the only manuscripts containing the Gospel of Matthew alone. Therefore, Codex 28 and Codex 1424 are the most important manuscripts for the textual criticism of the Gospel of Matthew. Codex 28 is the oldest manuscript containing the Gospel of Matthew alone. Therefore, Codex 28 is the most important manuscript for the textual criticism of the Gospel of Matthew.

Klinische Bedeutung der Dysphagieen gestörter und gelähmter Kranken.

Von

Dr. **Wilh. Zenker,**

Arzt an der Heil- und Pflegeanstalt Königslutter.

Sämmtliche der Einverleibung von Ernährungsmaterial dienende Bewegungen lassen sich auf eine kurze Kette motorischer Reflexvorgänge zurückführen. Blicken wir auf den Säugling: reflectorisch öffnet er bei Berührungen der Lippen den Mund, worauf dann durch den auf die Lippensäume ausgeübten Reiz der Brustwarze oder eines eingeführten Fingers Saugbewegungen ausgelöst werden. Diese bestehen, ausser den abwechselnde Vergrösserung und Verminderung der Capacität der Mundhöhle bezweckenden primitiven Kaubewegungen des Unterkiefers, wesentlich aus Stempelbewegungen der Zunge, die mit der Spitze flach auf den Boden der Mundhöhle aufgelegt und mit dem Rücken gegen den Gaumen emporgerichtet, successive rückwärts bewegt wird, wodurch vermittelst des entstehenden luftverdünnten Raumes eine gegen die Brustwarze gewandte vis a fronte geschaffen wird. Die Zunge ist es auch, welche hinterher die Milch in grösseren Portionen der Rachenhöhle entgegen führt, um sie dort dem sogen. automatischen

Bewegungsvorgange des Abschluckens und Schlingens zu übergeben. Die mit dem Beginne des Abschluckens in Kraft tretende zweite Bewegungsreihe ist und bleibt die nämliche durch alle Lebensalter hindurch: ihre Motoren haben wir als zu einem centralen Bewegungsapparate vereinigt, in der Organisation des Nervensystems prästabilirt vorhanden uns zu denken (in den Oliven nach *Schröder van der Kolk*).

Die erste Reihe hingegen, also alle die neben und nach einander wirkenden Bewegungen vom Eröffnen der Lippen bis zum Beginne des Abschluckens erfahren mit der Entwickelung des Menschen mannichfache Modificationen: die ursprünglich nur wenige Glieder zählende Bewegungskette verlängert sich in dem Maasse, als das vegetative, man könnte sagen: Reflexleben des Säuglings der bewussten Willensthätigkeit Platz macht. Während die Saugbewegung in ihrer Bedeutung als blosse Reflexbewegung mehr und mehr ausser Gebrauch gesetzt wird, müssen, den Anerbietungen und Anforderungen des äusseren Lebens entsprechend, neue Kräfte zur Verarbeitung und zum Transport der gelieferten Nahrungsmittel herangezogen, einexercirt und in Reihe und Glied aufgestellt werden: der Hunger spielt da eben die Rolle des unerbittlichen Befehlshabers. So arbeitet sich das Kind allmälig von der Milch zum Breie und vom Breie zu compacten Speisen durch; wie Marschiren und Sprechen, so lernt es die Bewegungen der Trigeminus-, Facialis- und Hypoglossus-Muskulatur durch tägliche und stündliche Uebung geschickt und immer entsprechender dem Zwecke der Nahrungsaufnahme zu accomodiren. Bald ist die ganze Bewegungskette fertig, und es bedarf nur noch des auf den Zweck gerichteten Willensimpulses (Essen-, Trinkenwollen), damit die Mechanismen, wie von einem automatischen Coordinationscentrum regiert, ohne Fehl und Zögern ablaufen.

Digitized by Google

Es lagen die Räder und Rädchen fertig und geordnet, des Gebrauches harrend: das Individuum hat sich daraus die Maschine fertig hergestellt. In der That verliert die physiologische Arbeit derselben nie den Charakter des Individuellen; ja selbst die anatomischen Verhältnisse sind hier Product und Hebel zugleich des individuellen Lebens. Vergleiche man nur die grobe Kieferpartie eines zwischen Brod, Kohl und Kartoffeln grossgezogenen Proletariers mit der gracilen Gesichtsbildung des im Ueberflusse aufgewachsenen Weibes der höheren Stände; nehme man ferner den Idioten, den Fresser, den Ungebildeten, andererseits den Feingesitteten, den Friand — wie leicht verfolgt man da die Stufenreihe vom thierischen Verschlingen bis zum hoffähigen Speisen! —

Betrachtet man so die gesammten der Einverleibung von Ernährungsmaterial dienenden mechanischen Vorgänge in ihrer Herausbildung aus den motorischen Reflexvorgängen des Säuglings, berücksichtigt man ferner, dass die Solidarität derselben trotz ihrer theilweisen Unterordnung unter die Willkür und trotz der Mannigfaltigkeit ihrer Verwendung die ganze Lebensdauer der Norm nach bestehen bleiben muss, so ergiebt sich die Ausdehnung des Bereichs der Dysphagien von selber. Es muss eben der ganze Zuführungscanal von den Lippen bis zur *Cardia* als ein continuirlicher physiologischer Bewegungsapparat angesehn und jede die Nahrungszufuhr störende oder hemmende Beeinträchtigung seiner Function von demselben Standpunkte aus, als Dysphagie nämlich, aufgefasst werden. In der That, einzig die Alterationen des sogen. automatischen Schlingvorganges unter Dysphagie begreifen zu wollen, scheint sich weder etymologisch noch physiologisch genügend rechtfertigen zu lassen.

Greifen wir nunmehr den normalen Mittelmenschen

heraus, um uns an ihm zunächst die erste Reihe der betreffenden Bewegungsvorgänge zu vergegenwärtigen. Da haben wir zuvörderst Lippen und Backen: Aus der anatomischen Zusammengehörigkeit ihrer Motoren, des *M. sphincter oris* mit den *Mm. buccinatorii* erklärt sich leicht das HandinHandgehen beider bei ihrer physiologischen Arbeit. Die tägliche Erfahrung lehrt zur Genüge ihre Leistung bei der Einnahme von Speise und Getränk, beim Kauen, Einspeicheln und bei der Locomotion derselben innerhalb der Mundhöhle. Dem *M. subcutaneus colli (platysma myoides aut.)* hingegen ist ausser den in den Handbüchern der Anatomie verzeichneten Functionen unzweifelhaft noch eine die Mechanik des Speisekanals berührende Wirkung zuzuschreiben. Dieselbe betrifft dessen im Gesicht sich inserirendes Muskelbündel und verhält sich zu der Wirkung des *M. buccinatorius* wesentlich antagonistisch. Während diesem bekanntlich die Aufgabe obliegt, im Verein mit dem *M. sphincter oris* die Backen und Lippen gegen die Zahnreihen zu bewegen, um einerseits im *vestibulum oris* befindliche Speisepartikel zwischen die Zähne zu schieben, andererseits den Austritt von Speise und Getränk aus der Mundhöhle nach aussen hin oder in den Vorhof zu verhüten, so ziehen die beregten Faserschleifen des *M. subcutaneus colli* hingegen die Backen, vornehmlich die Mundwinkelparthie derselben nach aussen, unten, hinten. Dadurch eben ist die Möglichkeit gegeben, die Backen zur Backentasche zu formiren, dem *vestibulum oris* eine bedeutendere Capacität zu verleihen und für Luft, wie für dünnflüssige Speise beiderseits zwischen Wangen und Zahnreihen je einen accessorischen Zuleitungscanal zu etabliren. In der That sieht man schon im gewöhnlichen Leben die *Mm. subcut. colli* in dieser Richtung arbeiten, sobald in der Mundhöhle befindliche allzu heisse Speise vor ihrer Deglutition noch einer

Digitized by Google

Abkühlung durch aspirirte Luft unterworfen werden soll. Dasselbe geschieht, wo, in pathologischen Zuständen, die Mundhöhle in ihrem vorderen Theile impermeabel wurde, oder wenn der von *Dyspnoë* Gequälte dem Sauerstoff instinctiv alle Thore zu öffnen sucht. — Für die bereits erwähnte Locomotion der Speise innerhalb der Mundhöhle greift in erster Reihe die Thätigkeit der Zunge Platz: sie ist es eben, welche die Speise in Empfang nimmt, die Qualität derselben durch Geschmack- und Tastsinn prüft, um hinterher ihre Verarbeitung auf das Sorgfältigste theils selbst zu besorgen, anderntheils wenigstens zu controliren. Dazu kommen dann die Kaubewegungen, von denen nur in Erinnerung zu bringen ist, dass sie beim Menschen wesentlich in einer Combination der Rotationsbewegungen des Unterkiefers um eine transversale Axe mit Seitwärtsbewegungen desselben bestehen, dass die Vor- und Rückwärtsbewegung des Unterkiefers hingegen nur ausnahmsweise zur Anwendung gelangt. Die Einzelphase der Kauoperation durch die einmalige Abwärts- und Aufwärtsbewegung des Unterkiefers dargestellt, kann vergleichsweise als Pendelschwingung angesehen werden. und zwar mit Recht, da sie der Regel nach eine Hin- und Zurückbewegung von gleicher Zeitdauer ausmachen und sich in regelmässiger Folge mit aequalem Aufwande von Kraft und Zeit wiederholen soll. Das Bild des ruhig frühstückenden Arbeiters — dieser gönnt sich Musse und huldigt lieber dem Naturgesetze, als sogen. feiner Sitte und Mode — rechtfertigt jenen Vergleich, der indessen nichts weiter als ein der Anschaulichkeit dienender Vergleich sein soll. Der Abweichungen von diesem Grundtypus des Kauens sind gleichwohl, wie der Augenschein leicht lehrt, gar manche. Zunächst müssen Pausen in der fortgehenden Kauoperation eintreten, damit durchgekautes Material weitergeschafft und neues zwischen die Zahn-

Digitized by Google

reihen eingebracht werde; dann ist die Excursionsweite jener Pendelbewegung des Unterkiefers wesentlich vom Volumen, die Energie des Zerquetschens von der Cohäsion der zu verarbeitenden Brocken und Stückchen abhängig. Mahlende Bewegungen unterstützen, wo es erforderlich ist, das Zerdrücken der Speise und bewirken ein längeres Verweilen der gegen einander gepressten Kiefer. Ferner kommt die Beschaffenheit der Kieferränder und der Zähne in Frage, nicht nur für den Modus der Kieferbewegung, sondern selbst für die Capacität der Mundhöhle; wissen wir doch, dass bei alten, zahnlosen Menschen das *vestibulum oris* mit der eigentlichen Mundhöhle nahezu verschmilzt und trotzdem der Raum für aufzunehmende Speise erheblich geschmälert ist. Rechnet man endlich noch den Einfluss des Hungers, des Temperaments, der Gewöhnung und Sitte hinzu, dann wird man sich nicht wundern, wenn manchmal nur die Andeutung jener Pendelbewegung übrig bleibt.

Wir wissen, dass die Schleimhaut der Mundhöhle — ausser ihr nur noch die des Bodens der Nasenhöhle — mit der äussern Haut die Eigenschaft des Tastsinns gemein hat, ja dass die Zungenspitze, die Wächterin der Mundhöhle, in der Beziehung selbst den Fingerspitzen um das Doppelte überlegen ist. Kein Wunder, wenn sie Tastsinn wie Algesie des übrigen Schleimhautüberzuges der Mundhöhle in einer Weise an Feinheit übertrifft, dass wir sie hier geradezu als sensiblen Brennpunkt anzusprechen haben. Leicht überzeugt man sich davon bei an Gesunden angestellten Versuchen, leicht gelangt man zu der Anschauung, dass die Tastthätigkeit der Mundhöhle zu der Zungenspitze in einem ähnlichen Verhältnisse steht, wie die Perception der übrigen Netzhautbezirke zu dem gelben Fleck: einzig Zungenspitze und gelber Fleck sind zur Vermittelung der deutlichen Wahrnehmung von Objecten bestimmt,

Digitized by Google

alle ihre Umgebung treffende Reize haben keine andere Bedeutung, als diesem Heerde der Sinneswahrnehmung das Vorhandensein eines zu betastenden, zu betrachtenden Gegenstandes zu signalisiren. Wie wir die Figur eines zur Seite Vorübergehenden wohl gewahr werden, aber erst dann erkennen, wenn wir ihr die Sehaxen unserer Augen zuwenden, so kann die Bekleidung der Wange und des Zahnfleisches wohl das Vorhandensein eines kleinen Gegenstandes im Vorhof des Mundes zur Kenntniss bringen, ob es sich aber um einen Apfelkern oder um eine Bohne, ob es sich um ein Stück Papier oder Leder handelt, darüber entscheidet dann erst der Tastsinn der Zungenspitze. Steht letztere somit bei der Prüfung des Speisematerials obenan, so darf man jedoch die Beihülfe der Lippen, des Gaumens und der Zähne nicht übersehen, welche letztere in gewisser Weise, sei es vermittelst der Nerven ihrer Pulpa, sei es vermittelst der des Zahnfleisches, oder wohl beider gemeinschaftlich, zu eben so vielen Tastorganen werden. Sie sind es, welche, unterstützt von der Sensibilität der Kaumuskeln, die Schwere und Festigkeit eines Gegenstandes, seine Zähigkeit (etwa, ob es sich um Holz, ob um Kork handelt) und Härte abschätzen. In dem Lichte kann man sich die Mundhöhle als Vorhof des Verdauungskanals vorstellen, in dem Alles gewogen und gemessen, taxirt und probirt wird, bevor es zur Verarbeitung und Verwendung kommt. Wie blosse Tastempfindungen (der herbe, mehlige, beissende Geschmack), wie Temperaturempfindungen (Pfefferminze, Eis) und selbst der Geruch (das Aroma einer Speise riecht man, man schmeckt es nicht) zu Hülfe genommen werden, um die Prüfung durch den „Geschmack“ zu vervollständigen, ist aus der Physiologie hinlänglich bekannt. Hier sei nur noch kurz erwähnt, dass wir da, wo wir bloss zu tasten meinen, bereits urtheilen, dass sich zwischen das Betasten eines unter der

Digitized by Google

Speise befindlichen Steinchens und dem Erkennen desselben als solchen wie seiner Elimination ein weitläufiger, theils psychischer Act einschieben muss. Es ist hier vielleicht das erste, dass wir während des Kauens das Knistern des Steines hören, sogleich wird er zwischen die Zähne gebracht, auf Gewicht und Solidität abgeschätzt, hinterher erfolgt die Generalprobe auf Umfang, Oberfläche etc. durch die Zunge — und jetzt, nachdem allemal auch Erinnerung und Urtheil, also rein psychische Action, angestrengt worden, wird das Pro und Contra des Hinabschluckens oder Ausspeiens erwogen und nun erst gehandelt. Wie geläufig und mühelos dieser Act auch bei Gesunden von Statten geht, wir sehen doch, wie mannigfach die Beschränkung und Behinderung desselben in Fällen deteriorisirten Nervenlebens ausfallen kann.

Gewiss wären hier in's Detail eingehende Erörtesungen bekannter anatomischer und physiologischer Thatsachen unangemessen. Dahingegen kann nicht unerwähnt bleiben, dass in der Norm alle die dem Zwecke des Ergreifens, Zerkleinerns und Transportirens von Speise dienenden Einzelbewegungen nicht nur für sich exact und zweckentsprechend zur Ausführung gelangen sollen; alle die dienstleistenden Muskeln und Muskelgruppen müssen eben auch, wie Räder einer guten Maschine, ohne Friction, ohne Zeitverlust und Kraftvergeudung zu veranlassen, im Ablaufe der Gesammtbewegung ihren Platz ausfüllen. Geschieht dieses nicht oder nicht ausreichend, so haben wir, selbst wenn der physiologische Zweck der Arbeitsleistung: die Einverleibung der Speise, schliesslich erreicht wird, die Bewegungsmaschine als defect anzusehen, haben es mit einer Dysphagie zu thun.

Kehren wir zu der beabsichtigten physiologischen Wanderung durch den Speisekanal zurück, so finden wir die von der Zunge zurückbewegte und durch den isthmus

Digitized by Google

faucium gezwängte Speise in der Rachenhöhle angelangt. Die jetzt eintretende, durch Reizung der *Rami palatini N. trigem. r. II.* reflectorisch erfolgende Eintreibung derselben in den Schlund geschieht dadurch, dass sich der Schlundkopf gegen die Zungenwurzel, welche die Rachenhöhle während des Slingacktes gegen die Mundhöhle zu völlig verschlossen hält und den Stützpunkt für den zu formirenden und zu ergreifenden Bissen bildet, erhebt. Diese durch bekannte Muskelapparate ausgeführte Bewegung bezweckt nebenher sowohl den Verschluss des Kehlkopfes wie der Nasenhöhle. Der Kehlkopf wird durch dieselbe eben unter den Schutz der das *ostium pharyngeum laryngis* deckenden Zungenwurzel gestellt; gewissermaassen zur Substitution dieser Arbeit sind der Kehldeckel und die untern Stimmbänder mit der Fähigkeit, den Luftkanal während des Schluckens gegen eindringende fremde Körper zu verschliessen, gleichfalls betraut. Der Rachen-Choanenverschluss ferner ist bedingt durch die Annäherung der Säume der hinteren Gaumenbögen an einander. Zu diesem Ende wirkt einmal der *M. pharyngo-palatinus*, indem er diese Säume streckt, und auf der andern Seite resultirt aus der die Schlingbewegung wesentlich bedingenden Contraction der *Mm. constrictores pharyngis* eine Annäherung der unteren Insertionspuncte der Gaumenbögen an einander, wodurch jetzt, da die oberen Enden derselben in sehr spitzem Winkel an einander stossen, der sichere Verschluss ausser Frage gestellt wird (vergl. *Henle*'s anat. Handb. Bd. II. S. 116). Demnach bleibt dem Bissen von den vier aus der Rachenhöhle führenden Thoren nur ein unverschlossenes und dieses, der Eingang in die Speiseröhre, dient ihm zugleich zum Transportmittel. Man braucht nur einen Blick auf das innige Gefüge der die associirte Gesammtbewegung des Abschluckens bezweckenden Mechanismen zu werfen, um den Grundcharakter aller phy-

Digitized by Google

siologischen Arbeit, mit möglichst einfachen Mitteln möglichst vollkommene Zwecke zu erreichen, auch hier in bewundernswürdigster Weise bethätigt zu sehen. Kein Wunder, wenn sich der Ausfall selbst des geringsten Constituenten der Maschine im Totalaffect ihrer Leistung markirt, wenn andererseits die gewaltigsten Störungen derselben in kaum glaublicher Weise compensirt werden können.

Was schliesslich den sogen. automatischen Vorgang der Fortbewegung von Speise und Getränk im Oesophagus anlangt, so wissen wir aus den Handbüchern der Physiologie, dass die successive nach unten wellenartig fortschreitenden Contractionen der Ring- und Längsmuskulatur die Speisenröhre Stück für Stück über den hier als Hypomochlion anzusehenden Bissen hinüberziehen und in dieser Weise abwärts befördern. Die Geschwindigkeit der Bewegung steht annähernd im graden Verhältnisse zum Aggregatzustande des Schlingobjects. Flüssige Bissen — unter Bissen verstehen wir die durch einen Schluckakt verschlungene Masse einerlei welcher Qualität — bedürfen nicht einer vollen Secunde, um den Weg vom Schlundkopf bis zur Cardia zurückzulegen; starke, compacte Bissen hingegen erfordern aus rein mechanischen Gründen erheblich längere Zeit, um ihr Ziel zu erreichen. Der Bewegungsmodus ändert sich mit dem Durchtritt des Bissens durch die Cardia in etwas, worüber bei Eruirung des Cardialgeräusches weitere Bemerkungen noch nachzufügen sein werden.

Um die Schlinggeräusche — Geräusche also, welche während und in Folge des Schlingens flüssiger und fester Massen in den Schlingorganen, speciell im Rachen, in der Speiseröhre und an der Cardia, entstehen — zur Diagnose der Dysphagieen zu verwerthen, wird eine kurze Analyse derselben um so nothwendiger vor-

Digitized by Google

auszuschicken sein, da sie in der Literatur wohl registrirt (vgl. *Gerhardt*'s Lehrb. der Auskult. und Percuss.), jedoch keineswegs erschöpfend behandelt sind. Kein Wunder', wenn sie dem Praktiker, wo nicht unbekannt, so doch fremd und deshalb für die Pathologie unfruchtbar blieben. Ein wegen Collision mit den Sätzen der Physiologie nicht wohl gelungener Versuch, praktische Gesichtspunkte zu gewinnen, ist neuerdings von Dr. *W. Hambürger* gemacht und findet sich Wiener Jahrb. Jahrg. XXIV. Heft 2.

Das erste, das durch Schlucken im Rachen entstehende Geräusch, hört man bei sich selbst recht wohl, am bequemsten unterrichtet man sich über dasselbe jedoch vermittelst des auf den untern Theil der Halswirbelsäule eines Andern aufgesetzten Ohres oder Stethoskops. Man wird dasselbe als ein nach der Dick- oder Dünnflüssigkeit des Verschluckten mehr crepitirendes oder mehr rauschendes Reibungsgeräusch, entstanden durch die Vermischung von Luft und Wasser resp. Speisebrei einer- und andererseits durch Friction der Wände des Rachens und seiner contenta, wahrnehmen. Das Geräusch variirt je nach der Entstehung seiner Componenten, der Einzeltöne — bekanntlich besteht jedes auskultatorische Geräusch aus einem Complex im Gesammteffect sich störender Einzeltöne —, vor allem nach dem Aggregatzustande und Volumen des Bissens, wohl auch nach der Energie, mit welcher geschluckt wird, und nach der Capacität der Rachenhöhle wie nach seiner anatomischen Beschaffenheit. Die Tonhöhe des Geräusches lässt sich aus begreiflichen Gründen nicht auf die musikalische Tonskala zurückführen; indessen kann es dem aufmerksamen Ohre nicht entgehen, dass dasselbe prononcirter und in tieferer Tonlage einsetzt, um successive aufsteigend und schwächer werdend, gleichsam sich zuspitzend, abzuklingen. Will man es demnach in zwei

Phasen zerlegen, so würde der tiefere und stärkere, oft selbst als kurzes Klappen gehörte Anfangsschall dem Momente entsprechen, in dem sich die Pharynxwände um den Bissen zusammenschnüren, während die zweite mit abnehmender Tonstärke und aufsteigender Tonhöhe bereits auf die Fortbewegung des fertigen Bissens zu beziehen ist.

Diese letztere Phase leitet in das beim Schlingen im Oesophagus entstehende Geräusch continuirlich über. Man überzeugt sich davon, indem man die Brustwirbelsäule entlang bis zum 9. Wirbel auskultirend, die verschluckten Bissen (zur Untersuchung eignet sich am Besten ein Schluck, vielleicht $\bar{3}\beta$ Wasser) mit dem Ohre verfolgt. Da der Bissen auf seiner Reise einem viel weniger kräftigen Drucke unterliegt, als im Rachen, wo es darauf ankam, die eingeführte Masse auf möglichst geringes Volumen zusammen- und in den Schlund hineinzupressen, während hier weder vom Bissen ein passiver, noch vom häutigen Schlauche ein activer Widerstand der Locomotion entgegensteht und nur die lockere Längsfaltung der Speiseröhrenwände zu überwinden ist, — da also die Grundbedingung des Geräusches eine Modification erlitten hat, so ist dieselbe selbstverständlich auch auf den Charakter desselben übertragen. In der That war bei dem ersten Geräusche der Charakter des Gepresstseins, des Hindurchquetschens, um onomatopoetisch den akustischen Eindruck wiederzugeben, vorherrschend, so empfängt das Ohr hier den Eindruck des blossen rauschenden Vorbeiströmens, Vorbeischüttens.

Eine dritte, kurz zu erwähnende Klangerscheinung mit dem Charakter raschen Ausgiessens oder besser rauschenden Ausspritzens, begleitet, freilich nicht constant vernehmbar und darum weniger verwerthbar, den Eintritt verschluckter Flüssigkeit in die Magenhöhle. Man überzeugt sich von demselben vermittelst des auf die

Dornen des achten und neunten Brustwirbels aufgelegten Ohres, wenn man Jemanden einen starken Schluck Wasser kräftig abschlucken lässt. Es wird sodann jenes Geräusch nicht eine volle Secunde nach dem Momente beginnender Schlingaction — von diesem kann sich der Auskultirende genau durch den auf den Kehlkopf des Schlukkenden aufgesetzten Zeigefinger vergewissern — unser Ohr erreichen.

Bezeichnet dieses den Anfang des Uebertritts der Flüssigkeit in den Magen, so kündigt das letzte der Schlinggeräusche, die der Kürze wegen κατ' ἐξοχην Cardialgeräusch bezeichnete auskultatorische Erscheinung, das Ende desselben an. Man wende auch hier wieder zur Norm der Untersuchungen das langsame, schluckweise Trinken von Wasser, zunächst bei gesunden, im Stehen oder Sitzen zu untersuchenden Individuen an, und setze diesen dann das Stethoskop auf den obersten Theil des linken Unterrippenrandes; die Rücksichten der Schonung und Bequemlichkeit lassen eben diese Weise passender erscheinen, als das Auskultiren über der Wirbelsäule. Im Mittel 7 Secunden nach dem Momente des Abschluckens vernimmt man jene Klangerscheinung als eine nicht immer gleich lange Reihe von einzelnen, in kürzern und längern Absätzen vernehmbaren Toncomplexen, die zusammen den Effect des unterbrochen gurgelnden Geräusches ausmachen. Es entsteht dasselbe beim Durchtritt der mit dem Bissen verschluckten Luftmenge durch die Cardia in derselben Weise, wie wir eine im Munde befindliche Portion Wasser und Luft bei zugekniffenen Lippen durch die *vis a tergo* der vorschiebenden Zunge gegen den Boden hin austreiben. Auch hier entsteht, nachdem das Wasser geräuschlos ausgespritzt ist, ein dem Cardialgeräusche ähnliches Gurgelgeräusch dadurch, dass die Gasmenge zwischen Zunge und Lippen in den Zustand elastischer

Digitized by

Spannung versetzt wird und jetzt in dem Maasse entweichen muss, als diese die Kraft des zusammengezogenen Sphincter oris überbietet. Sobald die überschüssige Luft entwichen ist und im Vorbeistreifen an den feuchten Lippensäumen ein kurzes Geräusch, die Einzelphase des Gesammtgeräusches, hervorgebracht hat, schliessen sich die gespannten Lippen sogleich, um kurz darauf zur Wiederholung desselben Vorganges wieder und immer wieder bis zur Entleerung des Gases — eröffnet zu werden. So entsteht durch rhythmisch unterbrochenes, rasches Ausströmen der Luft ein dem Gurgeln ähnliches Tönen, ein Geräusch, welches gegen das Ende hin, also mit abnehmender Luftmenge oder, nach der Bezeichnung der Physiker, mit der Verkürzung des Ansatzrohres, successive höhere Tonlage annimmt, sich zuspitzt. Umgekehrt ist das Verhalten, wenn man den Strahl nicht abwärts gegen den Boden, sondern aufwärts gewandten Gesichts emporsendet: jetzt wird das Geräusch dem Wasserstrahle vorausgehen, im ersten Falle folgte es demselben nach, — kein Wunder, da das Gas als leichterer Körper stets die Oberfläche des Wassers sucht. Dieser einfache Versuch erklärt uns den Vorgang an der Cardia zur Genüge, doch bietet er dann erst eine erschöpfende Analogie, wenn wir jenes Lippengeräusch in die hohle Hand oder besser in einen irdenen Krug erschallen lassen und damit die Bedingung zur Entstehung des sogen. metallischen Klanges schaffen (Consonanz der eingeschlossenen Luftmenge und Reflex der Schallwellen an den festen Wänden).

Aehnliche Verhältnisse wirken zur Entstehung des Cardialgeräusches zusammen. Die Cardia wird gleichfalls durch Kreismuskulatur in constantem, freilich nicht immer gleich festem Verschlusse gehalten, widerstrebend nur lässt sie daher den Bissen sowohl, wie die ihm adnexe Gasmenge durch. Während des Durchtritts des

Digitized by Google

ersteren fehlen die Bedingungen zur Entstehung des Geräusches, dieses kann erst geweckt werden, wenn die letzte an die Reihe kommt. Also diese im Rachen mit verpackte und dem Bissen nach — wiederum als leichterer Körper auf demselben schwimmend — in den Magenraum übertretende Luftmenge ist es, welche das Cardialgeräusch verursacht. Der Beweis dafür lässt sich unschwer daraus ableiten, dass, wenn man den Rumpf eines Individuums umkehrt und jetzt (also aufwärts —) schlucken lässt, unser Geräusch sofort nach dem Abschlucken das auskultirende Ohr trifft: hier langt zuerst die Luft, bei gewöhnlicher Körperstellung zuerst der feste und flüssige Theil des Bissens an der Cardia an. Dieses Gas wird ohne Zweifel in der an obigem Lippengeräusche explicirten Weise durch die passiv rhythmisch eröffnete Cardia hindurch getrieben, doch lässt sich annehmen, dass die abwärts treibende Kraft nicht nur durch Druck auf dieses Gasquantum wirkt, vielmehr mögen die betheiligten Längsmuskelfasern die Cardia auch direct zum Angriffspunkte ihrer Wirkung nehmen. Es kann sogleich hinzugefügt werden, dass die Gesammtthätigkeit des untersten Theils der Speiseröhre während der Einverleibung des Bissens eine unterbrochene sein muss, denn auch der Ablauf des Geräusches bietet zwei bis sechs, verhältnissmässig grössere Abschnitte, die nicht anders als durch momentanes Sistiren der gesammten Ueberleitungsaction zu erklären sind. Diese Pausen müssen offenbar auch beim Durchgange des substantiellen Theils des Bissens eintreten und eben dadurch ist erwiesen, dass kein continuirlicher, sondern ein durch Schliessen und Oeffnen der Cardia unterbrochener Uebergang des Bissens Statt hat.

Demnach stellt sich der auf rein auskultatorischem Wege erlangte Eindruck von dem Schlingvorgange kurz so dar: die auf einmal verschluckte Flüssigkeit langt

Digitized by Google

nach einer Reise durch den Oesophagus von nicht einer vollen Secunde an der Cardia an. Hier wird der Uebergang sofort in das Werk gesetzt, doch gelangt die Masse des Verschluckten nicht mit einem Male in den Magen, vielmehr sorgt — gewiss im Interesse der Gesundheit — die Bewegung der Cardia - Muskulatur für allmälige, portionenweise Einverleibung derselben; zum Schlusse kommt die mit dem Bissen verschluckte Gasmenge, sie beschliesst mit ihrem Gurgelgeräusche den gesammten Schlingact. Diese Anschauung, nach welcher der unterste Theil der Speiseröhre während des Schlingacts eine Art Vorhof für die dem Magen zuzuführende Speise bildet, möchte zugleich eine fassliche Erklärung für die Genese jener Anomalie: des von *Arnold* sogen. *Antrum cardiacum* — ampullenartige Erweiterung des Oesophagus oberhalb des Zwechfells —, abgeben.

Gar manche Frage knüpft sich an diese einzig das Unumgänglichste berührende Erörterung, doch nur die dringendsten derselben können hier zur Erwähnung gelangen.

Wie gestalten sich die Abweichungen von dem beschriebenen Bewegungsmodus, bedingt durch breiige und brockenhaltige Bissen, wie bei rascher Aufeinanderfolge der Schlingacte, wie ist das Verhältniss der Speise- zu der Gasmenge eines verschluckten Bissens; führt der compacte Bissen mehr Gas nach sich, mehr im schaumigen Speichel suspendirt (cf. *Funke*'s Physiologie Bd. I. S. 291) oder mehr in den Interstitien seiner Componenten, der Speisepartikel? Diese und mehrere ähnliche, zunächst nur physiologisches Interesse beanspruchende Fragen müssen hier bei Seite geschoben werden. Eine der wichtigsten Fragen, die nach dem Gasgehalte des Magens, drängt sich dagegen der Beantwortung um so unabweisbarer auf, da wir vorhin sahen, dass während einer Mahlzeit ein nicht unerhebliches Gasquantum ein-

Digitized by

verleibt werden muss. Wo bleibt dieses? Grossentheils kommt es zur Verwendung bei der respiratorischen und chylificatorischen Thätigkeit des Magens — das leidet keinen Zweifel; ein zweiter Theil wird durch den Pylorus entweichen, endlich der Rest oder vielmehr der Ueberschuss gelangt durch Eructation nach aussen.

In der That, der Magen enthält, abgesehen von pathologischen Zuständen, kaum jemals solche Gasmenge, dass auf diese der im Epigastrium oft auch in der Norm nachweisbare Darmpercussionsschall zu beziehen wäre. — Wer im Stande ist, willkürlich Luft zu verschlucken, der wird mit dem unbequemen Gefühle der Völle, das kurz nach dem Verschlucken derselben sich im Präcordium fühlbar macht, bekannt sein; meistens erfolgt auch sogleich, unfehlbar doch nach wiederholtem Luftschlukken ihre Rückkehr nach aussen unter hörbarem Geräusch. Ja, um kleine Quantitäten Gas, seien sie verschluckt oder etwa bei perverser Verdauungsthätigkeit im Magen entstanden, und mit ihm jenes Gefühl des Vollseins los zu werden, braucht man nur Luft nachzuschlucken: sehr bald wird sie der Magen, der selbst geringe Gasmenge nur widerwillig beherbergen zu wollen scheint, vermittelst der Bauchpresse und eines eigenen musculösen Apparats (vgl. *Schiff*'s Untersuchungen an jungen Hunden; *Moleschott*'s Untersuchung. IX. 4) ausstossen. So lässt es sich beiläufig auch erklären, dass manche melancholische Kranke fortwährend Luft verschlucken, um sie hinterher durch ructus wieder auszustossen: sie kämpfen auf diese Weise gegen das mit Angst und Befangenheit verbundene, drückende Präcordialgefühl, das sie mit dem ihnen von früher her bekannten der Gasansammlung im Magen identificiren. Vielleicht steht diese Gasbildung, die bei Psychosen, namentlich bei solchen mit gastrischen Störungen, eine alltägliche Erscheinung ist, häufig auch in

Digitized by Google

näherer, directer Causalbeziehung zu jener, noch immer schwebenden Präcordialsensation.

Will man sich von den Schallnüancen des Metallklanges — es ist für das geübte Ohr eine ganze Skala der Tonhöhe und Timbre betreffenden Schalldifferenzen, — ferner auch von den Bedingungen überzeugen, unter denen sie im Magen entstehen, dann sind die Untersuchungen an einem ausgeschnittenen menschlichen Magen zu empfehlen. Derselbe wird mit geringer Flüssigkeitsmenge gefüllt, der Länge nach auf den Tisch ausgebreitet; der Pylorus kann durch eine Pincette verschlossen werden, in die Cardia lässt man die an einen hohlen Kautschukball lose angeschraubte lange Spitze ein und unterbindet jene. Auf diese Weise ist man im Stande, den Magenraum sowohl vermittelst des Balles rasch und beliebig mit Luft zu füllen, als auch durch den Pylorus eine Entleerung herbeizuführen. Uebt man jetzt stossweise einen Druck auf den Ball aus, dann entsteht durch das aus der Spitze in die Flüssigkeit des Magens entweichende Gas ein Gurgelgeräusch. Man wird erstaunt sein über die Schallverschiedenheiten, welche sammt und sonders in die breiten Grenzen des metallischen Klanges fallen, sobald man das Geräusch weckt bei straff und schlaff gefülltem, bei halbleerem und fast entleertem Magen, dann, während man die im Magen eingeschlossene Luftsäule (einfach durch Druck mit der linken Hand) verlängert und verkürzt: dort handelt es sich um Veränderungen des Timbre, hier um die der Tonlage. Was jene anlangt, so unterscheidet das Ohr drei, einer geringern oder stärkern Spannung der Magenwände entsprechende Abstufungen des Metallklanges; man könnte sie bezeichnen als: 1) Hohlgefässklang, 2) Metallklang, 3) heller Metallklang. Die Tonlage kann wohl nicht durch musikalische Normen fixirt werden, wohl aber gelangt man durch Uebung unschwer zu der Fähigkeit,

Digitized by Google

aus der Höhe des Metallklanges auf die Länge der eingeschlossenen, schwingenden Luftsäule, in manchen Fällen consecutiv selbst auf die Capacität des Magens annähernd richtig zu schliessen. Bei diesen Versuchen, und davon gingen wir aus, kommt man zu der Erfahrung, dass selbst relativ geringe Quantitäten im Magen eingeschlossener freier Luft die Andeutung des metallisch klingenden Wiederhalls zu geben vermögen.

Nachdem somit das Terrain für die Dysphagieen abgesteckt und sondirt worden, so würde der Beschreibung derselben noch ein Wort der Rechtfertigung darüber vorauszuschicken sein, dass einzig die auf ein allgemeines Leiden des Cerebrospinalorgans: auf psychische Störung, auf Ataxie und Paralyse — Empfindungslähmung mit eingeschlossen, — zu beziehenden Functionsstörungen hier in Betracht gezogen werden. Obgleich die functionellen Beeinträchtigungen der Speiseapparate durch Missbildung und Zerstörung, durch Geschwüre und Geschwülste, durch Erweiterungen und Verengerungen häufig selbst mit den cerebral und spinal bedingten Dysphagieen ähnliche oder gleiche Erscheinungen verursachen, so müssen beide Categorieen jedoch ebenso streng geschieden werden, wie etwa die Untauglichkeit eines Gliedes bedingt durch Knochenbruch von solcher in Folge der Paralyse zu trennen ist. In gleicher Weise scheiden wir auch diejenigen Functionsstörungen aus, welche pathologisch-anatomisch auf Erkrankung und Zerstörung der Muskeln und peripheren Nerven zurückzuleiten sind, obgleich hier der Berührungspunkte und Uebergänge gar manche sind; findet sich doch gerade in *Duchenne*'s paralysie labio-glosso-pharyngée das Bindeglied zwischen den Dysphagieen aus peripherer und denen aus centraler

Digitized by Google

Ursache. In der That, das zu bearbeitende Feld bleibt gross genug, wenn wir die auf Centralleiden beruhenden Dysphagieen, mit deren Trägern jede Irrenanstalt ja in reichem Maasse gesegnet ist, einer gesonderten Betrachtung unterziehen.

Um zunächst von den Dysphagieen aus rein psychischer Ursache zu reden, so würden unter diese viele ohne Lähmung einhergehende Fälle von Hysterie, Melancholie und Blödsinn einzureihen sein. Bei ihnen findet sich zuweilen eine Renitenz gegen die Einnahme von Speise, die, mag sie auf Gefühlstäuschungen, Wahnvorstellungen, auf allgemeinem Nihilismus, oder blosser psychischer Schwäche beruhen, in ihren höchsten Graden wohl bis zur Vortäuschung von wirklichem Defect der Bewegungsapparate führen kann. In den überwiegend meisten Fällen sind da sämmtliche der Einführung und Zubereitung des Ernährungsmaterials dienenden willkürlichen Mechanismen: Lippen und Wangen, Zunge und Kauwerkzeuge, entweder vollständig ausser Thätigkeit gesetzt — und hier kann die Speisung nur dann zum Ziele kommen, wenn die Speise dem sogenannten automatischen Schlingapparate direct anheim gegeben wird; oder dieselben erleiden doch eine solche Herabsetzung ihrer Arbeitsleistung, dass der physiologische Zweck unvollkommen oder nur durch Kunsthülfe erreicht wird. Streng genommen dürfen Kranke, welche die Nahrung zu nehmen verweigern und ihre Esswerkzeuge überall nicht in Thätigkeit setzen, mit den Dysphagieen ebensowenig in Verbindung gebracht werden, wie man die Dysurie mit der Retentio urinae zu identificiren das Recht hat. Indessen bedürfen diese Zustände, sei es unter der Bezeichnung Dys- oder Aphagie, schon im Interesse der Vollständigkeit und auch der Diagnose hier der Erwähnung; dann aber pflegt wirkliche Dysphagie einzutreten, sobald man den Kranken zum Essen zwingt. In der

Digitized by Google

That, jede Art der Zwangsfütterung stört den naturgemässen Ablauf des Speisevorganges und bedingt im strengen Sinne schon deshalb Dysphagie, ganz abgesehen von dem nachtheiligen Widerstande des Kranken gegen dieselbe. Die Differential-Diagnose von der auf Coordinationsstörung oder Lähmung beruhenden Dysphagie wird dem auf die Anamnese und auf den Gesammtzustand des Kranken gewissenhaft Acht gebenden Arzte selten nur Schwierigkeiten bereiten. Schwieriger gestaltet sich die Diagnose, wo etwa, durch Störungen des Gemeingefühls hervorgerufen, Wahnvorstellungen auftauchen, welche die Einstellung der Thätigkeit eines Organs, eines Gliedes der Bewegungskette bedingen. Ob da die Zungen-, die Kaumuskeln wirklich gelähmt sind, oder ob der Kranke nicht kauen will, seine Zunge nicht bewegen zu können wähnt, darüber die Diagnose zu fixiren, ist meistens nicht leicht; in den Fällen gar, wo das Individuum sonst noch auf centrale Ursache zurückzuführende Motilitätsstörungen aufzuweisen hat, manchmal unmöglich. Nur die sorgfältigste Verfolgung der Krankheitsentwickelung und die skrupulöseste Prüfung der Thätigkeit des gesammten Nervensystems mit allen der Diagnostik zu Gebote stehenden Mitteln kann hier der Entscheidung entgegen führen.

Soll die Grenze der Dysphagieen noch um einen Grad ausgedehnt werden, so dürften als zu der oben erörterten Gruppe (Dysphagieen aus psychischer Ursache) gehörig, manche Maniaci und wiederum auch gewisse Blödsinnige hier mit hereinbezogen werden. Es handelt sich da um Zustände, wo Bewegungsdrang oder Gier zu einem so sehr beschleunigten Ablauf der beregten Bewegungsreihen hindrängt, dass dieses und jenes Glied derselben, und zwar in der Regel am liebsten die Zeit raubende Kauoperation, zur ausreichenden Thätigkeit nicht gelangt oder völlig ausfällt. War es in obigen Fällen die Scheu

Digitized by Google

vor dem Mittel (der Thätigkeit) oder vor ihrem Zweck (der Ernährung), so finden wir hier die Lust an der Muskelarbeit (als Folge des Bewegungstriebes) oder das sich überstürzende Ereilen ihres Zweckes (Essgier): beide Male ist die Nahrungseinnahme, ist mithin die Gesundheit des Individuums gefährdet oder geschädigt. Da bedarf es kaum des Wortes, um die langen Reihen der einer beeinträchtigten Nahrungseinnahme auf dem Fusse folgenden Störungen in den Chylificationsorganen heraufzubeschwören; es bedarf kaum der Erwähnung, dass gerade sie, sei es durch Unterhaltung eines peripheren Reizes, sei es vermittelst deteriorisirter Blutcirculation und Ernährung, eine Psychose dauernd zu unterhalten vermögen. In der That lassen sich manchmal, in ähnlicher Weise wie bei Herzklappenfehlern, die Causalmomente für die Hartnäckigkeit einer psychischen Störung von Stufe zu Stufe bis zur einfachen mechanischen Störung, zur Dysphagie, zurückleiten — doch auch diese, und damit schliesst der circulus vitiosus ab, war bedingt und wird unterhalten durch gestörtes Nervenleben.

Hat man schon die Dysphagieen bei bloss gestörten, nicht gelähmten Kranken als Hemmschuh für eine günstige Krankheitsentwicklung stets zu fürchten und zu bekämpfen, um wie viel wichtiger ist ihr Vorhandensein bei den unter Coordinationsstörung und Lähmung begriffenen Beeinträchtigungen der Motilität! Wahrlich, man braucht nicht lange zu suchen, wenn man eine Dysphagie mit dem traurigen Geleite ihrer Folgezustände zu beobachten wünscht: jede Irrenanstalt, namentlich solche mit paralytischen und epileptischen Kranken, vermag ihr Contingent zu dem Heere dieser Patienten zu stellen; auch jeder Irrenarzt wird seine betrübenden Erfahrungen über sie zu machen gehabt haben. Dass die Epilepsie, ganz abgesehen von ihren Krampfparoxysmen, unter den mit Störungen der Motilität hervortretenden Krankheiten beson-

Digitized by Google

ders hervorgehoben werden muss, wird Niemanden Wunder nehmen, der in Pflegeanstalten die prägnanten Bewegungsstörungen der epileptischen Irren zu beobachten Gelegenheit hatte. Doch nicht genug, dass man die Combination der Epilepsie mit Bewegungsstörungen anerkennt, man muss sich auch zu dem Satze bekennen, dass motorische wie psychische Störungen nothwendige Consequenzen des der Epilepsie zu Grunde liegenden neuropathischen Processes sind — Störungen, die, in ihren Anfängen geringfügig und deshalb als solche schwer zu diagnosticiren, nichts desto weniger frühzeitig schon bestehen, um mit den Fortschritten des (epileptischen) Hirn- und Rückenmarksprocesses mehr und mehr an In- und Extensität zu gewinnen*).

Unterscheidet man, zuvörderet also an Lippen und Backen, Bewegungsstörungen niedern — wenn man will auch mittleren — und hohen Grades, so ist damit freilich der Einwurf der Willkürlichkeit nicht vermieden; indessen entspricht jene Trennung sowohl der Nothwendigkeit, heterogene Symptomenreihen selbst ein und desselben Grundleidens gesondert zu betrachten, als vor allem auch dem praktischen Bedürfnisse des zur Diagnose berufenen Arztes. Der erste Grad dysphagischer Erscheinungen äussert sich hier in gesteigerter Muskelthätigkeit bei geminderter Arbeitsleistung, in Ungeschicklichkeit und Verlangsamung der Bewegungen — in herabgesetzter Coordinationsfähigkeit. Wir finden da etwa, dass der Löffel ungenügend nur geleert, die Flüssigkeit häufig zum Theil verschüttet wird, dass der Mund über Gebühr weit aufgerissen, auch wohl Gabel und Löffel bis an den Stiel in die Mundhöhle geschoben wird, dass die Kauoperation durch die Backen nicht genügend un-

*) Vorstehende Behauptung stützende Thatsachen zu unterstellen, soll die Aufgabe einer späteren Abhandlung sein.

Digitized by Google

terstützt ist, die Lippen während derselben nicht völlig sufficient bleiben.

Man ist freilich von vornherein nicht geneigt, auf Ataxie und Paralyse, speciell hier auf Dysphagie zu schliessen, wo es sich nur um langsame, weniger exacte, um „plumpe“ und „ungeschickte“ Bewegungen handelt.*) Und doch, was liegt dem mangelhaften Erfassen und Festhalten der Speise zum Grunde? Constant weisen wir in derartigen Fällen bei unsern Kranken lückenhafte und ungleiche Facialis-Innervation in den Lippen nach — eine Innervationsstörung, die im ersten Beginne, wo dem Speisevorgange noch weiter kein Abtrag geschieht, doch schon bei mimischen Bewegungen (beim Sprechen, Lachen) in das Auge springt, der bei fortdauerndem Bestehen sogar deformirend auf die Gestalt der Lippen wirken muss. Ferner ist es nichts Zufälliges, dass die hieher gehörigen Kranken beim Ergreifen der Speise ihre Lippen und Kiefer abnorm weit öffnen, um die zugeführten Bissen gewissermaassen einzufangen; es beruht diese Erscheinung darauf, dass die Kranken die Stärke des Bewegungsimpulses nicht völlig in der Gewalt haben und dann um so mehr mit dem Maasse ihrer Bewegung über das Ziel hinwegschiessen, da eine minder ausgiebige Bewegung als die erstrebte, dem Zwecke hier bei weitem mehr schaden würde, als diejenige von überweiter Excursion. Derartige willkürliche, in vielen Fällen halb instinctive Compensation von motorischen Defecten — sei es Compensation vermittelst unverhält-

*) Solche mehr artistische als naturwissenschaftliche Bezeichnungen für Bewegungsstörungen (unbeholfen, plump, roh etc.) können, so lange die exacte, rein naturwissenschaftliche Nomenklatur auch hier noch ihrer Geburt harrt, nicht wohl umgangen, eher noch umschrieben werden. Immerhin muss man sich bewusst bleiben, dass diese Bezeichnungen auch für in durchaus physiologische Breite fallende Bewegungsweisen herkömmlich sind.

Digitized by Google

nissmässigem Kraft- oder Zeitaufwande, sei es solche bedingt durch Herbeiziehen anderer motorischer Apparate — findet sich auch in anderen Bewegungsorganen. So ist der breitspurige Schritt des Paralytikers weniger directe Folge der Unsicherheit in den unteren Extremitäten, als er hingegen meistens darauf hindeutet, dass das betreffende Individuum seinem schwankenden Schwerpunkte (oder auch nur dem krankhaften Gefühle der Unsicherheit) eine genügend breite Unterstützungsfläche zu schaffen sucht. Dieses Gesetz — Compensation von Bewegungsstörungen — hat bei unsern Kranken eine ausserordentliche, kaum genügend gewürdigte Tragweite. Zur Erläuterung braucht nur auf die Sprache mancher mit Dementia paralytica oder Epilepsie behafteter Kranken hingewiesen zu werden: ist dieselbe im Ganzen auch geläufig, gut verständlich und scheinbar sicher, so erscheint sie doch dem scharfen Beobachter verlangsamt und hat an geschmeidigem Flusse wie an wohlklingender Phonation eingebüsst. Einzelne Laute und Worte werden ohne äussere Veranlassung gedehnt, prononcirt und im singenden Tone hervorgebracht, es treten am ungehörigen Orte kurze Pausen und Haltpunkte ein, Lückenbüsser und Flickworte („nä, hm, no“ wohl auch „ja, ja etc.“) werden eingeschaltet, es wird eine Silbe wiederholt intonirt, eine andere abnorm rasch oder langsam gesprochen. Alles das sind Mittel und Mittelchen, hinter denen der Kranke seine motorische Störung, und zwar der Intelligentere häufig so gewandt verbirgt, vermittelst derselben so geschickt dem Ziele sich nähert, dass man diese Maske genau kennen muss, um die Diagnose von ihr nicht beirren zu lassen.

Ebensowohl sind die bei den in Frage stehenden Kranken zu beobachtenden verlangsamten Bewegungen der Lippen und Backen beim Speisen mittelbare Folgen beschränkter Motilität: das Bindeglied ist auch hier die

Digitized by Google

Erfahrung, das Bewusstsein, das Gefühl des Kranken, dass der Defect am besten noch bei retardirtem Ablauf der Bewegungen verdeckt werde. Es müssen die Kranken bei ihrer Arbeit Kraft und Zeit verschwenden, ohne doch ihren Zweck vollkommen zu erreichen, daher dann der Eindruck des Plumpen, des Ungeschickten und Unschönen! Wo das Muskelspiel schon den Effect des Mühereichen und Erfolgarmen macht, wo beim Essen Vibrationen der Lippen, wo unwillkürliche Verziehungen derselben nach der einen Seite hin störend eingreifen, wo die Lippen weit vorgestreckt, zurückgestreift, selbst aufgerollt werden, wo die Mundwinkel auffallend weit zurückgezogen werden und trotz der kräftigen Mitwirkung der *Mm. buccinatorii*, der Zunge und selbst der oben eruirten Faserzüge des *M. subcutan. colli*, dann das *vestibulum oris* von Speisetheilen nicht völlig zu reinigen ist: hier darf ebensowenig ein Zweifel über die Ursache der Erscheinungen obwalten als dann, wenn die eine Seite der andern an Energie und Nachhaltigkeit der Bewegung voransteht, wenn Verziehungen und Verzerrungen Begleiter der gewollten Bewegung sind, wenn ferner Mitbewegungen um die Mundwinkel, auch selbst von diesen durch das ganze Gesicht hin weiter ausstrahlend, vorhanden sind. Aber selbst da, wo allein nennenswerthe Verlangsamung jener Bewegungen bei Individuen bemerkbar ist, die etwa an allgemeiner Paralyse erkrankt oder doch auf dieselbe verdächtig sind, selbst da besteht die Berechtigung, auf Bewegungsstörung, und zwar auf solche vom Kranken noch in etwa beherrschte und verdeckte zu schliessen.

Soll noch ein Wort über die vorhin erwähnten Mitbewegungen nachgetragen werden, so beruhen diese keineswegs allein darauf, dass durch Willensimpulse neben den gewollten noch andere, ungewollte, zwecklose, selbst zweckwidrige Bewegungen ausgelöst werden — Bewe-

Digitized by Google

gungen, die nicht nur in Motilitäts-Neurosen, sondern selbst bei völlig Gesunden im Affect ihre Rolle spielen; man muss noch eine zweite Erklärung statuiren. Wie oft bemerken wir beim Sprechen unserer Kranken, dass, sobald Schwierigkeiten, beruhend in den auszusprechenden Consonanten, Silben u. s. w., den Fluss der Rede zu hemmen drohen, dass dann mehr oder weniger irreguläre mimische Bewegungen über das Gesicht schiessen, dass die Lippen beben, die Nasenflügel gedehnt, die Augenbrauen emporgehoben, die Augenlider zusammengezogen werden und die Stirn sich in Falten legt. Gewiss findet hier die Annahme, es handle sich um unwillkürliche Mitbewegungen, darin ihre gerechtfertigte Erklärung, dass ein im Fortlaufe der Bewegung eintretendes Hemmniss sogleich gesteigerte Innervationsthätigkeit bedingt und diese dann ein Abirren der motorischen Impulse in vom Ziele abliegende Nervenbezirke begünstigt. Diese Erklärung deckt jedoch nicht alle hergehörigen Erscheinungen, vor allem nicht diejenigen, wo während jener bestehenden Schwierigkeit gewisse Muskeln, resp. Muskelgruppen in Contraction verharren, wie das beim Emporziehen der Augenbrauen, beim Runzeln der Stirn der Fall ist. Phaenomene dieser Art wird man sich nach Analogie des Fallenden, der im Falle nach einem Haltpunkte umhergreift, nach Art dessen, der bei heftigem Schreien, überraschem Reden, sehr angestrengter Bauchpresse und dergl. unwillkürlich die Faust ballt und die Zähne auf einander presst, als Suchen oder Bilden des *punctum fixum*, des Unterstützungspunktes erklären müssen. Ist gleichwohl die in Falten gelegte Stirn kein fester Punkt für die der Articulation dienenden Muskeln, so muss jenes Gesetz — dessen weitgreifende, allgemeinere Bedeutung nicht scharf genug betont werden kann — dennoch darauf angewandt werden. In der That, diese Erklärung rechtfertigt sich leicht, wenn man be-

Digitized by Google

rücksichtigt, dass jeder vom ganzen Körper oder von einzelnen Gliedern auszuführenden Bewegung die Sorge um den Unterstützungspunkt für die beabsichtigte Kraftäusserung vorausgehen muss, dass zu dem Ende entsprechende Positionen eingenommen und die bewegten Glieder fixirt werden. Da nun eine während des Ablaufes der Bewegung eintretende Verrückung des Unterstützungspunktes auf der Stelle Unsicherheit, Beeinträchtigung der gewollten Bewegung, selbst Vereitelung des Zweckes hervorruft, so ist umgekehrt, sobald Unsicherheit und Störung einer Bewegung Platz greift, die erste Frage nach dem Unterstützungspunkte, das erste Bestreben, ihn zu sichern. So hier: den Kranken drängt sich mit dem Bewusstsein der Unsicherheit der ausgeführten Bewegungen das Gefühl des fehlenden festen Punktes für dieselben auf, sie greifen und tasten nach diesem umher und so entstehen die Mitbewegungen, deren hier gedacht ist.

Die Leistungsfähigkeit der Lippen und Backen sorgfältigster Prüfung zu unterwerfen, ist in keinem der auf die hieher gehörigen Krankheitszustände verdächtigen Fälle zu versäumen, schon deswegen nicht, weil gerade die Lippen am meisten dem forschenden Auge preis gegeben sind und am frühesten Functionsstörungen im Gebiete des *N. facialis* verrathen. Doch nicht allein des *N. facialis*, denn es ist ein Hauptcharakteristicum jener allgemeinen centralen Neuropathieen (allgem. Paralyse, Epilepsie), dass nie vereinzelte Nerven und selten nur beschränkte selbst weitere Innervationsgebiete allein, meistens hingegen das Nervensystem in seiner Totalität getroffen, beeinträchtigt, zerstört wird. Hier weisen mithin die Bewegungsstörungen in den Lippen in erster Linie auf solche im ganzen Bereiche des *N. facialis*, in zweiter Reihe aber auch auf die anderer Nervengebiete, vornehmlich solcher hin, deren Thätigkeit mit jenem

Digitized by

einem gemeinsamen Zwecke dient. So ist es beim Speiseorgane, dessen Constituenten, wie die Saiten eines musikalischen Instruments, zu einander stimmen, wohl coordinirt auf demselben Grundtone ruhen müssen, soll harmonische Gesammtwirkung möglich sein. In der That, es lassen sich hinter gestörter Bewegung der Lippen bei genauer Prüfung meistens auch andere auf Dysphagie deutende Symptome im Verlaufe des Speisekanals auffinden und wo sie fehlen, da werden sie doch durch jene signalisirt: denn eben aus den feinsten Muskelmechanismen springen die ersten Symptome der motorischen Störung in das Auge. — Es lässt sich nicht übersehen, dass solche einem Zwecke dienende, zu einem Bewegungsorgane vereinige Reihe motorischer Apparate (Gehen, Sprechen, Schreiben, Essen etc.) eine dem reinen Reflexmechanismus sich nähernde Dignität erhält. Das organische Gefüge derselben beweist uns, dass auch ihre centralen Motoren, wahrscheinlich durch Vermittelung von Ganglienzellen, verbunden neben einander stehen und somit einmal in ihrer Gesammtheit, zum zweiten auch einzeln jeder für sich dem Willen unterstellt sind. Wie nachtheilig nun selbst unerhebliche Schädigung jener Bindeglieder auf das ganze Bewegungsorgan zurückwirken muss, leuchtet von selber ein.

Es wird nach dem Gesagten nicht schwer sein, die Lippen trotz der verschiedenen Weisen der Aufnahme von Speise und Trank (Essen, Trinken, Schlürfen, Saugen), trotz der Mannichfaltigkeit der zur Anwendung kommenden Instrumente (Messer, Gabel, Löffel etc.), trotz mitarbeitender Hülfsorgane und endlich trotz des Spielraumes subjectiver Willkür, Gebrauchs und Gewohnheit, auf motorische Störung zu controliren. Ja, wie häufig erkennen wir schon in den accessorischen Bewegungen: der Hände, der Arme, des Kopfes und Rumpfes

Digitized by Google

— den Typus der beim Essen sich manifestirenden Bewegungsstörung der eigentlichen Speiseapparate!

Beim Schlürfen und Einsaugen flüssiger (ausnahmsweise selbst fester) Speise ist die Wirkung der Aspiration nicht zu übersehen. Eben durch sie wird das Schlürfen — beim Trinken aus Trinkgefässen, beim Suppen essen etc. — ein complicirterer Vorgang: es ist erforderlich, dass das betreffende Gefäss, etwa ein Löffel, wie zum Ausgiessen theilweise in den Mund eingebracht wird, dass sich dann die Lippen demselben, wie auch seinem Inhalte genau adaptiren und jetzt die Aspirationsbewegung erfolgt. Diese drei Einzelbewegungen haben sich mithin zu einem gemeinsamen zu vereinigen und in ihrer Zusammenwirkung wiederum der Willkür und dem Bedürfniss des Individuums sowohl auf das präciseste nachzukommen, wie auch gegebenen äusseren Verhältnissen (Form des Trinkgefässes, Qualität des Getränks, augenblickliche Capacität der Mundhöhle und dergl. mehr) Rechnung zu tragen. Kein Wunder, wenn da bei so vielen unserer Kranken selbst mehr als jene Langsamkeit und Ungeschicklichkeit, denen wir vorhin die motorische Störung unter die Füsse geschoben haben, zur Beobachtung kommt. Der Eine schüttet aus seinem Löffel die Flüssigkeit neben dem Löffelstiel aus, bei ihm liegt der Mangel in den Bewegungen des Armes und der Hände, die das Instrument nicht horizontal zu halten im Stande sind; ein Anderer, der mit lautem Geräusch schlürft, konnte seine Lippen nicht in die rechte Stellung zu der Oberfläche der Flüssigkeit bringen. Ein dritter muss eines heftigen Hustenanfalls wegen das Essen für einen Augenblick einstellen: ihm hat die nicht genügend beherrschte, überstarke Aspiration gar Flüssigkeit in die *Glottis* mit gerissen, bevor diese zum Abschlucken geschlossen werden konnte; endlich überspringt ein Vierter manche Schwierigkeiten dadurch, dass er,

Digitized by

durch frühere schlechte Erfahrung gewitzigt, bei zurückgebeugtem Kopfe seine Suppe in den Mund eingiesst.

Denkt man sich die dysphagischen Erscheinungen aus den beschriebenen Grenzen weiter herausgerückt, so stösst man auf die höheren Grade der motorischen Störung: auf die hochgradigen Coordinationsstörungen und mehr oder weniger ausgeprägte Lähmungszustände — auf die lange Stufenreihe der Insufficienzen von Lippen und Backen. Bei allen ist die Diagnose so leicht, wie die Prognose schwer! Obgleich die halbseitigen Beeinträchtigungen der betreffenden Facialis-Gebiete während und in Folge der Hemiplegieen paralytischer Kranker am reinsten zur Beobachtung kommen, so wird man kaum höhere Grade von Bewegungsstörung weder bei Epileptikern, noch bei andern Hirn- und Rückenmarkskranken finden, wo nicht ein Mehr oder Minder auf der einen Körperhälfte, speciell des Facialis, falls dieser überall betheiligt ist, zu finden wäre. Ja, die Behauptung, dass völliges Gleichgewicht der Bewegungsstörungen auf beiden Seiten des Körpers — abgesehen von den Fällen völliger Zerstörung correspondirender Nervenstränge — nie vorkommt, weder bei wirklichen Paralysen noch bei sogen. Coordinationsstörungen, wird mit der Verfeinerung der diagnostischen Mittel und mit der daraus resultirenden Möglichkeit, auch den geringsten Ausschlag nach der einen oder anderen Seite hin objectiv festzustellen, ihre Bethätigung finden.

Wie oft hat man Gelegenheit, bei den apoplectiformen Anfällen der Paralytisch-Blödsinnigen die halbseitigen Lähmungen in Lippen und Backen durch die ganze Skala ihrer Erscheinungen zu beobachten. Was sich darüber bei *Romberg* und *Hasse* unter den Symptomen der mimischen Gesichtslähmung verzeichnet findet, hat auch hier seine volle Gültigkeit: „der Mundwinkel hängt herab, der Mund ist auf der kranken Seite nicht ge-

Digitized by Google

schlossen und nach der entgegengesetzten verzerrt", dann „sammeln sich beim Kauen die Speisen leicht zwischen dem schlaffen Buccinator und dem Kiefer, können nicht unter den Zähnen festgehalten werden" etc. (*Hasse*'s Nervenkrankh. S. 342). So finden wir unsere hemiplegischen Kranken! Es vermögen die Lippen Speise und Getränk weder aufzunehmen noch innerhalb der Mundhöhle zurückzuhalten: das Ernährungsmaterial muss hinter die Zahnreihen eingebracht werden, und selbst dann noch fliesst bei horizontal gehaltenem Unterkiefer Speichel und Flüssigkeit aus der kranken Seite aus, sammelt sich Speise im Vorhof und bauscht die schlaffe Wange hervor. Tiefere Betheiligung der übrigen weiter unten zu erörternden mechanischen Apparate des Speisekanals — vor allen der Zunge — pflegen in unsern Fällen nicht zu fehlen, und durch sie sowohl, wie durch die Mitaffection der psychischen Thätigkeiten wird das Gesammtbild der dysphagischen Symptome dann entsprechend modificirt. Verklingen mit der Restauration der hemiplegischen Kranken die Lähmungserscheinungen allmälig und klärt sich das Sensorium, dann besteht, selbst wenn Lippen und Backen wieder schlussfähig sind, längere Zeit hindurch noch eine Tendenz, die beeinträchtigte Seite zu schonen, die Speise auf der gesunden Seite zu verarbeiten und von der kranken fern zu halten. Diese Neigung, in ihrer Motilität beschränkte Organe und Gliedmaassen zu schonen, selbst weit über die Nothwendigkeit hinaus zu schonen, ist bei Paralysen eine allgemeine: auf ihre Rechnung hat man eine grosse Anzahl der als Lähmungserscheinungen passirenden Unregelmässigkeiten in der Anwendung motorischer Apparate zu stellen. In der That gelingt es häufig, einen vom hemiplegischen Anfalle genesenden Paralytisch Blödsinnigen durch Zuspruch, Versprechung und Drohung momentan vom Hinken abzubringen, den bisher Sprachlosen, der

Digitized by Google

auf alle Fragen höchstens ein Kopfschütteln oder einen Gestus zur Hand hat, ein paar Worte nachsprechen zu lassen, diesen zum Händedruck mit der scheinbar gelähmten Hand, jenen zur Wiederaufnahme der Kauoperation auf beiden Seiten zu bewegen. Es erfordert bei Geistesgesunden schon einen kräftigen Entschluss, eine längere Zeit hindurch zur Unthätigkeit verurtheiltes Glied rasch in volle Thätigkeit wieder eintreten zu lassen; um wie viel weniger ist der Geistesgestörte, der Blödsinnige im Stande, die ihm jetzt genügende vicariirende Bewegung oder völlige Unthätigkeit zu bekämpfen! Ihm fehlt dazu Bedürfniss, wie Willensenergie; in extremen Fällen mangelt sogar das Gedächtniss für den früheren Bewegungsmodus oder doch die Einsicht, dass dieser der zweckmässigere sei, ganz abgesehen von Störungen des Muskel- und Gemeingefühls, die so häufig die motorische Störung überdauern.

Die doppelseitige Facialis-Paralyse bedingt völlige Unthätigkeit der Lippen und Backen. Erstere verlieren die feinen Linien ihrer Contour völlig, hängen schlaff und regungslos herab, der Verschluss der Mundhöhle ist aufgehoben; diese flottiren als Spiel für In- und Exspiration, weichen dem Drucke der im Munde befindlichen Speise, gerathen wohl zwischen die Zähne und werden verletzt. Diese Erscheinungen können nicht übersehen werden, näher jedoch liegt die Gefahr, dieselben falsch zu deuten. Auch in manchen Fällen des apathischen Blödsinns wie der stupiden Melancholie sind Backen und Lippen anscheinend völlig gelähmt, der Speichel fliesst über die herabhängende Unterlippe aus und es wird keine Bewegung gemacht, um Speise aufzunehmen, zu verarbeiten und innerhalb der Mundhöhle zurückzuhalten. Hier redet man nur dann von Paralyse, wenn die Anamnese und der ganze status praesens auf eine Complication mit Lähmung hinweist; die Erscheinungen

für sich jedoch, mögen sie völliger Lähmung noch so sehr gleichen, nimmt man als Symptome absoluter Willenslosigkeit oder absoluten Nichtwollens. Anders urtheilt man bei solchen Zuständen paralytischer oder apoplectischer Individuen: hier ist es eine organische, dort war es eine nur dynamische Störung, hier Lähmung, dort Unthätigkeit. Gewiss liegt in dem eine grosse Inconsequenz! Nennt man Bewegungsorgane allemal dann paralytisch und gelähmt, wenn ihre Function beeinträchtigt oder ganz gestört ist, dann hat man überall Paralyse, wo jene dem physiologischen Zwecke nicht mehr dienen, also auch in den obigen Fällen von Blödsinn und Melancholie. Schliesst man jedoch bei der Beurtheilung der auf der Peripherie zur Erscheinung kommenden Bewegungsstörungen den Rückschluss auf die Beschaffenheit der Nervencentren mit ein, soll die Bezeichnung „Lähmung" auf organische Störung, auf Defect jener hindeuten, dann wiederum ist zu berücksichtigen, dass die in Frage stehenden pathischen Zustände sämmtlich Ausdruck centraler Gewebsveränderungen sind, einerlei ob Melancholie und Blödsinn oder *Dementia paralytica* und Paraplegie. Es ist ferner zu berücksichtigen, dass die Zustände hochgradiger Depression der Motilität, wie wir sie in Apoplexieen antreffen, mit den Erscheinungen gesteigerter Innervationsthätigkeit (fibrilläres Zucken, krampfige Zusammenziehung einzelner Muskeln) gepaart zu sein pflegen; manchmal sogar will es einen bedünken, als ob gerade der excessive centrale Reiz peripherisch als Lähmung zur Erscheinung gelangt. Und da geräth doch die Bezeichnung „Paralyse, Lähmung" mit ihrer Beziehung auf centrale Structurverhältnisse und daraus erwachsende Functionszustände um so mehr in die Enge, als häufig weder Messer noch Mikroskop die schwersten Paralysen (apoplectiforme Zustände der paralytischen Irren) pathologisch - anatomisch zu deuten

Digitized by Google

vermögen. In der That, hier geht es wie bei der theoretisch gerechtfertigten Trennung der Ataxien von den Paralysen: die Praxis erweist die Schwierigkeit, manchmal die Unmöglichkeit der Differentialdiagnose concreter Fälle.

Die verschiedenen Abstufungen der Insufficienz von Lippen und Backen lassen sich bei solchen Paralytisch-Blödsinnigen, die eben einen apoplectiformen Anfall überstanden und nun rasch der Besserung entgegen gehen, am vollkommensten beobachten. Scheinbar völlige Lähmung weicht oft so rasch, dass von Tage zu Tage ein Mehr der Leistungsfähigkeit und ein Minder der Insufficienz zu constatiren ist, bis der *status quo ante* mit blos trägen und ungeschickten Bewegungen wieder erreicht ist. Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass in dem einen Falle die Mm. buccinatorii, im andern der M. sphincter oris zuerst zur Arbeitsleistung zurückkehrt, dass meistens die eine Seite — ein Zeichen ihrer tieferen Beeinträchtigung — gegen die andere zurückbleibt, dass hier die Restitution sehr rasch, dort langsam oder nur unvollkommen erfolgt. Wie für die meisten motorischen Störungen, so ist auch hier die allgemeine Paralyse mustergültig; indessen finden sich gleichfalls bei sogen. Rückenmarkskranken wie bei Epileptikern die verschiedenen Bilder der betreffenden Bewegungsstörungen. Es sind da namentlich bei letzteren sehr heftige Krampfparoxysmen zu erwähnen, in deren Folge gern eine mehr oder weniger tiefe, aber meistens restitutionsfähige Beschränkung der Motilität Platz greift; dieselbe äussert sich in einer Steigerung der den Epileptikern zumeist eigenthümlichen Coordinationsstörung, selten in völliger Lähmung, trägt constant mehr den Charakter der ungeordneten, unbeherrschten Bewegung als den der Schwäche und Ohnmacht. So finden wir wohl, dass ein Paralytiker den ihm dargebotenen Löffel nicht leert,

Digitized

weil er die schlaffen Lippen nicht zu heben im Stande ist; auch der Epileptiker verfehlt sein Ziel: er bewegt seine Lippen zwar sehr kräftig und energisch, aber er beherrscht sie nicht, er kann ihnen die zur Erreichung des erstrebten Zweckes erforderliche Form nicht geben, es fahren Mitbewegungen störend dazwischen und der Versuch misslingt auch hier.

Die masticatorischen Bewegungsstörungen in zweiter Reihe machen einen um so wichtigeren Theil der Disphagieen aus, als auf ihre Rechnung ohne Zweifel ein nicht unerheblicher Procentsatz der bei paretischen Kranken so häufigen gastrischen Störungen zu schreiben ist. Jedenfalls ist diese Deutung für Kranke, welche die gröbste Speise mit einem Zungenschlage in den Pharynx befördern, ohne zu kauen und einzuspeicheln, bei weitem verständlicher als die so gern angesprochene „Innervationsstörung“ im Allgemeinen, oder auch „Störung im Gebiete des Vagus und Sympathicus“ der Urheberschaft von Gastricismen für schuldig zu erklären. Motorische Beschränkungen der zur Unterstützung der Kauthätigkeit bestimmten Zunge, Lippen und Backen vermögen der Arbeit des Kauens für sich schon wesentlich Eintrag zu thun, selbst wenn die *Pars motoria* des Quintus leistungsfähig geblieben ist. Der Kranke bemüht sich dann wohl, durch Seitwärts-, Vor- und Rückwärtsschieben des Unterkiefers, durch Zuhülfenahme der Hand und Finger Brocken unter die Zähne zu bringen, das *vestibulum oris* zu säubern nnd die Fortbewegung in der Mundhöhle zu unterstützen. Im andern Falle aber stellt er auch die Versuche des Kauens, die ihm Mühe machen und Zeit wie Geduld kosten, ganz ein, verlässt sich auf die Fütterung durch seinen Arzt und Wärter, oder bringt selber die Speise weit genug in den Mund ein. Es ist leicht ersichtlich, dass die Unthätigkeit der Kaumuskulatur nicht sogleich den Schluss auf völlige Paralyse der portio

Digitized by Google

minor N. trigemini gestattet. Je weniger der Erfolg der Kauoperation der Mühe und dem Kraftaufwande entspricht, je hochgradiger also die Coordinationsstörung der Kau- wie auch der Hülfsbewegungen ausfällt, um so entschiedener stellt sich beim Kranken die Tendenz heraus, ein Organ, das seinem Bewegungsdrange oder seiner Essgier nicht genügt, völlig ruhen zu lassen. Dieses geschieht zumal dann, wenn der Oesophagus weder mit Schmerzhaftigkeit noch mit Spasmus auf die Insulte durch grobe Bissen reagirt. In den Fällen hingegen, wo sich (paralytische) Kranke mit ihrem Essen abmühen, ihre Speise nicht sorgfältig genug zerkleinern und zermalmen können und, zwingt man sie zum beschleunigten Essen, sich sogleich verschlucken, husten und würgen, hier handelt es sich um Bewegungsstörungen (in seltenen Fällen vielleicht auch blos um Störungen des Gemeingefühls oder um Hyperästhesie) im weitern Verlaufe des Speiseksnals: ihrer ist sich der Kranke mit Schrecken bewusst, ihnen opfert er die lange Zeit des Kauens trotz Hunger und Gier.

Coordinationsstörungen niederen Grades sind nicht immer leicht herauszuerkennen, zumal in solchen Fällen, wo neben der motorischen die psychische Störung von Einfluss ist. Da heisst es dann zu unterscheiden, ob ein Kranker auffallend langsam kauet, weil der Ausfall nervöser Bewegungselemente durch die Retardation compensirt werden muss, oder weil der psychische Impuls träge und unsicher ist; ob er ferner das Kauen nur oberflächlich betreibt resp. ganz unterlässt, weil ihm die maniakalische Hast keine Zeit lässt, oder weil er die Muskulatur nur unvollkommen beherrscht.

Eine gut coordinirte Muskelaction setzt voraus, daas die gewollte Bewegung durch wohl geordnetes, harmonisches Zusammenwirken aller betheiligten Muskeln und Muskeltheile dem Zwecke entsprechend ausgeführt werde.

Digitized by Google

Und bei den Kaumuskeln fallen die Störungen der Coordination um so schärfer in das Auge, da einige Muskeln für sich eine andere Wirkung haben, als in Gemeinschaft mit den correspondirenden Muskeln der andern Seite, da ferner sogar Muskeltheile einen von der Wirkung des ganzen Muskels abweichenden Effect äussern können. So mag sich ein in die Gesammtthätigkeit des Kauens hemmend eingreifendes Vorschieben des Unterkiefers daraus erklären, dass nur oder doch vorwiegend die äussere Portion des *M. masseter* contrahirt wurde, während die gleichmässige Zusammenziehung aller Theile des Muskels erforderlich ist, um die erstrebte Aufwärtsbewegung zu bewirken. So kann ferner wider Willen eintretende Seitenbewegnng des Unterkiefers dadurch bedingt sein, dass die *Mm. pterygoidei int.* beim Kauen sich das Gleichgewicht nicht halten und dann Ausweichen des Unterkiefers nach der minder stark innervirten Seite erfolgt.

In der That, dem geübten Auge verrathen sich die Bewegungsstörungen schon früh: sieht man dem Gesammtcharakter des Kauens nicht sogleich die Abweichung vom Normgerechten an, oder will man aus dem Eindrucke der trägen, ungeschickten, unschönen Thätigkeit keine Entscheidung treffen, dann zergliedere man die Kauoperation in ihre Elemente und prüfe diese einzeln für sich. Es zeigt sich dann, dass statt der Pendelbewegung: ungleichmässige, ruckweise, über die Nothwendigkeit ausgiebige oder allzubeschränkte Bewegungen ausgeführt werden, dass unnöthige Mahl- und Nagebewegungen mit eingreifen, dass grosse Mühe mit kleinem Erfolg sich paart — kurz dass, ähnlich wie beim Sprechen des Paralytikers nothwendige Consonante ausfallen und ungehörige Laute eingeflickt werden, sich auch beim Kauen das Zuviel vom einen mit dem Zuwenig vom anderen zum Nachtheile des Ganzen in mannigfacher

Weise combinirt. Einmal beherrschen die Kranken die gewollten Bewegungen nicht, sei es in Folge gestörter Sensibilität und herabgesetzten Muskelgefühls, sei es veranlasst durch directe Störung in den centralen Coordinationselementen (Ganglienzellen und deren Faserzüge), dann aber greifen unwillkürliche Mitbewegungen einzelner Muskeln störend mit ein — und diese bedingen gern dem Zwecke entgegenlaufende Bewegungen, erschweren, ja verwirren leicht die gesammte Kauoperation. — Dahin sind jedoch nicht allein die eigentlichen Kaumuskeln zu zählen, deren Bewegungen leicht störend in einander greifen können; hierher gehören auch die Antagonisten derselben, (vornehmlich also die *Mm. digastric. maxill. inf.*) Ihnen liegt neben der Hauptaufgabe, den Unterkiefer abwärts zu ziehen, noch die zweite nicht unwesentliche Arbeit ob, durch ein der Aufwärtsbewegung desselben folgendes, gleichsam elastisches Nachgeben der Kaubewegung eine grössere Sicherheit zu verleihen. Geschieht dieses Nachgeben nun durch unterbrochene Innervationsimpulse, ruckweise und in sichtbaren Absätzen, wird der Unterkiefer oscillirend gehoben und gesenkt, wie es bei manchen, namentlich paralytischen Kranken zu beobachten ist, dann wird der Nutzeffect, trotz gesteigerter Muskelarbeit gemindert — und auch hier haben wir dann die Erscheinungen der Dysphagie.

Das Bestreben des Kranken, durch gesteigerte Aufmerksamkeit der lästigen Mitbewegungen Herr zu werden, ist meistentheils gerade deswegen ein eitles, weil mit ihr ein gewisser Grad von Befangenheit verbunden ist und diese die Unsicherheit nur noch zu steigern pflegt. — Jene Mitbewegungen, welche oben als Ausdruck des Suchens nach dem festen Punkte angesprochen wurden, sind auch hier zu beobachten; es ist da sogar die Erscheinung nicht selten, dass Kranke, zum rascheren Kauen — eben so zum geschwinderen Sprechen —

angespornt und gedrängt, selbst am Tische mit der Hand einen Halt suchen. Dieses Bestreben, für gehemmte oder defecte motorische Organe Aushülfe, Compensation, Unterstützung und Sicherheit anderweitig zu gewinnen, drückt sich so entschieden bei aller Muskelthätigkeit aus, verwebt sich so tief mit dem Leben und Schaffen des Menschen, dass es auch für pathologische Zustände ein Grundzug der Erscheinungen motorischer Beeinträchtigung bleibt.

Die halbseitige Paralyse der Kaumuskulatur kommt in seltenen Fällen für sich allein auch bei Geisteskranken vor, häufiger beobachtet man sie als Theilerscheinung weiterer Symptome hemiplegischer Lähmung. Meistens stellen dann schon die allgemeinen Lähmungserscheinungen die Diagnose über die Ausdehnung der Bewegungsstörungen ausser Frage; dessenungeachtet ist es allemal räthlich, sich durch Inspection und Palpation von der Leistungsfähigkeit der Masseteren und Temporalmuskeln, die bekanntlich der Untersuchung für Blick und Hand ausserordentlich zugänglich sind, zu informiren. Ferner auch liefert die Stellung des Unterkiefers manchmal wichtige Fingerzeige: findet sich des Unterkiefer z. B. während der Ruhe mehr nach der gelähmten Seite verzogen, während er beim Kauen sichtlich nach der andern Seite abweicht, so erhält beides in der physiologischen Wirkungsweise dort vornehmlich der *Mm. pterygoidei int.*, hier der *Mm. bivent. mandib.* seine genügende Erklärung. Wir sehen alle diese Kranken — vorausgesetzt, dass die Bewusstseinstörung nicht überall jede Action verleugnet — allein auf der gesunden Seite kauen; langsam und mühevoll nur geht die Kauarbeit von Statten, denn nicht nur, dass die Mitwirkung der einen Seite ausfällt, es müssen von dieser die Speisetheile auch nach Möglichkeit fern gehalten werden, damit sie, zwischen Zähne und Zahnreihen sich einklemmend

oder zwischen Zunge und Alveolarrand einerseits und andererseits im *vestibulum oris* liegend, kein mechanisches Hinderniss bilden. Je tiefer dann die Mitaffection der Zunge, auch der Lippen und Backen, desto langsamer und unsicherer ist die Kauthätigkeit, desto unvollkommener geschieht dem Zwecke Genüge.

Für diese wie für die doppelseitigen Paralysen liefert die *Dementia paralytica*, vornehmlich in ihren apoplectischen und apoplectiformen Anfällen, mit den mannichfachsten Complicationen gepaarte Musterbilder aller Grade. Die auf beide Seiten des Kauapparats sich erstreckende Paralyse höchsten Grades beobachtet man verhältnissmässig selten, zumeist noch im Agone-Stadium der Apoplexien. Sie charakterisirt sich besonders durch den herabhängenden Unterkiefer, der dem Gesetze der Schwere und passiven Bewegungen keinen Widerstand weiter entgegenzusetzen vermag. Aehnliche Erscheinungen allerdings bietet auch die *Melancholia attonita* und der apathische Blödsinn, ohne dass Lähmung (Lähmung im Sinne der Autoren) vorhanden wäre, und es würden diese dann unter die Dysphagieen, besser Aphagieen aus psychischer Ursache zu rechnen sein.

Minder hochgradige Paralysen gestatten den Schluss der Mundhöhle noch. Kaubewegungen fehlen indessen auch bei ihnen gänzlich, oder doch fallen sie mehr oder weniger rudimentär aus, tragen manchmal deutlich den Charakter reiner Reflexbewegungen: sie haben keinen oder unerheblichen Erfolg. Die eingeführte Speise bleibt auf der Zunge liegen oder fällt, je nachdem der Kranke sich in aufrechter oder liegender Situation befindet, nach vorn im einen, im andern Falle nach hinten zu; der Speichel sammelt sich im Munde an und fliesst aus den Mundwinkeln hervor. Als fernere Folge pflegt Salivation und der widerlichste *Foetor ex ore* mit Röthung und Entzündung, mit Pilz- und selbst Geschwürsbildung

Digitized by Google

auf der Mundschleimhaut einzutreten. So kann die masticatorische Paralyse, als Begleiterin der mit Lähmung einhergehenden centralen Neuropathieen, alle nach der Wirkung der betreffenden Muskeln und Muskelgruppen verschiedenen Modificationen von Lähmungszuständen und abnormen Bewegungen darbieten; auch das Gefolge trophischer Störungen wird bei längerer Dauer des Leidens kaum ausbleiben.

Auch die Krampfzustände der Kaumuskulatur können, da sie die Thätigkeit des Kauapparates beeinträchtigen, mithin Dysphagie veranlassen, nicht unerwähnt bleiben. Bekannt ist ihr reflectorisches Entstehen: einmal aus traumatischer Ursache, dann durch Reizzustände: des Uterus der Hysterischen, des Damkanals durch Würmer, der Gingiva zahnender Kinder etc. Hier jedoch handelt es sich um diejenigen masticatorischen Gesichtskrämpfe (der Ausdruck ist von *Romberg*), welche auf centrale Ursache zurückgeführt werden müssen. Doch auch diese können sehr wohl durch directe Reizung der dem Kauen dienstbaren Nerven — *pars motoria N. trigem.*, beziehungsweise auch *N. facialis* —, wie auch reflectorisch: durch Reizung sensibler Nervenfasern innerhalb der Schädelhöhle, entstanden gedacht werden.

Ihr Auftreten bei paralytischen und epileptischen Kranken ist keine Seltenheit, namentlich sind sie gern Begleiter der Krampfparoxysmen dieser und der apoplectiformen Anfälle jener. Die höchsten Grade sowohl der tonischen, wie der klonischen Form gelangen seltener zur Beobachtung und pflegen, wo sie eintreten, Theilerscheinungen allgemeinerer Convulsibilität und Symptome schwererer Hirnläsionen zu sein. Es findet sich bei unsern Kranken weniger die vollendete Mundklemme, bei der die Kiefer fest gegen einander gepresst gehalten werden und weder Kaubewegungen, noch überall die Einführung von Speise in den Mund möglich ist; we-

niger auch der heftigste klonische Krampf, welcher den Unterkiefer, wie im Schüttelfrost, gewaltsam gegen den Oberkiefer schlägt. Eine gewöhnliche Erscheinung dagegen sind die mittleren und niederen Grade des Trigeminuskrampfes, sowohl des tonischen wie des klonischen. Jener äussert sich dadurch, dass Kranke ihren Mund nur mit Mühe und nicht ausreichend weit öffnen können, dass in Folge dessen gröbere Speise weder eingenommen noch genügend zerkleinert werden kann.

Fälle, in denen die Atagonisten der eigentlichen Kaumuskeln dauernd tonisch contrahirt wären (Mundsperre), kamen mir nicht zur Beobachtung; gleichwohl bietet sich die Andeutung dafür im Gähnekrampf apoplectischer Kranker nicht selten dar. Hier fehlt gar häufig jede oder jede ausgiebige Inspirationsbewegung, es wird der Mund weit aufgerissen, verharrt einen Augenblick krampfhaft geöffnet, um sich dann wieder mit kurzer Exspiration oder ganz geräuschlos zu schliessen. Weit häufiger und vor allem weit mannichfaltiger sind die klonischen Krämpfe der Kaumuskulatur. Bei allen hierher gehörigen Erkrankungen des Hirns und Rückenmarks kommen die Spielarten derselben gelegentlich zur Beobachtung: von der einfachen, unwillkürlich erfolgenden Kaubewegung bis zum tactmässigen und beschleunigten Ab- und Aufbewegen des Unterkiefers, von leisen Mahlbewegungen bis zum heftigen, anhaltenden Zähneknirschen oder ruckweisen Verschiebung des Unterkiefers nach links und rechts, vor- und rückwärts. Manchmal haben Kranke ihre bestimmte Form dieses Krampfes; dieselbe wiederholt sich sowohl ohne erkennbare Veranlassung als namentlich mit den Steigerungen des Nervenleidens und mit seinen Paroxysmen (epilept. und apoplect. Anfällen). Bei andern wieder wechselt die Form; so können auf tonische, klonische Krämpfe folgen und umgekehrt. Endlich giebt es auch Fälle, und die Hirn-

erkrankungen mit hysterischer Basis stellen dazu das grösste Contingent, in denen alle nur möglichen Bewegungen des Unterkiefers krampfhaft ausgelöst werden und sich, in buntem Gemisch mit andern, coordinirten und uncoordinirten Convulsionen, abspielen. Es leuchtet ohne weiteres ein, dass in allen den skizzirten Krampfzuständen, unter welche sich auch die einschlagenden Fälle von Chorea ohne Zwang einfügen lassen, das Kauen, dann das Speisen und allgemein die Gesundheit des Individuums mehr oder weniger schwer benachtheiligt sein kann.

Die Bewegungen der Zunge sind von jeher bei der Diagnostik allgemein-paralytischer Zustände oben an gestanden. Doch war es vornehmlich der Stand der Artikulation, dessen sorgfältige Prüfung deshalb unerlässlich erschien, weil das Bilden der Sprachlaute die complicirteste Thätigkeit der Zungenmuskeln voraussetzt und bei dieser eben die Lückenhaftigkeit der Motilität am ersten zu Tage tritt. Sind hingegen die das Speisen vermittelnden Bewegungen der Zunge der Beobachtung in geringerem Umfange zugänglich, zur Diagnose von Neuropathien weit weniger nutzbar und darum auch weniger eingehend berücksichtigt, so bleiben sie doch in einer Richtung, für die Pathologie der Digestionsorgane, ungleich wichtiger und ist es darum auch unerlässlich, dieselben unter den Veranlassungen der Dysphagie mit zu beschreiben.

Die niederen Grade von masticatorischer Glossoplegie pflegen die Kauarbeit nicht wesentlich zu stören. Man bemerkt beim Essen die Verlangsamung und einen gewissen Grad von Unbeholfenheit, dieselbe wird dadurch bewirkt, dass der Kranke sich auf die gröberen Bewegungen der Zunge beschränkt und feinere ungeschickt oder gar nicht ausführt. Am frühesten sind dann die

Seitwärtsbewegungen erschwert, diejenigen, welche den Transport der Speisetheile von der einen zu der andern Seite und das Reinigen des Vorhofs wie der Zahninterstitien vermitteln. Hingegen bleibt die Rückbewegung der Zunge, die das durchgekaute Material in den Pharynx befördert, am längsten erhalten: sie ist eben weniger complicirt und lässt sich beim Essen nicht umgehen. So ist dafür gesorgt, dass die für die Einnahme der Speise unerlässlichsten Bewegungen am längsten brauchbar bleiben. Oeffnen des Mundes, Rückwärtsbewegung der Zunge, Bissenbildung und Deglutition — das ist die kurze Bewegungskette, vermittelst welcher die Beförderung der Nahrungsmittel zur Noth noch besorgt werden kann; mit ihr behilft sich mancher unserer Kranken, der die Bewegungen der Lippen, des Unterkiefers nicht oder nur unvollkommen beherrscht. Doch auch Blödsinnige büssen mit zunehmendem geistigen Verfall eine erlernte Fähigkeit nach der andern ein: erst verliert die Muskelarbeit ihre Geschmeidigkeit, dann die Geschicklichkeit, bald auch die Zulänglichkeit und endlich überall die Brauchbarkeit. So, in der That, lässt sich ein grosser Theil der Motilitätsstörungen tief blödsinniger Kranken auf das Sinken der psychischen Funktionen zurückführen und diesen ist es auch zu danken, dass derartige Individuen wie Thiere ihre Speise verschlingen, dass sie fast auf dem Standpunkt des Säuglings, auf den des Reflexlebens zurückgekehrt sind.

Kranke mit zitternder, schwerer Zunge und lallender Sprache erweisen sich bei genauer Untersuchung zu den beim Speisen erforderlichen Bewegungen auch weniger geschickt; die sonst so überaus gewandte Zunge scheint dann oft in einen trägen ungeschickten Klotz verwandelt zu sein. Dieser beim Sprechen paralytischer Kranker oft so evidente Eindruck stellt sich um so entschiedener auch hier heraus, je tiefer die Hülfsmuskeln — *Mm.*

Digitized by Google

buccinatorii, dann auch *M. sphinctnr oris* und die gesammte Kaumuskulatur — in Mitleidenschaft gezogen sind, je langsamer nnd unvollkommener also die Arbeit ausgeführt und der Zweck erreicht wird. Die Bewegungen der Zunge beim Kauen lassen sich nicht beobachten, daher man genöthigt ist, vom Totaleindrucke wie vom Erfolge der Speisethätigkeit auf jene Rückschlüsse zu machen. So viel lässt sich jedoch bestimmt sagen, dass meistens gerade die Zunge als Hauptschuldige anzusprechen ist, wenn beim Essen die grösste Mühe mit geringem Erfolge belohnt wird, wenn die Verarbeitung und Fortbewegung von Speise in der Mundhöhle sichtlich schlecht und schlechter von Statten geht, wenn endlich ein motorischer Apparat nach dem andern umgangen wird und der Kranke den gradesten, weil bequemsten Weg zur Einverleibung seines Essens wählt.

Höhere Grade von Dysphagie werden durch halbseitige oder doppelseitige Paralysen der Zunge veranlasst, und diese finden bei unsern Kranken gar häufig ihre Entstehung. Die halbseitige Lähmung gestattet meistentheils noch eine, wenn auch mangelhafte, Betheiligung der Zunge an den Geschäften des Speisens, namentlich dann, wenn der Kranke Bewusstsein genug besitzt, um die noch beweglichen Zungenmunkeln für die lahm gelegte Seite vicariirend eintreten zu lassen. Meistentheils jedoch ist er ausser Stande, den Ausfall der einen Seite bei Bewegungen der ganzen Zunge mit in Rechnung zu ziehen; es schiessen die Bewegungen, da das Gegengewicht der Antagonisten fehlt, nach der gesunden Seite hin über das Ziel hinaus: es entsteht Verwirrung in der die Gesammthätigkeit constituirenden Einzelbewegungen, es erfolgen Verletzungen der Zunge — und gar häufig unterbleiben jetzt selbst die Kauversuche. Man sieht, wie fehlerhaft es sein würde, in solchen Fällen sogleich auf Paralyse der ausser Thätigkeit gesetzten Kaumusku-

Digitized by Google

latur zu schliessen; ja allgemein, es wäre voreilig, selbst bei vollständiger Hemiplegie auf Paralyse aller Muskeln und Muskelapparate der betreffenden Seite zu erkennen. Es leitet vielmehr die meist auffallend rasche und fast complete Restitution der Paralytiker von ihren apoplectiformen Anfällen auf die Annahme hin, dass zu der Entstehung des äusseren Bildes von Paraplegie wie Hemiplegie mehrere Momente nothwendig zusammenwirken: zunächst ist der von Schlaganfällen unzertrennliche Choc, dann die Bewusstseinsstörung in Rechnung zu bringen, in zweiter Reihe erst kommt, ungerechnet die nicht unwichtige Betheiligung der Sensibilität, das directe Ergriffensein nervöser Bewegungscentra in Frage. In Betreff dieser hat man sich vorzustellen, dass in den meisten Fällen ein nur minimer Bruchtheil der die gelähmt erscheinenden Bewegungsapparate beherrschenden Nervenelemente vernichtet ist, dass durch den Ausfall derselben jedoch so lange allgemeinere Lähmungszustände unterhalten bleiben, bis das Individuum durch Reflectiren und Probiren gelernt hat, die Lücke auszufüllen, um mit den nunmehr defecten Bewegungsorganen nach Möglichkeit zu arbeiten. Daher das mit der Klärung des Geistes Hand in Hand gehende Schwinden der Lähmungserscheinungen — oft bis zur scheinbar völligen Restitution! Doch die zerstörten Glieder der Bewegungskette, die wir uns mit zu Gruppen vereinigten Ganglienzellen identisch vorstellen, bleiben zerstört: ihnen wird allemal eine Lücke in der Leistungstüchtigkeit der Muskelapparate entsprechen. Ist diese erstan noch so unscheinbar, vielleicht dem Auge völlig verborgen, sie erweitert sich in dem Masse, als mit wiederholten apoplectischen Anfällen Insult auf Insult erfolgt und die Zahl der Glieder jener Ketten gelichtet wird. Daher dann hinterlassen diese so perniciösen Krankheitsattaquen paralytischer Kranken zunehmende Ataxie, wachsende Schwäche und

Digitized by Google

schliesslich den gebrochenen Körper des ärmsten der Kranken.

Ist die Zungenspitze zur Ausführung der allerfeinsten Bewegungen bestimmt und darum bei Ataxien am frühesten betheiligt, so leidet in vorgerückten Paralysen, vor allem in Apoplexien, mit jener auch die gröbere Zungenthätigkeit sichtlich. Die Speisemassen werden weder zerkauet und zerquetscht, noch in grösseren Portionen schluck- und bissenweise dem Rachen entgegengeführt; vielmehr duldet die Zunge, passiv auf dem Boden der Mundhöhle liegend, das Vollstopfen des Mundes mit Speise und erhebt sich nur zum Abschlucken, wenn Flüssigkeit oder Brocken den *isthmus faucium* passirt sind. Mit solchen Störungen behaftete Kranke pflegen den Mund während der ganzen Mahlzeit voll Speise zu haben, vorn stopfen sie immer nach und hinten entführt der automatische Mechanismus ein entsprechendes Quantum; ja, selbst einige Zeit nach der Mahlzeit finden sich noch Speisepartikel auf und neben der Zunge vor. Ebensowohl findet man auch nicht selten den durch die Zunge gebildeten Rachen-Mundhöhlen-Verschluss insufficient. Es ist in solchen Fällen die Zunge nicht mehr befähigt, lückenfreie Scheidewand zwischen Rachen- und Mundhöhle zu bilden; mit jedem Schluckact wird eine geringe Portion Speisebrei neben der Zunge oder über den Zungenrücken hinweg in den Mund zurückgepresst. Die nächste Folge ist zu häufiges Abschlucken, die zweite: Verlangsamung und Beeinträchtigung des ganzen Speisevorganges. Die geringeren Grade der auf diesem Wege entstandenen Dysphagien werden leicht übersehen, gleichwohl sind sie häufige Begleiter der Zungenparalysen; die höheren Grade derselben prägen sich nicht selten schon in der Mimik und Haltung des mit dem Bissen ringenden Kranken aus. Wo wir solche arme Individuen mit zusammengezogenen Brauen und

Digitized by Google

ängstlichem Blick, mit emporgezogenen Schultern und vorgestrecktem Halse an ihrer Portion arbeiten sehen, sehen, wie sie schlucken und würgen, ohne recht vom Platze zu kommen, da dürfen wir auf tiefere Beschränkung des ganzen Schlingapparates schliessen. Dass zu diesem die während des Abschluckens erfolgende Erhebung des Zungenrückens gegen den Gaumen gezählt werden muss, ist bekannt; diese Bewegung überdauert auch in der Regel alle übrigen der Zunge — manchmal geht sie selbst dann noch von Statten, wenn die Zunge, übrigens völlig gelähmt, flach zwischen den Zahnreihen liegt.

In der That steht diese Bewegung der Zunge näher zu den übrigen dem Abschlucken dienstbaren Muskeln des Schlingkanals als zu denen der Zungenspitze und Darniederliegen derselben gebietet deshalb, auch die Rachenmuskeln, soweit es überall möglich ist, auf Bewegungsstörung zu mustern. Jedenfalls deuten die Störungen der jetzt zu prüfenden sogenannten automatischen Schlingbewegungen bei unseren Kranken auf schwere Affection der Centralorgane hin. Wie alle die dem vegetativen Leben dienenden, vom Willen unabhängigen Reflexmechanismen namentlich deshalb am dauerhaftesten sind, weil sie den Einflüssen psychischer Störung entzogen sind, so sind auch jene die haltbarsten Glieder in der Reihe der Bewegungsapparate des Speisekanals. Sie gestatten häufig noch die Fristung des Lebens, wenn alle zugehörigen willkürlichen Bewegungen längst erloschen sind.

Bevor wir jedoch die Mundhöhle verlassen, um den weitern Verlauf des Speisekanals der Prüfung zu unterwerfen, mag noch ein Wort über Sensibilitätsstörungen und ihre Einwirkung auf das Entstehen der Dysphagieen eingeschaltet werden. Wo sich bei unseren Kranken Anästhesie des Trigeminns consta-

Digitized by Google

tiren lässt — bekanntlich ist dieselbe vornehmlich bei paralytischen Kranken eine alltägliche Erscheinung —, da wird man ohne Mühe eine mehr oder minder starke Betheiligung der Mundschleimhaut feststellen können, und zwar pflegt in den Fällen die Zunge bei weitem schärfer und länger ihr Schmerz- und Tastgefühl zu bewahren als Gaumen, Zahnfleisch und Wange.

Daher kommt es denn wohl, dass manche Kranke Speisetheile oder versuchsweise eingeführte Stückchen Papier ruhig im Vorhof liegen lassen, sofort jedoch zu tasten, zu probiren und zu kauen beginnen, sobald jene auf die Zunge gelangen. In einigen Fällen meiner Beobachtung von bereits nach jeder Richtung hin deutlich ausgeprägter *Dementia paralytica* wurden sowohl schmerzhafte Reize normal percipirt, als auch ergab sich hier bei Erüfungen durch den Zirkel, durch Stückchen Kork und Holz, durch feines Leder und Papier etc. nicht die mindeste Abschwächung des Tastsinnes. Die bei weitem grösste Zahl der Kranken mit vorhandenen Lähmungszuständen war hingegen nicht ohne Herabsetzung der Sensibilität; bei ihnen schien es sich zu bewähren, dass die Analgesie sich früher ausbildet als eine Einbusse an Tastfähigkeit, dass Algesie wie Tastsinn jedoch in der Regel früher erlöschen, als die Fähigkeit der in der Mund- und Rachenhöhlenschleimhaut befindlichen Nervenendigungen, Reflexbewegungen (Würgen, Schlukken) zu wecken. Diese Reihefolge würde in der That auch die obersten Gesetze, dass das Entbehrlichere zuerst, zuletzt das Unentbehrlichste geopfert wird, entsprechen; jedoch lässt sich dieselbe hier nur als wahrscheinlich richtige Vermuthung, nicht als zweifellos gültiges Gesetz hinstellen, da Jedermann; der sich mit derartigen Untersuchungen an gestörten Kranken beschäftigt hat, die Unzulänglichkeit der Ergebnisse bitter empfinden muss.

Digitized by Google

Wie schwer nun Beeinträchtigungen der Controleeinrichtungen für das Speisematerial in Hinsicht auf die Integrität der Verdauungsorgane wiegen, dafür hat man genügend lebende Belege, zumal in Irrenanstalten. Wie bei Analgesie Verletzungen durch spitze Knochen etc. ungleich leichter erfolgen, so hat geschwächte Temperaturempfindung — auch diese Empfindungsqualität ist besonders zu registriren — leicht Reizung und Verbrennung durch verzehrte heisse Speise zur Folge, so zieht die Beschränkung des Drucksinns (Tastsinns κατ' ἐξοχην) eine mangelhafte Verarbeitung der Speise, und mit Hülfe von Wahnideen, auch das Verschlingen mechanisch und chemisch nachtheilig wirkender Dinge nach sich. Da kann es dann geschehen, wie bei einer unserer epileptischen Kranken, dass diese Anästhesie zu der für die Verdauungsorgane folgeschweren Wahnidee führt, glatte Steinchen seien ebenso viele Bonbons. Wo da die jedenfalls markirten Grenzen zwischen den Functionen des N. glossopharyngeus und des Quintus, also zwischen Geschmacks- und Taststörungen zu ziehen seien, die Frage gehört in die Lehre von den Sinnestäuschungen, hier ist nur zu constatiren, dass Störungen ihrer normalen Thätigkeit direct und indirect dem Kranken nachtheilig sein können, auch ohne Dysphagie zu veranlassen. Einer Dysphagie begegnen wir aber entschieden da wieder, wo ein Kranker von der in der Mundhöhle befindlichen Speise keine oder nur geringe Empfindung hat, wo in Folge dessen Behinderung der Einnahme, der Zerkleinerung und der Locomotion des Speisematerials eintritt. Berücksichtigt man hier, dass die Sensibilität zugleich Regulator für die Motilität ist, dann leuchtet ohne weiteres ein, dass die Functionsstörungen der betreffenden Mechanismen hier im graden Verhältnisse zu den Taststörungen stehen, dass mithin selbst ohne motorische Paralyse die Bedingung zu schweren Dysphagieen gegeben

Digitized by Google

sein kann. Bei unsern Kranken kommen indessen Empfindungslähmungen höchsten Grades, seien es halb- oder doppelseitige, kaum in reiner Form vor; doch ist es wichtig, im concreten Falle die sensible der motorischen Störung gegenüber nicht zu unterschätzen. Beide sind gar in den Fällen, wo es sich um Beeinträchtigungen der Reflexvorgänge handelt, nicht von einander zu trennen; gleichwohl pflegt man letztere unter den Motilitäts-Neurosen abzuhandeln, ohne zu wissen, ob der sensible oder der motorischen Bahn die Störung der Function zuzuschreiben sei. Das Erlöschen der Reflexaction pflegt die schwersten Lähmungszustände auszuzeichnen, Abschwächung derselben findet sich nicht selten bei paralytischen Kranken. Doch sind mir auch Fälle erinnerlich, wo bei schwerer Beeinträchtigung aller willkürlichen Bewegungen Reflexerscheinungen — etwa Würgen auf Reizung des weichen Gaumens mit einem stumpfen Instrumente — über die Norm leicht hervorzurufen waren und ohne jedwede Störung von Statten gingen.

Es ist eben so schwierig wie unnöthig, alle die einzelnen beim Schlucken mitwirkenden Muskeln nach dem Grade ihrer Bewegungstüchtigkeit durchzumustern. Ist der Schluckapparat in Folge centraler Störung schadhaft geworden, so sind alle zugehörigen Muskeln mehr oder minder in Mitleidenschaft gezogen und es handelt sich hauptsächlich um die Frage, welchen Grad der Untüchtigkeit dem ganzen Reflexapparate zugeschrieben werden muss. Durch die Abweichungen von der physiologischen Funktionirung sind uns auch hier die Criterien für dieselbe an die Hand gegeben. Wir wissen zunächst, dass beim Abschlucken die Rückkehr von Speise oder Flüssigkeit in die Mundhöhle nicht stattfinden darf; geschieht es dennoch, so findet sich der Grund dafür speciell in der oben erörterten Zungenlähmung, allgemein in der Dysphagie veranlassenden Beeinträch-

Digitized by Google

tigung des ganzen Schluckapparats — denn nicht in einem dieser Fälle fehlen auf weitere Lähmung deutende Symptome. Zu den wichtigsten dieser zählt das häufige Verschlucken der Kranken, jene durch in den Larynx eingedrungene Speisetheile verursachte mit Athem- und Erstickungsnoth verbundene Hustenzufälle. Dieselben mögen beim Schlürfen und Saugen auf Rechnung schlecht beherrschter und allzu kräftiger Aspirationsbewegungen kommen; wo sie während und in Folge des Abschlukkens eintreten, da hat man anzunehmen, dass der Schluss des *ostium laryng. pharyngis* gelockert sei. Dinse Erscheinung kann zunächst durch Lähmung der Zunge sowohl wie der Hebemuskeln des Zungenbeins hervorgerufen sein, indirect jedoch auch dadurch, dass Speise- und Flüssigkeitsreste vom unvollkommen erfolgten Abschlucken her im Rachen zurückblieben und bei der ersten Inspiration dann in den Larynx gelangen.

Erwähnenswerth ist hier die bei vielen mit Lähmungszuständen behafteten Kranken eintretende Minderung der Reflexreaction des Kehlkopfs auf Reiz durch eingedrungene fremde Körper. Es stehen die Versuche, dieselben durch Hustenstösse wieder herauszuschaffen, gegen die Anstrengungen, welche ein gesunder Mensch in gleichem Falle zu machen gezwungen ist, so weit zurück, dass man nach der Energie der Repulsionsversuche annähernd die Empfindlichkeit der Kehlkopfsschleimhaut zu taxiren vermag, dass man sich andererseits über die Häufigkeit von Lungenaffectionen dort nicht wundern darf, wo die Respirationsorgane, durch Störungen der Motilität wie der Sensibilität, doppelt gefährdet sind.

Wo sich der Kehlkopf unter dem tastenden Finger nur sehr langsam und ungenügend zu der Schluckbewegung emporhebt, da sind zunächst die *Mm. genio-* und *mylohyoidei* nebst dem vordern Bauche der *Mm.*

Digitized by Google

digastrici der Bewegungsstörung, der Lähmung anzuklagen; allgemein jedoch ist es auch gestattet, diese Art der Palpation zur Beurtheilung des Grades der vom gesammten Schluckapparate ausgehenden Dysphagie zu verwerthen. Bei dieser Untersuchungsweise, die immerhin einige Uebung nnd Aufmerksamkeit erfordert, ist jede erheblichere, etwa durch halbseitige Lähmung veranlasste Deviation des aufwärts bewegten Kehlkopfes nach rechts oder links als solche zu constatiren. Dieselbe erlaubt, wo sie sich unzweifelhaft herausstellt, den weitern Schluss auf halbseitige Beeinträchtigung des ganzen Schluckapparats und ist darum, bei der Sparsamkeit der Merkzeichen für letztere ein um so willkommeneres Diagnosticum. Insufficienz der hintern Gaumenbögen kann gleichfalls durch Paralyse bedingt sein, ihre Symptome sind umgekehrt auch wieder zur Diagnose derselben zu benutzen. Sind es meistens nur Hustenstösse und zwar bei unsern Kranken solche in Folge des sogen. Verschluckens entstandene, welche Speisepartikel oder Flüssigkeit durch den unvollkommen geschlossenen resp. gesprengten Rachen-Choanenverschluss hindurch und in die Nasenhöhle eintreiben, so kommen doch auch Fälle vor, wo solches beim einfachen Abschlucken geschieht; wo man dann Theile des Genossenen mit dem Nasenschleim vermischt antrifft, in vereinzelten Fällen selbst zur Nase ausfliessen sieht. Selten wird man im Stande sein, ein nur für intelligente Kranke, etwa Tabetische, verwendbares Diagnosticum zu benutzen: es ist dieses das Eingiessen oder Einspritzen von kaltem Wasser durch eine in den hintern Theil der Nasenhöhle eingeführte Canüle, während Patient zugleich die Schluckbewegung auf ihrer Höhe zu fixiren bemüht ist. Es darf dann der Norm nach kein Tropfen Wasser in die Mundhöhle eindringen, bis mit der Bewegung nachgelassen wird und der Kehlkopf wieder herabsinkt. Dieses durch

die Untersuchungen *Czermak*'s, nach denen der weiche Gaumen bei Hervorbringung der Vocale seine Lage in bestimmter Weise verändert, in die Physiologie eingeführte Criterium hat auch seinen zweifellosen Werth für die Pathologie, der seine Verwendung bislang jedoch fremd geblieben zu sein scheint. Es wird dieser Versuch, den Jedermann mit Leichtigkeit an sich selber probeweise ausführen kann, abgesehen selbst von unsern Zwecken, bei im Rachen vorhandenen Destructionsprocessen jeder Art der Diagnose dienstbar gemacht werden können.

Die niedern Grade dieser Dysphagieen pflegen übersehen oder geringgeschätzt zu werden, gleichwohl fallen sie den Kranken sehr lästig, fordern bestimmte Rücksichtsnahme auf die Qualität der Speisen und sind nicht ohne nachtheiligen Einfluss auf die Digestionsorgane. Kranke dieser Kategorie finden sich in jeder mit Paralytikern und Epileptikern versorgten Anstalt, man hört sie oft schon an dem das Speisen hie und da unterbrechenden Räuspern und Husten heraus, jedenfalls gewahrt man an ihnen bald die verlangsamte, ungeschickte selbst unsichere Thätigkeit der Ess- und Schlingwerkzeuge und überzeugt sich endlich bei schärferer Beobachtung von den einzelnen Symptomen der Dysphagie. Diese werden für den Arzt um so dringlicher und für den Kranken um so verderblicher, je mehr sie sich häufen und steigern, je entschiedener vor allen die Reflexthätigkeit des Schluckens und Schlingens ihren Dienst versagt.. Die höchsten Grade dieser Dysphagie, solche also, die keine oder doch nur sehr rudimentäre Schluckbewegungen zulassen, kommen in unsern Fällen kaum anders als beim tiefsten Darniederliegen des gesammten Nervensystems — in erster Linie nach Apoplexien — vor und bringen die dringendste Gefahr für Gesundheit und Leben mit sich. So lethal in der Regel das Grund-

Digitized by Google

leiden dieser Zustände ist, so kommt dennoch ein nicht zu verachtender Procentsatz allein, ein zweiter zum Theil auf Rechnung der Dysphagie: wo nicht durch Inanition und Suffocation, da in Folge von Beeinträchtigungen der Verdauungsthätigkeit und Assimilation, in Folge von Läsionen der an sich schon vulnerabelen Respirationsorgane. Wartet man hier allemal, bis die indolente Kehlkopfsschleimhaut Reflexthätigkeit in das Werk setzt und damit das Einrücken fremder Körper in die Luftwege signalisirt, oder überlässt man unerfahrenen dritten Personen die Fütterung, dann ist für den Kranken übel gesorgt. Ohne Zweifel, sobald man die Diagnose auf hochgradige Dysphagie gestellt hat — und nie soll der Arzt die Motilität der Speiseapparate aus dem Auge verlieren —, hat man zur Schlundröhre zu greifen. Wenn der Wärter erst sein Votum dahin abgiebt, dass „trotz der Mühe, die er sich gegeben habe, eigentlich nichts Rechtes hinunter wolle", dann pflegen die Bronchien schon für eine Pneumonie überreichlich fremde Körper zu bergen. Ohne Zweifel, je aufmerksamer man die durch Dysphagie veranlassten mechanischen Beeinträchtigungen der Respirationsorgane paralytischer Kranker im Auge hat, um so weniger wird man ihre, keineswegs für alle Fälle erwiesene, Prädisposition zur Entzündung anzurufen haben. Aehnliches ist übrigens in Erörterung der Frage, ob *gangraena pulmon.* bei Nahrungsverweigerung durch mechanischen Reiz oder in Folge geminderter Vitalität der Gewebe verursacht sei, von anderer Seite *(L. Meyer)* bereits hervorgehoben.

Ist die Bewegungsfähigkeit des dem Abschlucken dienstbaren Apparats der Diagnose nicht vollkommen zugänglich, um wie viel schwerer ist die Musculatur des Oesophagus auf Motilitätsstörung zu controliren! Wie überall die Pathologie der Speiseröhre, so gehören zumal die Functionsstörungen ihrer Muskulatur zu den dunkeln

Digitized by Google

Punkten der Medicin — und bei unsern Kranken erst verliert man selbst die sparsamen, bei Geistesgesunden jedoch verwendbaren subjectiven diagnostischen Haltpunkte So viel indess lässt sich behaupten, dass die Function der Speiseröhre zu allerletzt eingestellt wird. Wo die Bewegungen des Abschluckens selbst in Verwirrung gerathen, da geht oft die, allerdings auch bei weitem weniger complicirte Thätigkeit des Oesophagus noch rüstig von Statten. Der Beweis dafür lässt sich vermittelst der Auskultation des Schlingkanals leicht führen. In diesem Umstande liegt es eben, dass das practische Interesse und die Oesophagus-Paralysen sich nicht nahe berühren, denn mit der Unmöglichkeit des Abschluckens sistirt selbstverständlich auch die Leistung des Schlundes, und erstere allein ist es daher, welche in praxi als *Dysphagia paralytica* bisher in Frage kam. Wollen wir die Classification der durch Hyper- und Akinese entstandenen Dysphagieen in solche der Lippen und Backen, der Kaumuskeln, der Zunge, des Schluck- und Schlingapparats durchführen, dann müssen wir hier auch die Paralyse der Speiseröhre mit dem Bemerken statuiren, dass dieselbe so wenig practischen Werth beansprucht, wie sie der Diagnose seither zugänglich war.

Anders verhält es sich mit der sogen. *Dysphagia spastica*, wofür der Ausdruck im Sinne der Autoren hier als Krampf des Schlundkopfes und der Speiseröhre gebraucht ist; dieselbe kommt als vorübergehende Zusammenziehung eines Theils des Schlingkanals, als die sogen. *strictura oesophagi spastica* weit seltener, auch bei manchen unserer Kranken vor. Dahin sind zu zählen nicht nur Hysterische, deren globus übrigens ebenso wohl auf Sensibilitätsanomalie beruhen kann, nicht nur Epileptiker mit ihrer allgemeinen Tendenz zur Convulsion, nicht allein Individuen mit den Erscheinungen centralen

Reizes und centraler Lähmung, es kann eine Dysphagie dieser Art auch rein psychisch vermittelt sein:

Es lebt zur Zeit ein melancholischer Mann (*Hennecke*) in hiesiger Anstalt, der zu Anfang seines Hierseins die Nahrung verweigerte; und dieses zwar nicht etwa in Folge von Wahnvorstellungen oder aus Neigung zum Suicidum, vielmehr fürchtete sich Patient vor dem Speisen, das ihm „einen Krampf im Halse“ und Pein verursachte. Liess man ihn nach dringlichen Vorstellungen und unter der Drohung, man werde ihn füttern, falls er nichts geniesse, mit seinem Essen allein, dann führte er kleine, mit Daumen und Zeigefinger abgebrochene Brocken in den Mund ein und brachte selbst einen solchen Bissen erst nach wiederholtem Schlucken, unter Augenverdrehen und Halsrecken hinunter. Dagegen misslang jeder Fütterungsversuch, und zwar um so vollständiger, je entschiedener derselbe in das Werk gesetzt ward. Mit sichtbarer Hast und Angst machte Patient dann Schlingversuche, bis zum Rachen gelangte die Speise, dann aber war der Weg, offenbar durch Spasmus im obersten Theile der Speiseröhre abgeschnitten; obgleich sich der Kehlkopf regelrecht hob, so erfolgten statt des Abschluckens bald Würgbewegungen, Husten und Speien. Ganz allmälig gewöhnte sich der Kranke an seine Umgebung wie an die Speisen, und heute isst er, obgleich seine Wiederherstellung noch nicht erfolgt ist, in Reihe und Glied mit den Anderen Alles, was der Kostzettel bietet.

Es kann uns das Entstehen spastischer Zustände der Art bei Geisteskranken nicht Wunder nehmen, wenn wir berücksichtigen, dass blosse Affecte solche hervorzurufen vermögen: dass die Furcht schon einen leichten Cystospasmus, Zorn und Schreck den Schlundkrampf wecken kann. Wo dieser, wie vornehmlich bei den melancholischen Kranken, durch krankhafte Steigerung der

Digitized by Google

Affecte vermittelt wird, da scheint er am liebsten den obersten Theil der Speiseröhre, resp. den Schlundkopf einzunehmen, während übrigens jedoch sein Sitz an jeder Stelle des Schlingkanals sein kann. Der Widerstand, welchen krampfige Zusammenziehung der eingenommenen Speise entgegensetzt, ist nach der Intensität und Dauer derselben verschieden stark. So viel jedoch ist ersichtlich, dass Kranke, die ohnehin zum Essen schwer zu bewegen sind, selbst durch geringere Grade dieser Dysphagie zur Nahrungsverweigerung um so leichter getrieben werden, als sich an die ungewohnten Krampfgefühle im Halse oder in der Brust gern die bekannten Wahnvorstellungen knüpfen — der Wahn von im Leibe lebenden und zehrenden Thieren, von der Verwandlung alles Genossenen in Feuer und Gift, von Zugewachsen- und Verstopftsein. Die Schlundsonde als diagnostisches Universalmittel für Oesophagus-Krankheiten findet auch hier ihre Anwendung, doch muss man von ihrer Application so lange Abstand nehmen, als man noch ohne Schlundröhre auskommen zu können glaubt, und zwar aus zwei Gründen. Einmal ist die Exploration der Speiseröhre mit Festbinden resp. Festhalten und allen zugehörigen Manipulationen eine Operation, die auf den gestörten Kranken einen sehr tiefen, gewiss selten nur vortheilhaften Eindruck machen wird, dann aber lehrt die Erfahrung, dass hinterher meistentheils alle die Fütterungsmittel und Mittelchen fehlschlagen und jetzt die Schlundröhre unumgänglich geworden ist.

In die Categorie der Krampfzustände des Speisekanals gehören in erster Reihe die Kau- und Schlingbewegungen, welche wir häufig als Begleiter der epileptischen resp. epileptiformen Paroxysmen unserer Epileptiker und Paralytiker eintreten sehen. In den meisten, namentlich den ausgebildeten Krampfzufällen der Art spielen sie, in der Regel aus krampfhaften Bewegungen

des Unterkiefers und der Zunge wie aus Schluckbewegungen bestehend, eine nur untergeordnete Rolle gegenüber den die Muskulatur des Rumpfes und der Gliedmaassen einnehmenden Krämpfen. Sie treten erst in das Licht bei den unvollkommenen, den epileptiformen Paroxysmen, zumal da, wo der ganze Speisekanal an den spastischen Bewegungen Theil nimmt, während die Muskulatur des übrigen Körpers mehr in der Ruhe verharrt.

So wurde ein hier vor kurzem verstorbener 40jähriger Schneider *(H. Graefe)* mit allen Erscheinungen bereits weit vorgeschrittener allgemeiner Paralyse, wiederholt von Schlaganfällen heimgesucht, die neben den Erscheinungen der Apoplexie in letzter Zeit auch epileptiforme Zustände darboten. Letztere verliefen in der Art, dass ausser Hippus-Bewegungen der Bulbi und Verziehungen des Gesichts kaum ein leichtes convulsivisches Vibriren in den Muskeln der Extremitäten, geringe Flexion, Pro- und Supination der Glieder zu erkennen war. Dagegen begann sogleich mit dem Anfalle das krampfhafte Spiel der Lippen, des Unterkiefers, der Zunge und des Schlingapparats. Dasselbe stellte sich nur selten als ein der Norm entsprechendes Nacheinander der einzelnen Apparate des Speisekanals dar, meistens handelte es sich nur um rudimentäre, zu rasche oder zu langsame, irreguläre und gegenseitig sich störende Bewegungen derselben; gleichwohl ist kein Zweifel, dass die dem Speisen dienenden motorischen Apparate sämmtlich dem Krampfe unterworfen waren, die Speiseröhre nicht ausgenommen.

Was letztere anbetrifft, so könnte man meinen, dass einzig der Reiz des reichlich secernirten Speichels den Schlingact reflectorisch hervorgerufen habe — und dass dieser sich wirklich bis zum Magen fortsetzte, liess sich durch die Auskultation des Cardialgeräusches ausser

Digitized by Google

Zweifel stellen —, doch hätte in diesem Falle das Abschlucken im Verhältniss zu dem vorräthigen Speichel stehen müssen und wäre, wie es jedoch geschah, nicht erfolgt, als man den Kranke vorbeugte, die Rückwärtsbewegung der Zunge hemmte und den Speichel nach vorn ausfliessen liess.

So sehen wir, dass die Insufficienzen der einzelnen das Speiseorgan componirenden motorischen Apparate, jede mit ihrer Gruppe dysphagischer Symptome, zusammen das Gesammtbild einer Dysphagie liefern. Es ist zur Feststellung der letzteren daher die Prüfung der einzelnen Apparate unerlässlich, soll das Bild kein unbestimmtes, verschwommenes sein. Nicht anders wie bei den Sprachstörungen paralytischer Kranker! Wer hier blos nach dem durch die gehörten Laute hervorgebrachten subjectiven Eindrucke urtheilt, ohne mit der akustischen Wahrnehmung zugleich die bestimmte Vorstellung von der Action und Position der einzelnen, Stimmen und Sprache erzeugenden Apparate zu verbinden, dessen Diagnose bleibt schwankend und unzuverlässig.

Fragen wir nunmehr nach der practischen Ausbeute der vorn beschriebenen Schlinggeräusche und nach ihrer Bedeutung für die Diagnostik der Dysphagieen, so muss voraus bemerkt werden, dass dieselbe, so gering sie bislang ist, zu fortgesetzter Forschung auffordert. Da lassen sich zur Zeit bestimmte, der Pathologie einzuverleibende Gesetze freilich noch nicht aufstellen und es müssen statt ihrer die Fingerzeige genügen, welche den von der Untersuchung einzuschlagenden Weg bezeichnen sollen; jedoch kam es auch weniger auf das Auffinden neuer, vielleicht wichtiger Gesetze an, es handelte sich zunächst darum, der Deutung pathologischer Erscheinungen den physikalisch - physiologischen Grundbau zu schaffen.

Es scheint, dass auch die Chirurgie sich der Aus-

Digitized by Google

kultation des Schlingkanals bislang nur wenig, all' zu wenig angelegen sein liess: jedenfalls ist es der Reichthum an diagnostischen Mitteln nicht, welcher dieses Zaudern rechtfertigen könnte. Und doch liegt dieselbe den Chirurgen um einen ganzen Schritt näher, als uns, da jene die Anomalie der Form, die plastische Veränderung selbst, wir aber vermittelst ihrer erst die centrale Ursache zu diagnosticiren bezwecken.

Das erste der Geräusche erfährt bei tiefer Beeinträchtigung des Schluckapparats, wie wir sie in apoplectischen Zuständen antreffen, eine Abweichung dadurch, dass es bei rasch wiederholtem Abschlucken unvollkommen, weniger kräftig und weniger voll erscheint, oder aber es gwinnt an Stärke, Dauer, Umfang und geht mit nicht hergehörigen Nebengeräuschen, gleichsam schleppend von Statten. So schwierig die Umschreibung aller der akustischen Eindrücke ist, so leicht belehrt man sich durch die Auskultation entsprechender Fälle. Uebrigens bietet diese nur dort entschiedene Ergebnisse, wo, bei schweren Zuständen allgemeiner Lähmung, der Diagnose ohnehin genug Haltpunkte zu Gebote stehen.

Das zweite der Schlinggeräusche liefert meinen Erfahrungen nach keinerlei Criterien für etwa eingetretene Paralyse der Oesophagus-Muskulatur; dahingegen geht die durch *Spasmus* bedingte, dauernde oder vorübergehende Verengung und Verschliessung der Speiseröhre mit einem Geräusche (Reibungs-, Gurgelgeräusch) einher. Ob es sich in solchem Falle um blosse Verengerung oder um Verschliessung, um ein vollständiges Regurgitiren oder theilweises Hinabschlucken genossener Massen handelt, darüber kann man mit Hülfe des Cardialgeräusches zur bestimmten Entscheidung gelangen, und es ist diese deshalb nicht unwichtig, da die Maassnahmen der Fütterung davon abhängen, ob ein Individuum einen Theil des Verschluckten oder nichts in den

Magen bringt. Unterlegt man in solchen Fällen den Kranken mit Kissen in der Art, dass die Speiseröhre eine gegen die Cardia hin ansteigende Lage erhält, denn die Umkehrung des Rumpfes ist meistentheils sowohl unthunlich wie auch unnöthig, dann wird das Cardialgeräusch sofort nach dem Abschlucken der Flüssigkeit eintreten, wenn die Verengerung überhaupt etwas durchlässt, wo nicht, so wird dasselbe ganz ausbleiben. Es ist einleuchtend, dass die Auskultation des Schlingkanals über Strictur und Divertikel der Speiseröhren wichtige Aufschlüsse zu geben vermag; ja, man wird sich diese Untersuchung in gar manchen Fällen zu Nutzen machen können, bleibt man sich nur des physiologischen Vorganges der Einverleibung des Ernährungsmaterials und der sie begleitenden auskultatorischen Erscheinungen bewusst.

Unter welchen pathologischen Bedingungen Metallklang im Magen entstehen kann, das lässt sich in vollem Umfange zur Zeit nicht entscheiden; sind doch die Vorfragen über die Entstehung und Verwendung des Magengases noch nicht in erschöpfender Weise zur Erledigung gebracht. Es steht fest, das fieberhafte Kranke, dass Menschen mit gastrischen Störungen vorübergehend mehr oder weniger ausgesprochen metallisch klingendes Cardialgeräusch darbieten. Wie oft hört man bei unsern durch die *Hergt*'sche Methode (Fütterung durch Eingiessen von Flüssigkeit in die Backentaschen bei horizontaler Lage des Kranken, fixirtem Kopfe und eröffnetem *vestibulum oris*) ernährten Sitophoben vom Epigastrium her, das als geräuschvolles Hineinpoltern, als metallisch oft fast silbern klingendes Sprudeln sich darstellende Geräusch. Hier sind die Bedingungen zu der Entstehung desselben meistentheils vorhanden: abgesehen von der zur Gasbildnng neigenden Verdauungsstörung, die der Nahrungsverweigerung bekanntlich auf dem Fusse

folgt, schlingt der widerwillig und in horizontaler Lage schluckende Kranke weit mehr Luft als ein aufsitzender freiwillig trinkender Mensch, dann kann auch das Gas wegen anhaltend nachrückender Flüssigkeitsmassen nicht ausgestossen werden. Jedenfalls wird dasselbe jedoch, und das ist zur Unterscheidung von dem durch Paralyse verursachten Metallklang wichtig, bald nach dem Mahle verschwinden, wird grösstentheils durch *ructus* entleert, theils wohl auch verbraucht und den Darm abwärts befördert. Anders ist es bei apoplectischen Kranken. Hier scheint die Vorbedingung zu der Entstehung des metallisch klingenden Cardialgeräusches in einer Paralyse der Magen-Muskulatur zu beruhen, es würde im andern Falle weder, wie es doch meinen Erfahrungen nach ausnahmslos Statt hat, Begleiter von apoplectischen und apoplectiformen Anfällen sein, noch würde es mit diesen beginnen, ausdauern und mit ihrem Ablaufe wieder schwinden. Auch ist es *a priori* im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass, da der Darmmeteorismus aus paralytischer Ursache längst ausser Frage gestellt ist, die Muscularis des Magens von jenen Zuständen tiefen Darniederliegens der Nerventhätigkeit sollte unberührt bleiben. Nehmen wir daher nur an, dass die allgemeine Lähmung der Magen-Muskulatur seine passive Dilatation gestattet, dass zum zweiten auch der Apparat, welcher beim Erbrechen die Cardia erschliesst (Vgl. den oben erwähnten, durch [*Schiff*'s Untersuchungen constatirten Muskelapparat) sammt der Bauchpresse lahm gelegt ist, dann kann uns weder der Metallklang ein Wunder, noch seine Entstehung ein Räthsel sein.

Auffallend schon ist der Umstand, dass das Cardialgeräusch bei schweren Lähmungen, bei paralytischen Kranken, bei Rückenmarksleidenden zumeist an Stärke und Umfang gewinnt, dass es hier, um durch einen bekannten Ausdruck ein entsprechendes Bild zu erlangen,

grossblasiger wird. Da es nicht angeht, den Grund dafür in Re- und Consonanzverhältnissen zu suchen, so könnte man an paralytische Erschlaffung des Sphincterschlusses der Cardia denken, doch am wahrscheinlichsten findet sich die Erklärung in einer Beeinträchtigung der Motilität des Schluckapparats, in Folge welcher mit jedem Bissen mehr Gas, als normal, eingepackt und hinab geführt wird. Auf den soeben berührten paralytischen Zustand der Cardia könnte man mit mehr Recht da schliessen, wo gegen das Ende der Kranken die Sphincteren gern erschlaffen; hier verliert das Cardialgeräusch an Deutlichkeit und Schärfe, ja verschwindet dem Ohre völlig. Von weit grösserer Bedeutung ist immerhin das Eintreten des oben erörterten Metallklanges bei apoplectischen Zuständen. In der That, es war den Pathologen nicht entgangen, dass „verschluckte Flüssigkeit bei apoplectischen Kranken mit Geräusch in den Magen eintritt“ (vgl. *Hasse*'s Nervenkrankh. S. 390); indessen scheint man verkannt zu haben, dass das Cardialgeräusch eine physiologische Klangerscheinung ist und mit demselben Rechte auf die Geltung einer solchen Anspruch macht, wie etwa Herztöne und Athmungsgeräusch, dass dagegen der metallische Wiederhall desselben als seine Potenz anzusprechen und als diagnostisches Mittel für pathologische, vornehmlich apoplectische Zustände zu verwerthen ist.

Dass man sich zur Feststellung der Diagnose niemals allein auf die Auskultation des Cardialgeräusches beschränken, hingegen alle brauchbaren Hülfsmittel herbeiziehen wird, muss als selbstverständlich um so mehr vorausgesetzt werden, da ja die Percussion des Bauches als wichtiger Zweig der physikalischen Diagnostik auch des Magens zu schätzen ist. Immerhin, setzt man auch die Bekanntschaft mit dem erst durch *Luschka* in vollem Umfange gewürdigten *situs ventriculi* voraus,

Digitized by Google

sind die Resultate der Percussion hier mit Vorsicht aufzunehmen und haben ihre volle Bedeutung erst da, wo sie die Befunde der Auskultation bestätigen. Selbst die Palpation gewinnt einen Werth in so fern, als in den Fällen, wo prononcirter und tiefer Metallklang gehört wird, die queer über das Praecordium gelegte Hand Vibrationen der unterliegenden Theile wahrnimmt — offenbar eine ähnliche Entstehung von palpablen Schwingungen wie beim Pectoralfremitus. Allemal jedoch wird den andern Untersuchungsweisen gegenüber der Auskultation des Cardialgeräusches stets der erste Platz eingeräumt werden müssen. In der That, mir wurde dieselbe in paraplegischen Zuständen, unter denen die apoplectiformen Anfälle der paralytischen Kranken am meisten zur Beobachtung kamen, ein gewichtiger Anhalt auch für die Feststellung und den Verfolg des Gesammtzustandes eines Kranken. Wohl würde man zu weit gehen, wollte man zur Zeit schon aus dem Metallklange des Cardialgeräusches: aus seinem Entstehen das Eintreten, aus seinem Verbleiben die Dauer und aus der musikalischen Höhe und dem Timbre die Intensität des allgemeinen Lähmungszustandes wie nach einer Skala bemessen. Soviel jedoch steht fest, acceptirt man als Thatsache die Relation zwischen metallisch resonnirendem Cardialgeräusch und Lähmung der Magenmuskulatur einer- und andererseits zwischen der letztern und den paraplegischen Zuständen, dann wird man den directen Schluss von ersterem auf diese auch gerechtfertigt finden. Doch erst die dauernde Hingabe an diese Untersuchung und ihre Consequenzen kann objective Gesichtspunkte für Diagnose und Prognose liefern, zum Formuliren von empirisch gewonnenen Gesetzen gar bedarf es noch der Arbeit und der Zeitigung.

Schliesslich mögen zur Illustration der Gefahren, welcher wir uns bei hochgradigen Dysphagicen zu ver-

Digitized by Google

sehen haben, zwei, ausserdem noch in mehreren Beziehungen bemerkenswerthe Fälle nachgetragen werden.

Der 73 J. alte Arbeitsmann *H. Bothe* ward am 21. März 1867, nachdem er bereits 1½ Jahr daheim gestört gewesen und offenbar vernachlässigt worden war, körperlich hinfällig und mit den unverkennbaren Symptomen geistigen Verfalls in hiesiger Heil- und Pflegeanstalt recipirt. Er erholte sich unter geeigneter Pflege recht bald, doch konnte man weder dem weitergreifenden Blödsinn, noch auch dem Eintreten von Lähmungserscheinungen vorbeugen. Ohne dass das gesammte Krankheitsbild im Ganzen der *Dementia paralytica* entsprochen hätte, entwickelten sich aus einer allgemeinen Unsicherheit und Schwerfälligkeit der Bewegungen, wie man sie im höhern Alter nicht selten bei sonst gesunden Individuen antrifft, schwerere Bewegungsstörungen heraus. Während Pat. mit Armen und Händen andauernd grobe Bewegungen ausführen konnte und zu nicht unerheblichen Kraftleistungen mit denselben befähigt blieb, waren die Bewegungen der unteren Extremitäten nach Verlauf kaum eines Jahres der Art behindert, dass man den Kranken führen oder tragen musste, wollte man ihn vor den durch Fallen verursachten Verletzungen schützen. Hütete man ihn nicht, dann unternahm er, einen Stuhl vor sich her schiebend und auf diesen gestützt, Rutschpartien durch die Abtheilung, zum Schrecken der anderen Kranken, deren Essen er sich anzueignen suchte und dieses dann, wenn ein Raubzug gelang, mit grösster Gier verschlang. Es war das rechte Bein von vorn herein vorwiegend paralytisch, bald gesellte sich eine ankylotische Flexion im Knie- und Hüftgelenk desselben hinzu und diese eben vermehrte die Unsicherheit wesentlich dadurch, dass Pat. stets nur mit auf die Knie aufgestemmten Armen sich vorwärts bewegen konnte, bei rascheren Bewegungen aber und bei den Versuchen, sich aufzurichten, vornüber oder auf die rechte Seite fiel.

Der Stand des Artikulations- und Phonationsvermögens zeugte nicht von Paralyse: der Kranke sprach selten und bewegte sich dann nur in einem sehr engen Kreise von Gedanken und Worten. Was er jedoch sagte, deutete nicht auf Glossoplegie; eine im Klange und in der Bildung einzelner Consonanten beruhende Anomalie der Sprache durfte der Zahnlosigkeit und den eingesunkenen Kieferrändern einerseits wie andrerseits der fast völlig verstopften Nasenhöhle (haselnussgrosse, hypertrophische Verdickung des Knorpels der Nasenscheidewand in Folge von Haematom) und beschleunigter Respirationsthätigkeit auf Rechnung gesetzt werden. Daneben bestand Anästhesie und Analgesie wie auch allgemeine Herabsetzung der Re-

Digitized by Google

flexaction in hohem Grade. An diesem Falle erweist es sich, wie rein mechanische Missverhältnisse zur Dysphagie eine solche Disposition liefern können, dass es kaum eines hohen Grades von Essgier und Paralyse betreffender Muskelmechanismen bedarf, um die verderblichsten Folgen herbeizuführen. Unser Kranker war durch genanntes Rhinhaematom — mit welchem sich, beiläufig, Othaematom beider Ohrmuscheln ohne bekannte äussere Veranlassung entwickelte — genöthigt, durch den Mund zu respiriren, die Respirationsthätigkeit aber gestattete nur kurze Unterbrechungen ihres rhythmischen Ablaufs; daher war dann eine Collision der Speise mit der inspirirten Luft in der Mund- und Rachenhöhle um so schwerer zu vermeiden, als jene bei dem zahnlosen Alten ausserdem erheblich an Capacität verloren hatte, die Muskeln dieser aber zum Theil eine durch die veränderte Gestalt und Stellung des Unterkiefers in etwas verschobene Richtung, mithin geschmälerte Kraftwirkung erhalten mussten. Unter diesen Umständen konnte es nicht fehlen, dass der in demselben Grade blödsinnige wie esslustige Kranke nur mit grosser Mühe seine Speise zu sich nahm und dieselbe trotz Eifer und Consequenz nicht ohne die Unterstützung eines Wärters zu verzehren vermochte. Indessen blieb es lange Zeit bei der Unzulänglichkeit der Speisethätigkeit: ass Pat. allein, dann stopfte er fortwährend in den weit aufgerissenen Mund ein, presste die Kiefer zusammen und überliess es dem guten Glück, wie viel nach aussen zurückkehrte und was in die Rachenhöhle befördert ward; er verschluckte sich, keuchte und würgte wohl einmal, liess sich jedoch selten nur einen Augenblick dadurch in seiner Arbeit aufhalten. Mit Zunahme der übrigen Bewegungsstörungen jedoch vermehrten und verstärkten sich sämmtliche dysphagische Erscheinungen in bedenklicher Weise. Selbst flüssige Speise vermochte Pat. nicht ohne Mühe und Gefahr zu verschlucken, mit Brei konnte er schon gefüttert werden, doch musste man stets bereit sein, im Fall eintretender Erstickungsgefahr, die Rachenhöhle mit den Fingern zu entleeren; Brocken endlich von Brod, Kartoffeln, Gemüse durften nicht gereicht werden. Gerieth trotzdem etwas in den Larynx, dann erfolgten Hustenstösse und Expulsion von Speise aus Mund und Nase, darauf sogleich heftige Inspirationsbewegungen mit jenem charakteristischen Geräusche, das man bei fast verschlossenem Kehlkopfe durch gewaltsames Einathmen imitiren kann. Dadurch verschlimmerte sich natürlich die Sache, denn es wurden nur neue Speisetheile noch aspirirt und dem Sauerstoffhunger geschah keineswegs Genüge. In der That musste man in dem Falle auf sofortige Entleerung der Mund- und Rachenhöhle Bedacht nehmen; gewöhnlich erholte sich Pat. dann auch bald und

Digitized by Google

griff mit frischem Muthe wieder zu. Ueberall hatte er nie das Gefühl der Todesgefahr, manchmal sogar führte er, halb erstickt, noch den Löffel zum Munde. Pat. fristete so sein trauriges Leben bis zum Juni 1868, als während einer Mittagsmahlzeit ein nicht unerhebliches Quantum Brei in die Luftröhre eindrang, ohne dass es der gegenwärtige Wärter hätte hindern können. Hinterher entleerte man durch die in den Rachen eingeführten Finger und dadurch, dass man *B.* auf den Kopf stellte, schüttelte und klopfte, eine grosse Masse Brei und Schleim; jedoch beseitigte man dadurch nur die nächste Lebensgefahr. Pat. konnte, trotzdem man ihm mit Reizmitteln und stärkenden Sachen zu Hülfe kam, diesen Angriff auf seine Respirationsorgane nicht überwinden: unter rasch steigendem Fieber stellte sich früh Prostration ein und der Kranke starb nach Verlauf zweier Tage, ohne dass die physikalische Untersuchung des Thorax, ausser zahlreichen Rasselgeräuschen und verminderter Athmungsthätigkeit vorwiegend der ganzen l. Lunge, Haltpunkte für zweifellose Diagnose geboten hätte.

Von dem Sectionsergebnisse, das übrigens auf unsere Zwecke ohne Bezug war, sei nur über die Respirationsorgane erwähnt, dass die Schleimhaut der Bronchi hie und da erhebliche Röthung darbot, dass die an den Rändern stark emphysematösen, übrigens schweren und blutreichen Lungen eine Menge ödematöser Flüssigkeit beherbergten, dass endlich die linke Lunge stellenweise die Zeichen beginnender Hepatisation mit Abscessbildung an sich trug. Es fand sich kein durch fremde Körper völlig verschlossener Bronchus, ebenso wenig waren Speisetheile, über deren Eindringen gleichwohl kein Zweifel sein kann, in den Bronchis aufzufinden.

Der zweite Fall betrifft einen 34jährigen, wohlgebauten und kräftigen Schlosser, *Wiegmann*, dessen ganze Erscheinung schon bei seiner am 3. März 1867 erfolgenden Aufnahme in die Anstalt die Diagnose auf *Dementia paralytica* gestattete. Dieselbe bestätigte sich hinterher durch das psychische Verhalten des Kranken wie auch durch die allmälig an In- und Extensität wachsenden Bewegungsstörungen.

Der Gang, bei im allgemeinen sehr kräftig entwickelter Muskulatur und vortrefflichem Ernährungszustande, unsicher, schwerfällig, mit breitspurigem, divergirenden (Schlittschuhläufer-) Schritt; die Bewegungen der Hände und Arme ungeschickt und kaum zu den

Digitized by Google

gröbsten Arbeiten verwendbar; die Sprache behindert, verlangsamt, ohne Kraft und Modulation. Dazu fanden sich die Pupillen bis auf die Grösse eines Stecknadelknopfs starr zusammengezogen, die Zunge beim Ausstrecken vor- und zurückschnellend, vibrirend; wechselnde Temperatur der Haut im Allgemeinen und häufige Differenz derselben auf beiden Körperhälften; die Sensibilität der Haut auf die verschiedensten, auch auf starke electrische Reize fast ohne Reaction.

Die Interessen des tief blödsinnigen, aber ruhigen und lenksamen Kranken concentrirten sich fast einzig auf sein Bett, den Abort und den Teller — und gerade die Essgier sollte ihm verderblich werden, denn auch die Bewegungen der Speiseapparate waren erheblich beeinträchtigt. Zum Kauen hatte der Kranke keine Zeit, obgleich er der Bewegungen der betreffenden Muskulatur noch Herr war; ebenso wenig traten die masticatorischen Bewegungen der Zunge und Wangen ein: Pat. beschränkt sich auf den Transport der Speise in den Rachen vermittelst der Zunge und auf das hinterher erfolgende Abschlucken. Gewiss darf man die dauernd belegte Zunge und den *foetor ex ore* nebst Darmtympanie und verhärtetem Stuhlgang dieser Art der Einverleibung des Essens, wenigstens zum Theil, Schuld geben. — Man wusste, dass *W.* ohne Rücksicht auf Qualität und Quantität der Speise gern mehr zu essen geneigt war, als er verschlucken und verdauen konnte, dass er hie und da hustete und würgte. Daher modificirte man seinen Kostzettel demgemäss und beaufsichtigte ihn beim Essen, ohne indess das am 25. August 1867 eintretende traurige Ereigniss zu ahnen.

Dasselbe wurde dadurch herbeigeführt, dass *W.* Morgens beim Kaffeetrinken Brocken von Weisbrod in die Luftröhre bekam, die man durch Manipuliren natürlich nicht entfernen konnte. Es liess die durch rasch zunehmende Erstickungsnoth bedingte *indicatio vitalis* keine Wahl weiter und man schritt zur Tracheotomie. Die Operation eröffnete, in gewöhnlicher Weise ausgeführt, die vordere Peripherie der obersten Trachealringe und konnte, da weder starke Blutung noch andere Uebelstände eintraten, unschwer und ohne ungewöhnliche Benachtheiligung des Kranken vollendet werden. Hinterher erfolgten heftige und rasche In- und Exspirationen, mit ihnen verschwanden die Suffocationserscheinungen, sowie für den Augenblick die Lebensgefahr. Es muss bemerkt werden, dass der Kranke trotz der heftigen Action der Respirationsmuskulatur, vor und während der Operation verhältnissmässig indolent geblieben war, nur geringen Widerstand leistete, keinen Schmerz äusserte und gleich nach der Operation etwas Wein mit gewohnter Begier trank. Man brachte nach der Operation einen Katheter von unten durch den

Kehlkopf gegen den in den Rachen eingeführten Finger ein und überzeugte sich, dass der Larynx von Brocken frei war. In der That athmete Pat., sobald man die in die Communicationsöffnung eingelegte Canüle mit dem Finger verschloss, verhältnissmässig frei durch den Kehlkopf hindurch. Anhaltend jedoch auskultirte man grossblasiges Rasseln und Röcheln von der Trachea und den groben Verzweigungen derselben her. Die Annahme, dass jene Speisemasse während oder nach der Operation in einen oder einige der groben Bronchien hinabgefallen sei, bestätigte sich durch die auffallende Erscheinung, dass die Auskultation am Thorax das Fehlen des Athmungsgeräusches am oberen Lappen der l. Lunge constatirte, während die übrigen Lungenlappen ihr vesikuläres Athmen darboten. Als der Kranke nach einigen Stunden mit einem heftigen Hustenstosse, nebst grosser Menge blutigen Schaums, ein bohnengrosses Stückchen erweichten Weissbrods durch die Canüle herauswarf, begann jener Lappen wieder an der Respiration Theil zu nehmen. Nicht lange, und es zeigten sich die auf das Entstehen ausgedehnter Pneumonie hinweisenden Symptome — unzweifelhaft eine Folge der in den Luftwegen zurückgebliebenen Brodtheilchen. Die Temperatur der Haut steigerte sich am ersten Tage auf 38,3° C., der Puls 106, die Zahl der Respirationen auf 32 in der M. Am ersten Abend schon hatte sich eine geringe Dämpfung des Percussionsschalles unter der Spitze der l. Skapula markirt, dort fanden sich auch die zahlreichsten Rasselgeräusche, die übrigens zerstreut über den ganzen Umfang der Lungen verbreitet waren. Behandlung symptomatisch; die Nacht wenig Schlaf, Unruhe, Delirien. Am zweiten Tage erhob sich die Temperatur auf 40° C., Pat. hatte spärlichen, concentrirten und sendimentirten Harn, kleinen Puls von 140 Schlägen und 50 oberflächlichen Respirationen in der M. Man hörte bronchiales Athmen und Bronchophonie über den untern Lappen beider Lungen, dazu war hier ausgesprochen matter Percussionsschall vorhanden. Die Diagnose auf doppelseitige Pneumonie mithin ausser allem Zweifel, bestätigte sich dazu noch durch mitunter ausgehustete sanguinolente Sputa. Man reichte Pat. wiederholt etwas leichte Speise, musste sich indessen überzeugen, dass Theilchen derselben aus der Canüle wieder hervorkamen. Im Verlaufe des (zweiten) Tages verfiel der Kranke trotz Belebungsmittel bereits ausserordentlich, delirirte die Nacht hindurch wieder viel und schlief wenig. Am 3ten Morgen zeigte er mehr Frische und Reaction, als man erwartet hatte, indessen verscheuchten die objectiven Erscheinungen bald jede gute Hoffnung: Temperatur anhaltend über 40° C., Pulse 140, Respiration 50 in der M. Die physikalischen Symptome der

Pneumonie hatten sich mehr markirt, die Dämpfung des Percussionsschalles erstreckte sich über die ganze Rückseite des Thorax. Im Verlaufe des Tages stieg die Temperatur auf 43,3° C., die Respirationsthätigkeit verflachte sich mehr und mehr, die Kräfte sanken; bald konnten die in den Luftwegen aufgehäuften Hindernisse nicht mehr bewältigt werden, es trat collapsus ein — und der Kranke starb, trotz angewandter Reize, um 10½ Uhr Abends, am 3. Tage nach der Operation.

Die angestellte Obduction ergab, nebst dem gewöhnlichen Bilde des Schädels und Hirns eines paralytischen Kranken, gut erhaltene, von der Norm kaum abweichende Körperorgane. Die Schleimhaut des Rachens, des obersten Theils der Speiseröhre und des Kehlhopfs geschwollen und geröthet, stellenweise von bläulichem Ansehn. An der Trachea fanden sich der 2te, der 3te und 4te Ringknorpel in der Mitte ihrer vorderen Peripherie durchschnitten, um die klaffende Oeffnung herum erhebliche Röthung und Schwellung der Schleimhaut; übrigens auf der Innenfläche der Luftröhre reichliche Auflagerung von Schleim und blutigem Schaum. Die r. Lunge dunkel pigmentirt und schwer; die beiden obern Lappen derselben ödematös infiltrirt, der untere völlig pneumonisch verdichtet, luftleer, schwer und derb. Die l. Lunge bot dieselben Verhältnisse dar, war gleichfalls im untern Lappen vollständig hepatisirt, während der obere Lappen noch lufthaltig, aber ödematös sich erwies. In den gröbern und feinern Bronchien beider Lungen fand man stellenweise intensive Röthung der Schleimhaut, reichliche Ansammlung von Serum und Schleim, wie auch kleine und kleinste Partikel erweichten Brodes; durch Brodtheile verstopfte Bronchien dagegen präsentirten sich nicht.

Digitized by Google

Doppelwahrnehmung und Doppeldenken.

Eine psychologische Studie

von

Dr. **Max Huppert**,

zweitem Anstalts-Arzte in Colditz.

Obwohl das centrale Nervensystem, das sich in den Hemisphären ausbreitet, ein doppelseitiges ist, so denken wir mit unsern beiden Hemisphären dennoch ebenso wenig doppelt, als wir mit beiden Augen doppelt sehen. Wenn man indess erwägt, dass, wie man schon längst weiss, selbst bei sehr erheblicher Atrophie der einen Gehirnhemisphäre dennoch die geistigen Functionen, lässt man nur eine rasch eintretende geistige Ermüdung unbeachtet, ganz regelmässig von Statten gehen, so liegt der Gedanke nahe, dass schon die eine Hemisphäre allein zu den geistigen Functionen genüge, sowie weiter, dass, analog wie bei den in duplo vorhandenen Sinnesorganen auch die paarigen Grosshirnhemisphären zugleich doppelt und einfach functioniren. So nahm denn auch schon *Wigan* eine völlige Duplicität der Seele an, so suchte *Hollands* manche psychische Störungen auf eine Incongruenz beider Hemisphären zurückzuführen, so endlich auch *Follet* die psychischen Aberrationen „auf eine Störung im Gleichgewicht der Innervation beider Hemi-

sphären.“ Alles dies entbehrt jedoch nach *Griesinger**) genügender empirischer Begründung, wie überhaupt *Griesinger* auch weiteren dahin zielenden Beobachtungen keine grosse Bedeutung beizulegen vermag.

Neuerdings hat nun *Jensen* in seinem in der ersten Sitzung für Psychiatrie auf der Dresdener Naturforscher-Versammlung gehaltenen Vortrag: „Ueber Doppelwahrnehmungen in der gesunden wie in der kranken Psyche“**) diese Idee von Neuem aufgenommen und durch vier Beobachtungen an Geisteskranken zu erhärten gesucht. Von jener bekannten Erscheinung ausgehend, dass mitunter, meist auf kurze Zeit, in uns das dunkle Bewusstsein erwacht, diese oder jene Situation bereits genau so, wie sie gegenwärtig gerade vorliegt, erlebt zu haben, gelangt er zu der Hypothese, dass ähnlich wie in den Augen zwei Bilder, so auch in den Hemisphären zwei Wahrnehmungen zu Stande kommen, die aber unter normalen Verhältnissen sich zum allergrössten Theile decken, fast congruent sind, und so nur als ein Einzelnes percipirt werden, dagegen unter anormalen Verhältnissen, wenn beide Hemisphären nicht congruent fungiren, zu Doppelwahrnehmungen führen, und ähnlich wie beim Schielen (wenigstens anfänglich) Doppelbilder neben einander in den Raum hinausprojicirt, so die Doppelwahrnehmungen in die Zeit, zeitlich auseinandergelegt, projicirt werden.

Im Anschluss an diesen Vortrag, den ich bei den Lesern der Zeitschrift als bekannt voraussetzen darf, möchte ich zwei analoge Beobachtungen mittheilen, die, obwohl sie nicht ganz genau dieselbe Erscheinung behandeln, welche *Jensen* unter obigem Titel beschrieben

---

*) *Griesinger*, Pathol. und Therap. der psych. Krankh. 2te Auflage. S. 24.

**) Allgem. Zeitschr. f. Psych. 25. Band, Supplementheft. p. 48.

hat, doch gerade deshalb von um so grösserem Interesse zu sein scheinen, als sie eine Erweiterung jener fraglichen Erscheinung darstellen und die Erklärung ihres Zustandekommens nach der *Jensen*'schen Hypothese als unzureichend erkennen lassen. Als ich den betreffenden Aufsatz las, wurde ich sofort an eine von mir bereits früher gemachte Beobachtung — im Krankenjournal finde ich sie unterm 26. Juni 1867 notirt — lebhaft erinnert und fand, ohne zu suchen, zu Anfang dieses Jahres einen zweiten ganz analogen Fall, der wiederum dem ersten zur Ergänzuug diente. Durch ein vorsichtiges und möglichst erschöpfendes Examen beider Kranken, die sich, nebenbei bemerkt, nicht näher kennen, habe ich alle einschlagenden Verhältnisse eingehend untersucht und zuvörderst den Thatbestand möglichst objectiv festzustellen mich bemüht.

Der erste Fall betrifft einen ledigen 37jährigen Commis F., dessen Krankheit am besten als eine Varietät der allgemeinen progressiven Paralyse zu bezeichnen ist.

Ein ursprünglich beschränkter Mensch, der geschlechtlich excedirte und auch syphilitisch inficirt war — hat noch Geschwürsnarben an der Eichel — erkrankte angeblich im Mai 1863 sogleich mit Höhenwahnvorstellungen, kam ins Stadtkrankenhaus zu Dresden, besserte sich und sollte zu seinem Vater gebracht werden, als er in Leipzig neue hochgradige Aufregung zeigte, deshalb dem Georgenhaus daselbst übergeben und von dort am 20. Juli 1863 dem Sonnensteine zugeführt wurde. Hier machten sich alsbald Symptome von Lähmung an den Extremitäten und Sprachwerkzeugen auffällig, auch trat Bettpissen ein; die psychischen Erscheinungen blieben sich wesentlich gleich, Perioden mit gewaltthätigen Ausbrüchen stellten sich ein, die Wahnideen von unermesslichem Besitz und Ansehen wurden häufig geäussert, obwohl auch Zeiten der Ruhe und Beschäftigungsfähigkeit wiederkehrten. Bei seiner Zuführung in hiesige Pflegeanstalt, 4. Januar 1865, zeigte er anfänglich ein zerstreutes, geschwätziges und selbstgefällig tändelndes Wesen, war immer sehr glückseliger Stimmung, rühmte in überschwänglicher Weise seine

Digitized by Google

körperlichen wie geistigen Kräfte trotz seiner thatsächlichen nicht geringen Kraftlosigkeit, Vergesslichkeit und Urtheilslosigkeit, wurde immer agitirter, zum Theil in Folge von sehr häufigen Gehörs- und bisweilen auch Gesichtshallucinationen, war unrein mit Urin und Stuhl, zerriss die Kleider etc., erhielt endlich eine Einreibung von *ungu. tart. stib.* auf den Scheitel, erschien darauf gemässigter und weniger ausschweifend, mitunter selbst deprimirt und äusserte Verfolgungswahnideen. Bereits in dieser Periode, 20. Juni 1866, finde ich von meinem Vorgänger die Notiz eingetragen, dass F. um Versetzung bittet, „weil ihn das beständige Sprechen der Stimmen, besonders gegen Abend oder wenn es sonst ruhig wäre, sehr störe; namentlich würde ihm beim Lesen Alles vorgesagt." Allmälig trat eine anhaltende Remission ein, in der sich F. noch befindet; er wurde ruhig, freundlich, hielt sich rein, war jederzeit willig und geduldig, fleissig im Garten, erschien übrigens nur einfach schwachsinnig, insbesondere sehr vergesslich, war aber zu Zeiten noch leicht zu „beleidigen" und immer in fast knabenhafter Weise auf's Eifrigste bestrebt, durch Lesen verschiedentlicher Bücher sich fortzubilden. Nur von Zeit zu Zeit beschwert er sich zwischendurch über ihn beschimpfende Stimmen, welche ihm seine früheren geschlechtlichen Sünden vorwürfen; er glaubt dann jedesmal von der lebhaften Sinnestäuschung hingerissen, dass Frauen im Hause über ihm seien, und quält sich mit der Lösung dieses Räthsels erregt ab, bis nach einiger Zeit, wenn jener Eindruck verwischt ist, auch nur die Möglichkeit eines solchen Ursprungs ungläubig belächelt wird. — Die rechte Gesichtshälfte ist erschlafft, die rechte Pupille erweitert, beim Sprechen zeigt sich häufiges Vibriren der Lippen, die Zunge weicht nach rechts ab, die Sprache ist erschwert, häufig hesitirend, der Druck der rechten Hand schwächer, der Gang nicht selten stolpernd, unsicher, die Haltung schlaff und gebückt. Seit dem 25. Lebensjahre ist er myopisch, auf dem einen Auge stärker.

Dieser Kranke hatte mir, wie erwähnt, früher einmal geklagt, dass er bei seiner Lectüre — und er treibt, wie gesagt, sehr eifrig alle mögliche Lectüre „zu seiner Ausbildung", wenn auch ohne Erfolg — häufig an dem so wünschenswerthen Fortgang seiner Studien dadurch gehemmt und aufgehalten werde, dass gleichsam noch Jemand Wort für Wort mit- oder nachlese; er empfindet ganz deutlich, wie jedes Wort, das er liest, von Frauenstimmen — „etwa 50—60 an der Zahl," die aber wie im Chor sprechen — ziemlich laut nachgesprochen wird, so dass er nicht so rasch im Lesen fortkann, wie er möchte, sondern immer aufgehalten

wird. Am Ende seiner Lectüre, wenn er zu lesen aufhört, hört er dann jedesmal ganz deutlich noch die letzten Worte nachreden. Diese Erscheinung trat früher, und damals waren auch die (Gehörs-) Hallucinationen viel häufiger, bei weitem öfter und anhaltender auf wie jetzt, dauerte zwar meist nur minutenlang, zu Zeiten aber auch Viertel- bis Halbestunden lang an, während sie gegenwärtig fast ganz weggeblieben zu sein scheint. Gleichgültig war es dabei, ob das Buch, welches er las, ihn interessirte oder nicht, und war dieser Umstand von keinem Einfluss auf das Nachlesen. Er hatte aber ferner beobachtet, dass dieses Nachlesen oder Nachsprechen verschwand, sobald er laut sprach, und hatte wiederholt diese Entdeckung in der Weise mit Erfolg benutzt, dass er, um nicht in seiner Lectüre gestört zu werden, sich das, was er las, leise vorlas. Dann hörte er jene mitlesenden Stimmen nicht mehr. Um sich dann zu vergewissern, ob jene Stimmen noch da wären, brauchte er blos einen Augenblick innezuhalten: hörte er die zuletzt gelesenen Worte noch nachreden, so waren sie noch da. Eine weitere interessante Beobachtung hatte er noch beim Briefschreiben gemacht; sobald er nämlich die Anrede — eine sterootype und daher schon fertige Phrase —: „Theuerster, innigstgeliebter Bruder!“ anfing und etwa die Buchstaben Th schon niedergeschrieben hatte, „wussten sie schon diese Worte und sagten sie ihm vor“, eine Beobachtung, die er während des weiteren Schreibens kaum noch einmal zu machen Gelegenheit fand, „denn diese Worte konnten sie wohl wissen, die sind ja ganz bekannt.“

Dies ist Alles, was ich bei einem vorsichtigen wiederholten Examen von dem leicht ermüdenden und leicht sich verwirrenden Kranken erfahren konnte. Von ganz gleichen Zuständen, wie sie *Jensen* beschrieben, brachte dieser Kranke nichts vor. Nichtsdestoweniger hat dieses psychopathische Symptom mit dem von *Jensen* beschriebenen Phänomen eine unverkennbare Analogie. Hier wie dort sehen wir, dass eine Gesichtswahrnehmung doppelt ist, dass mit andern Worten scheinbar eine zweite verzögerte Wahrnehmung zum Bewusstsein gelangt, der ersten wörtlich gleich, wenn auch anscheinend nicht abgeblasst, nicht schwächer wie die erste, aber, und dies ist der sehr wesentliche Unterschied von *Jensen*'s Behauptung, auf den ich schon hier hin-

weisen will, nicht doppelt als (Gesichts-) Wahrnehmung, sondern doppelt als Vorstellung; denn nicht das gedruckte Wort etwa erscheint doppelt (nach aussen mit Gesichtsfeld projicirt), sondern das gedachte Wort (doppelt gehört).

Jensen hatte nun zur Erklärung des von ihm beschriebenen Phänomens die Hypothese aufgestellt, dass hierbei Doppelwahrnehmungen zu Stande kämen, die aber nicht räumlich, sondern zeitlich getrennt projicirt würden, und in einer Incongruenz der Functionen der Grosshirnhemisphären die womöglich anatomisch an diesen aufzufindende Ursache dieser Erscheinung gesucht und wahrscheinlich zu machen sich bemüht. Ist nun diese Hypothese für die eben mitgetheilte Beobachtung zureichend? Was den Theil der Beobachtung anbelangt, dass der Kranke jedes Wort, Silbe für Silbe, nachsprechen hört, so handelt es sich allerdings hier beim Lesen zunächst um eine Wahrnehmung und zwar des Gesichts — auch die Fälle von *Jensen* sind wesentlich und ursprünglich im Gebiete des Gesichtssinnes liegende Vorstellungen und Bilder —, so dass es wohl denkbar wäre, dass nicht blos Eine, sich deckende Wahrnehmung der beiden durch den peripherischen Gesichtsapparat percipirten Eindrücke zu Stande käme, sondern auch noch eine zweite, verzögerte, hier angeblich zwar nicht abgeblasste, sondern laut — „von 50 bis 60 Stimmen“ — nachgesprochene Wahrnehmung, die indess doch nur so laut ist, dass schon ein leises Sichvorlesen jene Stimmen verdeckt und übertönt, wie überhaupt die Gehörsperceptionen, um dies gleich hier zu erwähnen, entschieden niemals doppelt empfunden werden, sondern im Gegentheil, selbst wenn den gesehenen ganz gleich, jenes störende Nachreden verschwinden machen und so förmlich zur Correction der Gesichtswahrnehmungen dienen. Es liesse sich somit jenes Phänomen des Nachlesens

Digitized by Google

vielleicht noch mittelst der *Jensen*'schen Hypothese von den Doppelwahrnehmungen erklären, wenn es sich hier thatsächlich eben noch um Wahrnehmungen und nicht vielmehr um Vorstellungen handelte, während dagegen die Meinung von *Jessen* (l. c. p. 63), der in der fraglichen Erscheinung nur einen Vorgang der Erinnerung sieht, bei welchem in uns ein gegenwärtiges Ereigniss die Erinnerung eines vergangenen ähnlichen so lebhaft erweckt, dass man der Täuschung verfalle, es fielen beide zusammen, obwohl Wahrnehmung und Erinnerung nicht gleichzeitig, sondern aufeinander folgen, in diesem Falle kaum noch ernstlich in Betracht zu ziehen ist. Wie aber erklärt sich erst jene weitere Beobachtung, die der Kranke beim Schreiben machte? Sobald er nämlich die Anrede zu schreiben begann, wurde ihm diese constante und daher bereits fertige Phrase vorgesagt, eine Beobachtung, die er im weiteren Schreiben des Briefes, den er neu zu concipiren und auszudenken hatte, kaum noch ein einziges Mal zu machen Gelegenheit hatte. Wenn es nun auch nach einem eingehenden Befragen des schwachsinnigen Kranken wahrscheinlich wird, dass er damit nur sagen wollte, dass, sobald er die ihm geläufige Redewendung dachte, sie ihm auch nachgesagt wurde, d. h. doppelt wäre, und nur vorgesagt, noch ehe er sie niederzuschreiben vermochte, so handelt es sich hier doch ganz bestimmt nicht mehr um von aussen kommende Wahrnehmungen, sondern um eigene Gedanken, um selbstgeschaffene Vorstellungen. Nichtsdestoweniger werden auch sie doppelt empfunden. Wie lässt sich dies erklären? Da hier keine Wahrnehmungen stattgefunden haben, so ist auch die Hypothese von *Jessen* nicht mehr anwendbar. Oder handelt es sich hier doch um eine Reproduction wie *Jessen* will? Wir wollen einstweilen diese Frage unbeantwortet lassen, bis wir den zweiten Fall, der ungleich ausgiebiger ist, kennen gelernt haben.

Digitized by Google

B., unverheiratheter Kaufmann, 52 Jahre alt, leidet schon über 20 Jahre an primärer Monomanie *(Snell)*, die unter stürmischen Gemüthsbewegungen begonnen haben soll, jetzt ruhiger verläuft. Von zahlreichen Sinnestäuschungen des Gesichts, Gehörs und Geschmacks und höchst mannichfachen perversen Gemeingefühlssensationen heimgesucht, sowie von vielfachen Verfolgungswahnideen erfüllt, die auf's Engste mit den Hallucinationen verknüpft und von gleich hoher Bedeutung wie diese für den Kranken sind, glaubt sich *B.*, der seinen Wahn vollständig systematisirt, zu höchstem Lebensglück, zu einem „Amor" bestimmt und kann diese Peinigungen und Machinationen seiner Verfolger nur als eine Vorbereitung zu seiner Vollendung ansehen. Am 6. April 1852 wurde er in Sonnenstein aufgenommen und am 29. October 1853 hiesiger Pflegeanstalt übergeben. Seit etwa 3 Jahren klagt er über die Symptome der Presbyopie.

Schon seit vielen Jahren, erzählt er, wird er von einer Bande ihm sonst Unbekannter verfolgt, die ihn auf ganz fabelhafte und entsetzliche Weise quälen; sie lassen „Stangen oder Säulen von Gasströmen" auf ihn los, machen ihm „Abspannungen und Erschütterungen", zerschneiden ihm das Herz, tippen ihm aufs Trommelfell, machen ihm Wadenkrämpfe etc., andermale wieder „versetzen" sie ihn, z. B. in einen Gelehrten, und er ist dann ihm Stande, ihm ganz fremde Sprachen zu verstehen, oder in ein reissendes Thier, und er hat dann Begier nach rohem Fleisch; durch zahlreiche Reden und Stimmen suchen sie ihn zu verwirren und widerstreiten ihm; wieder zu anderen Zeiten versetzen sie ihn in eine fremde Stadt, und er sieht und hört und riecht — „wohl durch Erweiterung oder Annäherung der Lebenskraft oder der Nerven" — was dort geschieht; oder sie machen ihm Bilder vor, er sieht tanzende Figuren etc., oder sie nehmen ihm plötzlich den Geschmack, wenn er eben isst, oder lassen ihn umgekehrt plötzlich etwas Gutes, Chocolade z. B. schmecken; wenn er eine Kränkung erfahren hat, peinigen sie ihn oft wochenlang deshalb, und will er es nun dem Arzt sagen, so nehmen sie ihm die Gedanken und richtigen Worte aus dem Gedächtniss; sie wissen auch alle seine Gedanken, kennen seinen Geist durch und durch, ja sind wohl auch im Stande, seine Gedanken zu leiten, machen ihm Träume etc. etc. Was uns aber hier vor Allem interessirt, ist die Klage, dass, wenn er lese, stets eine Stimme — jetzt verstellt und keuchend wie eine Maschine, während es früher mehrere Stimmen waren — das Gelesene laut nachspreche, bisweilen selbst so laut, dass er „eine schmerzliche Pein am Trommelfell" empfinde; geschehe dieses „Nachlesen" nicht zu laut, so störe es ihn jetzt gar nicht mehr, da er sich wirklich schon ganz

daran gewöhnt habe, werde es aber lauter, so brauche er sich nur leise vorzulesen, um jene Stimme zum Schweigen zu bringen. Manchmal indess, fügte er später hinzu, sei die nachlesende Stimme aber so laut, dass sie sich selbst durch sehr lautes Vorlesen nicht übertönen lasse, und dann zugleich auch sehr schmerzhaft. Hört er auf zu lesen, so bemerkt er auch noch ein oder das andere Wort nachsagen, so lange etwa noch sein Geist auf das Gelesene hingewendet sei. Aber nicht blos das, was er liest, auch alle seine Gedanken werden ihm immer „nachgeredet", d. h. sind zweifach, aber so gut wie gleichzeitig; denn sowie sie sich entwickeln und entstehen — „und sie wissen es besser wie ich, wann und wie sie sich die Gedanken entwickeln" — „heben sie sogleich mit an", sprechen sie sie auch sofort nach, Silbe für Silbe, „als ob die Nachreden förmlich an den einzelnen Worten hingen", so dass er fortwährend doppelt denke, was er auch immer denken möge. Diese „Nachreden" beim Lesen wie beim eigenen Denken kommen aber stets von aussen ins Ohr. Während im vorigen Falle der Kranke *F.* auf meine Frage ausdrücklich erklärte, dass seine Feinde seine eigenen Gedanken doch nicht wissen könnten, das sei ja unmöglich, und nur die bekannte Phrase, die Anrede seines Briefes, hätten wissen und vorsagen können, geht dieser Kranke weiter, indem er behauptet, dass „sie" alle seine Gedanken wissen und auf der Stelle nachreden, so lange er stille denke; denn wenn er laut rede, wenn er seine eigenen Gedanken ausspräche, so bemerke er jenes Nachreden nicht. Auch das, was Andere zu ihm sprächen, höre er nicht doppelt, sondern immer nur einfach. Einige wenige Male sei es ihm aber auch vorgekommen, dass sie ihm seine Gedanken vorgesagt hätten, noch ehe er sie selbst gedacht, „2—3 Secunden früher", und dann habe jenes Nachreden gefehlt. Auf meine Frage, ob der erste Gedanke oder der andere, die Nachrede, stärker sei, lauter klinge, gab er an, dies sei wechselnd, bald das eine, bald das andere der Fall. Dieses Nachreden oder Doppeldenken geschehe immer, und bei alledem riefen sie ihm noch allerlei verwirrende „Reden" und Worte (Hallucinationen) ins Ohr, diese aber seien einfach, nicht doppelt, wie seine eigenen Gedanken, nur dass bisweilen eine und dieselbe Phrase — nicht die einzelnen Silben — unzählige Male hintereinander, oft stundenlang und dann zugleich sehr schmerzhaft für ihn, wiederholt würden. Auch diese „Reden" sucht er oft durch lautes Sprechen irgend welcher beliebiger Worte und Reden zu übertäuben, oft aber ganz vergeblich. Beides, das Nachsprechen seiner eigenen Gedanken wie diese Reden (die Hallucin.), sind ihrer Intensität nach gleichlaut

und rührten von denselben Personen her: sie fangen z. B. an zu reden — einfach —, dann denkt er — doppelt — dann nehmen sie ihre vorige Rede wieder auf u. s. f. *B.* unterscheidet so genau beiderlei Vorstellungen, seine eigenen beabsichtigten Gedanken und die Hallucinationen, sowohl formell, indem erstere stets doppelt, letztere einfach sind, als auch letztere ganz ihrem meist feindseligen, selten tröstlichen Inhalte nach. Beim Schreiben verhält es sich ähnlich wie beim Denken, indem sie die Gedanken, die er zu Papier bringen wollte, so wie sie entständen, nachsprächen, noch ehe er sie niedergeschrieben. Dieses Nachreden habe er übrigens erst einige Jahre später, als er die Stimmen vernommen, „zu vermehrter Qual" von ihnen bekommen. Als ich ihn fragte, ob er auch im Traume jenes Doppeldenken und Nachreden vernehme, so wenn er etwa träume, dass er mit Jemand spricht oder sich unterhielte, gab er wiederholt an, dass er mit grösster Bestimmtheit behaupten könne, dies finde im Traume — er liegt ganz gewöhnlich auf der einen oder andern Seite, da er auf dem Rücken liegend nicht schlafen kann — nicht statt und sei ganz gewiss höchstens nur ein- bis zweimal ausnahmsweise vorgekommen; zugleich blieben aber auch im Traume jene anderen Reden weg, die sie führten, und er denke und spreche da ganz wie vordem (in gesunden Tagen); „nur kommt es mir nicht zu Gute, weil ich es im Traume nicht so deutlich empfinde."

Indem ich mich zunächst auf das, was ich bisher aus dem Kranken zu Tage gefördert habe, beschränke und nur noch mehr gelegentlich einige weitere Beobachtungen einzufügen gedenke, gehe ich zuvörderst zur Vergleichung beider Fälle über, um das ihnen Gemeinsame aufzusuchen. Wir finden bei dem ersten Kranken F. zunächst beim Lesen das Symptom des Nachlesens, und es ist bestimmt hier blos ein Nachlesen, wie aus der Klage, dass er bei seiner Lectüre aufgehalten wird, sowie aus jener anderen Bemerkung, dass er am Schlusse seiner Lectüre noch die letzten paar Worte nachreden hört, mit voller Bestimmtheit hervorgeht. Diese Nachrede erscheint relativ zum gelesenen Worte laut, so laut wie eine helle Frauenstimme, wird aber dennoch, wenn der Kranke sich nur leise vorliest, schon übertönt und

Digitized by Google

nicht mehr bemerkt, eine Angabe, deren Widerspruch leicht begreiflich ist. Kaum brauche ich noch zu erwähnen, dass die Nachrede und das Gelesene durchaus gleich sind; beide sind aber, wie es wohl überhaupt beim Lesen nicht anders der Fall sein dürfte, nicht sowohl Doppelwahrnehmungen, sondern vielmehr Doppelvorstellungen. Die Erscheinung tritt nur vorübergehend und verhältnissmässig selten auf, und zugleich hat der Kranke Hallucinationen, die, als jene Erscheinung noch häufiger war, auch zugleich öfter auftraten. Aehnliche Doppelvorstellungen in andern Sinnesgebieten, insbesondere dem Gehör, wurden nicht beobachtet. Bei einer einzigen bestimmten Gelegenheit endlich hat F. die Empfindung, dass auch seine eigenen Gedankenworte doppelt sind oder, wie er sich ausdrückt, vorgesagt werden.

Im zweiten Falle B. finden wir zunächst wieder das Nachlesen, hier aber wohl mit dem Unterschiede, dass es schneller, „fast zugleich“ mit dem Lesen eintritt; wenigstens klagte B. kaum einmal über Hemmung und Aufenthalt beim Lesen. Nichtsdestoweniger ist es doch auch ein Nachlesen, wie daraus hervorgeht, dass auch B. am Ende der Lectüre noch die letzten paar Worte nachträglich vernehmen kann. Auch hier wird laut nachgeredet, meist aber nicht lauter, als dass nicht schon durch leises Vorlesen die Stimme zu übertönen wäre. Diese Nachreden kommen, wie er ein ander Mal aussagt, oft schneller, oft langsamer, und wenn schneller, dann zugleich mit einer schmerzhaften Pein. Diese Erscheinung tritt hier aber stets und immer auf, nicht blos vorübergehend. Aber es handelt sich hier wiederum ebensowenig um Doppelwahrnehmungen, als vielmehr um Doppelvorstellungen. Weiter aber, und dies ist der hauptsächlichste Unterschied vom vorigen Falle, werden auch alle „seine Gedanken immer

nachgeredet", sowie sie nur entstehen, sind sie sogleich doppelt. Diese neue Beobachtung setzt die im obigen Falle beim Briefschreiben F.'s gemachte erst ins rechte Licht, und betonte ich schon vorher, dass nicht sowohl die Wahrnehmungen, als vielmehr die Vorstellungen doppelt erschienen, so giebt diese Beobachtung einen weiteren und unumstösslichen Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht: die eigene Geistesoperation scheint doppelt vor sich zu gehen, und nicht mehr sind es die peripherischen (Gesichts-) Perceptionen, auf die das Hauptgewicht zu legen und der Ursprung des fraglichen Phänomens zurückzuführen ist, sondern die central entstehenden Vorstellungen. Nicht die Perceptionen geschehen doppelt, sondern vielmehr die Vorstellungen, mögen sie nun durch Sinneseindrücke hervorgerufen sein oder aus dem Bewusstseinsinhalte hervortreten, und dadurch scheinen secundär die Wahrnehmungen doppelt. Und wenn wir bisher gefunden haben, dass es nur Worte und Gesichtsvorstellungen sind, die doppelt erscheinen, so stimmt dies auch mit unsern sonstigen psychologischen Kenntnissen überein, insofern wir ja hauptsächlich in Worten und demnächst in Gesichtsvorstellungen denken. Dass aber die gesprochenen Worte nicht doppelt erscheinen, liegt höchst wahrscheinlich nur daran, dass, ganz analog wie bei Sichvorlesen, eben der Klang der gesprochenen Worte die „Nachrede" übertönt.

Einige Male ferner sind dem Kranken auch die Gedanken vorgesagt worden. Es fragt sich, worauf es beruht, dass sie bald oder meist als nach-, bald oder ausnahmsweise als vorgesagt bezeichnet und empfunden werden. In der verschiedenen Schnelligkeit des Eintritts der nachgesprochenen, richtiger gesagt doppelten Worte kann schwerlich der Geund dieser Modification des Nachredens zu finden sein, vielleicht aber in

Digitized by Google

der verschiedenen Klangintensität der sogenannten Nachrede? Allein der Irre B. erklärt ja ausdrücklich, dass diese wechselnd sei, bald sei der erste, bald der zweite (identische) Gedanke intensiver, lauter, und überdies ist dieser Wechsel in der Intensität thatsächlich viel häufiger, als jene nur „zwei bis drei Mal" vorhanden gewesene Erscheinung des Vorsagens. Wodurch der Kranke sich bewogen fühlt, das eine Mal den doppelten Gedanken als nachgeredet, das andere Mal als vorgesagt zu bezeichnen, liegt daher noch völlig im Dunkeln. — Beim Schreiben ist es wie beim Denken, „denn das Schreiben ist ja auch nur ein Denken." Neben diesen „Nachreden," um den vom Kranken gebrauchten, übrigens von diesem selbst als nicht ganz zutreffend bezeichneten Ausdruck zu gebrauchen, machen sich noch zahlreiche Hallucinationen, insbesondere des Gehörs bemerklich, die, nebenbei erwähnt, schon früher aufgetreten und, was die des Gehörs anbelangt, zwar von gleicher Intensität wie die Nachreden sind, aber auffälligerweise nicht doppelt, sondern einfach. Auf diesen letzteren Umstaud gedenke ich später zurückzukommen. Von ganz hervorragendem Interesse erscheint aber endlich die Angabe des Kranken, dass er im Traume — und er träumt sehr häufig — nicht doppelt denke, das Nachreden nicht vernehme, ebensowenig wie die anderen Reden, die sie ihm ins Ohr sagen, eine Angabe, die, abgesehen davon, dass sie ganz bestimmt und wiederholt gemacht worden ist, um so eher allen Glauben verdient, als ja bekannter Maassen Irre dieser Art, wie auch B., durch den Mangel geistiger Schwäche charakterisirt sind*). Wie erklärt sich dieser scheinbare Widerspruch?

---

*) *J. Snell*, Monomanie als primäre Form der Seelenstörung. Allg. Ztschr. f. Psych., Bd. XXII. Heft 6, S. 368.

Es ist, um dies nachträglich hier einzufügen, sehr begreiflich, dass unter so bewandten Umständen dieser Irre B. zu der Wahnidee kommt, dass seine Feinde seine Gedanken zu leiten verständen, dass sie sie ihm nicht blos vorsagen, sondern selbst machen und eingeben, dass sie seine Gedanken wissen, ein Umstand, den jener erste Kranke F. noch als ein Ding der Unmöglichkeit belächelte. Es liegt hier nun auch sehr nahe, daran zu denken, dass auch jene häufig gehörte, gereizte Antwort mancher Geisteskranken „Sie wissen es ja schon, ebenso gut wie ich, Sie brauchen gar nicht erst noch zu fragen", oder jene Klage: „Es wissen Alle meine Gedanken", sowie endlich: „Meine Gedanken werden mir von Anderen gemacht, ich muss reden, was Andere mir eingeben" etc. etc., wie sie in ihren vielfachen Variationen jedem Irrenarzte zu Genüge bekannt und doch unerklärt sind, mit diesem Phänomen des Doppeldenkens oder wie wir es sonst bezeichnen wollen, möglicher oder höchst wahrscheinlicher Weise in engstem Zusammenhang stehen und von ihm aus ihren später nicht mehr oder nur schwer nachzuweisenden und zu verfolgendeu Ursprung nehmen.

So geeignet nun auch somit die Hypothese von *Jensen* sein mag, eine Menge dunkler und seltsamer Klagen unserer Kranken auf ein einfaches elementares Symptom zurückzuführen, zu erklären, so wenig erklärt erscheint sie selbst und muss insbesondere ihr Zustandekommen aus Doppelwahrnehmungen mit Recht bezweifelt werden. Während die *Jensen*'schen Fälle diese Annahme noch zulassen, vorausgesetzt dass es sich auch hier wirklich um Wahrnehmungen handelt, gestatten es die eben mitgetheilten zwei Beobachtungen entschieden nicht mehr. Wenn im ersten Falle F. noch das Doppelsehen durch die Annahme von Doppelwahrnehmungen erklärt zu sein schien, widersprach dort schon die mehrfach besprochene

Digitized by Google

Beobachtung beim Briefschreiben, sowie die bei genauerer Betrachtung gewonnene Einsicht, dass die Verdoppelung — beim Lesen — eben nicht im Gebiete der Sinnesperception statthat, sondern dass vielmehr die Vorstellungen des gedachten Wortes doppelt sind. Noch schärfer und ganz zweifellos tritt dieser Umstand bei dem zweiten Kranken B. hervor, der nicht blos beim Lesen, sondern auch beim gewöhnlichen Denken die deutliche Empfindung des Doppeldenkens hat, mag er nun, wie fast immer, den doppelten Gedanken für nachgeredet halten, oder für vorgesagt. Hier ist von einer Perception gar nicht mehr die Rede, so dass auch die in beiden Fällen bestandenen Sehstörungen kaum in Betracht kommen. Aber auch an die Möglichkeit, diese Nachreden als eine Art von Reproduction *(Jessen)* anzusehen, kann nicht mehr gedacht werden. Dagegen möchte auch ich die Annahme einer Incongruenz der Function beider Hemisphären für berechtigt halten, nur dass diese Incongruenz vielleicht weniger in Störungen der Peripherie der Hemisphären, als viel eher in ihrer Verbindung durch die einfachen mittleren Theile, die Commissuren, begründet sein mag. Die in beiden Hemisphären entstehenden Vorstellungen, mögen sie nun durch äussere Eindrücke hervorgerufen sein oder durch die innewohnende Energie der betreffenden Hirntheile reproducirt werden, decken sich nicht, wobei es unentschieden bleiben mag, ob sie nicht gleichzeitig (nacheinander) erfolgen oder ob in ihrer Leitung eine einseitige Hemmung der Verzögerung eintritt. Dann aber liegt auch der Gedanke sehr nahe, ob nicht alle unsere Vorstellungen und Gedanken vielleicht in den paarigen Hemisphären ursprünglich immer doppelt entstehen, aber in einem normal functionirenden Gehirn — bei gleicher Leitungsgeschwindigkeit — zu vollstän-

Digitized by Google

digen Deckung gelangen und so die Einheit des Denkens bewirken.

Und eine Bestätigung für die Richtigkeit der soeben entwickelten psychologischen Ansicht bietet die Beobachtung des Einfachdenkens im Traume (p. 538) dar, obwohl es auf den ersten Blick fast scheinen möchte, als ob sie mehr die Hypothese von *Jensen* stütze; denn wenn, wie im Traume, keine Wahrnehmungen von aussen kommen, so können natürlich auch keine Doppelwahrnehmungen erfolgen. Allein es lässt dieser Vorgang des einfachen Vorstellens und Denkens im Traume doch eine andere Erklärung zu. Wie das Blut auf das gesammte Nervensystem einen anregenden Einfluss ausübt, so auch auf die an Capillaren so reiche Rindensubstanz der Grosshirnhemisphären, die Werkstätte des Vorstellens und Denkens. Liegen wir nun auf der Seite, so wird das Blut dem Gesetze der Schwere folgend sich in die tiefste Hirnpartie senken, aus der einen obern Hemisphäre in die andere unten liegende fliessen und sich daselbst anhäufen, demgemäss auch stärker auf die tiefer gelegene Hemisphäre resp. ihre Hirnrindenzellen einwirken und deren eigenthümliche Function lebhafter in Wirksamkeit treten lassen, während in der anderen Hemisphäre das Entgegengesetzte, eine Schwächung der Thätigkeit der Ganglienzellen die Folge sein wird*). Es wird folglich im Schlafe, und zwar in der Seitenlage, vorzugsweise nur die eine Hemisphäre — wenn überhaupt — in Thätigkeit sein, die andere hingegen sehr wenig thätig oder nahezu unthätig bleiben, also im vorliegenden Falle nur die eine Hemisphäre Traumvorstellungen produciren.

Wenn ich nun bereits im Vorigen aus anderen Gründen zu der Vermuthung gelangt war, dass in der Regel

---

*) cf. *Schröder van der Kolk*, Pathol. u. Therapie der Geisteskrankh. S. 24.

Digitized by Google

auf beiden Hemisphären gleichzeitig oder, wenn man will, parallelgehend die Vorstellungen entstehen, analog aber, wie bei den identischen Netzhautpunkten im Auge, im normalen Zustande beide Vorstellungen sich decken und nur als Eine zum Bewusstsein kommen, so müssten nach meiner Theorie im Traume nur auf Einer Seite des Grosshirns Vorstellungen sich erzeugen. Für gewöhnlich werden wir uns dieser doppelten Vorstellungsbildung aber ebenso wenig bewusst werden, wie der doppelten Entstehung der optischen Bilder im Auge. Anders dagegen bei B., dessen Gedanken stets doppelt sind und der uns somit ein treffliches Mittel an die Hand giebt, die Richtigkeit der oben aufgestellten psychologischen Ansicht zu prüfen. Ist sie nämlich richtig, so müssen bei B. die Gedanken im Traume nicht mehr doppelt, sondern einfach sein. Dies ist nun thatsächlich der Fall, die Gedanken und Worte, die im Wachen immer doppelt sind, sind im Traume einfach, und es wird somit der Beweis geliefert, dass im Traume nur halbseitige Vorstellungen producirt würden, im Wachen dagegen zweifache; und was von den in Worten umgewandelten Vorstellungen gilt, wird höchst wahrscheinlich auch von allen übrigen Vorstellungen gelten.

Wenn ich im Vorhergehenden gesagt habe, dass nur die eine Hemisphäre im Traume thätig ist, die andere nicht, so ist dies selbstverständlich dahin zu verstehen, dass, wie ich auch schon angedeutet, die eine Hemisphäre in Folge des vermehrten Blutzuflusses in erhöhte Thätigkeit versetzt ist, die andere dagegen in eine sehr verminderte, so dass bei letzterer wohl auch noch Vorstellungen entstehen mögen, aber dann jedenfalls sehr abgeblasst, leise, matt. Ich kann hier nun eine Bemerkung nicht unterdrücken, die mir auf den Umstand, dass die Traumbilder ganz gewöhnlich etwas Körperliches, Sinnliches, Leibhaftiges haben, einiges Licht zu

werfen scheint. Ich möchte nämlich an eine ophthalmologische Beobachtung erinnern, die etwas Analoges hat. Betrachten wir nämlich ein Gemälde, einen Holzschnitt etwa, mit dem einen Auge durch einen Tubus, während das andere Auge geschlossen bleibt, so erscheinen die Figuren durch Abschneidung der Randstrahlen nicht blos schärfer und klarer — und zugleich kleiner —, sondern auf einmal auch ganz körperlich und heben sich förmlich aus dem Gemälde hervor, während sie, wenn wir sie mit beiden unbewaffneten Augen betrachten, nur (mehr minder) flächenartig erscheinen, und fangen wir nun an, das unbewaffnete Auge langsam und allmälig zu öffnen, so wird mit dem Hinzutritt des — matteren und grösseren — zweiten Bildes diese Illusion immer geringer, je mehr wir das bisher geschlossene Auge öffnen. Ein Aehnliches scheint mir im Traume, die doppelte Vorstellungsbildung vorausgesetzt, der Fall zu sein: die eine blutreichere Hemisphäre sieht gleichsam die Vorstellungen und Bilder schärfer, voller, mehr in der Nähe, die andere blutarme dagegen dieselben nur sehr blass, verschwommen, matt, mehr wie aus der Ferne oder fast gar nicht, und vergleichen wir die durch die peripherischen Sinne eindringenden Wahrnehmungen mit den Randstrahlen, so wären im Traume auch die Randvorstellungen abgeschnitten. Könnte nicht auf dieser hochgradigen Differenz in der Intensität der Vorstellungsbilder in beiden Hemisphären die charakteristische Körperlichkeit, das Plastische der Traumbilder beruhen?

Resumiren wir aber jetzt die Ergebnisse der bisherigen Untersuchung mit besonderer Rücksicht auf die von *Jessen* aufgestellte Hypothese, so waren wir also zu folgenden Resultaten gelangt: 1) beruht (bei B.) jenes Doppeldenken im wachen Zustande, in welchem die Blutvertheilung in beiden Hirnhälften eine gleiche ist, in der That auf einer gleichzeitigen oder parallelgehenden dop-

pelten und zugleich identischen Thätigkeit in jeder der beiden Hemisphären, weil eben, wie dieser Fall B. zeigt, wenn die eine Hemisphäre ausser Thätigkeit gesetzt ist oder, wie im Traume, ruht, das Doppeldenken verschwindet und nur noch die einfache (einseitige) Gedankenbildung Statt hat; 2) bedingen nicht sowohl Störungen in der Peripherie der Hemisphären diese pathologische Erscheinung, sondern es ist vielmehr diese Incongruenz in einer Störung der einfachen mittleren Theile, der Commissuren, zu suchen, da wohl die Vorstellungen an sich beiderseits regelmässig entstehen, aber nur nicht zur rechtzeitigen Deckung kommen; 3) erfolgt jene Duplicität nicht innerhalb der Sphäre der Perception, sondern vielmehr am Orte der Vorstellungs- oder Wortbildung. So auch lassen sich die Beobachtungen *Jensen*'s erklären. Der auf die peripherischen Enden der Sinnesnerven gemachte Eindruck wird durch centripetale Fortleitung zur Wahrnehmung, die Wahrnehmung durch weitere Fortleitung zur Vorstellung und zum Worte*), und hier nun tritt die Spaltung oder die Verdoppelung ein, und die Wahrnehmung gelangt scheinbar als eine zweifache zum Bewusstsein. Daher kommt es, dass keine räumliche Projection stattfindet, weil es sich eben nicht mehr um Wahrnehmungen handelt, wie *Jensen* noch irrthümlich annimmt, sondern um Vorstellungen, und diese können nur „in die Zeit" hinaus projicirt werden, das Denken hat keine Ausdehnung im Raume.

Und doch lässt sich vielleicht noch schärfer präcisiren, wenn die Verdoppelung der Vorstellungen in die Erscheinung tritt. Wir haben nämlich noch des bemerkenswerthen Umstandes zu gedenken, dass eine ganze Gruppe von Vorstellungen bei B., die er als „Reden" bezeichnet, in einem ihm sehr klar bewussten Gegensatz zu

*) *Jessen*, Psychologie pag. 98.

zu seinen eigenen „Gedanken", einfach sind. Wie unterscheiden sich aber diese Vorstellungen von den andern? Richten wir unsere innere Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, den wir untersuchen und betrachten wollen, so wird diese beabsichtigte Gedankenentwicklung — sei es durch den Contrast, sei es durch die Aehnlichkeit der Vorstellungen — fortwährend durch unwillkürlich auftauchende Vorstellungen, Erinnerungen und Bilder unterbrochen und durchkreuzt, ohne dass diese jedoch in ihrem flüchtigen Vorübereilen den Fortgang unseres Nachdenkens zu stören vermögen, wenn sie nicht zu lebhaft dem denkenden Geiste sich aufdrängen. Diese Vorstellungen nun, die unwillkürlich auftreten und nicht beabsichtigt, nicht gewollt werden, scheinen es wesentlich zu sein, die in der Form von Hallucinationen unserem Kranken einfach sind, während dagegen diejenigen Vorstellungen, auf die er seine Aufmerksamkeit richtet, so besonders beim Lesen (ganz wie im ersten Fall bei F.), und die zu seiner Gedankenentwickelung und Ueberlegung mit Absicht herangezogen werden, doppelt erscheinen. Dies würde auch mit der *Hagen*'schen Theorie von der Hallucination*) übereinstimmen. *Hagen* erklärt die Hallucination (l. c. p. 52) für einen sensibeln Krampf, dessen wesentliche Eigenschaften die zu heftige und unwillkürliche Functionsstörung ist; hier finden wir nun dieselben Eigenschaften wieder: diese einfachen hallucinatorischen Vorstellungen treten unwillkürlich und mit einer gewissen gesteigerten Lebhaftigkeit auf. Wenn es also wesentlich die beabsichtigten und mit Willen in Bewegung gesetzten Vorstellungen sind, die doppelt zum Bewusstsein kommen, so wird es sehr wahrscheinlich, dass diese Spaltung der bisher congruenten Vorstellungen

*) *Hagen*, Zur Theorie der Hallucination. Allg. Zeitschr. f. Psych. 1868. Bd. XXV. 1. u. 2. Heft, S. 1.

Digitized by Google

oder richtiger ihre Incongruenz erst zu Tage tritt in bestimmten Bahnen, in welche unter Leitung der Aufmerksamkeit die Vorstellungen zum Zweck des Denkens und Ueberlegens nach einem vorgesetzten Schlusse hin einlenken.

Ob übrigens zwischen der Einfachheit der hallucinatorischen Vorstellung und ihrer Leibhaftigkeit (hier als deutlicher Stimme und gesprochenem Worte) ein innigerer, vielleicht causaler Zusammenhang bestehe, ob nicht viellleicht gar die Hallucination, analog der Traumvorstellung, wie ich sie oben zu erklären versuchte, eine halbseitige und daher sinnlich lebhafte Vorstellung sei, muss ich dahin gestellt lassen. Andererseits möchte ich mich aber doch von vornherein gegen den etwanigen Einwand verwahren, dass etwa diese hallucinatorischen Vorstellungen den Traum ausmachen, da, abgesehen von der ausdrücklichen Angabe des intelligenten Kranken, dass diese „Reden" im Traume fehlen, auch hier die Hallucinationen und Traumvorstellungen inhaltlich sowohl wie formell sich noch unterscheiden.

Es erübrigt schliesslich noch die schon berührte Frage zu beantworten, ob auch noch andere Vorstellungen als nur die in Worte gefassten allein doppelt sind: eine Frage, die um so schwieriger zu beantworten ist, als es eben ungemein schwer ist, für die nicht in Worte umgewandelten psychischen Vorgänge den richtigen und zutreffenden Ausdruck in Worten zu finden. Indess spricht gerade die hier so gesuchte und oft geradezu mühsame Redeweise des Kranken dafür, dass ähnliche Vorgänge sich in ihm vollziehen, die sich indess einer genauen Untersuchung doch fast ganz entziehen. Mancherlei Einzelangaben scheinen dafür zu sprechen; ich unterlasse es jedoch, sie hier noch weitläufig aufzuführen, da ich trotz allen Bemühungen und trotz meiner Ueberzeugung, dass auch andere, insbesondere Gesichtsvorstellungen,

Digitized by Google

doppelt auftreten, doch zu keinem sichern Resultate gekommen bin.

Wir stehen hier überhaupt vor einem ebenso räthselhaften wie bedeutendem psychologischen Problem, über das vielleicht noch weitere Beobachtungen weitere Aufklärung bringen. Höchstwahrscheinlich ist es mir aber bei der Analyse dieses zweiten Falles geworden, dass die Vorstellungsbildung immer doppelt von Statten geht, im normalen Zustande dagegen nicht doppelt empfunden wird und nur in seltenen pathologischen Fällen, da das Experiment ausgeschlossen bleiben muss, als doppelt bewusst wird. Die von mir aufgeführten zwei Fälle, sowie die vier von *Jensen* betreffen übrigens nur chronische oder unheilbare Irre mit zahlreichen Hallucinationen und Illusionen. Ein ähnliches Phänomen, wie es *Jensen* beschrieben, habe ich nur bei einem einzigen Kranken, einem seit etwa zwei Jahren an Verfolgungswahnsinn leidenden Buchhändlergehülfen gefunden, dem, als er vor ungefähr anderthalb Jahren der Anstalt zugeführt wurde, alle Gesichter als bekannt, als früher schon einmal gesehen vorkamen, ohne dass er sie aber mit früher gesehenen Gesichtern etwa verwechselte oder verglich, und zwar längere Zeit hindurch, während ihm dies keineswegs von den Localitäten oder der ihm bisher unbekannten Gegend etc. schien, sondern einzig und allein von den Physiognomien. Weiter aber ergab auch die Untersuchung dieses Falles nichts.

Digitized by Google

Zur Casuistik.

Wahnsinn oder Verbrechen? — Der von Dr. *Lion* sen. in „Gutachten über Brandstiftung und Zurechnungsfähigkeit" (Vjschr. f. Psychiatrie ed. *Leidesdorf*, Jg. II. pag. 350) aufgestellte Grundsatz: „Der Mensch ist — — so lange zurechnungsfähig, als er der Strafbarkeit seiner Handlungen sich bewusst ist," veranlasst den Unterzeichneten zur Mittheilung nachstehenden Falles, welcher die Irrigkeit des obigen, für das Urtheil des nichtärztlichen und besonders des richterlichen Publicums höchst gefährlichen Grundsatzes darlegt.

Am 8. October 1864 war in der kleinen Fabrikstadt J. auf dem Bodenraum eines zweistöckigen Hauses Feuer ausgebrochen, bei welcher Gelegenheit 3 Gebäude von der Flamme verzehrt und 3 Männer von den einstürzenden Trümmern erschlagen wurden. Der in jenem Orte immer bereite und sehr häufig nicht unbegründete Verdacht auf böswillige Brandstiftung wurde durch den Umstand unterstützt, dass bei dem Brande ein aus dem Vorsaal-Fenster des Obergeschosses herabhangender Strick bemerkt worden war, an welchem möglicherweise ein Mensch eingestiegen sein konnte. Weder den Wirth des Hauses noch seine Nachbarn, ebenso wenig den Miether des Obergeschosses, Fabrikarbeiter S., konnte vernünftigerweise der Verdacht vorsätzlicher Brandstiftung treffen, da der letztere dabei sein ganzes unversichertes Mobiliar verloren und da ihn überdiess, wie durch Zeugen nachgewiesen wurde, der Brand im Schlafe überrascht hatte. S. war erst vor ½ Jahre mit seiner Frau und 2 ganz jungen Kindern nach J. gezogen und genoss in der Stadt des besten Rufes. Die Frau lebte eingezogen und war nur für ihre Familie thätig, beklagte sich aber öfter gegen ihren Mann, dass sie es an dem fremden Orte nicht gewohnt werden könne,

Digitized by Google

dass ihre Wirthin insbesondere gegen die Kinder unfreundlich sei, und setzte es durch, dass die Wohnung binnen Kurzem gewechselt werden sollte. Uebrigens war das Verhältniss zwischen den Miethern und Wirthen des Hauses nicht etwa gehässig, indem die letzteren den Grund zu dem gestörten Verkehr zwischen den Familien in der grossen Empfindlichkeit der Frau S. erkannten und sie zu schonen suchten, da sie durchaus nicht böswillig, sondern nur wenig umgänglich, übrigens aber ehrbar und in der Erfüllung ihrer Pflichten sogar ängstlich gewissenhaft erschien. An die Frau S. wurde demnach als an die Urheberin des Brandes von der allein competenten Seite der Wirthsleute ebenfalls nicht gedacht. Gleichwohl wurden andern Tages beim Aufräumen des Schuttes — in Gegenwart der Frau S. — Stimmen laut wider „das fremde Volk, das den Einwohnern das Brod wegnehme und die Häuser anstecke.“ Hievon erschreckt und in dem Glauben, dass man ihren Ehemann arretirt habe, entfernte sich Frau S. — das Eine Kind an der Hand, das Andere auf dem Arme — schweigend von der Brandstätte, wo sie noch Einiges von ihrer Habe unversehrt wiederzufinden gehofft hatte. Eine halbe Stunde danach fand man sie hilferufend in der Nähe eines Hauses an einem seichten Teiche, in welchem sie ihre beiden Kinder ertränkt und sich selbst, wiewohl vergebens, zu ertränken versucht hatte. Die Kinder wurden todt aus dem Wasser gezogen, die Mutter in Haft genommen.

Die Voruntersuchung vor dem Localgericht ergab fast nichts, da Inculpatin kaum antwortete und so schwachsinnig erschien, dass sie weder ihr Alter richtig anzugeben, noch aus gegebenen Zahlen zu berechnen vermochte.

Die Thatsache, dass sie ihre Kinder absichtlich ertränkt hatte, leugnete sie nicht, die Ursache, warum sie die That begangen, war nicht möglich zu erfahren. Ueber Begebenheiten aus ihrem frühern Leben war sie wenig zurückhaltend, über das, was vor Kurzem geschehen, fast unüberwindlich schweigsam. Dabei spiegelte sich ganz deutlich die Furcht auf ihrem Gesichte ab und ihre ängstlichen Blicke, mit denen sie nach irgend einem verlorenen Worte die Sachverständigen maass, verriethen, dass sie sich schuldbewusst fühle und sich zu verrathen fürchtete, wenn sie sprechen würde. Diesen Eindruck gewann auch der Criminalrichter, der die Inculpatin für eine Simulantin hielt, während sie der Arzt, Dr. W., nach 8tägiger Beobachtung, auf Grund des Schweigens, der Nahrungsverweigerung, der Schlaflosigkeit, des Fieberns etc. für irrsinnig erklärt hatte. Zur Entscheidung der Frage wurde die S. dem Kreis-Physikat zur weitern Beobachtung übergeben und in das allgemeine Krankenhaus

Digitized by Google

in D. eingestellt. Bald nach ihrer Ankunft in demselben zeigte sie sich redselig, gefällig, genoss die ihr vorgesetzten Speisen und verlangte nach Beschäftigung. Nur von Zeit zu Zeit äusserte sie Angst, besonders wenn ihrer Kinder Erwähnung geschah. Als Motiv zur Ermordung der letzteren gewann man ihr mühsam die Aeusserung ab, dass böse Leute, namentlich die Hauswirthin, die Kinder schlecht behandelt hätten — und — um die Kinder dem drohenden Unglück zu entziehen, habe sie dieselben in's Wasser gestossen und auch sich umbringen wollen. Die Schwäche dieses Motives, das mit überzeugender Einfalt vorgebracht wurde, befestigte das umgebende Personal in der Ansicht, dass man es mit einer unglücklichen Schwachsinnigen zu thun habe.

Aber auf einmal war Pat. am Abend des 25. October wider alles Erwarten aus dem Krankenhause, wo sie sich wohl fühlte, verschwunden und wurde erst nach länger als 24 Stunden durch einen Fremden, dem ihr Wesen aufgefallen war, wieder eingebracht. Sie selbst theilte mit, dass sie durch ein Fenster entsprungen, durch die Stadt gelaufen, in die offene Thür eines Schäferhauses eingetreten, die Nacht daselbst zugebracht, andern Tages ihren Weg auf's Gerathewohl in einer sehr wasserreichen Gegend fortgesetzt und in der ganzen Zeit, wo sie planlos umherirrte, nichts als ein wenig Brod, das man ihr unterwegs geschenkt, genossen habe. Ihr Gesichtsausdruck war sehr verwirrt, ihr Aeusseres verwildert. Hierauf wurde die S. am 28. October der hiesigen herzogl. Irrenanstalt übergeben. *Stat. praes.* — Pat. 29½ J. a., von mittlerer Grösse, 4'8", ziemlich fett bei 116 Pfd. Körpergewicht, hat blondes Haar, blaue Iris, bläulich-blasse Hautfarbe, blasses Zahnfleisch, blasse Conjunctiva, weite Pupillen, stupiden, aber ängstlichen Gesichtsausdruck, kleinen Puls von 92 Schlägen. Ihr Schädel ist brachycephal, zeigt aber sonst nichts Abnormes, nur dass auf der Höhe des Scheitels ein linsengrosser feuchter Schorf sich befindet, der schon bei dem ersten Aufenthalt der Pat. in dem Krankenhause zugegen gewesen ist. Psychisch erscheint die *S.* sehr deprimirt.

Die Anamnese ergab Folgendes: Pat. ist die Tochter eines Mannes, der 5 Jahre vor ihrer Geburt an Epilepsie gelitten hat, dann in Irresein verfallen und, als sie 3 Jahre alt war, blödsinnig gestorben ist. Als Kind wenig begabt, hat sie nur ein geringes Maass von Kenntnissen erworben, ca. 15 Jahre alt an Typhus und Bandwurm gelitten. Die Menstruation ist ohne Beschwerde und zwar im 17. Lebensjahre eingetreten und bis zum 24., wo die *S.* sich verheirathete, regelmässig erfolgt. Kinder hat die *S.* 2 geboren und selbst gesäugt. In der Ehe, wie auch früher, hat sie sich still, sanft,

bescheiden, arbeitsam und ohne Neigung zum raschen Handeln, seit ½ Jahre aber besonders empfindlich und schweigsam gezeigt.

Der weitere Verlauf ihrer Leidensgeschichte in der Irrenanstalt war folgender. In den ersten beiden Nächten hatte Pat. nicht geschlafen. 4 Nächte Schlaf, Bäder, Regelung der Verdauungs-Functionen, leichte Beschäftigung besserten die deprimirte Stimmung. Der Puls war mässig voll, bis zu 85 Schlägen in der Minute. Pat. war sogar bisweilen heiter, und wünschte sich hier im Hause zu vermiethen, nicht aber zu ihrem Manne, der sie doch immer gut behandelt hatte, zurückzukehren. Doch schon am 4. November traten Stirn-, Magen- und Bauchschmerz, Brechneigung und Stuhlverstopfung ein, das Gesicht war geröthet, die Augen glänzend, der Puls 92 — in den folgenden Tagen wieder Erbrechen, wobei ein Spulwurm und später ein fusslanges Stück Bandwurm abging — überall Schmerz und Hyperästhesie der Haut. Unter fortdauernden Uebelkeiten verlangt Pat. noch einen Geistlichen, weil sie sterben zu müssen glaubt, und gesteht dem letztern, dass sie, als sie geglaubt, man habe ihren Mann um der Feuerbrunst willen arretirt, aus Furcht vor der Schande plötzlich in Verzweiflung gerathen, mit ihren Kindern ins Wasser gegangen und als diese ertrunken seien, an einem Baume sich habe erhängen wollen. Nach diesem Geständniss und darauf erfolgter Communion fühlte Pat. zwar in ihrem Gewissen sich erleichtert, als indess am nächstfolgenden Tage Fieber und „Schmerzen im Gehirn" heftiger wurden, trieb sie die Gewissensunruhe noch während der Nacht an, weiter zu bekennen, was sie dem Geistlichen verheimlicht hatte: Sie selbst habe das Feuer auf dem Bodenraume angezündet, um aus der Stadt *S.* fortzukommen.

In einer späteren Vernehmung vor dem Richter wiederholte sie ihre Aussagen, die man für Fieber-Phantasieen hätte nehmen können, gleichlautend und fügte noch hinzu, dass der vorgefundene Strick von ihr zum Fenster mit Vorbedacht hinausgehängt worden sei, um den Verdacht der That auf Andere zu leiten. Beweggrund, das Feuer auf dem Bodenraum anzuzünden, sei aber für sie gewesen, dass sie einige daselbst befindliche Stücke Holz habe vernichten wollen, aus Furcht, man werde beim Umzuge aus der Wohnung entdecken, dass dieses Holz auf unredliche Weise erworben sei und ihr Ehemann werde damit aus dem Dienste entlassen werden und in Schande gerathen. — Es erwies sich übrigens im Verlaufe der Untersuchung, dass das Holz rechtmässig durch Geschenk von Seiten des Fabrikherrn, bei welchem *S.* arbeitete, durch letztern erworben und die Furcht seiner Frau daher unbegründet war.

Den weiteren Verlauf der Krankheitsgeschichte bis zum Tode

der S., der unter schweren Leiden durch Decubitus und Pyämie am 19. December 1864 erfolgte, übergehen wir und bemerken nur, dass das Bewusstsein bis kurz vor dem Ende meist klar und der Gemüthszustand ein verhältnissmässig ruhiger blieb. Aus dem Sectionsbefunde heben wir nur heraus, dass unter dem Schorf auf dem Scheitel ein 2½''' Durchm. haltendes, bewegliches Knochenstück (Necrose) und unter diesem auf der *Dura* eine flache Geschwürsfläche von 1¼ Zoll Länge mit gebuchteten Rändern sich befand, von dem aus eine Oeffnung in den Arachnoidealraum, eine andere in den *Sin. longitud.* führte, während eine dünne Schicht erstarrten Eiters ringsum mehrere Zoll lang auf der *Dura* sich erstreckte. Auf der *Basis cranii* bis in den Spinalkanal befand sich unter der *Dura* flüssiger grünlich-weisser Eiter, desgleichen in den Orbitis, in den Schläfenbeinen; — in den Sinus Blut- und Faserstoffgerinsel, in der *Jugularis dextra* flüssiges Blut und Eiter. Die stark injicirte *Pia* hing stellenweise fest an der weichen Rinde, in den Sulci war stellenweise Serum. Beide Lungenhälften von zahlreichen Abscessen von Hirsekorn- bis Haselnussgrösse bedeckt.

Leider ist der Sectionsbefund für die Pathogenese nicht zu verwerthen, da über den Zeitpunkt des Entstehens der Schädelnecrose und über den etwaigen Zusammenhang der wahrscheinlichen Kopfverletzung mit der Psychose kaum Vermuthungen, geschweige denn sichere Auskunft, aufgefunden werden konnten. Das Interesse an dem Fall beruht somit nur auf seiner psychologischen Seite.

Eine erblich disponirte, in geringem Grade Schwachsinnige verfällt in Melancholie von ebenfalls mässigem Grade, nachdem sie ihren gewohnten Verhältnissen entrückt ist, wird äusserst empfindlich und furchtsam, — der Irrthum, dass ihr Mann das Holz entwendet habe, steigert ihre Angst, die daraus hervorgehende Erkenntniss, dass es sich um Ehre und Brod handele, treibt sie zu der verbrecherischen That, sie zündet das Holz und das Haus an. Sie hat dabei das volle Bewusstsein, das Verbrechen zu begehen, denn sie trifft Maassregeln, den Verdacht auf Andere zu leiten, und zwar in raffinirtester Weise, — um selbst straflos auszugehen. Ist sie nicht eine Verbrecherin? und zwar eine verhärtete und im höchsten Maasse mit Verstellungskunst begabte Verbrecherin, da sie es wagt, an der Brandstätte, wo 3 Häuser und 3 Menschen durch ihre That zu Grunde gegangen sind, der Volkswuth in anscheinend unschuldigster Weise entgegenzutreten? Wir glauben die Frage mit Bestimmtheit verneinen zu können, sogar wenn Rachegefühle, von denen in der ganzen Verhandlung nicht die Rede war, als Motive mitgewirkt hätten. Sie ist eine Schwachsinnige, die, von Angstgefühlen getrieben, Hand-

Digitized by Google

lungen begeht, deren nächste Folgen sie zwar übersehen kann, ihr Verstand ist aber so gering, dass sie sofort, um einem Urtheil zu entgehen, zu den äussersten Mitteln greift. Man denke daran, wie leicht es ihr geworden wäre, das Holz ohne Aufsehen zu vernichten, — ferner an die rasche, ganz unmotivirte That der Ermordung ihrer Kinder. — Endlich ist der schreiende Contrast zwischen der Empfindlichkeit, mit der die *S.* Alles, was ihre Person oder ihre Angehörigen betraf, aufnahm und der Herzlosigkeit, dem Unglück Anderer gegenüber, gewiss nur als Ausdruck eines kranken Gemüthes, das zwischen Torpor und höchster Erregung schwankte, zu betrachten. — Zurechnungsfähig aber ist ein solcher Mensch nicht, wenn er auch der Strafbarkeit seiner Handlungen sich bewusst ist.

Dr. *M. Fraenkel.*

Zur therapeutischen Casuistik. — 3. Mehrjährige Onanie durch Oxyuris vermicularis mit folgender Psychose. Beseitigung der Madenwürmchen mittelst Kali picronitricum. Aufhören der Onanie und Genesung der dadurch bedingten Psychose.

Louise B., 20 Jahre, katholisch, ledig, Bauernmädchen, ist vom Vater her zur Seelenstörung disponirt, wenigstens hat sich der Grossvater väterlicherseits in einem Anfall von Schwermuth erhängt und ist eine Schwester des Vaters von sensibler nervöser Constitution und wiederholt schon Anfällen von Melancholie unterworfen gewesen. Auch der Vater der Kranken ist oft exaltirt, aufbrausend, von sonderbarem Benehmen und etwas dem Trunk ergeben.

Die Entwicklung der *L. B.* ging normal von Statten, sie zeigte gute Anlagen, einen kräftigen Körper und harmonische Ausbildung ihrer Fähigkeiten.

Im 16. Jahr traten die Menses ohne weitere Beschwerde ein. Bald darauf bemerkte man, dass die Kranke zu onaniren anfing, immer mehr diesem Laster fröhnte und dadurch recht viel von ihrem früheren frischen Aussehen und ihrer Munterkeit verlor, auch in iher intellectuellen Leistungsfähigkeit einbüsste. Nachdem sie fast 4 Jahre onanirt hatte, blieb Anfang Juni 1867 mit der Verschlechterung ihrer Constitution die Menstruation aus. Bald darauf trat eine psychische Störung — *melancholia activa* mit Affecten der Angst, dämonomanischen Wahnvorstellungen und entsprechenden Visionen auf.

Als Patientin Ende September der Anstalt übergeben wurde, war das acute Stadium der Psychose vorüber, der Affect, die Wahnvorstellungen zurückgetreten. Dafür fand sich ein ganz stumpfsin-

siges, idiotenhaftes Wesen, ein apathisches, rein vegetirendes Dahinleben, dabei die grösste Unreinlichkeit, Rücksichtslosigkeit und ein vollständiger Verlust aller Scham, so dass sie ganz ungenirt vor Andern der Onanie fröhnte. Die Untersuchung der Organe ergab nichts Abnormes, auch die Genitalien boten nach keiner Richtung einen Befund, der einen Erklärungsgrund der habituellen Onanie hätte abgeben können. Der geringe Grad von *fluor albus*, der sich fand, war offenbar eher Folge als Ursache der Lasters, gegen das vergebens Zwangsmittel, Sitzbäder etc. angewendet wurden.

Anfangs October zeigte sich bei der bisher ganz stupiden Kranken eine neue intercurrirende melancholische Erregung mit grossem ängstlichen Affect und kindischen Selbtvorwürfen begangener Verbrechen der Brandstiftung und Gotteslästerung. Diese Störung hatte sich unter der Anwendung von *tinct. opii* im Laufe der nächsten 4 Wochen wieder verloren. Mittlerweile gelang es, den wahrscheinlichen Grund der Onanie zu finden.

Die fortgesetzte Untersuchung der Stühle zeigte deutlich, dass grosse Massen von Oxyuris im Mastdarm sich befanden, auch hatte die Kranke auffallend oft mit den Fingern in der Nase gebohrt. Es wurden nun Klystiere von *Kali picronitricum* gr. x zwei Mal täglich angewandt, auf die massenhaft Madenwürmer abgingen und so lange fortgesetzt, bis im Stuhl sich keine mehr fanden.

Der Erfolg war ein überraschender — die Kranke hörte auf zu onaniren, so dass sie in eine ruhige Abtheilung des Hauses versetzt werden und dort mit Arbeiten beschäftigt und abgelenkt werden konnte. Sie wurde zusehends munterer, freundlicher, geordneter, verhielt sich durchaus decent, onanirte nicht mehr, gewann bald ihre alte Arbeitsfähigkeit, Heiterkeit und intellectuelle Höhe wieder und konnte, nachdem dieser Zustand sich während mehrerer Wochen so erhalten hatte, Mitte Februar 1868 aus der Anstalt genesen entlassen werden, aus der sie dankbar und voll Einsicht in ihre überstandene Krankheit schied.

Die Entlassene blieb in der Folge gesund und kürzlich eingezogene Erkundigungen meldeten ihre glückliche Verheirathung.

Dr. *v. Krafft-Ebing.*

Fälle von Psychosen nach Ileo-Typhus. — Eine Ileo-Typhus-Epidemie, welche in den Jahren 1867 und 1868 in der 4 Meilen von Schwerin in Mecklenburg entfernten Seestadt Wismar und ihrer Umgegend herrschte, auch hierher ihre Ausläufer sandte und eine be-

trächtliche Zahl von Opfern forderte, liess auch öfters im Convalescenz-Stadium Nachkrankheiten im Bereiche des Nervensystems zurück, von welchen dem Ref. einige bemerkenswerthe Fälle zur Kenntniss kamen. Mehrmals blieb, besonders nach schwerem Verlaufe eine, mit heftigen Muskelschmerzen verbundene, lähmungsartige Schwäche der unteren Extremitäten zurück, die sich erst nach Wochen, ja Monaten sehr allmälig verlor. Viermal, und zwar stets nach leichterem, mit wenig intensiven Erscheinungen, mässigem Fieber, geringer Temperaturhöhe und Pulsfrequenz verbundenen, nicht sehr protrahirtem Verlaufe, traten bald nach dem Beginne der Convalescenz Psychosen auf, theils in der Form heftiger Manie: einmal, schneller vorübergehend, bei einem 8jährigen Kinde, und einmal bei einer im Alter der Decrepidität stehenden Frau; zweimal in der Form von Melancholie bei zwei Schwestern, deren eine sich bereits nach mehreren Wochen wieder vollkommener Gesundheit erfreute, während die andere noch jetzt ihren düstern Wahnideen und schweren Angstgefühlen zur Beute ist. In zwei anderen Fällen, bei jungen kräftigen Burschen aus der arbeitenden Klasse, entwickelten sich nach leichterem Typhus anscheinend analoge Krankheitszustände, welche das Gemeinsame hatten, dass unter anhaltender grosser Empfindlichkeit des Epigastrium anfänglich mit mässiger, dann immer häufiger mit stets grösserer Heftigkeit ein peinlicher Druck in der Magengegend auftrat, welcher sich von hier gegen die Brust hin verbreitete; das Sprechen wurde unmöglich und die Besinnung schwand für kürzere oder längere Zeit. In dem einen dieser Fälle, der mir nur zu flüchtiger Beobachtung kam, schwanden die Anfälle, die schliesslich täglich, selbst mehrmals an demselben Tage wiederkehrten und stets heftige Kopfschmerzen zurückliessen, nach Anwendung mässiger Morphium-Gaben und eines *Vesicat. perp.* auf die Herzgrube. In dem anderen Falle steigerten sich die Symptome zu bedeutenderem Grade. Der Kranke, ein verständiger, gesitteter Mensch, von 19 Jahren, kräftiger Constitution, Kellner, beschrieb die Anfälle, welche anfänglich in grösseren Intervallen, später regelmässig täglich Nachmittags gegen 3 Uhr auftraten, in folgender Weise: er empfand, nachdem er die Nacht hindurch ruhig geschlafen und am Vormittage sich wohl befunden, bei stets Ueberhand nehmendem Appetitmangel aber wenig oder nichts genossen hatte, einen erst leisen, dann immer heftigeren Druck in der Herzgrube, als ob hier ein Stein, wie er sich ausdrückte: „ein Stück“ läge. Verbreitete sich dieser Druck nach der rechten Seite hin, so wusste der Kranke vorher, dass er zwar nicht die Besinnung verlieren, aber von heftigen allgemeinen Convulsionen werde befallen werden, welche dann bis Abends 6 Uhr

Digitized by Google

anhielten und den in Schweiss gebadeten und erschöpften Kranken einer ziemlich ungestörten Nachtruhe überliessen. Stieg dagegen „das Stück“ gegen die Brust hinauf, so wurde, wie der Pat. vorhersagte, der Kopf eingenommen, er verlor die Besinnung, begann zu deliriren, und gerieth in eine tobsüchtige Aufregung, deren Bewältigung zuweilen die Kraft von drei bis vier Männern erforderte und die gegen 8 Uhr des Abends einer grossen Erschöpfung wich, worauf die Nacht ruhig verlief; am folgenden Morgen war keine Erinnerung des Vorgefallenen, und nur eine bald schwindende Eingenommenheit des Kopfes zurückgeblieben. Nachdem diese Anfälle Wochen lang mit einander unregelmässig gewechselt hatten und vergeblich mit äusseren und inneren Mitteln, bald als Cardialgie, bald als Intermittens behandelt waren, versuchte ich, hinzugerufen, weil ausser obigen Krankheitserscheinungen und einiger Tardita salvi nichts Krankhaftes zu constatiren war, subcutane Injection von ¼ Gran *Morph. muriatic.* auf die Herzgrube. Der nächste Anfall änderte sich dahin, dass der Kranke zwar unbesinnlich wurde, der convulsivische Krampf aber sich auf die Brustmuskeln beschränkte und die Respiration in so heftiger Weise steigerte, dass eine Lungenblutung von etwa einer halben Theetasse schäumigen Blutes erfolgte. Die Injection wurde mit Steigerung auf ½ Gr. erneuert und seitdem hörten die Krampfzufälle spurlos auf. Nachdem diese Behandlung bis zum Verbrauch von 2 Gr. Morphium fortgesetzt und auch für Regulirung der Verdauungsthätigkeit gesorgt war, blieben doch Empfindlichkeit und Druck in der Herzgegend noch zurück; eine Untersuchung des Rückens lies eine sehr empfindliche Stelle in der Gegend der ersten Rückenwirbel auffinden; fliegende Blasen-Pflaster und später Einpinselung von Jodtinctur machten zwar diese Empfindlichkeit verschwinden, nicht völlig jedoch jene in den Präcordien, welche erst nach äusserer Anwendung von Jod auch auf dieser Stelle verschwand. Der Kranke erholte sich nun vollständig; als er seinen Dienst wieder angetreten hatte, trat zwar ein Orgasmus des Bluts, mit Kopfschmerz, öfterem Nasenbluten, selbst leichter Hämoptoë auf, doch reichte der Gebrauch von Hallerschem Sauer mit Kirschlobeerwasser hin, um auch diese vorübergehende Erscheinung zu beseitigen. — Ich kann schliesslich die Vermuthung nicht zurückweisen, dass die anfänglich unterlassene Untersuchung der Rückenwirbelsäule vielleicht schon damals eine Spinal-Irritation als Ausgangspunkt des ganzen Leidens nachgewiesen haben würde. Beachtenswerth scheint die Bahn, welche die krankhaften Empfindungen von der Herzgrube aus bald gegen das Rückenmark, bald gegen das Gehirn hin verfolgten.

Schwerin. *Fl.*

Literatur.

Die Anatomie des menschlichen Kopfes von Dr. *Hubert von Luschka*. Tübingen 1867. Verlag der Laupp'schen Buchhandlung.

In demselben Maasse, in welchem man sich mit der Vorstellung vertraut gemacht hat, dass das Gehirn ebenso gut sog. organischen und parenchymatösen Erkrankungen unterworfen ist, wie alle übrigen Organe des menschlichen Körpers, hat sich auch die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass zur richtigen Würdigung der Erkrankungen und Functions-Anomalien des Gehirns die Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse in analoger Weise von Wichtigkeit sein dürften, als es erfahrungsgemäss und anerkannter Maassen in Bezug auf die übrigen Organe und ihre Erkrankungen der Fall ist.

Je mehr sich durch die seit einiger Zeit auf dem Wege der pathologisch-anatomischen Forschung gewonnenen Resultate unsere Kenntniss von der organischen Grundlage der Geisteskrankheiten erweitert und durch den Nachweis verschiedener bisher unbekannt gebliebener pathologischer Zustände des Gehirns auch das Gebiet der „Hirn-Krankheiten" eine grössere Ausdehnung erfahren hat, — um so mehr macht sich auch das Bedürfniss nach einer genauen Feststellung und anschaulichen Darstellung der gesammten, das Gehirn, seine Umhüllungen und Nachbar-Organe betreffenden anatomischen Verhältnisse geltend. Diesem Bedürfnisse kommt das vorstehend genannte Werk entgegen, welches die 2. Abtheilung des III. Bandes von des Hrn. Vf. grösserem Werke: „Die Anatomie des Menschen, in Rücksicht auf die Bedürfnisse der praktischen Heilkunde" bildet, zugleich aber auch unter dem oben angeführten Titel ein selbstständiges Handbuch darstellt. Auf 550 Seiten sind die gesammten anatomischen Verhältnisse des Kopfes mit derjenigen Sorg-

falt und Genauigkeit abgehandelt, durch welche sich anerkannter Maassen auch die vielen bereits früher erschienenen anatomischen Arbeiten des rühmlichst bekannten Hrn. Verf. auszeichnen.

Es bietet das in Rede stehende Werk nicht allein die mit bekannter Sorgfalt eruirten Data der descriptiven Anatomie, sondern zugleich auch eine Topographie der einzelnen Regionen des Kopfes, eine Darstellung der räumlichen und Gewichts-Verhältnisse des Schädels und Schädel-Inhaltes, mit besonderer Berücksichtigung der durch Alter, Geschlecht, Race u. s. w. bedingten Verschiedenheiten. Desgleichen ist auch der Entwicklungsgeschichte sowie dem Bedürfnisse der praktischen Heilkunde gebührend Rechnung getragen.

Das Werk zerfällt in 2 Haupt-Abtheilungen, von denen die erste den Schädel, die zweite das Gesicht behandelt. In der Einleitung findet sich eine Uebersicht über die verschiedenen Schädel-Typen, über Schädelmessung u. dgl. Die erste Haupt-Abth. giebt zunächst topographische Skizzen der verschiedenen Schädelregionen, I. der Regio superior (R. frontalis, verticalis, occipitalis etc.), II. der Regio inferior (R. basilaris cranii anterior, media, posterior etc.), demnächst die Beschreibung des Schädels, in 3 Abschnitten, betreffend: 1) die Wandungen des Schädels, 2) den Schädelraum, 3) den Inhalt des Schädelraumes. Der 1. Abschnitt zerfällt in 5 Kapitel (Knochengerüst, Musculatur, Gefässe, Nerven und äussere Haut der Schädelwand). Der 2. Abschnitt behandelt I. den gesammten Schädelraum, II. die einzelnen Abtheilungen des Schädelraums und die Anordnungs- und Structur-Verhältnisse der Dura mater, ihrer Sinus, Nerven etc. Der 3. Abschnitt (v. S. 157—255) ist der Darstellung der Structur- und Lage-Verhältnisse des Gehirns nebst zugehörigen Gefässen, Cavitäten und Umhüllungs-Membranen gewidmet. Nach Erörterung der elementaren Bestandtheile, der Gewichts-Verhältnisse und der speciellen Architektonik des Gehirns folgt die Beschreibung der einzelnen grösseren Abschnitte: A. des verlängerten Markes, B. des kleinen Gehirns, C. des grossen Gehirns — sowohl bezüglich der äusseren Gestaltung als der inneren Organisation. — Die zweite Haupt-Abtheilung behandelt in 6 Abschnitten: 1) den Kau- und Geschmacks-, 2) Geruchs-, 3) Seh-, 4) Gehör-Apparat, 5) den Gefäss- und 6) den Nerven-Apparat des Gesichts.

Die besondere Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse des Schädels und Gehirns empfiehlt das genannte Werk vorzugsweise der Beachtung der Psychiater; insbesondere verdient es Anerkennung, dass durch viele in den Text eingefügte, sauber ausgeführte Holzschnitte die sonst schwierig aufzufassenden Lage- und Form-Verhältnisse anschaulich gemacht worden sind.

Wenn wir hier noch einen Wunsch aussprechen dürfen, so wäre es der, die Zahl der Holzschnitte bei erneuter Auflage des Werkes noch vermehrt zu sehen. Vielleicht würde es auch als eine dankenswerthe Ergänzung anzusehen sein, wenn dem Vorkommen einzelner, obgleich nicht constant, doch mehr weniger oft vorkommenden Anomalien (Varianten), der Form und Lage einzelner Hirntheile, noch mehr als es schon geschehen, Rechnung getragen würde, z. B. die nicht ganz selten zu beobachtende Duplicität des einen Abducens u. dgl. m. Erwähnung fände. Endlich dürfte sich auch die Uebersichtlichkeit namentlich des Inhaltsverzeichnisses durch Verwendung verschiedener Kategorien von Typen noch erhöhen lassen. Im Uebrigen lässt die äussere Ausstattung des Buches kaum etwas zu wünschen übrig und was die Zahl der Holzschnitte anbetrifft, so sei hier beispielsweise hervorgehoben, dass zur Veranschaulichung der Lage und Form-Verhältnisse des grossen Gehirns nicht weniger als 12 Holzschnitte dienen, in welche Zahl die xylographischen Darstellungen der Gefässplexus, der mikroskopischen Hirn-Elemente u. dgl. nicht mit einbegriffen sind.

Dr. *Meschede.*

Digitized by Google

Bibliographie.

1. *Selbständige Werke.*

Deutsche.

Amann, Ueber d. Einfl. der weibl. Geschlechtskrankh. auf d. Nervensystem, mit besond. Berücksicht. d. Wesens u. d. Erschein. d. Hysterie. Erlangen, 1868. gr. 8. VIII. u. 99 S.

Bastian, *A.*, Beiträge zur vergleichenden Psychologie. Die Seele und ihre Erscheinungsweise in der Ethnographie. Berlin, 1868. Dümmler. 1 Thlr. 20 Sgr.

Die Auffassung des Psychischen. Die Ahnen und die Manen. Die Pathologie der Besessenheit und die Priesterärzte.

Beckhaus, C., Beitrag zur Behandlung der Geisteskrankheiten mit Opium. Diss. inaug. Bonn, 1869. 31 S.

Von 15 im J. 1868 in Siegburg mit Opium (1—2 Gr. pro d. früh und Abends beginnend, bis 8 Gr. p. d. steigend und dann wieder fallend) behandelten Fällen genasen 5 vollständig, drei Besserung. Am erfolgreichsten bei Frauen mit hyster. Grundlage oder in Folge depotenzirender Einflüsse, besonders der Sexualsphäre.

Bischoff, Th., Die Grosshirnwindungen der Menschen, m. Berücks. ihrer Entwicklg. b. d. Fötus u. ihrer Anordnung bei den Affen. München, 1868. gr. 4. 167 S. mit 1 Taf.

Caspari, O., Die psycholog. Bewegung in Rücksicht d. Natur ihres Substrats. Eine krit. Untersuch. als Beitrag zur empir. Psychologie. Leipzig, 1869. Voss. gr. 8. IX u. 71 S. 18 Ngr.

Dussy, E., Zur Entwicklungsgeschichte des Kopfes d. Menschen u. d. höheren Wirbelthiere. Mit Holzschn. u. 1 Atl. von 9 Taf. in Fol. mit 53 S. Text. Tübingen, 1869. gr. 8. 232 S. 7 Thlr.

Erichsen, J. E., Ueber die Verletzung der centralen Theile des

Nervensystems. A. d. Engl. von *L. Kelp.* Oldenburg, Schulze. 20 Sgr.

Esse, C. H., Die Krankenhäuser, ihre Einrichtung u. Verwaltung. Mit 1 Atlas von 80 Tafeln. 2te Aufl. Berlin, Enslin. 5⅓ Thlr.

Fresenius, F. C., Die psycholog. Grundlagen d. Naturwissenschaft. Wiesbaden, Kreidel. 24 Sgr.

Frommhold, O., Die Migraine und ihre Heilung durch Electricität. Pest, Heckenast. 24 Sgr.

Hartsen, A. v., Grundlegung von Aesthetik, Moral u. Erziehung, vom empirischen Standpunkt. Halle, 1869. 115 S.

— — Untersuchungen üb. Psychologie. Anm. zu *R. Zimmermann*'s philosophische „Propädeutik". Leipzig, 1869. 124 S.

Koeppe, M., De haematomate cartilaginum nasi (rhinaematomate) ex permutationibus laesionibusque telae cartilagineae vel ex perichondritide nasali orto. Habilit. dissert. Halle, 1869. 4. 18 S.

Corollarien. 1. Die gesunden Knorpel erscheinen wegen des erheblichen Mangels an Blutgefässen, wegen der durch ihre Elasticität sehr schweren Zerbrechlichkeit fast gar nicht zur Hämatombildung geeignet.

2. Durch pathologische und Altersveränderungen werden sie brüchig und spaltbar, erhalten Höhlen, wächst gefässhaltiges Gewebe in sie hinein.

3. Dadurch werden sie zu innerlichen Continuitätstrennungen und Blutungen in dicht begränzte Höhlen: zur Hämatombildung prädisponirt.

4. Die Veränderungen des Knorpelgewebes kommen, wie im Ohrknorpel, ebenso im Nasen-, Kehlkopf-, Tracheal-, Intervertebral-, Synchondrosen- vor allem häufig in den Rippenknorpeln vor.

5. Ebenso kommt es in ihnen allen zur Hämatombildung nach Verhältniss der Häufigkeit des Vorkommens der Gewebsveränderungen.

6. Sehr different ist die Grösse der Hämatome und zwar wird sie bestimmt durch die Grösse der Knorpel und durch das Maass der Ausdehnungsfähigkeit der Bedeckungen.

7. Am grössten pflegen sie an den Ohren zu sein, weil bei der Grösse des Organs und der Concavität der einen Fläche eine vollständige Ausstülpung derselben gestattet ist.

8. Weniger gross sind sie an den Nasenknorpeln, da sie nur stellenweise eine Concavität vorstülpen können; am kleinsten sind sie an den Rippenknorpeln, deren convexe Oberfläche eine wesentliche Ausdehnung der Decken nicht gestattet.

Digitized by Google

9. Rhinämatom als Folge von Knorpelgewebsveränderungen kommen am Median- wie an den Seitenwandknorpeln vor.

10. Der Medianknorpel zerbricht dabei; zwischen die Bruchstellen, abgelöstes Perichondrium und Knorpeloberfläche, ev in Spalten des Knorpels ergiesst sich Blut und stülpt die Schleimhaut vor sich her in die Nasenlöcher.

11. Durch directe Dislocation der Bruchstücke, sowie Muskelzug wird bei der Rückbildung die äussere weiche Nase nach innen retrahirt; das Septum bleibt unregelmässig verdickt.

12. Beim Hämatom der Seitenwandknorpel stülpt sich die concave Fläche der Nasenflügel vor.

13. Zwischen den Bruchstellen und Spalten wächst schliesslich gefässhaltiges Bindegewebe.

14. Die Median- und Lateralknorpel werden in ähnlicher Art verändert gefunden, wie die Ohr- und Rippenknorpel: die Grundsubstanz ist stellenweise körnig oder faserig verändert; z. Thl. zeigt sich Proliferation der Knorpelzellen; es sind Höhlen und Spalten gebildet mit erweichtem resp. bindegewebigem und gefässhaltigem Inhalt.

15. An den betr. Kranken bestanden Othämatome vorher, oder sie entwickelten sich mit den Rhinämatomen.

16. Die psychischen Formen sind sogen. secundäre resp. Schwächezustände oder gehen in solche über. Der directe Zusammenhang d. Rhin- u. Othämatome mit der der Psychose zu Grunde liegenden Gehirnkrankheit bleibt dahingestellt; doch ist es bemerkenswerth, dass auch die Rhinämatome als Folgen der sonst sehr seltenen Continuitätstrennungen der Nasenknorpel wieder bei Geisteskranken zunächst beobachtet worden sind.

17. Als Gelegenheitsursachen für Othämatome sind mit Bestimmtheit oder grosser Wahrscheinlichkeit traumatische Einwirkungen während grosser Agitation oder bei Hinfälligkeit der Kranken nachgewiesen.

18. Traumen ähnlicher Intensität dürften indessen bei gesunden Knorpeln nicht die Continuitätstrennung hervorgebracht haben.

19. Ausgenommen ein Fall sind die Kranken unter dem Durchschnittsalter, in dem die gefundenen Gewebsveränderungen als Altersveränderungen zu deuten sind.

20. In zwei Fällen (zu denen mit grosser Wahrscheinlichkeit noch zwei andere gehören) prädisponirt nicht eine Gewebserkrankung des Knorpels die Nase zur Hämatombildung.

21. Die Höhle und der Bluterguss entstehen hier nach Ablösung des Perichondriums vom Knorpel.

22. Die Hämatombildung war in allen Fällen die unmittelbare Folge eines Erysipelas faciei.

23. Durch Uebergang der erysipelatösen Entzündung auf das Septum entsteht eine Perichondritis nasalis.

24. Durch die Perichondritis nasalis wird, wie bei der Perichondr. laryngea ein Kehlkopfknorpel, der Nasenscheidewandknorpel vom Perichondrium und damit von den ihn ernährenden Gefässen getrennt.

25. Der von der ausgetretenen Flüssigkeit umspülte, isolirte Knorpel erweicht bis zum vollständigen Schwund.

26. Durch den Schwund des stützenden Knorpels sinkt bei der Rückbildung des Hämatoms die weiche Nase unterhalb des Knochens ein; das Septum ist nicht verdickt.

27. Zur Behandlung wird die frühzeitige Eröffnung des Hämatoms empfohlen.

Krafft-Ebing, *v.*, Die transit. Störungen d. Selbstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitor. Irrsein in klin.-for. Hinsicht. Erlangen, 1868. gr. 8. 120 S.

Lang, *A.*, Jahresbericht üb. die Landes-Irrenanstalt Steiermarks vom J. 1868. Graz, 1869. 22 S.

Liman, *C.*, Zweifelhafte Geisteszustände vor Gericht. Gutachten erstattet und für Aerzte u. Richter bearbeitet. Berlin, 1869. Hirschwald. 466 S.

Locher, *H.*, Medicinisch-chirurg. Klinik. Vorlesungen üb. sämmtl. Fächer der praktischen Medicin. Bd. II. Klinik der Schädel-, Gehirn- u. Geisteskrankheiten. gr. 8. geh. 2⅔ Thlr. Erlangen, 1869. Enke.

Lombroso, Klinische Beiträge zur Psychiatrie. Physikalische, statistische Studien und Krankengeschichten. Mit Genehmigung des Verf.'s gesammelt und aus dem Italienischen übertragen von Dr. *M. O. Fraenkel*. Leipzig, 1869. Wigand. 202 S.

Meynert, *Th.*, Der Bau der Gross-Hirnrinde u. s. örtlichen Verschiedenheiten. Mit 5 Tafeln. (Sep.-Abdr.). Neuwied, Heuser. 22½ Sgr.

Madelung, *W.*, Ueber die Anwendung der Einreibungen des Ung. Stib. Kali tartarici in die Scheitelgegend in bestimmten Psychosen. Bonn, 1869. 34 S.

Von 19 Fällen 3 Mal Genesung, 5 dauernde Besserung, sechs vorübergehende, 5 Mal keine Reaction. Nie Verschlimmerung.

Digitized by Google

Pauly, *J.*, Das Delirium acutum maniacale. Diss. inaug. Bonn, 1869. 67 S.

8 Fälle aus Siegburg mit Sectionsberichten. Klare Zusammenstellung der Anhaltspunkte für die differentielle Diagnose, Prognose und Therapie.

Preyer, *W.*, Ueber d. Grenzen d. Empfindungsvermögens und des Willens. 4. Bonn, 1868. 16 S. 10 Sgr.

Rüdinger, Die Anatomie d. menschl. Gehirnnerven. München, 1868. 8. IV u. 63 S. u. 13 Taf. 3⅓ Thlr.

Schmidt, *Th.*, Compendium der Nervenkrankheiten. Zum Gebrauche für Studirende u. Aerzte. Leipzig, 1869. 548 S.

Schreber, Aerztl. Zimmergymnastik. Mit 45 Abbild. 12. Aufl. Leipzig, 1869. 1 Thlr.

Schultze, *M.*, Observationes de structura cellularum fibrarumque nervearum. Bonn, 1868. gr. 4. 10 S. u. 1 Taf. ⅓ Thlr.

Stark, *C.*, Die Heilanstalt Kennenburg, ihre Lage, Einrichtungen und Leistungen innerhalb der letzten neun Jahre. Ein Rechenschaftsbericht. Stuttgart, 1869. 39 S.

Mehr als ein einfacher Bericht. Theilt die Ansichten des Verf.'s über Privatanstalten, Restraint, die Stellung des Hausgeistlichen, die psychiatrischen Heilmittel u. s. w. mit. Von 1860—69 wurden 186 Kranke in die Anstalt aufgenommen.

Beschreibung der Hamburger Irrenanstalt Friedrichsberg. Nebst 2 Plänen. Hamburg, 1869.

(Situationsplan und Grundriss des Parterre. Beides genügt nicht, um einen klaren Ueberblick zu bekommen, obwohl man dankbar für jene sein wird.)

Ausländische.

Arthaud, *J.*, De l'état mental des épileptiques au point de vue méd.-légal. Lyon, 1869. 8. 56 pp.

Broca, *P.*, Mémoire sur les crânes des Basques de St.-Jean-de-Luz, suivi de recherches sur la comparaison des indices céphaliques sur le vivant et sur le squelette. Paris, 1868. V. Masson. 83 pp.

Bouchut, *E.*, Cérébroscopie. Des tubercules de la rétine et de la choroïde reconnus à l'ophthalmoscope et indiquant la tuberculose cérébrale. br. in 8° de 32 p. Paris, 1869.

Byasson, *H*, Essai sur la rélation qui existe à l'état physiologique entre l'activité cérébrale et la composition des urines. Paris, 1868. 8. 66 pp.

Campagne, Traité de la manie raisonnante. (Mit Preis gekrönt.) Paris, 1869. Masson. 8. 579 p. 8 Frcs.

Cotard, J., Etude sur l'atrophie partielle du cerveau. Paris, 1868. 103 p. et 2 pl.

Despine, P., Physiologie naturelle. Etude sur les facultés intellectuelles et morales dans leur état normal et dans leurs manifestations anomales chez les aliénés et chez les criminels. Montpellier, 1868. XVIII et 1818 p.

Durand, J. P., La philosophie physiologique et médicale de l'académie de médecin. br. in -8. de 100 pages. 1868.

Förster, E., De l'éclampsie puerpérale. Strassbourg, 1867.

Zunächst spricht Verf. über die Zeit des Auftretens der Eclampsie, Vorkommen von Vorboten, und nach genauer Beschreibung eines Anfalles, über die Prognose, als einer sehr ernsten für das Leben der Mutter, noch viel mehr für das des Kindes.

Es folgen zwei Krankenberichte. Im 1. Fall blieb eine Frau 3 Tage lang, mit geringer Unterbrechung, in Chloroformnarkose, 31 Anfälle mit nachfolgenden sehr bedrohlichen Erscheinungen traten auf. In den ersten Tagen nach der Entbindung wusste die Wöchnerin nicht einmal, dass sie schwanger gewesen sei, erst am 6. Tage erwachte das Gedächtniss. Im anderen Falle trat Eclampsie am Tage nach einem partus praecipitatus auf. Die Wöchnerin benahm sich zuerst wie eine Hysterische, dann folgten in 11 Stunden 12 Anfälle. Eine subcutane Morphium-Injection von 0,005 Grmm. mit vier Blutegel hinter jedes Ohr brachten Heilung. Hier dauerten die nachfolgenden psychischen Störungen nur bis zum 3. Tage.

Giraud, J., Observations statistique sur les aliénés. Nancy, 1868. br. in-8 de 30 p.

Girondeau, L. A., De la circulation cérébrale intime dans ses rapports avec le someil. Paris, 1868. 8. 48 p.

Guérineau, Rapport sur le service de l'asile d'aliénés de Napoléon-Vendée, pour l'année 1869. br. in -8. de 100 p.

Van Hobscheck, H., De l'influence de choléra sur la production de la folie. br. in 4. de 12 p. Bruxelles, 1868.

—, *Aphonie*, traitement par l'électricité localisée. br. in 8 de 13 p. Bruxelles, 1869.

Hospital, Rapport sur l'asile d'aliénés Sainte-Marie, de Clermont-Ferrand, pour l'année 1867. br. in 8. de 24 p.

Ingels, B. C., Folie dissimulée, observations cliniques. br. in 8. de 15 p. Gand, 1868.

Digitized by Google

Lagardelle, F., Des accidents convulsifs dans la paralysie générale progressive. br. in 4. de 102 p. Paris, 1869. 3 Frcs.

— —, De l'orgueil et de la folie. br. in 32. de 30 pages. Paris, 1869.

Legrand du Saulle, Prognostic et traitement de l'épilepsie. Succés remarquables obtenus par l'emploi du bromure de potassium à haute dose. Paris, 1869. Savy. 8. 31 p. 1 Frcs. 50 Ct.

Grosse Dosen von 4—5 Grmm. p. d. länger als 4 Jahre.

Lunier, L., Etudes sur les maladies mentales et les asiles d'aliénés. De l'aliénation mentale et du cretinisme en Suisse. Paris, Savy. 5 Frc.

Morel, Analogies entre les dégénérescences intellectuelles, physiques et morales des habitants des contrées paludéenes et celles des habitants des pays goîtrigènes. Paris. br. in 4. de 24 pages. 1868.

de Neufbourg, Ph., Origine et formation des actes intellectuels et instinctifs de l'homme. La Flèche, 1868.

Paz, E., La santé de l'esprit et du corps par la gymnastique. Paris, 1868. 18. 140 p. 1 Frc.

Poincaré et *Bonnet, H.*, Recherches sur l'anatomie pathologique et la nature de la paralysie générale. In 8. Paris. Masson. 2 Frcs.

Rudanowsky, P., Etudes pathologiques sur le système nerveux de l'homme et de quelques animaux supérieurs d'après les coupes de tissu nerveux congélé. Avec Atlas de 20 pl. cont. 203 photograph. Paris, 1868. 8. 60 p. Atlas in Fol.

Nach mit dem Doppelmesser gemachten und frisch einer Temperatur von —6° R. ausgesetzten Durchschnitten. Die ersten 10 Taf. enthalten makroskopische Photographieen, der zweite Theil mit *Hartnack*'schen Objectiven vorgenommen.

Semelaigne, Etude histor. sur l'aliénation mentale dans l'antiquité. Ime partie. Paris, 1869. 288 p.

Senhert, St., Les aliénés: lettre à un deputé. br. in 18 de 48 p. Paris, 1869, chez Farne.

Bain, J., The senses and the intellect. 3. edit. 8 vo. 1868. 15 s.

Blanford, G. F., Insanity without Delusion. Lewes, 1869.

Gray, P., Annual address before the medical society of the state of New-York, Febr. 5, 1868, Utica 1868. 30 p.

(Weist die innigen Beziehungen der Geistesstörungen zur Medicin im Allgemeinen und deren Bedeutung als Störungen des Central-Nervensystems insbesondere nach und erörtert ihre Bedeutung für die klinische Verwerthung.)

Kirkbride, Th., Report of the Pensylvania hospital for the insane, for the year 1868. br. in 8° de 60 p. Philadelphia, 1869.

Twelft annual report of the trustees of the state lunatic hospital at Nordhampton. Oct., 1867. Boston, 1869 (von Pling Earle mit Grundriss).

Eleventh annual report of the General Board of Commissioners in Lunacy for Scotland. Presented to both Houses of Parliament by Command of her Majesty. Edinburgh, 1869. Constable. 310 p. 1 Sch. 8 P.

Twenty-Sinth annual report of the managers of the state lunatic asylum for the year 1868. Albany, 1869. 48 p.

Mit Grundriss der Anstalt. Unterhaltungskosten 199,273 Doll., darunter für Gehälter und Löhne 42,319, für Verpflegung 66,316, Beleuchtung 10,897, Medicin 4,137, Kleidung 13,362, Wasser 2,151. — Bestand im Anf. des Jahres 603 (310 M., 293 W.), aufgenommen 382 (207 M., 175 W.), durchschnittlich in Behandlung 589. Entl. geheilt 157 (80 M., 77 W.), gebessert 85 (49 M., 36 W.), ungeheilt 105 (65 M., 40 W.), nicht geisteskrank 10 (6 M., 4 W.), gestorben 58 (33 M., 25 W.). Blieb Bestand 570 (284 M., 286 W.). — Seit Eröffnung der Anstalt im Jahre 1843 wurden aufgenommen 8,762, entl. 8,192.

The Second annual report of the Surrey County Lunatic Asylum at Brookwood. 1869.

The report of the resident medical superintendent of the Richmond district Lunatic Asylum, Dublin, for the year 1868. Dublin, 1869.

The Seventh Annual report of the Cumberland and Northumberland Lunatic Asylum for 1868. Carlisle, 1869.

The Twenty-third Annual Report of the Devon Lunatic Asylum. Exeter, 1869.

The Report of the Nordhampton General Lunatic Asylum, from Jan. 1868 to Dec. 1868. Northampton, 1869.

St. Luke's Hospital for Lunatics. Established 1751. Reports for the Year 1868. London, 1869.

The Thirteenth annual Report of the State of the United Lunatic Asylum for the County and Borough of Nottingham for 1868. Lonthwell 1869.

The Fourth Annual Report of the Newcastle-upon-Tyne Borough Lunatic Asylum for 1868. Newcastle-upon-Teyne, 1869.

The Nomenclature of diseases drawn up by a joint committee appointed by the royal college of physicians of London. London, 1869. 327 p.

Digitized by Google

Gaskill and *Nairne* (commissioners in lunacy) vertraten in der Commission die Irrenärzte. Unter den functionellen Störungen d. Nervensystems werden unt. Anderem eingereiht Nr. 93 Epilepsie, 99 Hysterie, 103 *del. trem.*, 104 Hypochondrie.

Unter affectus mentis steht Nr. 105 Manie, eingetheilt in akute und chronische, Nr. 106 Melancholie, Nr. 107 Dementia und zwar acute und chronische, Nr. 108 Dementia paralytica, Nr. 109 Idiotie und Nr. 110 Blödsinn (angeborener).

Robertson, L., Sussex county lunatic asylum, Haywards Heath; tenth annual reports for 1868. br. in 8. de 70 p. Lewes, 1869.

Robertson, C. L., The alleged increase of lunacy. br. in 8. de 23 p. Londres, 1869.

Forlani, F., L' Isterismo nei suoi rapporti colla follia e colla responsabilita. Memori medico legali. gr. 8. 12 Bogen. Wien, Manz. geb. 1 Thlr. 10 Sgr.

Gianelli, G. L., Sulle cause che Escludono o Diminui scomo la imputabilita secondo il progetto di cordice penale diramato nell' agosto 1867. Milano, 1867. 120 p.

— —, Sulle cause fondamentali di incapacita criminale state ritenute nell' ultimo progetto di cordice penale del regno. Padova, 1868. 31 p.

Grilli, P., Del manicomio fiorentino; Tavole ed annotazioni statistiche compilate. br. in 8. de 56 p. Florence, 1869.

Miraglia, B. G., Le amministrazioni dei manicomi. br. in 8. de 20 p. Caserte, 1869.

Lombroso, C., Azione degli astri e delle meteore sulla mente umana sana ed alienata. Milan, 1868. br. in 8. de 120 p.

Rendiconto del Manicomio di Trieste per il Quinquennio 1863—1867. Trieste, 1869. 74 p.

Sannicola, G., La Clinica delle malattie mentali nella R. Universita di Napoli. br. in 8. 24 p. 1868.

---

2. *Psychiatrisches in nicht-psychiatrischen Zeitschriften.*

Deutsche.

Brück, Schwindelangst (Aura vertiginosa). — Deutsche Klinik, 1869. Nr. 5.

Caspari, Ueber den Einfluss von Uteruskrankheiten auf die Psychose. — Deutsche Klinik, 1869. Nr. 12.

In beiden Fällen rasche Heilung nach Beseitigung des Uterusleidens.

Conradi, S., Ueber die Sprache der Irren. — Wien. med. Ztschr. XVIII. 70. 1868.

Diberg, Vergift. des Arztes *Desiderief* durch den Arzt *Vengrjanowski*. — Arch. f. ger. Med. in Russland. 1868. 4. Jahrg. 4. Hft.

Der Thäter litt zur Zeit der That an *Dem. paral.* Dennoch wurde er verurtheilt und nach Sibirien in die Bergwerke verbannt.

Friedlowsky, A., Ueber Verengerung des for. magnum und des Anfanges des can. vertebralis. — Wien. Jhrb. XV. p. 240. 1868.

2000 Schädel wurden untersucht, Angeborene Verengerungen in 7 Fällen: 2 bei normaler Beschaffenheit der Kopfgelenke, 5 bei Synostose von Atlas und Hinterhauptsbein. Verengerungen des for. magn. durch Vorgänge im Extrauterinleben, drei Mal: 2 Mal durch Caries, 1 Mal durch Neubildung.

Fronmüller, G. und *Kersch, S.*, Ueber Narcein als hypnoticum. — Memorabilien XIII. 3 u. 7. 1868.

Das Mittel verdient das Lob nicht.

Gehewe, Ertravagante Erscheinungen der Nahrungsaufnahme bei den Geisteskranken. — Pet. med. Ztschr. XIV. S. 287.

Glatter, Ueber die Zurechnungsfähigkeit von Verbrechern. — Wien. med. Presse IX. 49.

Henle J. und *F. Merkel*, Ueber die sog. Bindesubstanz der Centralorgane des Nervensystems. — *H.* und *Pf.*'s Ztschr. f. rat. Med. 3. Reihe. XXXIV. 1. S. 1849.

Hoffmann, E. K., Ueber Heterotopie von grauer Hirnsubstanz. — *H.* und *Pf.*'s Ztschr. f. rat. Med. 3. Reihe. XXXIV. 1. S. 104.

— —, Beitrag zur Kenntniss der Geschwülste des Gehirns und Rückenmarks. — *H.* und *Pf.*'s Ztschr. XXXIV. 179—193.

3 Fälle. Im Einen nach 14 J. Geistesstörung, Tod mit Dementia. Verdrängung beider Hemisphären durch eine Geschwulst der *Dura mater*. Im 2. Falle Frau von 67 J., mit Lähmung und psychischer Störung in Folge von Geschwulst an der Seite der Basis. Im 3. Fall Frau von 43 J., mit erheblicher Geistesstörung, tabetischem Gange und Hyperästhesie der Beine. An der Seite der Falx ein kirschkerngr. Psammoma und in *Dura mater spin.* zahlreiche lappige Wucherungen.

Kohlschütter, E., Zur Mechanik des Schlafes. — *H. Pf.*'s Ztschrft. f. rat. Med. 3. Reihe. XXXIV. 1. S. 42.

v. Krafft-Ebing, Beiträge zur forensischen Casuistik der Seelenstörungen. — *v. Horn*'s Vtjschr. 1869. Juli.

Ermordung einer Frau und eines Kindes in dämonomanischem Wahnsinn. — Mord der Ehefrau in religiösem Wahnsinn wegen vermeintlicher ehelicher Untreue. — Ermordung der Ehefrau. Chronischer Alkoholismus. Verfolgungswahnsinn.

Leidesdorf, *M.*, Ueber d. Psychiatrie in älterer u. neuerer Zeit. — Wien. med. Ztschr. XVIII. 91—94.

— —, Diagnose u. Behandlung d. paralytischen Geisteskrankheit. — Wien. Wochschr. 1869. Nr. 3.

Maschka, Ist der Angabe der *A. H.*, dass sie vor 7 J. ihre Schwester ertränkt habe, Glauben zu schenken oder nicht? — Vtjschr. f. ger. Med. Bd. X 2. Heft, S. 262.

Nach schwerer Gehirnaffection im 9. J. blieb die betr. Person geistig schwach, litt an petit mal, blieb nicht consequent in der Selbstanklage, die früher nie sich äussert, machte einen Selbstmordversuch und klagte sich in dieser Zeit an. Die Annahme ist daher begründet, dass die Selbstanklage auf einer irrigen Vorstellung beruht.

Massmann, Ueber Errichtung von Districts-Irrenhäusern in Russland. — Deutsche Klin. 40. 1868.

Meynert, *Th.*, Ueber den Bau der Grosshirnrinde und seine örtl. Verschiedenheiten. — Wien. med. Jhrb. XVII. 1. S. 13. 1869.

Miklucho-Maclay, Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Gehirns. — Jen. Ztschr. f. Med. IV. 3 u. 4. S. 553.

Money (in London), *A*, Ueber die Verabreichung von Nahrung u. Medicamenten durch die Nase, wenn sie durch den Mund nicht möglich ist. — Wien. med. Wochschr. Nr. 39. 1869.

Fütterung durch die Nase. Ein Trichter wird in die Nase des hingelagerten und festgehaltenen Kranken geführt und nach und nach Flüssigkeit hineingegossen.

Paulicki, Geistesstörung nach Variola. — Memorab. XIII. 6.

Ripping, *L. H.*, Ein Fall von angeborenem Herzfehler bei einem Epileptischen. Mit 1 Tafel. — *H.* und *Pfeufer*'s Ztschr. 1869. 1. Heft.

Roth, *M.*, Zur Frage von der Bindesubstanz in d. Grosshirnrinde. — *Virch.* Arch. XLVI. 243—48.

Vrf. deutet die perivasculären Radiärfasern in der Grosshirnrinde als ein Lymphreticulum allerfeinster Art, worin die Blutgefässe aufgehängt sind.

Schiel, *J.*, Beiträge zur Electrotherapie. — Deutsch. Arch. f. klin. Med. 5. Bd. 2tes Heft.

Eine Dame litt seit einer Reihe von Jahren an heftigen Anfällen von Kopfweh mit Schwindel und Erbrechen. Von

der gewöhnlichen Migräne dadurch verschieden, dass Pat. nach Ablauf der Anfälle sich nichts weniger als wohl befand; litt beständig an starkem Sausen im r. Ohr. Nur bei gehöriger Unterstützung vermochte sie eine kurze Strecke weit zu gehen, fehlte diese, so wurde sie von Schwindel erfasst u. vermochte sich nicht aufrecht zu erhalten. Nach 20 Sitzungen mit Kopf- und Sympathikus-Strömen wesentliche Besserung. Dann nur noch 2 leichte Necker. Nach 46 Sitzungen (innerhalb ¾ Jahres) geheilt.

Schlager L., Ueber die Feststellung der Prognose bei psychischen Störungen. — Wien. med. Jahrb. XVI. S. 133.

Seydel, Ueber den Zusammenhang zwischen Zurechnungsfähigkeit und Eclampsia parturientium. — *v. Horn*'s Vtjschr. Neue Folge. Bd. IX. Heft 2. S. 317.

Folgende Schlüsse: 1) Eclampsie und Geistesstörung kommen schon in der Schwangerschaft neben einander vor und können zur Unzurechnungsfähigkeit führen. 2) Während der Geburt, der besonders den Anfällen ausgesetzten Zeit, fehlt in den Intervallen und oft längere Zeit bis zu 10 Tagen die gesetzliche Zurechnungsfähigkeit. 3) Nachdem Personen, die daran gelitten, die Besinnung wieder erlangt haben, sind sie der akuten Manie mehr als andere Wöchnerinnen ausgesetzt. Als occassionelle Momente sind schwere Localerkrankungen und Gemüthsbewegungen zu betrachten.

Sommer, E., Theorie des Schlafes. — *Henle*'s Ztschr. XXXIII, 2. und 3. S. 214.

Walser, E., Die Zurechnungsfähigkeit eines Brandstifters. — Würt. Corr.-Bl. XXXVIII. 31. 32.

Weisbach, A., Der Wassergehalt d. Gehirns nach Alter, Geschlecht und Krankheiten. — Wien. med. Jhrb. XVI. S. 46.

Muttermord aus religiöser Manie. — Oesterr. Ztschr. f. Heilk. XIV. 31. 32. 33.

Irrenfürsorge, öffentl., Zur Frage über dieselbe. — Oesterr. Ztschr. f. ger. Heilk. XIV. 34.

Ausländische.

Allbutt, T. Clifford, Ueber den Zustand der optischen Nerven und der Retina bei Irren. — The Amer. J. of med. sc. 1869. Jan. p. 273. Med. chir. Transact. t. 1. p. 97.

Verf. giebt darin an, dass er zuerst sich veranlasst fand, ophthalmoskopisch „die als Paralysis generalis“ bekannte

Digitized by Google

Form von Irresein zu untersuchen. Er that es in der Voraussetzung, pathische Zustände in den Gefässen der Retina zu entdecken, und zwar ähnlich jenen, wie sie als in den Blutgefässen des Gehirns stattfindend bei dieser Krankheit, beschrieben werden. Dieses war jedoch nicht der Fall; sondern vielmehr fand er eine andere pathische Veränderung; nemlich Atrophie des Sehnerven war der ständige Befund. Nachdem der Vf. einmal begonnen hatte, optische Untersuchungen bei Irren anzustellen, fühlte er sich gedrungen, dieselben fortzusetzen. Die bedeutende Anzahl der Fälle, in welchen sich mehr oder weniger grosse pathische Veränderungen vorfanden, flössten ihm Vertrauen ein, seine Beobachtungen als mittheilungswerth zu veröffentlichen. Er hoffte, dass vermittelst des Ophthalmoskops ein weiteres Streben sollte angeregt werden, um das Studium der Geistesstörungen auf eine positive Basis zu stellen. Ein Irrenhaus ist auch in der That ein Museum von Hirnkrankheiten — und die directe Beobachtung eines Gehirnsprösslings, wie der Sehnerven-Apparat, mag allerdings in solchen Fällen von hohem Werthe sein; denn sie vermag nicht allein als Mittel zu dienen, um zwischen Structur- und Functionsstörung zu entscheiden; sondern sie kann auch zur Erklärung von Structur- und Functions-Veränderungen dienen. Vf. zieht nun vor und zwar aus mehreren Gründen, diese Fälle vielmehr im Einklang mit einer Classification der mentalen Krankheiten, als im Zusammenhalte mit der supponirten Entstehung und Natur von Läsionen zu rubriciren. Die Fälle selbst sind hauptsächlich dem West Riding Asylum zu Wakefield, einige dem North und East Riding Asylum zu Clifton nächst York entnommen. Im Ganzen untersuchte er 114 Fälle.

1) Paralysis generalis. Vf. untersuchte 53 Fälle. Er fand in 41 derselben entschiedene Krankheit des Sehnerven, 7 derselben liessen es zweifelhaft und 5 zeigten sich normal. Er folgerte daraus: a) dass fast in jedem Falle von allgemeiner Lähmung Atrophie des Sehnerven statt hat und gewöhnlich auch von Atrophie der Riechnerven begleitet ist; b) dass sie nur gegen Ende des ersten Stadiums zu erkennen ist, indem sie langsam von den Centren der Sehnerven ausgeht; c) dass sie als blassrothe Suffusion des Nerven beginnt ohne besondere Stasen oder Exsudation, und als einfache weisse Atrophie endet. Vf. vergleicht diesen Process mit der sogenannten roth- und weissen Hirnerweichung; d) dass die Atrophie des Nerven sich in keinem constanten Verhältnisse zur

Digitized by Google

Ataxie der Orbita-Muskeln befindet; e) dass sie sich dagegen darstellt in Beziehung mit dem Zustande der Pupille, welche während der ersten Stadien contrahirt erscheint und erweitert im Stadium vollendeter Atrophie; f) dass, da das Symptom sich nicht sehr frühzeitig einstellt, es wahrscheinlich wenig diagnostischen Werth hat, während dessen pathologische Bedeutung wahrscheinlich sehr gross ist.

2. Manie. Vf. bringt hievon 51 Fälle vor. In 25 derselben fanden sich vermittels des Ophthalmoskops symptomatische Veränderungen vor, 13 derselben sind als zweifelhaft bezeichnet und 13 zeigten sich als vollkommen gesund oder wiesen keine symptomatischen Verletzungen nach, wie glaucom u. s. w. Vf. entnahm aus seinen Beobachtungen: a) dass das Ophthalmoskop in einer grossen Zahl von Manien symptomatische Veränderungen enthüllt; b) dass diese am gewöhnlichsten vorhanden sind, wo andere Symptome organischen Leidens bestehen, nur dass sie nicht selten von Meningitis abhängig sind; c) dass nach einem Paroxysmus von Manie eine Lähmung der Blutgefässe in der Scheibe und um sie herum hinterbleibt, deren Folge wahrnehmbare Hyperämie ist; d) dass während des Paroxysmus vielleicht ein Krampf besteht in den Blutgefässen, wie eben eine Beobachtung ihm nachgewiesen hatte; e) dass die ständigen Veränderungen Stase, consecutive Atrophie, einfache Atrophie oder solche Zustände gemischten Charakters sind.

3) Dementia. Unter 38 Beobachtungen fand Vf. in 23 Fällen Krankheiten des Sehnerven oder der Netzhaut ausgesprochen, 6 davon waren zweifelhaft und in 9 Fällen fand gesunder Zustand statt. Viele dieser Fälle erkannte er als von organischen Leiden abhängig. Vf. glaubt, dass bei einfacher acuter Dementia, selbst wenn sie tief begründet ist, keine optische Veränderung stattfindet.

4) u. 5) Melancholie und Monomanie. In 70 Fällen zeigten nur 3 Augenleiden. Wenige dieser Fälle hingen von organischen Leiden ab. Man fand gewöhnlich Anämie der Netzhaut, wenigstens bei Melancholie.

6) Geistesstörung von Epilepsie abhängig. Unter 43 Fällen fand sich Kranksein des Sehnerven oder der Netzhaut, 9 davon waren zweifelhaft und 19 zeigten gar keine Veränderung. Erkrankung des Sehnerven ist nicht selten Folge von Epilepsie. Die meisten Fälle, welche optische Verände-

Digitized by Google

rungen erkennen liessen, bekundeten organische Leiden, durch andere Symptome erkennbar.

7) Idiotie. Vf. hatte vorgängig Amaurose bei Idioten bemerkt. Er unterzog 12 Fälle seiner Untersuchung, bei 5 fand er Atrophie der Scheiben. Er warf die Frage auf, ob dieser Atrophie-Befund abhängig sein möchte von encephalischen Entzündungen in der Kindheit. *Ullersperger.*

Allison, A., Ueber nächtliche Geistesstörung. — Med. Tim. and Gaz. Aug. 22. 1868.

Anstie, F., Ueb. Behandl. d. epileptiformen Neuralgie in ihren früheren Stadien. — Lancet I. 2, Jan. 1869.

Bastian, H. C., The plugging of minute vessels in the grey matter of the brain, as a cause of the delirium and stupor etc. — Brit. med. Journ. Nr. 421. 422. 1869.

Bei der mikroskop. Untersuch. einiger kl. Blutgef. u. Kapillaren aus der grauen Subst. der Windungen bot jedes Präparat kleine embol. Massen in verschied. Theilen des lumen der kl. Art. u. Capill. von einer meist deutl. Beschaffenheit dar, doch augenscheinl. frischen Ursprungs. Man konnte getrennte Massen v. unregelm. Gestalt u. Sitz wahrnehmen, entstanden durch Zusammenballung v. weiss. Blutkörperchen. An einigen Stellen war es eine dünne Masse, nur durch Vereinig. v. 3 oder 4 weissen Blutkörp. gebildet; an anderen konnte man br. unregelm. gestaltete Vereinigungen innerh. einiger v. d. dickern Gefässen sehen, die wohl durch gegenseit. Anhängung von 2—300 solcher Körperchen entstanden sein mochten. Die breitesten Massen waren nach Messung $\frac{1}{100}$'' l. und $\frac{1}{330}$'' br. An andern Stellen zeigten sich br. rundl. Körper, deren Natur bei der ersten Besichtigung nicht so klar war, doch erkannte man bei genauerer Prüfung bald, dass diese sich mit aller Wahrscheinlichkeit durch vollst. Verschmelzung von Körperchen in eine Masse gebildet hatten, die darnach mehr oder weniger durch körnige Entartung untergegangen war. Dazwischen gab es alle möglichen Uebergangsstufen. An einigen Stellen war die Masse der weissen Blutkörperchen in die dünnen Arterien und Capillaren nach Art wirklicher Emboli eingestopft und die Gefässe dahinter waren mit Blut angefüllt. In sehr vielen Gefässen aber konnte man in den Gefässen Massen sehen, die zu schmal waren, um verschliessen zu können. Die Gefässe aller Theile der gr. Gehirnwindungssubst. zeigten ähnliche verschliessende Massen im Innern. Dr. *Sch.*

de Berdt Hovell, Ueber Neurosen, in Folge moral. Erschütterungen entstanden. — Lond. Hosp. Rep. IV. p. 464. 1868.

Bergeon, L., u. *Ch. Kastus*, Anapnograph, Apparat zur Verzeichnung d. Respirationsbewegungen. — Gaz. hebd. 2. Ser. V. 37. 39. 40. — l'Union 111.

Bizzozero, G., Sul parenchima della gliandola pineale. — Gazz. med. Ital. Lomb. Ser. VI. Tom. I. 1868.

Die Zirbeldrüse ist von dünner Bindegewebskapsel eingeschlossen, woraus ins Parenchym die Blutgefässe treten und zu dichtem Capillarnetze sich auflösen, in denen Zellen mit Fortsätzen gebettet liegen.

— —, Di alcune alterazioni dei linfatici del cervello e della pia madre. — Estratto dal giornale la Revista clin. Bologna 1868. p. 16.

3 Autopsien, bei denen Affectionen der perivasculären Lymphräume der Pia mater und des Hirns nachweisbar waren.

Bouchard, Ch., La question des Aliénés et la loi de 1838. — Gaz. hebd. 1868. Nr. 49.

Bis jetzt herrschte die Krankenhaus-Behandlung (système nosocomial) vor, deren Einrichtung Vf. in einem früheren Artikel besprochen.

Er will über die Aufzunehmenden sprechen, die Art der Aufnahme besprechen, Aufnahme- und Entlassungsbestimmungen und Sicherung Geistesgesunder gegen Irrthum und Betrug.

In den Departements steht die Präfectur an der Spitze, in Paris die Polizei-Präfectur.

Die unschädlichen Geisteskranken, die im Zustande der Landstreicherei leben, bleiben oft in Freiheit, der Bettelstab sorgt für ihren Unterhalt. Wo die Bettelei verboten, kommen sie in Armenhäuser. Ein grosser Theil jedoch durch Vermittelung zur Wohlthat der Asyle.

Sind diese landstreichenden Irren gemeingefährlich, so bringt sie die Order des Präfecten in das Asyl.

Dann giebt es Irre ohne Familie, aber mit einigen persönlichen Mitteln. Wenn gemeingefährlich, wird ihre Sequestration herbeigeführt, und sie in ein öffentliches oder Privat-Asyl je nach ihren Mitteln gebracht. Wenn diese sich herumtreibenden, aber familienlosen Irren nicht gemeingefährlich sind, bekümmert sich Niemand um sie. Kommen dann bei Einigen freilich Zeiten, wo sie eine Behandlung wünschen möchten, können sie nach unseren Gesetzen keinen Zutritt zu einem Asyl erlangen.

Digitized by Google

Begeht ein gefährlicher Kranker eine schlimme Handlung, so kann er keine Verantwortlichkeit auf sich laden, wenn das Irresein vom Gericht anerkannt ist. Hat er eine Familie, so ist diese nur verantwortlich, wenn zwar seine Geisteskrankheit ausgesprochen, er aber nicht sequestrirt ist; man kann aber in keinem Falle die Familie verfolgen, wenn sie die Interdiction oder Sequestration nicht veranlasst hat.

Wenn dennoch ein gemeingefährlicher Kranker in der Familie lebt, kann er durch Familienbeschluss in ein Asyl gebracht werden. Ist er unvermögend, so kann ihn der Präfect in ein Departements-Asyl zulassen.

Wird ein Gefangener und nach Anklage Verurtheilter in seinem Gefängnisse irre, so bringt man ihn in das Departem.-Asyl. Nach seiner Genesung kommt er bis zur Abbüssung seiner Strafe wieder ins Gefängniss zurück. Ist der Irre aber nach Ablauf seiner Strafzeit noch nicht geheilt, so kann er entweder in seine Familie zurückgenommen oder in ein anderes Asyl untergebracht werden. — Ist ein Angeklagter vom Gericht für geisteskrank erklärt und unter Curatel gestellt und er genest in einem Asyle, so muss von dem Tage ab, von dem der Arzt das Zeugniss der Genesung ausstellte, der Präfect die Freigebung bewirken. — In einzelnen Asylen giebt es noch besondere Abtheilungen für gefangene Irre, die ein wahrer Schandfleck (flétrissure) für diese Asyle sind. —

Aufnahme in die Asyle, zunächst in Paris:

Die gewöhnlichen Polizei-Agenten bringen alles, was sie aus irgend einem Grunde aufgreifen, nach der Polizei-Präfectur. Dort ist eine Abtheilung für die Irren. Dorthin kommen direct die Irren, die mit einem ärztlichen Zeugniss versehen sind, oder die Recidive, die schon in einem Asyle waren, wo die unbemittelte Familie auf ein Zeugniss von dem die Polizeipräfectur besuchenden Arzte hofft, denn innerhalb 24 Stunden muss jeder dort befindliche Kranke von einem Arzte untersucht werden. Die ärztlich für Irre Befundenen werden an demselben Tage nach dem Aufnahme-Büreau befördert, das in Verbindung mit dem Asyl St. Anne steht. Die zweifelhaften Fälle können länger, bis zu 14 Tagen, auf der Polizei-Präfectur bleiben, um wiederholt untersucht zu werden. — Die Art des Transportes nach dem Aufnahme-Büreau ist höchst mangelhaft und lässt sehr viel zu wünschen übrig; mancher ist deshalb auf dem langen Wege dahin gestorben oder bald nachher erlegen. Aerztliche Ueberwachung wäre hier vor allen Dingen nöthig!

by Google

Nr. 52. Ausser der angeführten Art der Aufnahme können auch die Maires in den Departements und die Polizei-Commissare zu Paris, wo Gefahr im Verzuge, die Kranken direct nach dem Aufnahme-Büreau senden. Aber auch Familien, die von den Commissaren abgewiesen wurden, aber der Pflege ihres Irren sich nicht unterziehen wollen, dann auch solche, die die Kosten einer Volontairstelle tragen wollen, kommen direct mit ihren Kranken zum Aufnahme-Büreau, mit dem Zeugniss eines Arztes, der nicht in der Anstalt oder verwandt ist, sowie mit den nöthigen Papieren zur genauen Erkennung des Kranken.

Die Ankunft der Irren von der Polizei-Präfectur zum Aufnahme-Büreau ist für sie mit einer grossen Erleichterung verbunden, man nimmt ihnen die Bande ab, badet sie und kleidet sie wohl auch neu. Alles ist hier geschmackvoll und zweckmässig eingerichtet. Die Aerzte auf dem Aufnahme-Bureau fertigen sofort für jeden Kranken ein Zeugniss aus, das innerhalb 24 St. in den Händen der Polizei-Präfectur sein muss.

Nach der ersten vorläufigen Prüfung werden die Kranken nach den verschiedenen Abtheilungen der Aufnahme-Büreaus verwiesen. Es bestehen zwei solche entsprechende Haupt-Abtheilungen, für jedes Geschlecht je eine. Jede derselben hat in ihrem Erdgeschoss 5 Abtheilungen für Epileptiker, Idioten, Blödsinnige, Halbruhige, Ruhige. Damit verbunden sind 2 Zellen für kurzen Aufenthalt der Unruhigen. Jede Hauptabtheilung enthält noch eine Infirmerie mit 5 Betten und 1 Isolirzimmer für contagiöse Krankheiten. — Von hier werden die Kranken, wo ein Irrthum in der Diagnose sich zeigte, nach anderen Krankenhäusern oder ihren Familien, sobald es thunlich, zurückgebracht. Irre bleiben oft bis zu ihrer Heilung hier, wenn es nicht für statthaft gehalten wurde, den Transport nach einer andern Heilanstalt des Seine-Departements vorzunehmen. — So kann das Aufnahme-Büreau 30 Personen aufnehmen, und im Nothfalle, mit Heranziehung der Infirmerie und der Isolirzimmer, 42. Das wird aber bald nicht mehr ausreichen, denn wenn manchen Tag auch nur 2 oder 3 Kranke aufgenommen werden, so kommen doch Tage vor, wo man 18 und selbst 20 aufnimmt. Vom 1. Mai 1867 bis dahin 1868 betrug die Zahl 2432, Tagesmittel also 6,64. Vom 1. Mai 1868 bis 1. Oct. 1868 aber 1162, also für den Tag 7,66.

Die für geisteskrank erkannten, aber nicht mit einer *intercurrirenden* Krankheit behafteten werden sofort den verschiedenen Anstalten des Seine-Departements zugetheilt. Die acuten

Digitized by Google

Fälle kommen nach St. Anne, der eigentl. Heilanstalt, die subacuten und die Convalescenten nach Ville-Évrard und auch nach Vaucluse. Alle an Blödsinn und Schwäche Leidenden kommen nach Bicêtre und der Salpétrière.

Nach eingetretenen Veränderungen im Krankheitsverlaufe können die Kranken nach dem Aufnahme-Büreau zurückgebracht werden, und nach einer neuen ärztlichen Prüfung werden die Reconvalescenten von St. Anne nach Vaucluse oder Ville-Evrard geschickt, die an Demenz Leidenden aus diesen Asylen und auch von St. Anne nach Bicêtre und der Salpétrière. Von St. Anne nach Vaucluse oder Ville-Evrard werden die Reconvalescenten besonders aus dem Grunde geschickt, damit sie die Wohlthaten d. système colonial kennen lernen. Denn das Asyl Vaucluse nimmt 180 Hektaren ein, das von Ville-Evrard aber 300 und mit beiden stehen Meiereien in Verbindung. — Wie den in Freiheit gesetzten der Zugang zu den passenden Lebensstellungen mehr erleichtert werden könne, ist noch eine offene Frage. — Die Asyle des Seine-Departements nehmen aber nicht blos Unbemittelte auf, sondern auch Bemittelte, die aber ohne jeden Unterschied mit ihnen zusammen behandelt werden. Nur mit Ville-Evrard wird ein Pensionat verbunden, und das ist für die Mittelklassen dringend nöthig, die mehr durch ihre äussere Lebensstellung als durch ihre Einnahmen etwas gelten. — Endlich noch eine Neuerung, die darin besteht, dass auch gewisse Geisteskranke poliklinisch vom Asyl St. Anne aus behandelt werden können. — Zu erwähnen ist auch noch, dass in St. Anne Art. 34. der Königl. Botschaft vom 18. Dez. 1839 verletzt ist, demzufolge in den Asylen Männer nur von Männern und Frauen von Frauen gepflegt werden sollen.

Von den drei Arten der Behandlung der Irren, dem système famial, système colonial, système nosocomial, ist das letztere in Frankreich vorherrschend geblieben, trotz mancher Angriffe. Das système colonial ist nur in Verbindung mit dem système nosocomial zu empfehlen. Die näheren Erörterungen über beide Systeme bieten nichts Neues. Der Behandlung in den Familien endlich spricht er am Wenigsten das Wort, trotz Gheel. Die Colonie von Gheel in seiner jetzigen Gestalt sieht er nur für das Weichbild eines Irrenasyls an. Das système nosocomial muss das herrschende aber nicht das ausschliessl. System bleiben. — Der Hauptvorwurf der Gegner der Asyle und des Gesetzes v. 1838 ist der, dass willkürliche Freiheitsberaubungen

durch sie möglich wären. Aber selbst mit den Mängeln, die Vf. bespricht, hält er das Gesetz von 1838 bei einer ehrlichen und intelligenten Anwendung für ein gutes. Man muss aber fordern, dass Diejenigen, die mit der Irrseins-Erklärung von Personen betraut werden, sowohl wissenschaftliche Befähigung als moral. Tüchtigkeit besitzen, im Uebrigen darf man sie aber nicht in zu enge Grenzen zwingen. Dr. *Schroeter.*

Brierre de Boismont, Suicide de Labouche, accusé d'assassinat et reconnu aliéné par la chambre des mises en accusation de la Cour impériale de Paris. — Ann. d'hygiène publ. 2 Sér. T. XIX.

Brown-Séquard, Ueber die verschiedenen Arten der Leitungen für Gefühlseindrücke im Rückenmark. — Arch. de Phys. I. 5. S 610. Sept. et Oct. 6. p. 716.. Nov. et Dec.

Campo, H., Ueber die Leidenschaften. — El Siglo med. 759. 760. Julio, 1868.

Charcot, Ueber die Temperatur d. centralen Theile bei Apoplexie mit Hirnblutung und Hirnerweichung. — Gaz. de Paris. 6. p. 76. 1869.

Dumontier, Ueber die Schlafkrankheit unter den Negern an der Westküste Afrika's und auf d. Antillen. — Gaz. de hop. 120.

Dunn, R., Ueber Aphasie, mit Bezug auf deren centralen Ursprung. — Brit. med. J. Jan. 30. 1869.

Ferrand, La migraine. — Son siège anatomique. — Efficacité du bromure de potassium. — Union méd. 3. Série. T. V.

Hochling, A., Hysterie b. Manne. — Phil. med. and surg. Rep. XIX. 15. p. 309. Oct.

Huxley, Ueber die Schädelform b. d. Patagoniern u. d. Fungianiern. mit Bemerk. über amerik. Schädel überhaupt. — J. of Anat. and Phys. 2 Sér. II. S. 253. May.

Jackson, S., Ueber Bewusstsein und Fälle sogen. Doppelbewusstseins. — Amer. Journ. of the med. Sc. f. Januar 1869. S. 17.

Natur und Sitz des Bewusstseins, sagt Vf., sind noch zwei unbestimmte Punkte — und die Beobachtung von Modificationen, welche zeitweise unter besonderen Umständen davon entdeckt werden, möchte wohl geeignet sein, hierüber einiges Licht zu verbreiten:

1. Fall. Ein Comptoirdiener in einem Kaufmannsmagazine ward von Convulsionen befallen. Derselbe war vorgängig in Maryland gewesen, wo ihn ein remittirendes Fieber befallen hatte, in Folge dessen er einige Zeit auf niederer Diät gestanden. Ehe noch seine Reconvalescenz befestigt war, kehrte er von da zurück und übernahm sein Geschäft. Bald darauf

Digitized by Google

hatte er eine grosse Waarensendung abzupacken, wobei er sich sehr abmüdete. In Folge dessen wurde er nun Abends von heftigen Convulsionen befallen und war bewusstlos. Nach 24 Stunden liessen dieselben nach, ohne besondere Residuen, ausgenommen grosser Erschöpfung mit zeitweiligem Delirium, welcher Zustand 2 Tage lang anhielt. Am 3. Tage gewahrten seine Pflegepersonen, dass sein Verstand befangen war in Erzählung von eingebildeten Scenen, die in New-York vorgingen, wo er in Gesellschaft und in Unterhaltung zu sein wähnte, seine besondere Aufmerksamkeit einem Frauenzimmer schenkend. In seiner Einbildung hatte er einen Nebenbuhler, mit dem er in Streit gerieth, der mit Herausforderung und Zweikampf endete. Dieser Einbildungsroman setzte sich halbestundenweise 3 Tage lang fort, und jedes Mal nahm er das Geschichtchen da auf, wo er es vorgängig abgebrochen hatte. Die Töchter des Hauses, welche sich für die Romanze interessirt hatten, waren jedes Mal in Kenntniss gesetzt worden, wenn wieder eine Fortsetzung erfolgte.

Während des Vorgangs hatte er die Augen offen, und nach allem Anscheine war er wach und bei Bewusstsein — allein wenn der Vorgang plötzlich nachliess und man ihn befragt, was er gethan, behauptet er fest geschlafen zu haben. Er war durchaus unbewusst dessen, was vorgegangen. Die Mädchen hatten bemerkt, dass seine Sprache oder Redeweise weit über ihrem gewöhnlichen Stande verfeinert war. Im Verhältniss als sein Nervensystem sich erholte und seine Kräfte zunahmen, schwand auch die unnatürliche Kundgebung des Bewusstseins. Bald darauf begab er sich zur Erholung auf's Land, wo er auch vollständig seinen Zweck erreichte.

2. Fall. Ein Mädchen von 18—20 J. hatte vor 5 Jahren eigenthümliche Zufälle zu bestehen: es hatte nämlich mehrere Anfälle von Herbstfieber bei einer Constitution und Organisation, bei der auch nicht eine Function im Normalverhältniss war, — es war so abgemagert und schwach, dass es ohne Beistand nicht aus dem Bette konnte. Als sie in des Vf.'s Behandlung kam, war sie täglich heftigen Anfällen von Neuralgie und Krämpfen mit Störung des Bewusstseins und zeitweiligem Delirium unterworfen. Die neuralgischen Schmerzen trafen häufig das rechte Auge und veranlassten Amaurose. Soweit die Untersuchung reichte, zeigte sich das Auge in vollkommenem Zustande. Die Anfälle selbst waren aber so heftig, dass sie den Kopf verwirrten. Es schrie auf vor Schmerz und be-

hauptete, der Augapfel sei aus seiner Höhle getreten und eine Kohle habe dort Platz genommen. Acupunctur mit 5 bis 6 Nadeln um das Auge herum beschwichtigten ihn.

Um diese Zeit erlitt es stets täglich Modificationen seines Bewusstseins und hatte intensive wandernde Schmerzen, welche in wenigen Minuten die Runde durch den ganzen Körper zu machen schienen, was es dadurch zu erkennen gab, dass es nach den ergriffenen Theilen fuhr und zuletzt mit beiden Händen die Gurgel fasste, als wollte es den Larynx zerquetschen. Wer sie bewachte, hatte gerade zu verhindern, dass sie die Kehle nicht erhaschen konnte. Eine Moxa im Nacken gesetzt, hob den Zustand. In ein Paar Tagen hatten Neuralgie und Krämpfe an Intensität und Frequenz nachgelassen, so dass es 2—3 Tage in ruhigem Zustand hinbrachte.

Eine Freundin, welche ihr beistand, setzte dann den Verf. in Kenntniss, dass es täglich Momente habe, wo es nicht im natürlichen Zustand seines Bewusstseins war, und es eine Wandlung seines Charakters und Thuns gewahren liess. Oft war es in Unterhaltung mit imaginären Personen und setzte Dinge und Zustände voraus, die keine Wirklichkeit hatten. Vf. fand es eines Tages in grosser Geistesniedergeschlagenheit u. Ströme von Thränen vergiessend. Als Vf. ihre Freundin um die Ursache befragte, erzählte diese, dass die Kranke sich beklagte, von ihm ausgescholten worden zu sein. Sie nahm weder von ihm noch von seiner Erklärung Notiz, dass es eine Täuschung sei. Es hatte zuweilen seine Schwierigkeit, die beiden verschiedenen Zustände zu unterscheiden, dennoch aber hatte ihre Freundin ein Mittel, worauf sie achtete — und dieses war, sie zum Singen aufzufordern. Im Zustande ihres anormalen Bewusstseins nahm sie keinen Anstand, dieser Aufforderung nachzukommen, obschon sie weder Stimme hatte, noch musikalisch war. Im normalen Zustande wäre sie durch nichts dahin zu bringen gewesen.

Als die Nervenanfälle an Intensität nachliessen, waren auch diese Zufälle von geringerer Dauer und minder häufig, und mit ersteren verschwanden letztere gänzlich. Eigentlich zeigt dieser Fall nur, welchen Modificationen das Bewusstsein unterworfen ist.

3. Fall. Ein Frauenzimmer von 15—16. J. bei anscheinend guter Gesundheit, für sein Alter vollkommen entwickelt, dessen organische Verrichtungen in voller Ordnung waren, erlitt tägliche Veränderungen seines Bewusstseins. Es war des Gegen-

wärtigen vollends unbewusst, — alle seine Aufmerksamkeit schenkte es abwesenden Freunden, womit es sich in imaginäres Gespräch einliess. So bald es aus diesem Zustande zu seinem natürlichen Charakter zurückkehrte, war es wie verkehrt, indem es mit seinen Gefährtinnen und Freundinnen in Unterredung trat. Es litt unter grosser Depression. Vf. fand es beim zweiten Besuche im Gespräche mit Bekannten seiner Heimath (300 Meilen entfernt), brach aber plötzlich ab, ein Selbstgespräch beginnend, in dem es über sein Geschick klagte. Die Mutter gab hierüber die Auskunft, dass ihre Tochter in einem Institute, nahe an ihrer Heimath, einen Fieber-Anfall erlitten hatte, an dem sie ein Arzt mit vieler Aufmerksamkeit behandelt hatte. Obschon er über die Mitte der Lebensperiode stand, hatte sie ihn so in Affection genommen, dass sie es nicht zu verhehlen vermochte. Die Eltern nahmen sie deshalb aus der Pension weg, was jedoch nicht den gewünschten Erfolg hatte, indem sie hierauf in einen Zustand von Depression und Melancholie verfiel, der den oben beschriebenen mentalen Ausgang nahm. Aerztliche Behandlung war erfolglos geblieben.

Als nach diesen Vorgängen das Mädchen in Behandlung des Vf. trat, versprach sich dieser nur Erfolg von moralischer Behandlung, und schickte es, da es bereits hoher Sommer war, nach Cap May, woher es indessen ungebessert zurückkam. Da es von englischer Familie abstammte und Verwandte in England hatte, wurde den Seinigen Hoffnung einer völligen Heilung von einer Reise dahin und dem Besuche der Verwandten gemacht. In der That kehrte es auch von daher körperlich und geistig gesund zurück.

4. Fall. Ein Mädchen, nervös-lymphatischen Temperaments, empfindlich, leicht zu Störungen des Nervensystems geneigt, schmächtiger Muskulatur mit schlaffen Gelenk- und Bänderapparat, so dass sie bis ins zwölfte und dreizehnte Lebensjahr Eisenschienen tragen musste, verlor im Alter von 14—15 Jahr alle Esslust, Geschmack und sein Speichel ward so scharf, die Zähne zu beschädigen. Vf. ihr Unvermögen zu essen bezweifelnd, bestand auf einem Versuche, wozu Patientin sich gerne bereit erklärte. Es nahm Speise zu sich, kaute sie und machte vergebene Versuche, den Bissen zu schlucken. Mit der Hand und dem Gabelstiel schob sie ihn in den Schlund; aber hier blieb er auch — es kam nicht zu thätiger Schlingbewegung. Auf Befragen, was sie hiebei fühle, gab sie den Bescheid, es komme ihr vor, als habe sie sich bis zum Schlunde voll-

gegessen. Sie kaute verschiedene Nahrungsartikel, schluckte den Speichel nieder, warf aber stets die Speisematerie aus. Ihre Subsistenzmittel bestanden in Flüssigkeiten, hauptsächlich Pajarete Wein, Bier und Wasser. Pures Wasser ward stets durch Regurgitation wieder ausgestossen. Dieser Zustand hatte 10 Jahre gedauert, bis Geschmack und Esslust wiederkehrten, bis die Patientin ihre gewöhnliche Esweise wieder annahm und mit ihrer Familie ihre Mahlzeiten einnahm.

Anfangs gaben sich verschiedene nervöse Symptome kund in Form von Krämpfen, meistens in den Armen, wie in den unteren Extremitäten, Abdominal-Neuralgieen, ein permanenter Hinterhauptsschmerz an der basis cranii, welcher bei Rückneigung des Kopfes zunahm. Es begleiteten diese Zeichen bald mentale Störungen, vorzüglich Nachtszeit, wie Delirien, während welcher es schwer war, die Kranke im Bette zu halten, und Gesichtshallucinationen. Auch kam es vor, dass sie aus dem Bette sprang und im Haus herum tanzte von Zimmer zu Zimmer, manchmal eine Stunde lang, regelmässig Abends 8 Uhr. Nachdem die Reihe dieser Erscheinungen aufhörte, kam eine neue zum Vorschein, von Doppelbewusstsein ausgehend. Die erste Kundgebung hievon bestand in Handlungen von ihrem gewöhnlichen Benehmen durchaus abweichend; so ging sie z. B. plötzlich in die Küche, richtete ein Beefsteak her, ging ins Zimmer und stellte es auf den Tisch — dann kam sie plötzlich zu sich und war erstaunt über die eben gemachten Vorkehrungen, dessen unbewusst, was sie eben gethan hatte. Ein ander Mal, ohne ein Wort zu ihrer Mutter zu sagen, nahm sie Shawl und Hut, ging gegen ihre Gewohnheit aus, und kam in einiger Entfernung vom Hause zu sich, ohne zu wissen wie sie dahin gekommen war. Es waren diese Anfälle von einem gänzlichen Wechsel ihrer Stimme und ihres Charakters begleitet. Während sie sonst mild und artig war, wurde sie grob und zurückhaltend. Ein andermal spielte sie in diesem Zustand auf dem Clavier, oder ging zur Arbeit, zu nähen oder zu einer anderen häuslichen Beschäftigung, deren sie sich nachher nicht mehr entsann, so zwar, dass es schwer war, einen Zustand vom andern zu unterscheiden. Es waren diese Anfälle meist spontan, denen sich manchmal eine kleine mentale Erregung beigesellte. Sie konnte sich an nichts von Dem erinnern, was vorgefallen; sondern glaubte geschlafen zu haben. Von dieser Zeit an kamen die Anfälle von Doppelbewusstsein

Digitized by Google

täglich vor, abwechselnd in Frequenz, Dauer und Intensität und hielten an bis zur Zeit, jedoch weniger oft und leichter.

Zwei ähnliche Fälle erwähnt *Combés* Phrenologie, wovon den ersten Dr. *Samuel L. Mitchell* von New-York beschrieb — den zweiten beobachtete Dr. *Dyce* von *Aberdeen*, veröffentlicht von Dr. *Dewar* in den Transact. of the Royal Society of Edinbourgh, 1822. *Ullersperger.*

von Krafft-Ebing, Note sur la valeur du traitement des maladies mentales par les injections sous-cutanées de morphine. — Bull. de la soc. de méd. de Gand. 1868.

In Illenau werden 10—16000 subc. Injectionen jährlich gemacht. Vf. theilt deren bisherige Resultate mit. Man unterscheidet eine allgemeine und lokale Einwirkung. Fast stets ist sie sedativ, nur in seltenen Fällen von Manie und Anämie des Gehirns ist sie erregend. Die Wirkung hält c. 3—6 Stunden an, zuweilen muss man sie 3 Mal täglich wiederholen. Man beginnt mit 1—2 Centigr. und steigt bis 1 Gr. pro die. Am glücklichsten sind die Resultate bei Lypemanie, überhaupt bei Consistenz von Neuralgien. Besonders bei Frauen ist dies oft der Fall. Man muss diese Neuralgien als excentrische Aeusserungen eines Zustandes von Hyperästhesie der Cerebro-Spinal-Centren ansehen. Die Präcordialangst findet man fast stets mit Intercostal-Neuralgien oder Cardialgien verbunden. Der schmerzhafte Punkt ist der geeignetste für die Injection.

Auch in den Fällen, wo in Folge secundärer Anlage eine Neuralgie oder Neuropathie, zuerst isolirt, dann zu Delirien, Halluc., Manie durch sympathische oder Reflexaction aufs Gehirn führt, ist die Injection sehr oft eine Wohlthat. In der Manie ist die Wirkung geringer. In chron. Manie, alter dem. mit Unruhe wird die habituelle Unruhe, Schlaflosigkeit, Zerstörungssucht vermindert. Unruhe und Schmutzsucht sind seit der Anwendung in der Anstalt geringer geworden.

Lagardelle, Allg. progressive Paralyse, mit Sectionsbefund. — Gaz. des hôp. III. 1868.

Legrand du Saulle, Commentaires méd.-lég. sur l'article 901 du Code Napoléon; de conditions mentales requises pour faire une donation ou un testament. — Ann. d'hyg. publ. 2 Ser. T. XXX.

— — Ueber Progn. u. Behandlg. d. Epil., grosse Dosen Bromkalium. — Gaz. des hôp. 137. 138. 1868.

Lindsay, W., Ueber Typhomanie. — Edinb. med. XIV. S. 325. Oct.

Lombard, J. S., Ueber den Einfl. geistiger Arbeit auf die Temperatur des Kopfes. — Arch. de Phys. I. 5. S. 670. Sept. u. Oct.

Lombroso, C., a) Mania pellagrosa mit Entwicklungshemmung; Heilung. — b) Aphasie mit angebl. Idiotismus in Folge von Atrophie d. vorderen Hemisphären. — Riv. clin. VII. S. 243. 244.

— —, Pseudomelarosi ed inflammazione corticale del cervello e mania per causa morale. — Rendiconti del R. Instituto lomb. Fasc. X. 1868.

Lussana, Experimentaluntersuch. und pathol. Beobachtungen über die Geschmacksnerven. — Arch. de Phys. II. 1. S. 20. Janv. 2 Févr. 1869.

Magnan, Ueber d. Sehstörungen bei allgem. Paralyse. — Gaz. de Par. 35. S. 510. 1868.

Maround und *Peter*, Ueber die Temperatur im fieberh. Zustande und im Momente des Todes bei Neurose. — Journ. de Brux. XLVII. S. 31. 1868.

Maudsley, H., Die frühzeitige Behandlung d. Geisteskrankheit. — Med. Tim. and Gaz. Avril 4. 1868.

Vf. rühmt das Opium, in der Privatpraxis bei Manieen, das Einpacken in ein nasses Tuch, das nicht über 8 Stunden fortzusetzen, inzwischen 1 Mal zu wechseln ist.

— —, Zur Aphasie. — Lancet II. 22. 23. Dec.

Montgomery, E., Fall von Paraplegie nach Gemüthserschütterung. St. Louis med. and surg. J. Nr. 5. V. 4. S. 314. July.

Oedmansson, Fälle von Aphasie. — Dubl. J. XLVI. S. 482.

Pusta, A., Ueber Behandlg. d. Melancholie. — Gaz. Lomb. 42. 1868.

Pidoux, Ueber die psychol. Phänomene vor, während und nach der Anästhesirung. — l'Union 2. 3. 1869.

Proust, A., Ueber die Ernährungsstörungen in Folge von Nervenaffectionen. — Arch. gén. 6. Sér. XIII. S. 210. Févr. 1869.

Ramskill, J. Sp., Ueber die Anwendung d. Brucin gegen Epilepsie mit Magensymptomen. — Lancet I. 3. Jan. 1869.

Robertson, O. L., Dr. Lauder Lindsay's Bett für Geisteskranke. — Lancet II. 26. Dec. S. 826.

Sandberg, Ueber allgem. Paralyse. — Norsk. Mag. 2. Reihe XXII. 1. S. 1.

Schivardi, Pl., Fall von *del. melanch.*, geheilt durch Electricität. — Gazete médicale Italienne. Jhrg. 1867.

Serrano, N., Ueber die gegenseit. Beziehungen zwischen psychischer u. somat. Freiheit und Gesetzmässigkeit. — El Siglo méd. 768. Setiembre. 1868.

Tardieu, A., Question méd.-leg. de la simulation. — Ann. d'hyg. publ. 2 Sér. T. XXX.

Tournier, De la tuméfaction de la région dorsale des tendons des

Digitized by Google

extenseurs des doigts et de leurs gaînes tendineuses, avec arthrite métacarpo-phalangienne, par suite d'hémiplégie, de cause cérébrale, chez des sujets non saturnins. — Union med. 1869. Nr. 17.

8—12 Tage nach dem apoplect. Anfalle trat eine 1—mehrmonatliche Anschwellung der Sehnen, ihrer Scheide an der Hand und eine entzündl. Affection der Metacarpo-Phalangen- und Phalangengelenke ein.

Villard, Epilepsie und Chorea bei einem Idioten; Asymmetrie der beiden Gehirnlappen; Cyste an der Hirnbasis. — Gaz. de Par. 5. S. 60. 1869.

Voisin, A., Ueb. die allgemeine Paralyse. l'Union 1868. 85—92. — *Schmidt's* Jhrb. 1969. No. 1. S. 79.

Unter allgem. Paralyse versteht man einen Symptomencomplex: Charakteränderung, Abnahme der Intelligenz, Behinderung des Sprechens, Ataxie der Bewegungen, Irrsein mit dem Charakter des Wohlseinsgefühls, seltner der Melancholie, mannigfache Erscheinungen in den Sinnen und endlich Blödsinn und Marasmus. Vorherrschend Blödsinn und ataktische Störung der Bewegungen. Der Name „allg. Paralyse" unpassend, die path. Anat. untergräbt dies Wort und zeigt, dass die Störungen nicht auf das Gehirn beschränkt sind. Die Verschiedenheit der anatomischen Befunde beweist schon die Mannigfaltigkeit der Krankheitsformen: meningitis, entzündliche cerebrale Erweichung, Wucherung der Glia.

Vom klin. Standpunkte unterscheidet Vf. 4 Formen: 1) von congestiver Natur (Calmeil's men.-encephalitis), 2) mit Rückenmarkssymptomen verbunden, welche zuweilen vorhergehen. 3) Folge von Heerderkrankungen, wie Apopl. und Erweichung des arteriellen Systems, senile Form. Die epileptiformen Anfälle gleichen den epileptischen und bei beiden ist vorzugsweise die med. obl. betheiligt. Die Sinnesorgane sind in der 1. Periode intact; in der 2. ungleiche Erweiterung der Pupille und ungleiche Empfindlichkeit gegen das Licht, zuweilen Unempfindlichkeit. Die ophthalmoskopischen Untersuchungen sind sehr verschieden ausgefallen. Der Geruchssinn ist häufig gestört, fast zerstört im 3. Stadium. Unter 19 Paralytikern mangelte er bei 13 (9 im 3. Stad., 4 im 2. Stad.). Ursache sind plastische Exsudate in der Umgebung des Geruchsnerven. Der Geschmack ist oft verändert. Auch das Gehör ist bisweilen gestört, ebenso die Hautsensibilität im Beginne oft.

— —, Geisteskrankheiten in Nervenaffectionen, Affectionen des

Sympathicus bei Epilepsie. — Ueber den Einfluss der Verwandtschaft auf die Geisteskranken. — l'Union 109. 118. 1868.

Voisin, *A.*, De l'épilepsie simulée et de son diagnostic par des caractères sphygmographiques du pouls. — Ann. d'hyg. publ. 2 Sér. T. XIX.

— —, Conférences cliniques sur les maladies mentales et les affections nerveuses. — Union méd. 3 Sér. T. VI.

Zani, *J.*, Delle malatie mentali e degli studj relativi. — Bologna, 1869.

Geisteskrankheiten, Anwendg. d. subcutanen Morphiuminjectionen. Journ. de Brux. XLVIII. S. 334.

Irrenwesen, Französ. Gesetz vom J. 1838, über das. — Gaz. hebd. 2 Sér. V. 52.

Epilept. Anfälle u. Urämie b. Morb. Bright. — Tribune médicale. 1868. Nr. 16.

25jähr. Wagenmaler, Febr. 1866 im Spital behandelt wegen Athemnoth, Oedem der unteren Extremitäten, geschwächter Sehsinn, Schmerz i. d. reg. cardiaca, Blasengeräusch an der Herzspitze m. d. 2. Tone. Wiederum im August 1867 mit gleichen Erscheinungen, nachdem epilept. Anfälle hinzugetreten waren. Eiweiss im Harn. Längeres Coma n. d. epil. Anfällen, die von Novbr. ab häufiger. Rechts stellte sich unvollst. Paralyse ein, Intelligenz nahm ab. Ende Nov. keine epil. Anfälle mehr, aber dauerndes Coma. 9. Decbr. Tod. Gehirn zeigte: Oedem der Meningen u. der Hirnmasse, Blutleere, seröse Infiltr. des subarachnoid. Zellgeweb., sowie in den Hirnkammern; i. l. *corp. striat.* ein nussgrosser apoplect. Heerd, umschrieben von einem Pseudo-Membran; i. d. Kammerflüssigkeiten Fettkugeln und Hämatoidinkrystalle.

Digitized by Google

Anstaltsberichte.

Statistische Nachricht über die Herzogl. Altenburgische Irren- Heil- und Pflege-Anstalt „Genesungshaus zu Roda“ auf das Jahr 1868

von Medicinalrath Dr. *Maeder*, Director derselben.

Am 1. Januar 1868 waren Bestand:

171 Irre, nämlich 90 Männer, 81 Frauen.

Aufgenommen wurden im

Jahre 1868 . . . . . 54 - - 27 - 27 -

Summa . . 225 Irre, nämlich 117 Männer, 108 Frauen

(gegen 222 Irre (117 M., 105 Fr.) im Jahre 1867).

Unter 225 Verpflegten waren: Ehemänner 26, Ehefrauen 31, Wittwer 11, Wittwen 20, geschiedene Männer 3, geschiedene Frauen 3, ledige Männer 77, ledige Frauen 54.

Von 171 am 1. Januar 1868 als Bestand Verbliebenen standen im Alter von 18—20 Jahren 2, 21—30 Jahren 31, 31—40 Jahren 32, 41—50 Jahren 45, 51—60 Jahren 37, 61—70 Jahren 21, 70—80 Jahren 3.

Von 54 im Jahre 1868 Aufgenommenen (gegen 46 im Jahre 1867) standen im Alter von 7 Jahren 1, 20 Jahren 1, 21—30 Jahren 13, 31—40 Jahren 16, 41—50 Jahren 13, 51—60 Jahren 6, 61—70 Jahren 3, 71—80 Jahren 1.

Von 225 Verpflegten waren 148 Inländer (75 M., 73 Fr.) gegen 141 im Jahre 1867, und 77 Ausländer (42 M., 35 Fr.) gegen 81 im Jahre 1867; von letzteren gehörten an: 55 dem Fürstenthum Reuss j. L., 12 dem Fürstenthum Reuss ä. L., 4 dem Königreich Preussen, 2 dem Grossherzogthum Weimar, 2 dem Herzogthum Gotha, 1 dem Herzogthum Meiningen, 1 dem Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.

Nach den Monaten kamen 54 zur Aufnahme: im Januar 3, Februar 2, März 5, April 4, Mai 2, Juni 7, Juli 6, August 5, September 8, October 6, November 4, December 2.

Unter den Aufgenommenen befanden sich 7 im ersten und 2 im zweiten Rückfall.

Von 225 Irren gehörten 40 der höheren, 126 der mittleren und 59 der niederen Bildungsstufe an.

II. Im Jahre 1868 wurden verpflegt: 225 Irre in 65,499 Tagen (gegen 65,231 Tage im Jahre 1867), daher 1 Irrer durchschnittlich 291 Tage.

Bei einer Gesammtbevölkerung des Herzogthums im Jahre 1868 von 141,650 Seelen wurden im Jahre 1868 verpflegt: 148 Inländer, daher 1 Irrer auf 950 Seelen.

III. Von 225 Irren (117 M., 108 Fr.) litten an Melancholie 20, nämlich: 9 M., 11 Fr., Manie 38, nämlich: 11 M., 27 Fr., Wahnsinn 59, nämlich: 38 W., 21 Fr., Verrücktheit 45, nämlich: 23 M., 22 Fr., Blödsinn (im Allgemeinen, Idiotie, paralytischer und epileptischer Blödsinn) 54, nämlich 29 M., 25 Fr., Epilepsie und Geistesstörung 9, nämlich 7 M., 2 Fr. Hiervon gingen im Laufe des Jahres 1868 ab: 47 (22 M., 25 Fr.), und zwar als geheilt resp. gebessert 21 (12 M., 9 Fr.) 9,34 pCt., als ungeheilt 3 (1 M., 2 Fr.), es verstarben 23 (9 M., 14 Fr.) 10,23 pCt., so dass demnach am Jahresschlusse 1868 als Bestand verblieben: 178 (95 M, 83 Fr.).

IV. Als Entstehungsursache der Seelenstörung liessen sich bei 54 im Jahre 1868 Aufgenommenen in 24 Fällen physische und in 7 Fällen psychische Alterationen; in 5 Fällen gemischte physische und psychische Alterationen annäherungsweise nachweisen; in 9 Fällen lag Rückfall vor; in 9 Fällen war das ursächliche Moment nicht zu ermitteln.

Von 23 Verstorbenen befanden sich im Alter von 20—30 Jahren 4, 31—40 Jahren 3, 41—50 Jahren 6, 51—60 Jahren 6, 61—70 Jahren 4.

Nach den Monaten verstarben im März 1, Mai 2, Juni 2, Juli 5, August 1, September 3, October 1, November 7, December 1.

Bei den 23 Verstorbenen erfolgte der Tod in 6 Fällen durch Krankheiten des Hirns und dessen Pertinenzien, in 7 Fällen durch Krankheiten der Brustorgane, in 4 Fällen durch Krankheiten der Constitution.

Jahres-Bericht über Aufnahme und Entlassung in den beiden Warschauer Irrenheil- und Pflege-Anstalten vom Jahre 1867.

Von Hofrath Dr. *A. Rothe*, Chef-Arzt beider Anstalten.

In einem früheren Aufsatze gab ich die Beschreibung der männlichen Irrenheil- und Pflege-Anstalt zu Warschau sowohl in Betreff ihrer geschichtlichen Entstehung, wie auch ihrer jetzigen baulichen Einrichtung, administrativen und ärztlichen Verwaltung. Um diesen Aufsatz zu vervollkommenen, muss ich noch einige Worte über die weibliche Anstalt hinzufügen.

Da das St. Johannes Hospital durch einen Mönchsorden gegründet, und bis vor Kurzem auch noch von Mönchen und Laienbrüdern verwaltet wurde, so ist es leicht begreiflich, dass in demselben nur ausschliesslich männliche Kranke aufgenommen wurden; die Patienten weiblichen Geschlechts aber fanden ihr Unterkommen in einer Abtheilung des Hospitals zum „Kindlein Jesu". Diese Abtheilung, welche nur als eine Zugabe, oder richtiger gesagt unnützer Ballast angesehen wurde, konnte sich durchaus keiner besonderen Bevorzugung erfreuen, und wenn die Anstalt für Männer schon viel zu wünschen übrig lässt, so ist dies an der Abtheilung für Frauen in einem noch viel höheren Grade der Fall.

In der Mitte des verflossenen Jahres wurde mir auch die Leitung dieser Abtheilung übergeben, welche auf diese Art zu einer selbständigen weiblichen Anstalt erhoben wurde, und dadurch befinde ich mich in der angenehmen Lage, über beide Anstalten berichten zu können.

Die weibliche Irrenheil- und Pflege-Anstalt des Hospitals zum „Kindlein Jesu" befindet sich im Centrum der Stadt und besteht aus zwei durch einen gedeckten Gang mit einander verbundenen Gebäuden, einem gemauerten zweistöckigen, 53 poln. Ellen lang und 20 Ellen tief, und einem hölzernen einstöckigen Gebäude, 60 Ellen lang und 20 Ellen tief.

Ausser diesen Räumlichkeiten, welche von dem eigentlichen Hospitale vollkomen getrennt ihren besonderen Eingang haben und rund herum von Gärten umgeben sind, besitzen wir noch 3 grosse Säle im eigentlichen Hospitale, aber in der nächsten Nähe der Irrenanstalt, für ruhige Unheilbare, und einen kleinen Saal im Garten für Patienten, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind.

Alle diese Räumlichkeiten, die nichts Bemerkenswerthes bieten,

Digitized by Google

können zur Noth 100 Kranke fassen. Leider aber übersteigt die Zahl unserer Kranken diese Norm um vieles, denn manchmal haben wir 160 und noch mehr.

Welche Uebelstände aus solch' einer Ueberfüllung entspringen müssen, ist leicht einzusehen.

Das ärztliche Personal besteht, ausser dem Chef-Arzt, aus einem Ordinator und aus einem Hausarzt, denen zur Hülfe ein Chirurgus hinzugegeben ist.

Die Aufsicht über die Kranken und das niedere Dienstpersonal leiten drei barmherzige Schwestern mit seltener Ausdauer, Liebe und Aufopferung.

Das niedere Dienstpersonal, die Wärterinnen, sind in hinreichender Zahl vorhanden.

Die Aufnahme, Entlassung, Verpflegung und Behandlung geschieht nach denselben Regeln, wie im Johannes-Hospital,

Am 1. Januar 1867 war Bestand:

	Geisteskranke.	Epileptische.	Gebissene. *)	Summa.
Männer . .	130	38	2	170
Frauen . .	88	26	—	114
Summa . .	218	64	2	284

Im Laufe des Jahres 1867 wurden aufgenommen:

	Geisteskranke.	Epileptische	Gebissene.	Summa.
Männer . .	145	27	3	175
Frauen . .	186	120	—	306
Summa . .	331	147	3	481

Summa der Verpflegten im Jahre 1867:

	Geisteskranke.	Epileptische.	Gebissene.	Summa.
Männer . .	275	65	5	345
Frauen . .	274	146	—	420
Summa . .	549	211	5	765

*) Dies sind solche Personen, die wegen Bisswunden durch die der Tollwuth *(Hydrophobia Lyssa canina)* verdächtigen Thiere der Anstalt zur Observation übergeben werden.

Digitized by Google

Hiervon gingen im Laufe des Jahres ab:

	Geisteskranke.		Epileptische.		Gebissene.	Summa.
	Männer.	Frauen.	Männer.	Frauen.	Männer.	
Geheilt . . .	57	72	2	2	4	137
Gebessert und ungeheilt .	35	64	15	104	—	218
Gestorben . .	44	38	9	18	—	109
Summa . . .	136	174	26	124	4	464

Verbleibt am 1. Januar 1868:

	Geisteskranke.	Epileptische.	Gebissene.	Summa.
Männer . .	139	39	1	179
Frauen . .	100	22	—	122
Summa . .	239	61	1	301

Auch im verflossenen Jahre hat sich der Bestand an beiden Anstalten um 17 Personen vermehrt, und zwar um 9 Männer und 8 Frauen.

Die Sterblichkeit scheint eine sehr grosse, denn von 765 Verpflegten starben 109 und zwar 16 pCt. Männer und 14 pCt Frauen. Durchschnittlich also 15 pCt., doch muss ich hierbei erwähnen, dass 13 Frauen an der Cholera, die im verflossenen Jahre stark in Warschau geherrscht, dahin gerafft wurden, und ausserdem uns oft Kranke mit andern nicht dem Irrsein angehörenden Leiden zugeschickt wurden, deren ganzer Aufenthalt in der Anstalt nur nach Stunden gerechnet werden konnte. Werden derartige Fälle abgerechnet, so verbleibt für die Todesfälle ein Verhältniss von 9 pCt.

Specielle Statistik.

Eintheilung der Krankheiten.	Bestand am 1 Januar 1867.			Hinzugekommen im Jahre 1867.			Summa der Verpflegten.
	M.	Fr	S.	M.	Fr	S.	
1. Hysterisches Irresein .	—	1	1	—	30	30	31
2. Delirium acutum, melanch. c. mania . . .	2	1	3	3	1	4	7
3. Melancholia	5	6	11	23	12	35	46
4. Mania c. M. generalis .	28	9	32	52	77	129	161

Digitized by Google

Eintheilung der Krankheiten.	Bestand am 1. Januar 1867.			Hinzugekommen im Jahre 1867.			Summa der Verpflegten.
	M.	Fr.	S.	M.	Fr.	S.	
5. Mania partialis (partielle Verrücktheit)	3	1	4	3	1	4	8
6. Paranoia (Wahnsinn) .	9	14	23	8	14	22	45
7. Dementia	69	51	120	18	32	50	170
8. Dementia c. paralysis .	2	4	6	3	4	7	13
9. Dementia c. paralysis progressiva	13	—	13	22	1	23	36
10. Idiotia	1	1	2	4	8	12	14
11. Epilepsia c. Vesania .	22	14	36	7	17	24	60
12. Epilepsia simplex . .	16	12	28	20	103	123	151
13. Observatio	3	—	3	3	2	5	8
14. Gehirnkrankheiten ohne Irresein	—	—	—	1	4	5	5
15. Morsura	2	—	2	3	—	3	5
Summa .	170	114	284	175	306	481	765

Folgende Tabelle giebt uns einen Ueberblick über die aus den Anstalten Entlassenen, sei es als geheilt, gebessert oder ungebessert, und endlich die durch den Tod abgegangenen.

Krankheitsformen.	Geheilt.			Gebessert und ungebessert			Gestorben.			Summa.			Bestand pro 1868		
	M.	F.	S.	M.	F.	S.	M.	F.	S.	M.	F.	S.	M.	F.	S.
Hysterisches Irresein . .	—	11	11	—	18	18	—	—	—	—	29	29	—	2	2
Delirium acutum	5	—	5	—	—	—	—	2	2	5	2	7	—	—	—
Melancholia .	8	6	14	6	5	11	—	4	4	14	15	29	14	3	17
Mania	39	55	94	15	9	24	9	11	20	63	75	138	12	11	23
Mania partialis	3	—	3	1	—	1	—	—	—	4	—	4	7	2	9
Paranoia . .				2	4	6	—	2	2	2	6	8	15	22	37
Dementia . .	—	—	—	8	22	30	10	8	18	18	30	48	69	53	122
Dementia cum paralysis .	—	—	—	—	1	1	2	4	6	2	5	7	3	3	6
Dem. c. par. progressiva	—	—	—	3	—	3	21	1	22	24	1	25	11	—	11
Idiotia . . .	—	—	—	—	3	3	2	2	4	2	5	7	3	4	7
Epilepsia cum Vesania . .	—	—	—	5	13	18	6	5	11	11	18	29	18	13	31

Digitized by Google

Krankheits-formen.	Geheilt.			Gebessert und ungebessert			Gestorben.			Summa.			Bestand pro 1868.		
	M.	F.	S.	M.	F.	S.	M.	F.	S.	M.	F.	S.	M.	F.	S.
Epilepsia simplex	2	2	4	10	91	101	3	13	16	15	106	121	21	9	30
Observatio .	2	—	2	—	2	2	—	—	—	2	2	4	4	—	4
Gehirnkrankheiten ohne Irresein . .	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4	4	1	—	1
Morsura . . .	4	—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	4	1	—	1
Summa	63	74	137	50	168	218	53	56	109	166	298	464	179	122	301

Vergleichen wir nun nach vorhergehender Tabelle das Verhältniss der Heilbaren zu den Unheilbaren, so finden wir, dass am 1sten Januar 1867 73 Personen verblieben waren, bei welchen man mehr oder weniger noch auf Genesung rechnen konnte, zu dieser Zahl waren hinzugekommen 230, im Ganzen also 303. Unheilbarer aber waren verblieben 177, zu welchen im Laufe des Jahres hinzukamen 116, im Ganzen also 293, mithin also war das Verhältniss der Heilbaren zu den Unheilbaren wie 303 : 293 also fast wie 1=1. Dieses Verhältnis ist durchaus kein günstiges, und lässt uns befürchten, dass wir in der Folge eine überwiegende Zahl Unheilbarer in der Anstalt haben werden, und dieselbe den Charakter einer Pflegeanstalt annehmen muss; noch mehr überzeugt uns von dieser Voraussetzung folgende Tabelle, welche die Zahl der verbliebenen Kranken in ihrer wirklichen Gestalt zeigt, d. h. diejenigen Formen von Irresein, welche uns am 1. Januar 1868 verblieben waren.

Wirklicher Bestand nach den Formen am 1. Januar 1868.

Krankheitsformen.	M.	Fr.	S.
Hysteriosis	—	1	1
Delirium melanch. et maniae	—	—	—
Melancholia	7	4	11
Mania generalis	8	8	16
Mania partialis	3	1	4
Paranoia	17	12	29
Dementia	84	63	147
Dementia c. paralysis	4	4	8
Dementia c. paral. progressiva	11	—	11
Idiotia	3	3	6

Krankheitsformen.	M.	Fr.	S.
Epilepsia c. Vesania	21	11	32
Epilepsia simplex	17	15	32
Observatio	3	—	3
Gehirnkrankheiten ohne Irresein	—	—	—
Morsura	1	—	1
Summa	179	122	301

Hier sehen wir nun deutlich, dass von den 301 Hinterbliebenen kaum 1/5 d. h. 61 zu den Heilbaren gehören, 4/5 aber solche sind, denen früher oder später aber aller Wahrscheinlichkeit kein anderes Ende bevorsteht, als der Tod.

Die Tabelle der Krankenbewegung nach den einzelnen Monaten der Aufnahme liefert kein Resultat, da es zu den Seltenheiten gehört, dass die Kranken der Anstalt in demselben Monate, in welchem sie erkrankten, übergeben werden. Gewöhnlich kommen sie erst nach Erschöpfung aller Mittel im Hause zu uns, daher auch verhältnissmässig so viel Unheilbare.

Dem Alter nach verhielten sich unsere Neuaufgenommenen folgendermaassen:

Alters-Tabelle der Neuaufgenommenen:

	Irre.		Epileptische.		Gebissene.
	M.	Fr.	M.	Fr.	M.
bis 10 Jahr . . .	—	2	—	1	1
von 10—15 Jahre .	—	4	—	3	—
- 15—20 - .	9	7	3	15	—
- 20—25 - .	14	31	2	13	—
- 25—30 - .	31	32	6	11	—
- 30—35 - .	24	36	4	21	2
- 35—40 - .	24	20	10	8	—
- 40—45 - .	12	25	1	22	—
- 45—50 - .	16	9	1	8	—
- 50—60 - .	9	18	—	13	—
- 60—70 - .	5	2	—	3	—
über 70 Jahre . .	1	4	—	2	—
Summa .	145	186	27	120	3

Digitized by Google

In Bezug auf den Stand:

	Irre.		Epileptische.		Gebissene.	Summa.
	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	
Verwittwet .	2	26	2	20	—	50
Verheirathet .	68	85	10	30	1	194
Ledig . . .	75	75	15	70	2	237
Summa .	145	186	27	120	3	481

In Bezug auf den bisherigen Aufenthalt.

	Irre.		Epileptische.		Gebissene.	Summa.
	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	
Warschau . . .	88	142	16	116	—	362
Provinz . . .	48	41	11	3	3	106
aus Russ. Gouvernements .	9	3	—	1	—	13
Summa .	145	186	27	120	3	481

Was die Neuaufgenommenen anbelangt, so waren das erste Mal in den Anssalten Irre 112 M., 144 Fr. Epileptische 18 M , 47 Fr. Gebissene 3 M. Zusammen 324. Das zweite Mal Irre 26 M., 18 Fr. Epileptische 1 M., 13 Fr. Summa 58.

Das 3te Mal Irre 5 M., 4 Fr., Epileptische 1 M., 12 Fr. Summa 22. Das 4te Mal Irre 1 M., 7 Fr., Epileptische 2 M., 9 Fr. Summa 19. Das 5te Mal Irre 1 M., 4 Fr., Epileptische 7 Fr. Summa 12. Mehr als 5 Mal Irre 9 Fr., Epileptische 5 M., 32 Fr. Summa 46.

In Bezug auf die frühere Beschäftigung der Männer: Officiere 5 Irre. Soldaten 8 Irre, 2 Epilept. Geistliche 3 Irre, 2 Epileptische. Dem ärztlichen Stand angehörend 5 Irre. Lehrer und Studenten 8 Irre, 2 Epilept. Beamtete 29 Irre, 1 Epilept. Kaufleute 4 Irre, 1 Epilept. Gutsbesitzer 11 Irre. Handwerker 32 Irre, 5 Epilept., 1 Gebissener. Taglöhner 22 Irre, 10 Epilept. Landleute 18 Irre, 4 Epilept, 2 Gebissene. Zusammen 175. Die Frauen theile ich nach ihrem Bildungsgrade ein und fand mit höherer Bildung 15 Irre 4 Epilept., mit gewöhnlicher Bildung 29 Irre, 7 Epilept., und endlich ohne alle Bildung 142 Irre, 109 Epilept., zusammen also 306.

Was den Aufenthalt aller unserer Kranken in den Anstalten anbelangt, so giebt uns darüber folgende Tabelle Aufschluss.

Aufenthalts-Dauer der Kranken in den Anstalten.

	bis 3 Monat.		bis 6 Monat.		bis 9 Monat.		1 Jahr		1½ Jahr		2 Jahr		5 Jahr		10 Jahr		15 Jahr		20 Jahr		30 Jahr		40 Jahr		Summa.
	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	Fr	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	Fr.	M.	Fr.	
Irre	69	139	59	36	40	8	42	4	9	—	20	1	15	49	8	26	6	5	3	3	1	3	1	—	549
Epileptische . .	17	121	15	7	8	7	8	5	6	—	2	1	7	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	211
Gebissene . . .	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Summa .	91	260	74	43	48	15	50	9	15	—	22	2	22	52	10	28	6	5	3	3	1	3	1	—	765

Schliesslich bleibt mir noch über die vermeintlichen Ursachen oder die ätiologischen Momemente Rechenschaft zu geben, die Lösung dieser Frage gehört bei uns zu den allerschwierigsten, denn der grösste Theil der Kranken betritt die Anstalt ohne die geringsten anamnestischen Data mitzubringen, oder wenn ja welche gegeben, so sind dieselben so unvollkommen und unzureichend, dass sich auch selbst aus den Gegebenen nichts entnehmen lässt.

Um nun wenigstens zu einigen Nachrichten zu kommen, suchte ich von allen Denjenigen, welche die Kranken besuchten, Erkundigungen einzuziehen, wie auch von den geheilten oder gebesserten Kranken selbst, doch dass diese Aussagen keine befriedigenden sein konnten, brauche ich wohl nicht erst hervorzuheben, aus diesem und keinem anderen Grunde nannte ich sie daher auch vermeintliche Ursachen, dieselben sind folgende:

Trunksucht 46 M., 98 Fr. = 144. Psychische Ursachen 54 M., 24 Fr. = 78. Organische Gehirnkrankheit 12 M., 13 Fr. = 25. Onanie 26 M., 1 Fr. = 27. Syphilis und Scrophel 18 M., 6 Fr. = 24. Gehirnerschütterung 18 M., 1 Fr. = 19. Ueberanstrengung, geistige 29 M., 2 Fr. = 31. Erbliche Anlage 20 M., 6 Fr. = 26. Allgemeine Entkräftung 11 M., 8 Fr. = 19. Gemischte Ursachen 13 M. Noth 16 M., 7 Fr. = 23. Sonnenstich 4 M. Tabakvergiftung 2 M. Typhus 7 M., 3 Fr. = 10. Morsura 5 M. Unbekannte Ursachen 152 Fr., 59 M. = 211. Getäuschte Liebe 2 Fr. Religiöse Schwärmerei 8 Fr. Menstruationsstörungen 18 Fr. Wochenbett 15 Fr. Gehirnkrankheiten 18 Fr. Tuberculose 4 Fr. Geschlechtliche Ausschweifung 23 Fr. Chronischer Magen- und Darmcatarrh 4 Fr. Altersschwäche 7 Fr. Summa 345 M., 420 Fr. = 765.

Leider sehen wir aus diesen, wenn auch unvollständigen Daten, dass die Trunksucht eine der bedeutendsten Ursachen, und was noch auffallender ist, dass das weibliche Geschlecht dieser Leidenschaft bedeutend mehr unterworfen ist, als das männliche.

Die Section, die fast immer gemacht worden ist, mit Ausnahme der verstorbenen Pensionaire, deren Verwandten es nicht gestatteten, ergab überall vollgültige pathologische Veränderungen.

Verhandlungen psychiatrischer Vereine.

2. Versammlung der Mitglieder des Vereins der Irrenärzte Niedersachsens und Westphalens am 1. Mai 1869 in Hannover.

Die Mitglieder des Vereins versammelten sich Nachmittags 4 Uhr. Es hatten sich nachstehende Herren eingefunden: Sanitätsrath Dr. *Hüpeden* aus Hannover, Med.-Rath Dr. *Kelp* aus Oldenburg, Director Dr. *Kind* aus Langenhagen, Dr. *Lorent* aus Bremen, Sanitätsrath Dr. *Meyer* aus Brake, Dr. *Ripping* aus Hildesheim, Dr. *Seebohm* aus Königshof, Dr. *Snell* aus Hildesheim, Sanitätsrath Dr. *Wahrendorff* aus Ilten, Dr. *Wiebecke* aus Hildesheim, Dr. *Wiedel* aus Hildesheim, Dr. *Wiedemeister* aus Osnabrück, Dr. *Zenker* aus Königslutter.

Zum Vorsitzenden wurde Dr. *Snell* aus Hildesheim, zum Schriftführer Dr. *Wiedel* aus Hildesheim erwählt.

Dr. *L. H. Ripping*, Ueber einige mikroskopische Befunde in der Hirnrinde von Geisteskranken, die in Melancholie verstorben.

Der Gegenstand betrifft einige eigenthümliche mikroskopische Befunde in der Hirnrinde solcher Melancholischer, die erst mässig lange Zeit an Melancholie gelitten haben und in Melancholie verstorben sind. Der Umstand, dass eigentlich nur selten frischere Melancholien zur Section gelangen, rechtfertigt es die den Beobachtungen zu Grunde liegenden Fälle zunächst im Detail vorzuführen, um dann die gewonnenen mikroskopischen Befunde genauer zu präcisiren und zuletzt einige Zeichnungen von solchen mikroskopischen Präparaten nebst dazu gehöriger Tafelerklärung vorzulegen.

Der 1ste Fall betraf eine 52 Jahre alte Frau, Mutter zweier Kinder. Dieselbe wurde im April 1866 in die Hildesheimer Anstalt aufgenommen und bot das charakteristische Bild einer aufgeregten

Melancholie dar. Ueber ihren früheren Gesundheitszustand gab das begleitende Physikatsgutachten nur sehr geringe Auskunft, doch wurde erwähnt, dass die Kranke vor etwa 11 Jahren bei Gelegenheit einer Reihe von Missionspredigten, die damals in ihrem Heimathsdorfe abgehalten wurden, 1½ Tag irre gewesen sei. Die Form dieser psychischen Störung war nicht näher beschrieben. Die zweite Erkrankung, die aber Veranlassung zur Aufnahme in die Anstalt gab, bestand seit 7 Wochen und war wiederum durch Missionspredigten entstanden. Die grosse, stark abgemagerte Kranke jammerte fortwährend, dass sie nicht selig werden könnte, dass sie der Teufel selbst sei u. s. w. Bei ihrem Eintritte in die Anstalt erschien sie sofort als eine körperlich sehr schwer Erkrankte, sie hatte frequenten Puls und erhöhte Körpertemperatur, doch war objectiv zunächst der Ort der Erkrankung nicht aufzufinden. Bei genauerer Untersuchung, die namentlich durch eine schon mehrere Tage vor der Aufnahme bestehende hartnäckige Nahrungsverweigerung auf den rechten Weg geleitet wurde, fand sich eine bedeutende *Glossitis acuta*. Die Zunge lag als harte, graugelbe, gequollene, unbewegliche Masse im Munde; unter der Zunge lag eine wallnussgrosse, harte, der Ranula ähnliche Geschwulst, deren grösster Theil allerdings links vom *Frenulum linguae* lag; ebenso war die linke *Glandula submaxillaris* stark geschwollen und ragte sehr unter dem linken Unterkiefer hervor. Tiefe Incisionen in die Zunge, Blutentziehungen und warmer Verband des Halses waren erfolglos und die Kranke starb am 7. Tage nach ihrer Aufnahme. Die ganze Erkrankung war somit in 8 Wochen abgelaufen. Die Section bestätigte die Diagnose in Betreff der Glossitis und Entzündung der *Glandula submaxillaris* und zeigte, dass namentlich ein bedeutendes *Oedema glottidis* den Tod so rasch herbeigeführt hatte. Interessant war der mikroskopische Nachweis, dass an der Entzündung der Zunge sich nicht blos das interstitielle Bindegewebe betheiligt hatte, sondern die Muskelfasern selbst, indem dieselben sehr dick und gequollen erschienen und in ihrem Sarcolemma Massen von Kernen abgelagert waren.

Das Hirn wog 42 Unzen; seine weichen Häute waren etwas leicht getrübt, deren Gefässe mit Blut gefüllt, und im Subarachnoidealraume fand sich etwas klare Flüssigkeit. Die blasse, übrigens normal breite Hirnrinde glänzte auf dem Durchschnitte wässerig, während die Marksubstanz mehr trocken war, und obgleich an Zahl nicht viele aber grosse Blutpunkte zeigte. In den Ventrikeln, an den Ganglien und an den Gefässen der Hirnbasis fiel nichts Besonderes auf.

Bei der mikroskopischen Untersuchung des in Chromsäure-Lösung erhärteten Gehirnes fiel auf, dass in der Hirnrinde

1) die Neuroglia sehr wenig Kerne zeigte;

2) dass die Ganglienzellen, nicht blos die kleinen schmalen aus der oberflächlichen Ganglienschicht, sondern auch die grösseren aus den tieferen Schichten, alle sehr hell, arm an Körnchen, sehr schlank-pyramidenförmig, scharf contourirt und mit glänzendem Kern versehen, erschienen;

3) dass die Capillaren und kleineren Gefässe in ihren Wandungen sehr dünn, blass und kernarm erschienen, während gleichzeitig bei Verschiebung des Focus auftretende dunkle Längs- und Schrägstreifungen deutlich eine Längs- und Schrägfaltung der Membran nachwiesen. Am auffallendsten war mir jedoch, dass diese Gefässe zu beiden Seiten eingefasst waren von einem der Breite des ganzen Gefässes entsprechenden eigenthümlich mattglänzenden Saume, dessen matter Glanz bei veränderter Einstellung auch auf dem darunter liegenden Gefäss erschien und dieses verdeckte. Eine blosse Lücke im mikroskopischen Präparate, die vielleicht zufällig bei der Präparation entstanden wäre, konnte es nicht sein. Dem widersprach einerseits der eigenthümlich matte Glanz, der nicht blos den Saum charakterisirte, sondern auch bei Verschiebung des Focus über dem Gefäss erschien, andererseits das constante Vorkommen an allen Gefässen, soviel Präparate ich auch immer anfertigen mochte.

Dieser eigenthümliche Befund frappirte mich, da er mir bei der Untersuchung der Gehirne, namentlich Geisteskranker, noch nicht aufgestossen war, ja gerade damals umsomehr, weil ich kurz vorher ein Gehirn einer chronisch verlaufenen allgemeinen Paralyse untersucht hatte, in dem das gerade Gegentheil — nämlich eine ungeheure Kernwucherung in den Gefässwandungen und starke Kernablagerung in der Nachbarschaft der Gefässe — vorhanden war. Eine befriedigende Deutung jenes eigenthümlichen Befundes wollte mir anfangs in keiner Weise gelingen, als mir zufällig die Abhandlung von *His* in dem XV. Bande der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie: „Ueber ein perivasculäres Kanalsystem in den nervösen Centralorganen und über dessen Beziehungen zum Lymphsystem", in die Hände kam.

Nach Durchlesung dieses Aufsatzes, worin *His* seine sowohl durch mikroskopische Untersuchungen als auch durch Injection gewonnenen Resultate dahin präcisirte, dass er die Existenz constanter „perivasculärer Lymphräume" an den Gefässen des Gehirns und die Existenz eines epicerebralen Lymphraums an der eigentlichen Hirnoberfläche nachwies, konnte ich nicht mehr zweifelhaft sein, dass

Digitized by Google

ich in den oben beschriebenen mattglänzenden Säumen den Ausdruck von weiten perivasculären Lymphräumen vor mir hatte — ob erweiterten Lymphräumen, das musste erst die fortgesetzte Untersuchung ergeben.

Eine Reihe von Gehirnen von periodischen Manien, in Blödsinn übergegangenen Melancholien, allgemeinen Paralysen u. s. w. liess mich vergeblich nach jenen eigenthümlichen Erscheinungen suchen, wenigstens fanden sich nur sehr schmale Säume, bis etwa drei Monate nach jenem Sectionsbefunde in der Hirnrinde einer Geisteskranken sich dieselben Veränderungen in mindestens ebenso auffallender Weise wieder fanden.

Der 2te Fall betraf ein 25 Jahre altes Mädchen, das in der Jugend längere Zeit an Chlorose gelitten hatte. Sie hatte deshalb die Beschäftigung als Nähterin aufgeben müssen und dann mehrere Jahre als Magd zu voller Zufriedenheit ihrer Herrschaft gedient, bis sie etwa ¾ Jahre vor ihrer Aufnahme in die Anstalt an Melancholie erkrankte, in der Gehörs- und Gefühlshallucinationen nebst Verfolgungsideen sehr hervorstachen. Während ihres fünfmonatlichen Aufenthaltes in der Anstalt machte sie, abgesehen von den Zeichen ihrer gedrückten Stimmung, schon mehr den Eindruck von geringem Schwachsinn: sie sprach gar nicht, sass in der Regel still für sich und arbeitete nur wenig. Körperlich war sie blass und mager; sehr bald nach ihrer Aufnahme zeigten sich die Erscheinungen einer fieberhaften Erkrankung, die nach objectiver Untersuchung für eine acute Tuberculose der Lungen und des Peritoneum gehalten wurde. Bei der Section fand sich Folgendes:

Der Herzbeutel enthielt etwa 3 Unzen klarer gelblicher Flüssigkeit, das Herz war mässig gross, die Klappen normal und die Musculatur nicht verändert. Die rechte Lunge war an der Spitze und hinten adhärent. Nach Herausnahme der Lunge zeigte sich unter dem Pleura-Ueberzuge eine Masse von grau-weissen, linsen- bis erbsengrossen Knötchen, in deren Umgebung sich fast immer ein kleiner Bluterguss fand. Mit diesen Knoten waren beide Lungen durchsetzt. Der vordere Rand des unteren Lappens der rechten Lunge war in einer Grösse von 2 Zoll Durchmesser ganz von der Masse jener Knötchen durchsetzt. Die Masse der Knoten unterschied sich wesentlich von der der Tuberkeln; sie war vielmehr fest, auf dem Durchschnitt wie Speck anzusehen und gab beim Messerstrich etwas klaren Saft. Auch in der Costalpleura fanden sich solche Knoten eingelagert. In der *Bifurcatio tracheae* lag eine Taubenei grosse, in derselben Weise entartete Lymphdrüse.

Bei Eröffnung der Bauchhöhle floss eine Menge gelblich ge-

färbter Flüssigkeit aus. Das *Peritoneum parietale* war fest verwachsen mit dem Peritoneal-Ueberzuge der Leber und Milz und mit einer Menge jener Knötchen durchsetzt. Leber und Milz, die beide sehr vergrössert, waren ebenfalls unter einander fest verwachsen, und unter ihrem Peritoneal-Ueberzuge fand sich eine etwa 3 Linien dicke Schicht jener graugelben speckigen Masse, ausserdem war ihr Gewebe mit kleinen Knötchen durchsetzt. Das grosse Netz war stark verdickt, etwa ¼ Zoll dick, in Folge von Einlagerungen jener Knötchen die sich mit dem Scalpellstiele sehr leicht herausschälen liessen. Beide stark verdickte Tuben, deren linke mit dem Ovarium fest verwachsen war, zeigten auf dem Querschnitte dieselbe Entartung ihrer Wandung.

Die mikroskopische Untersuchung jener Geschwulstmassen zeigte eine Neubildung, die aus einem Bindegewebsgerüst bestand, welches nicht regelmässige Alveolen umschloss, in diesen Alveolen lagen Haufen von runden hellen Zellen mit zarten Contouren und glänzendem Kern, wie die Lymphzellen; nirgends war ein Zerfall oder eine fettige Entartung nachzuweisen.

Will man diese Geschwulst unter eine der bestehenden Formen bringen, so würde man sie am besten den leukämischen Knoten oder, wie sie sonst genannt werden, lymphatischen Neubildungen subsumiren, eine Geschwulstform, die übrigens mit demselben Recht zu den Myxomen gerechnet werden kann und dem Alveolar-Carcinom auch nicht fern steht.

Bei Eröffnung des kleinen und dünnen Schädels floss etwa 1 Unze klarer Flüssigkeit aus. Das Gehirn wog 42 Unzen. Die weichen Hirnhäute waren wenig blutreich, zart und leicht von der Hirnrinde abzuziehen. Die Hirnrinde war sehr blass, fast gelblich auf dem Durchschnitte, aber etwas glänzend; die Marksubstanz sehr blutarm. Die Seitenventrikel enthielten eine geringe Menge Flüssigkeit, ihr Ependym zeigte nichts Abnormes, wie überhaupt makroskopisch an dem Gehirn nichts Abnormes aufzufinden war, namentlich fanden sich im Gehirn nirgends Ablagerungen, die an die vorhin beschriebenen Ablagerungen in der Lunge, Leber, Milz u. s. w. erinnert hätten.

Bei der mikroskopischen Untersuchung fanden sich in der Hirnrinde ausser der Armuth an Neuroglia-Kernen, ausser den hellen und nur wenig Körnchen enthaltenden sehr schlank-pyramidenförmig gestalteten Ganglienzellen und ausser der Kernarmuth und Schräg- und Längsfaltung der Gefässwandungen wiederum jene mattglänzenden Säume um den Gefässen, die in diesem Falle aber noch breiter, oft

Digitized by

unregelmässig ausgebuchtet und namentlich an den Umbiegungsstellen der Gefässe oft viel breiter wie das Gefäss selbst erschienen.

Seitdem habe ich jene Veränderungen bald in stärkerem, bald in geringerem Maasse regelmässig wieder gefunden bei Personen, die mässig lange Zsit an Melancholie litten und während derselben zu Grunde gingen; zunächst

3) bei einer 40 Jahre alten Frau, die aus einer Familie stammte, in der Geistesstörungen erblich sind. Sie war zwei Monate vor ihrer Aufnahme an Melancholie erkrankt, war damals arbeitsscheu geworden, hatte unter grosser Angst viel gebetet, gefürchtet vergiftet zu werden, dann wieder geäussert, sie wäre schon todt und ihre Angehörigen wären verdammte Sünder etc.

Schon bei der ersten Untersuchung wurde eine Insufficienz und Stenose der *Valvula mitralis* nachgewiesen. Die Kranke starb am 10ten Tage nach ihrer Aufnahme plötzlich in der Nacht.

Die Section bestätigte die Insufficienz und Stenose der *Valvula mitralis*, und war diese bedingt durch eine in Folge von Fett- und Kalkeinlagerung zu einem dicken Wulst verdickte Mitralklappe. Aus dem übrigen Befunde will ich nur noch hervorheben, dass Leber und Milz vergrössert und sehr blutreich waren. Das Hirn wog 40 Unzen. Die Gefässe der *Dura mater* waren stark gefüllt, die weichen Hirnhäute zart und blutreich. Im Subarachnoidealraume fand sich etwas klare Flüssigkeit. Die Hirnrinde war auf dem Durchschnitt ziemlich blutreich, grauröthlich gefärbt, aber glänzend. Die Marksubstanz zeigte zahlreiche grosse Blutpunkte. An der Hirnbasis erschien die linke *Art. fossae Sylvii* atheromatös entartet. Bei der mikroskopischen Untersuchung der Hirnrinde fiel mir auf, dass trotz dem aus der Kalkeinlagerung in die Klappen folgenden schon längeren Bestehen der Circulationsstörung doch die Gefässe nicht sonderlich gefüllt, sondern schlaff, faltig und kernarm und von einem breiten mattglänzenden Saume umgeben waren. Ausserdem fanden sich in diesem Falle an den Gefässen zerstreute Ein- und Auflagerungen von Fettkörnchen.

Der 4te Fall betraf eine 47 Jahre alte Frau. Sie hatte zuerst in ihrem 16. Lebensjahre unter den Nebenerscheinungen der Chlorose kurze Zeit an einer leichten Melancholie gelitten; einen zweiten Anfall hatte sie nach der Geburt ihres ersten Kindes durchgemacht. Darauf war sie gesund geblieben bis vor etwa 4 oder 5 Jahren, dann hatte sie aber jedes Jahr zur Winterszeit, wenn sie weniger ins Freie gehen konnte und mehr in der Stube sitzen musste, einen leichten Anfall von Melancholie bekommen, in dem sie still, trübe, arbeitsscheu war und allerhand Beschwerden klagte; mit dem Früh-

jahr hatte sich beim Arbeiten im Freien wieder Alles verloren. Der letzte Anfall von Melancholie, der sie in die Anstalt führte, war im Februar des betreffenden Jahres mit dem Tode ihres Ehemannes ausgebrochen und trug den Charakter einer heftigen aufgeregten Melancholie. Als sie im August, also 7 Monate nach Ausbruch der Krankheit, der Anstalt übergeben wurde, jammerte und stöhnte sie viel, dass sie keine Vergebung ihrer Sünden finden und nicht selig werden könnte; ferner klagte sie, dass sie ganz „taub“ im Kopfe sei — ohne Zweifel wollte sie damit das Gefühl von Unbesinnlichkeit und Benommenheit ausdrücken, denn sie hörte recht gut. Bei der körperlichen Untersuchung wurde mit Bestimmtheit Lungentuberkulose nachgewiesen und an dieser starb sie dann auch nach drei Wochen, ohne dass in ihrem psychischen Verhalten eine Aenderung eingetreten wäre. Bei der Section zeigte das 48 Unzen wiegende Gehirn Zartheit der weichen Hirnhäute, etwas Flüssigkeit im Subarachnoidealraume, wässerigen Glanz der Hirnrinde und Blutarmuth der Marksubstanz.

Bei der mikroskopishhen Untersuchung ergab sich der oben geschilderte Befund an den Bestandtheilen der Grosshirnrinde.

Zum 5ten Male fand ich jene Veränderungen der Grosshirnrinde in dem Gehirn einer 49 Jahre alten Frau, die aus einer Familie stammte, in welcher Tuberculose erblich ist. Sie erkrankte einen Monat vor ihrer Aufnahme an aufgeregter Melancholie und zwar ziemlich plötzlich, nachdem sie einige Zeit vorher an heftigen reissenden Schmerzen in den Beinen gelitten hatte, als diese Schmerzen verschwanden. Die Untersuchung bei ihrer Aufnahme konnte keine Tuberkulose nachweisen; die ängstliche unruhige Kranke ass aber schlecht, hatte keinen Schlaf und magerte von Tage zu Tage ab. Schon 2 Monate nach ihrer Aufnahme wurde mit Bestimmtheit Tuberkulose in der Spitze der rechten Lunge nachgewiesen; nach ferneren 2 Monaten starb sie, nachdem etwa 2 Wochen vorher zuerst eine Verdichtung der unteren Lappen beider Lungen nachgewiesen war. Die Section bestätigte die Diagnose, indem sich in der Spitze der rechten Lunge neben kleineren Tuberkeleinlagerungen eine kleine mit käsiger Masse gefüllte Caverne fand, während die unteren Lappen beider Lungen mit hirsekorn- bis erbsengrossen Tuberkeln durchsetzt waren. Eine besondere Erscheinung muss ich noch erwähnen, die sich bei der Zerlegung des 41 Unzen schweren Gehirnes fand: es war nämlich das Ependym des vierten Ventrikels bis fast zu einer Linie verdickt und gallertartig erweicht. Bei der mikroskopischen Untersuchung dieses Ependyms fanden sich in der unter der Epithel-Lage des Ependyms sich befindenden faserigen

Digitized by Google

Thomas Hart Benton.
Senator of Missouri, 1821-1851.

Fig. 1. Portrait.

Printed by Stephanus, 16mo. Pp. 8 + 1.

Unterlage neben vereinzelten *Corpuscula amylacea* Massen von kleinen, runden, scharf contourirten, einen deutlichen Kern enthaltenden Zellen zwischen die Fasern gelagert, welche ganz den sogenannten Granulationszellen glichen.

Um durch Aufzählung fernerer mehr oder weniger interessanter derartiger Krankheitsfälle nicht länger die Zeit zu missbrauchen, so will ich nur noch den letzten Fall erwähnen, den zu untersuchen ich Gelegenheit hatte, nachdem die sorgfältige Arbeit von *Henle* und *Merkel*: „Ueber die sogenannte Bindesubstanz der Centralorgane des Nervensystems in *Henle* und *Pfeufer's* Zeitschrift für rationelle Medicin, Bd. XXXIV. Heft 1, S. 49 u. ff. bereits erschienen war.

6ter Fall. Der Kranke war ein 24 Jahre alter junger Mann, der seit seinem 7. Jahre an einer Anschwellung des Knies gelitten hatte. Etwa 3 Monate vor seiner Aufnahme war er an Melancholie erkrankt. Während seines 1¾ Jahre langen Aufenthaltes in der Anstalt bot er stets unverändert das Bild einer tiefen Melancholie dar; er sprach nichts oder nur flüsternd, war ängstlich und scheu, bewegte sich sehr ungern von der Stelle, ohne dabei einen Mangel an Verständniss zu bekunden; vielmehr zeugte das sorgfältige und verständnissvolle Beobachten seiner Umgebung für das Vorhandensein eines ziemlich guten Verstandes. Etwa 3 Monate vor seinem Tode wurde er von der damals in unserer Anstalt herrschenden Dysenteria befallen, von der er sich nicht wieder erholen konnte; er starb vielmehr unter den Erscheinungen einer hinzugetretenen Lungentuberkulose.

Das mit zarten, leicht abziehbaren Häuten überzogene blutarme Gehirn wog 46 Unzen; seine Rindensubstanz wie Marksubstanz war blass und auf dem Durchschnitt wässerig glänzend.

Ueberblicke ich nun, unter Mitbenutzung der von *Henle* und *Merkel* gelieferten werthvollen Untersuchungen über die Lymphwege des Gehirns, die in den vorgenannten Fällen gewonnen Resultate der mikroskopischen Untersuchung, so kann ich dieselben in Folgendem zusammenfassen:

1) In allen Fällen war die Neuroglia sehr arm an Kernen.

2) Die Ganglienzellen waren in allen Schichten der Hirnrinde sehr schlank-pyramidenförmig, scharf contourirt, hell und arm an Körncheneinlagerungen und enthielten einen länglichen hellglänzenden Kern. Sehr häufig waren diese schlanken dünnen Ganglienzellen, namentlich in der oberflächlichen Ganglienzellenschicht, von einem etwa der Hälfte der Breite der Ganglienzelle entsprechenden glänzenden Saume eingefasst, der meistens längs der Ganglienzelle, oft aber auch vor dem Kopfe derselben lag. Dieser Saum hatte grosse

Aehnlichkeit mit dem, welcher in der Regel die grossen Ganglienzellen der tieferen grauen Substanz des Rückenmarks und die grossen Ganglienzellen des Kleinhirns umgiebt, nur war er viel breiter.

3) Die Capillaren und kleineren Gefässe der Hirnrinde waren in ihren Wandungen sehr dünn, blass und arm an Kernen. Dieselben lagen mit Längs- und Schrägfalten versehen innerhalb eines weiten mattglänzenden Lymphraumes, der oft unregelmässig ausgebuchtet und an den Umbiegungsstellen der Gefässe oft sehr weit erschien. An den Theilungsstellen der Gefässe, namentlich an den gabelförmigen, bildete dieser Lymphraum oft eine grössere Lakune. In den mikroskopischen Querschnitten der Hirnrinde fanden sich ausserdem durch das Gewebe zahlreich zerstreut ziemlich grosse runde oder ovale Hohlräume — Löcher —, die offenbar als Querschnitte jener Lymphräume aufzufassen waren, aus denen sich bei der Präparation das Gefäss herausgezogen hatte, denn sehr oft waren darin noch ein oder mehre Lymphkörperchen zu sehen.

4) In dem zuletzt von mir erwähnten Falle wurde an Querschnitten der noch mit *Pia mater* überzogenen Hirnrinde der zuerst von *Bergmann* (Zeitschr f. rationelle Medicin, Bd. VIII. und XI.), dann von *E. F. Schulze* in seiner Monographie, darauf von *His* und zuletzt von *Henle* und *Merkel* so genau beschriebene, „epicerebrale Lymphraum" sehr weit gefunden. Derselbe liegt zwischen der leicht faserigen Grenz-Membran der *Pia mater* und der oberflächlichen moleculären Schicht der Hirnrinde und wird durchzogen nicht nur von Gefässen, die aus der Pia sich in die Hirnrinde senken, sondern auch von den stabförmigen Fortsätzen der Grenzmembran der Pia, die ebenfalls sich in die Hirnrinde senken. In unserem Falle fanden sich nun nicht blos in dem durch diese stiftförmigen Fortsätze gebildeten Maschenwerk Lymphkörperchen eingelagert, sondern sehr häufig auch in der Nähe der durchziehenden Gefässe ganze Reihen von Lymphkörperchen zusammengehäuft.

Will man die in den mitgetheilten Krankengeschichten enthaltenen wichtigen Momente zusammenstellen und einer Kritik unterwerfen, so springt vorzugsweise Folgendes ins Auge:

In allen Fällen ist die Geistesstörung eine noch nicht sehr lange bestandene Melancholie.

In allen Fällen sind die Betroffenen in der Ernährung heruntergekommene Subjecte, die entweder früher an Chlorose gelitten haben, oder Zeichen von scrophulöser Erkrankung an sich tragen, wie z. B. in unserem letzten Falle die chronische Anschwellung des Knies, oder sonst Symptome von Anämie zeigen.

In allen Fällen gesellte sich entweder Tuberculose hinzu

und führte zum Tode, oder aber es tödtete eine andere den lymphatischen Charakter tragende Krankheit, wie diffuse Neubildung lymphatischer Knoten, Glossitis und Entzündung der *Glandula submaxillaris*. Bei Erwähnung der Tuberculose kann ich nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, wie verschieden die Geistesstörung in unseren Fällen von den in den Endstadien der Tuberculose auftretenden eigenthümlichen Störungen ist. In letzteren Fällen trägt die Störung vielmehr den Charakter der Manie: die Kranken überschätzen sich, sie haben die grösste Hoffnung auf Genesung, sie überlegen, was sie übers Jahr für Einrichtungen treffen wollen, sie machen Reisepläne und wenn ihnen der Tod schon auf den Lippen sitzt, kaufen sie noch Reisekleider, ja sie überschätzen ihre eigenen Kräfte so sehr, dass sie selbst losreisen, um in der nächsten Stadt ihren Geist aufzugeben. Ganz anders ist es in unseren Fällen, da ist nichts zu finden von Ueberschätzung, da sind es tiefe Melancholien, in deren Verlaufe sich erst Tuberculose hinzugesellt, ohne die deprimirte Gemüthsstimmung aufzurichten.

In allen Fällen ferner ist das Hirngewicht ein niedriges, bei Frauen 40—42 Unzen, bei dem Manne 46 Unzen.

In allen Fällen findet sich wässeriger Glanz der Hirnrinde auf dem Durchschnitte und klare Flüssigkeit im sogenannten Subarachnoidealraume. Für ersteres mag die Erweiterung der perivasculären Lymphräume des Gehirns und für letzteres die Erweiterung des epicerebralen Lymphraumes wohl vorzugsweise als ursächliches Moment anzuschuldigen sein. Denn für eine Erweiterung der perivasculären Lymphräume muss ich die oben mitgetheilten Befunde in der That halten, weil ich in allen anderen Fällen die Lymphräume nie so weit gesehen habe. Was den epicerebralen Lymphraum betrifft, so fehlen mir allerdings noch ausgedehntere Controle-Untersuchungen.

In allen mitgetheilten Fällen waren die Gefässe der Hirnrinde blass, kernarm, schlaff und faltig. Ist dies nun Folge von verringerter Füllung der Gefässe selbst, oder ist es die Folge einer stärkeren Füllung und Ausdehnung des perivasculären Lymphraums, und sind sie also passiv zusammengedrückt oder hat beides stattgefunden?

In allen Fällen endlich sind die Ganglienzellen sehr schlank-pyramidenförmig, fast etwas verschmälert, arm an Körnchen und häufig in einen breiten, hellen, glänzenden Saum gelagert. Sind sie auch ohne sonstige weitere Degeneration — wie solche bei der allgemeinen Paralyse ja vorkommt — arm an Inhalt und erschlafft oder kann der helle Saum anders gedeutet werden?

Das sind die Resultate von Beobachtungen und Untersuchungen,

die ich einer nachsichtigen Beurtheilung vorlege und für deren dunkle oder gar irrige Punkte, ich um Belehrung bitten möchte.

Nachtrag*).

Schon sehr bald nach Einsendung vorstehenden Vortrags hatte ich wiederum Gelegenheit, die Gehirne zweier in Melancholie verstorbener Frauen zu untersuchen, und daran die oben angedeuteten Controle-Untersuchungen vorzunehmen. Ich erlaube mir, die beiden Fälle in der Kürze mitzutheilen:

Der 7te Fall betraf eine 44 Jahre alte Frau, deren Mutter und Grossmutter geisteskrank gewesen war. Sie litt seit etwa zwei Jahren an Melancholie, die ohne Veränderungen bis zum Tode fortbestand. Sie wurde etwa ¾ Jahr vor ihrem Tode in der Anstalt von Dysenteria befallen, nach der sie sich nicht wieder erholen konnte; die Durchfälle dauerten fort, es trat Lungen- und Darmtuberculose hinzu und so erfolgte der Tod. Das Hirn wog 1344 Grmm.

Im 8ten Falle war es eine 54 Jahre alte Frau, deren Vater geisteskrank gewesen war und die selbst schon 12 Jahre vor ihrer Aufnahme kurze Zeit an Melancholie gelitten hatte. Der letzte Anfall hatte 2 Jahre gedauert. Während ihres Aufenthaltes in der Anstalt war stets ihr eigenthümlich gedunsenes Aussehen und wiederderholtes Anschwellen der Beine aufgefallen, ohne dass die Untersuchung der verschiedenen Organe und des Harns etwas Abnormes ergeben hätte.

Noch mehr trat dieses Gedunsensein hervor, als sie, wenn auch nur kurze Zeit, an Dysenteria gelitten hatte. Etwa 3 Monate vor ihrem Tode entwickelten sich Drüsenanschwellungen am Halse, in der Achselhöhle und in der Leistengegend. Die damals vorgenommene Untersuchung ergab eine bedeutende Vergrösserung der Leber, nicht der Milz; in dem durch Nadelstiche gewonnenen Blute erschienen bei der mikroskopischen Untersuchung die farblosen Blutkörperchen sehr vermehrt. Bei der Section wog das Gehirn 1347 Grmm.

In beiden Fällen waren die weichen Hirnhäute zart, leicht abziehbar, und im Subarachnoidealraume fand sich klare Flüssigkeit.

---

*) Dem dem Protokolle der Sitzung beigelegten Aufsatze sendete der Herr Vrf. den vorstehenden Nachtrag nach, der deshalb der Zusammengehörigkeit halber ebenfalls hier seinen Platz gefunden hat. Red.

Digitized by Google

Bei Vornahme dieser Sectionen drängten sich folgende Reflexionen auf:

1. Sind die oben bei meinem Vortrage ausgesprochenen Veränderungen des Hirns für die Melancholie als wesentliche aufzufassen, so müssen sie sich auch in diesen beiden Fällen finden.

2. Sind die oben angeführten und in der Zeichnung wiedergegebenen mattglänzenden Säume der Ausdruck weiter perivasculärer Lymphräume, so müssen sie sich auch von dem epicerebralen Lymphraume aus injiciren lassen.

3. Der Inhalt dieses epicerebralen Lymphraums muss Flüssigkeit mit Lymphkörperchen sein.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend begann ich die Untersuchung in folgender Weise:

Mit einer feinen Injectionsspritze stach ich unter die weichen Hirnhäute ein und versuchte einen Tropfen der subarachnoidealen Flüssigkeit herauszuziehen; es gelang dies leicht und ich konnte so diese Flüssigkeit unter dem Mikroskop für sich allein untersuchen. Die sofort vorgenommene Untersuchung ergab in der That in der klaren etwas zähen Flüssigkeit zahlreiche Lymphkörperchen, die bald nur als helle Scheiben erschienen, bald mit ihrer Membran einen grossen Kern eng umschlossen.

Zur Injection bediente ich mich einer mässig starken Höllensteinlösung und injicirte, den Druck langsam steigernd, dieselbe unter die weichen Hirnhäute; darauf schnitt ich ein etwa ein Zollquadrat grosses Stück dieses injicirten Gehirns heraus und erhärtete es in Alkohol. Bei der zwei Tage später an dem erhärteten Gehirn vorgenommenen mikroskopischen Untersuchung fand sich in der That, dass die Injectionsmasse von dem epicerebralen Lymphraume aus mit den von der Pia in die Hirnrinde eintretenden Gefässen eine ziemliche Strecke weit in das Gehirn mit eingedrungen war. Die Gefässe waren umgeben von einem breiten braunröthlichen Saume, offenbar der durch die Höllensteinlösung gefärbten Wandung des perivasculären Lymphraums.

Dieselbe Färbung durch Höllensteinlösung fand sich in diesen Fällen an den Fig. 1b. hellgezeichneten Quer- und Schrägschnitten der perivasculären Lymphräume. Der epicerebrale Lymphraum selbst war sehr weit und die denselben durchsetzenden Wandungen des Maschenwerks waren segelförmig aufgebläht, ein Zeichen, dass sie durch starke Anfüllung mit Flüssigkeit bauschig ausgetrieben waren. Am auffallendsten wurden diese mikroskopischen Bilder, wenn man sie verglich mit den Bildern solcher mikroskopischer Hirnapparate, die ich angefertigt hatte von dem in derselben Weise injicirten Hirn

eines Paralytikers, dessen Hirnhäute mit der Hirnrinde fest verwachsen waren und sich von der Hirnrinde nur mit Substanzverlust abziehen liessen; hier war der epicerebrale Lymphraum nur als ganz schmale helle Linie zu sehen und nirgends war Injectionsflüssigkeit mit den Gefässen in die Hirnrinde eingedrungen.

Die mikroskopische Untersuchung von Hirnstückchen, die in Chromsäure-Lösung erhärtet waren, ergab dieselben Veränderungen, die ich oben bereits beschrieben habe, als: Erschlaffung und Faltung der Gefässwandungen, Erweiterung der perivasculären Lymphräume, Körnchenarmuth, Erschlaffung und Verschmälerung der Ganglienzellen.

Erklärung der Abbildungen.

Figur 1. zeigt einen Theil eines Querschnittes der Hirnrinde bei 250facher Vergrösserung.

a) die erweiterten perivasculären Lymphräume von der Fläche gesehen;

b) Querschnitte dieser Lymphräume, aus denen bei der Präparation das Gefäss sich herausgezogen hat,

bei b' ein Lymphkörperchen enthaltend;

c) ein gabelförmig sich theilendes Gefäss vom Lymphraume eingeschlossen, dieser bildet in der gabelförmigen Theilung

d) eine Lymphlakune;

e) eine blasse körnchenarme Ganglienzelle vor deren Kopf ein hellglänzender (f) Raum liegt.

Figur 2. zeigt isolirte Ganglienzellen aus der vierten Rindenschicht, schlank, nicht körnchenreich, mit scharfem Contour und hellglänzendem Kern bei 1000facher Vergrösserung. (*Hartnack*'sches Immersions-System).

Figur 3. Ein Theil eines Querschnittes der Hirnrinde, oberflächliche Ganglienzellenschicht:

a) sehr schmale dünne glänzende Ganglienzelle, körnchenarm,

b) glänzender Raum vor dem Kopfe einer derselben.

350fache Vergrösserung.

Figur 4. Eine solche schlank-pyramidenförmige Ganglienzelle aus derselben Schicht, an allen Seiten von solchem breiten hellglänzenden Saume umgeben.

1000fache Vergrösserung.

Figur 5. zeigt aus ihren Lymphräumen herausgezogene blasse,

Digitized by



4

2



3

Digitized by Google

Digitized by Google



schlaffe, längs- und schräggefaltete kernarme Gefässe, die an einzelnen Stellen eine sparsame Auflagerung von Körnchen zeigen.

350fache Vergrösserung.

Figur 6. zeigt einen senkrechten Abschnitt der Hirnrinde eines mit Höllensteinlösung injicirten Gehirns mit Hirnhäuten von einer Melancholischen bei 90facher Vergrösserung:

a) die von Höllenstein braunroth gefärbten weichen Hirnhäute;

b) der mit segelförmig aufgeblähten Wandungen (c.) durchsetzte erweiterte epicerebrale Lymphraum;

d) die von Höllenstein gefärbte, oberflächliche körnige Hirnrindenschicht;

e) ein Gefäss, mit dem die Höllensteinlösung in dem perivasculären Lymphraume eingedrungen ist und diesen (f.) braunroth gefärbt hat;

g) Schrägschnitt eines mit Höllensteinlösung injicirten perivasculären Lymphraumes.

In der über den Gegenstand eröffneten Diskussion bemerkte Dr. *Wiedemeister*, dass er in dem Gehirne von Geisteskranken, welche an Melancholie verstorben waren, regelmässig Leerheit und Erschlaffung der Capillar-Gefässe gefunden habe, sowie in der Manie starke Füllung der Capillaren.

Da ein weiterer Vortrag nicht angekündigt wurde, so stellte der Vorsitzende die Beobachtungen über „Doppel-Wahrnehmungen“ in der gesunden und kranken Seele, welche unlängst von *Jensen* in der allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie publicirt worden sind, zur Diskussion. Um zunächst die von *Jensen* behauptete Häufigkeit der sogenannten Doppelwahrnehmungen bei gesunden Menschen zu constatiren, wurden die Anwesenden nach solchen Wahrnehmungen befragt und es fand sich in der That, dass die Mehrzahl der Anwesenden derartige Beobachtungen an sich selbst gemacht hatte. Es wurden hierauf pathologische Erscheinungen der genannten Art von mehreren der Anwesenden constatirt. Dr. *Wiedel* trägt einen dahin gehörenden sehr eclatanten Fall vor. Ein Mädchen in der Pflegeanstalt zu Hildesheim, welche an Epilepsie mit periodischen Aufregungen leidet und sich zum erstenmal in der Anstalt befindet, behauptet früher bereits dreimal in der Anstalt gewesen zu sein. Sie habe bei ihrer früheren Anwesenheit ganz ähnliche oder gleiche Situationen wie gegenwärtig erlebt. Wenn z. B. eine neue Kranke in ihre Abtheilung aufgenommen wird, so behauptet sie, dieselbe sei bei ihrer dreimaligen früheren Anwesenheit in der Anstalt ganz in derselben Weise jedesmal aufgenommen worden u. s. w.

Digitized by Google

Dr. *Seebohm* erzählt einen ähnlichen Fall, in welchem ein in seine Anstalt (Königshof) neu aufgenommener Kranker die Anstalt, die Umgegend und die nahe gelegene Stadt (Münden) genau zu kennen vorgab, während er niemals in der Gegend gewesen war.

Dr. *Lorent* beobachtete eine altersschwache Dame, welche zugleich in der Gegenwart und längst vergangener Zeit vor 30—40 Jahren zu leben glaubte und z. B. nach längst verstorbenen Personen fragte und mit denselben in Verkehr zu stehen glaubte.

Dr. *Snell* macht auf den Zusammenhang derartiger Erscheinungen mit der bei Geisteskranken so häufig beobachteten Personen-Verwechselung aufmerksam.

Dr. *Seebohm* stellt an die Versammlung die Frage über die Höhe der Gaben von Narcoticis, besonders Morphium, welche beobachtet worden seien ohne Schaden für die Gesundheit und das Leben der Kranken. Er erzählt von einer Kranken, welche sich unter der Behandlung eines anderen Arztes allmälig an die Gabe von 24 Gran Morphium täglich (Morgens 12 Gr. und Abends 12 Gr.) gewöhnt hatte.

Dr. *Snell* kannte eine hysterische, an Neuralgieen leidende Dame, welche ebenfalls 16 Gran Morphium täglich nahm.

Es entspann sich hieraus eine Diskussion über die Frage, ob Geisteskranke höhere Gaben von Narcoticis ohne Schaden ertragen könnten als Geistesgesunde, was von einigen der Anwesenden behauptet, von anderen aber in Abrede gestellt wurde.

Dr. *Ripping* regt die Frage des Kalium bromatum bei Epilepsie an. Alle stimmen darin überein, dass die Wirkung dieses Mittels sehr ungleichmässig und unsicher sei.

In der Anstalt zu Hildesheim wurden in letzterer Zeit zahlreiche Versuche damit gemacht. In einigen Fällen verminderte das Mittel die Zahl der Anfälle sehr bedeutend und beruhigte auch die Aufregung dieser Kranken, jedoch nur selten auf die Dauer. In anderen Fällen zeigte sich keinerlei günstige Wirkung.

Dr. *Lorent* legte der Gesellschaft ein Album mit Photographieen und Autographen deutscher Irrenärzte vor, welches zum Besten des neu erbauten deutschen Hospitals in London verwerthet werden soll. Dr. *Lorent* hat zu dem gleichen Zwecke noch ein grösseres Album mit 600 Photographieen und Autographen deutscher Naturforscher und Aerzte gesammelt. Die Versammlung drückte demselben ihre Anerkennung für dieses ebenso mühevolle als verdienstliche Werk aus.

Die Sitzung wurde hierauf geschlossen.

Nächste Versammlung am 15. October dieses Jahres, Nachmittags 4 Uhr, in *Bornemann's* Hôtel in Hannover.

Dr. *Snell.*

Digitized by Google

Kleinere Mittheilungen.

„*Die schriftlichen Aeusserungen Geisteskranker*“ — hält Dr. *E. Güntz* für die hauptsächlichsten Formen der Geisteskrankheiten (Melanch., Tobsucht, Wahnsinn, Verrücktheit, progressive Paralyse mit Höhenwahn und Blödsinn) wesentlich verschieden:

1) Die Schriften sind abweichend nach Form, Inhalt, Quantität und Qualität, wobei die Schrift selbst relativ oder absolut normal sein kann.
2) Die Abweichungen beweisen oft am frühesten den Beginn der Seelenstörung.
3) Durch die schriftlichen Aeusserungen wird das Krankheitsbild vervollständigt und resp. berichtigt. Oft geben sie allein den Aufschluss über Ursache und Dauer der Erkrankung.
4) Sie zeigen am frühesten und sichersten den Uebergang aus einer psychischen Krankheitsform in eine andere an.
5) Sie geben den sichersten Anhalt für das Eintreten und Fortschreiten der Genesung.
6) Sie sind in forensischer Beziehung ein Unterstützungsmittel zur Beurtheilung jedes Einzelfalls.
7) Selbst bei ausgeprägten und vorgeschrittenen Krankheitsformen können relativ und selbst absolut normale schriftliche Producte von Geisteskranken geliefert werden.

Der Melancholische schreibt nur selten, von 100 nur 20, manche im Verlaufe der ganzen Krankheit gar nicht. Manchmal ist dies noch das einzeige Zeichen der Krankheit. Ein Kranker sprach im Briefe die zuversichtliche Hoffnung auf baldige Genesung aus und machte ¼ Stunde später einen Erdrosselungsversuch. Im Anfangsstadium ist der Inhalt klar, aber der Grad der melancholichen Verstimmung übersteigt die Grösse des geschilderten Unglücks.

In Mel. mit Stupor ist der Kranke unfähig zu schreiben.

In der sogen. schwarzen Melancholie schreibt der Kranke

entweder gar nicht oder correcte zuversichtlich gestimmte Briefe, täuscht leicht. In der Mel. mit Hypochondrie füllt der Kranke im Anfange die Briefe mit seinen Leiden aus, später ist er noch schreibselig, zeigt den beginnenden Schwachsinn durch das Stereotypen von Form und Inhalt, den grillenhaften Blödsinn durch lakonische, zuweilen überraschende Kürze. Der Tobsüchtige malt nur, ist vor dem Beginn schreibselig. Im Wahnsinn schreiben von 100 die Hälfte. Bei Beobachtung der geselligen Form und scheinbar klarer Sprache giebt die auffällige Verworrenheit des Niedergeschriebenen Auskunft. Bei religiösem Wahnsin Neigung zu vielem Schreiben mannigfaltigen Inhaltes. Der Verrückte schreibt viel und gern, theils in Folge der Wahnvorstellungen, theils aus Selbstgefälligkeit (Klagschriften, Bittschriften etc.). Bei allgemeiner Paralyse, wenn Anf. die Lähmung vorwiegt, schreibt der Kranke klar, aber mit auffällig unsicheren Schriftzügen und der Arzt kann früh die Diagnose feststellen. Im umgekehrten Falle ist der Gedankengang lückenhaft und stereotyp, während die Schriftzüge noch sicher und fest sind. (Sitz.-Ber. der Ges. f. Natur u. Heilk. in Dresden 1868/69. S. 102.) L.

Nocturnal Insanity. — Unter dieser Bezeichnung beschreibt Dr. *Andrew Allison* aus Bridlington eine eigenthümliche Geistesstörung. Er sagt von ihr, die pathognomonischen Zeichen vorführend, von allen Geisteszuständen, womit der Psychologe zu thun hat, bieten wenige eben Phasen dar von grösserer Schwierigkeit, als jene nächtlichen Hallucinationen, denen ein gewisser Theil von Kranken unterworfen ist. Es sind dies Personen von den verschiedensten Temperamenten, welche gelegentlich während der Nacht Merkmale von Geistesstörung gewahren lassen, indess sie zur Tageszeit scheinbar ganz davon frei scheinen. Gewöhnlich sind Individuen, durch besondere Sparsamkeit charakterisirt, Beute dieser Krankheit. Die vorzüglichste Anlage, welche das beginnende Stadium dieses Gehirnleidens kennzeichnet, ist Geiz, sich kundgebend durch unmässiges Verlangen, übertriebene Arbeit zu verrichten, und durch Unzufriedenheit mit Denen, die nicht zu ihrem Gewinne erheblich mitbeigetragen. *Latimer*, ein scharfer ärztlicher Beobachter, weist nach, dass in der Nähe von Rotterdam die Mehrzahl der Kapitalisten während der letzten 2 Lebensjahre maniakale Zeichen offenbaren, und dass ihre Excentritäten beherrscht werden vom Betrage ihres Besitzes oder von den verschwenderischen Gewohnheiten ihrer Leibeserben. Dieser Mann versichert, er selbst sei dieser Epidemie nur durch die Bescheidenheit seines Vermögens entgangen, das er sich in 35jähriger Praxis erworben. Solche Kranke verrichten zur Tages-

Digitized b

zeit ihre Geschäfte mit gewohntem Geschicke, und während der Geschäftsstunden lastet auf ihrem geistigen Wesen nur ein geringer Verdacht, — allein zur Zeit, wo sie sich zur Ruhe begeben, treten an die Stelle des Gescheidtseins bei Tage Anzeichen von Störung desselben. Zeitlich in der Nacht beginnt so ein Individuum aufgeregt zu werden, raisonnirt unrichtig und verwirft den Bescheid seiner Freunde in der Meinung, dass sie auf sein Verderben abzielten. Dieser Zustand von Illusion geht in Melancholie unter, die den ersten Theil der nächtlichen Tragödie bildet. Zuletzt wird es von einem Gefühl von Erschöpfung überholt, legt einen uneigennützigen Wunsch für das Wohlergehen Anderer an den Tag, sehnt sich nach Ruhe und verfällt endlich in einen unterbrochenen Schlaf von ein Paar Stunden, womit sich der zweite Zeitraum der Nacht-Scene abschliesst. Gegen Morgen geht es wieder mit Eifer, einer edleren Sache würdig, an den Mammon-Schrank. Er entwickelt beträchtliche geistige und grosse Muskelthätigkeit und dieses mit einer rastlosen Aengstlichkeit in Besorgung von Aufträgen und mit einer Art von Missbilligung Derer, die nicht gleich ihm thun. Zu Bette verkehrt er gerne über religiöse Themen und verbreitet sich über praktische Moralität, abwechselnd Furcht und Hoffnung über sein Geschick ausdrückend. Jeden kommenden Abend treten seine Täuschungen wieder hervor und die Nacht wird wieder in Gesprächen hingebracht, ganz gegen die Weise eines gesunden Menschen. Sollte seine Familie sich mit Absonderung befassen wollen, so stösst sie auf bedeutende Schwierigkeit, die ärztliche Untersuchung einzuleiten. Zur Tageszeit ist es dem Irrenarzte unmöglich, aus Handlung oder Gespräch des Kranken solche Haltungspunkte zu gewinnen, um damit eine Ueberweisung in ein Irrenhaus zu begründen und ist auf fragmentarische Mittheilungen von Jenen beschränkt, welche mit seinen nächtlichen Hallucinationen conversiren. Daher kommt nun die Schwierigkeit, seinen Geisteszustand zu einer Zeit zu lösen, in der seine Handlungen von geisteskranken Trieben gelenkt werden, welche oft zu einem bedenklichen Vorschub in der Anwendung zweckdienlicher Mittel bestimmen.

Das Gesetz in seiner väterlichen oder vormündlichen Fürsorge für Sicherheit von Leben und Eigenthum, verkörpert sich in dem Dazwischentreten des Priesters und des Sicherheitsbeamten, und veranlasst die nothwendige Absperrung der Kranken in eine gesetzlich bestehende Anstalt, womit dann ein endlicher Entscheid ermöglicht wird.

Die Verfügung über Personen, mit dieser Form von Irresein behaftet, wird oft Gegenstand forenser Untersuchung. Vrf. hatte vor

ein Paar Jahren die Oberaufsicht in einem Falle von nocturnal Insanity — und wäre es zu einer legalen Untersuchung gekommen, so hätte er als Ergebniss seiner Beobachtungen blos angeben können, dass sein Kranker zur Tageszeit vollkommen bei Sinnen sei, dass er aber zur Nachtszeit unbezweifelt ein unzurechnungsfähiger Irrer sei. Solche Fälle veranlassen oft Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf Verantwortlichkeit Crimineller, mit schweren Vergehen belasteter. Gewöhnlich sieht das ärztliche Personal den Angeschuldigten gerade nur in dem dem geistig gestörten entgegengesetzten Zustande. Die Folge davon ist, dass förmlich chamäleonartige Behauptungen aufgestellt werden, auf der einen Seite auf Schuld, auf der anderen ganz entgegengesetzt auf Schuldlosigkeit lautend. Vrf. hält nun dafür, dass, wenn ein Verbrechen während eines Paroxysmus-Anfalls von Geistesverwirrung gefasst, zur Zeit scheinbarer Verantwortlichkeit aber verübt wurde, das Vergehen unmittelbar ein milderndes Ansehen gewinnt.

Die Vollbringung einer unrechten Handlung während eines nicht erwiesenen normalen Geisteszustandes erhebt sich blos zu einer fraglichen Nachweisung legaler Schuld, während positive Anzeige nächtlichen Irreseins die Zeugschaftswage zu Gunsten des Angeschuldigten neigt. Vrf. ward von der Ortsbehörde eines Nachbardorfes einmal aufgefordert, über den Geisteszustand einer Frau zu berichten, welche während der Nacht einen Mordversuch gegen ihren Gatten verübt hatte. Die genaueste Untersuchung lieferte gar keinen Nachweis auf einen anormalen Zustand der Intelligenz. Dennoch wiederholte sie später ihren Versuch, den Gatten im Bette auf die Seite zu schaffen. In Folge einer Dazwischenkunft eines Priesters und eines anderen Surgeon ward sie ins York county Asylum überführt, wo sie 12 Monate verblieb.

Grosse Missgriffe wurden schon in den Gerichtshöfen begangen dadurch, dass man Nacht-Irresein übersah.

Kein Gerichtshof soll das Zeugniss eines Irrenarztes annehmen, der nicht Tag- und Nacht-Zustand vom Verstande seines Kranken zum Gegenstande seiner besonderen Erforschung gemacht hat — ohne dieses kann kein richtiger Schluss über den ganzen Fall erhoben werden. In jedem civilisirten Lande überhebt volle Nachweisung von Geistesstörung einen Gefangenen der gesetzmässigen Folge beabsichtigten Verbrechens, und die cerebrale Erschöpfung, welche auf Nächte voll Aufregung erfolgt, muss die Strafe für Handlungen, während der Intervalle von Irresein begangen, zusammt fraglich machen. Dem Vrf. gelten lichte Zwischenräume, welche während der Nachtwahnsinns eintreten, nicht weniger für Beweis von gestörter

Digitized by Google

Intelligenz, als dass sie nicht den Angeschuldigten von den Folgen eines beabsichtigten Verbrechens losmachen. Die ersten Perioden remittirender Geistesstörung kennzeichnen Zustände von *congestio apoplectiformis* oder *vertigo epileptica*. Bei weiter vorgeschrittener Periode hat ein höherer Grad von krankhafter Entwickelung statt und der arme maniacus ist dann als gesetzlich unzurechnungsfähig erklärt. Geht die Diagnose auf ein cerebro-spinal-Leiden, und nicht auf Sympathieen entfernter Organe hinaus, dann ist die Prognose trüber. Hirnpathologie und Pathologie von Organen, damit zusammenhängend Microscopie haben viel geleistet für Kenntniss organischer und Functionsstörungen — und dennoch sind wir auf weitere Studien noch angewiesen — und abwarten ihrer Resultate. Das Licht, welches bereits schon die Morphologie des Gehirns erleuchtet und helle Reflexe auf die Psychiatrik wirft — erhielt noch einen wohlthätigen Zuschuss in den Irrenanstalten der Neuzeit, in denen sich die Menschheit ebenso viele Monumente errichtet hat.

(Medical Times and Gazette Nr. 947. 1868. S. 210).

Dr. *J. B. Ullersperger.*

Aus der Schweiz — In unserem Irrenwesen sind wesentliche Ereignisse zu notiren. Director *Gudden* von Werneck ist zum Director der Anstalt bei Zürich und zum Professor der Psychiatrie an der Hochschule ernannt, und die neue Anstalt wird nächstes Frühjahr eröffnet werden. Höchst wahrscheinlich wird Dr. *Huguenin* 2ter Arzt werden. Beide Persönlichkeiten werden der schweizerischen Psychiatrie zur Ehre gereichen und wir wünschen ihnen von Herzen Glück zu ihren Stellungen.

Auch die Regierung des Cantons Waadt hat einen Director gewählt für die neue Anstalt bei Lausanne. Man wusste einen der tüchtigsten jungen Aerzte, Dr. *Dumur*, zu gewinnen, der nun eine Reise in die bedeutendsten Anstalten Europas machen und sich zunächst zu einem längeren Aufenthalte nach Illenau begeben wird. Sein Reiseplan ist für 2 Jahre — bis zur Vollendung der Lausanner Anstalt — berechnet. Wir empfehlen den liebenswürdigen, talentvollen Mann allen unsern Collegen und zweifeln nicht daran, dass er die herrliche Anstalt am Genfersee mit dem Geiste der Humanität und Wissenschaftlichkeit beleben wird.

Königsfelden schreitet unter *Schaufelbühl*'s sachkundiger Leitung rasch vorwärts und scheint den Siegespreis der schweizerischen Anstalten zu erringen. Viel trägt hiezu bei die Einheitlichkeit des Programmes, über das Dr. *Schaufelbühl* einzig gebietet, wie dieses seiner Zeit *Bovet* bei *Préfargier* zum Wohle dieser Musteranstalt möglich

war. In der Geschichte von Königsfelden ist noch einer interessanten Episode zu erwähnen. Als es sich vor 2 Jahren darum handelte, 2 Millionen für diese Anstalt zu beschliessen und die Herren des grossen Rathes bedenkliche Miene machten, wurde von den Freunden der Anstalt zunächst der Antrag gestellt, Dr. *Schaufelbühl* vor die Versammlung zu berufen und seine Ansicht zu hören. Der Antrag wurde genehmigt, und durch eine zweistündige meisterhafte Rede brachte es unser College dazu, eine fast einstimmige Annahme des regierungsräthlichen Antrages und die Genehmigung der 2 Millionen zu erzielen.

Auch in Luzern geht es vorwärts und es kann fast mit Sicherheit angenommen werden, dass das von *Zinn* und *Schärer* ausgearbeitete Project des Umbaues des Klosters St. Urban die Genehmigung erhalten werde. Die Anstalt soll für 250 Kranke eingerichtet werden, der Ankauf des Klosters und der Ländereien 600,000 Fr. und der Einbau 600,000 Fr. kosten. Freiburg, Schaffhausen und Basel sind noch im Stadium des Projectirens, doch hoffen wir, dass auch in diesen Cantonen die Projecte bald positive Formen annehmen werden.

St. Pirminsberg ist durch *Zinn*'s unermüdliche Bestrebungen in eine Anstalt ersten Ranges umgewandelt worden. Der psychiatrische Congress der Schweiz hat daselbst am 28. August seine Sitzungen gehalten. Préfargier hat eine prächtige Villa zur Aufnahme reicher Pensionaire erhalten, die sehr sehenswerth ist und wohl zu den besten gehört, was für diese Kranken bisher geleistet wurde. Die Waldau hat eine Ackerbaucolonie gegründet, zunächst allerdings nur für 30 Männer; es sind aber alle Aussichten vorhanden, dass dieselbe vergrössert werden wird. Die Zellengebäude sind seit 2 Jahren mit Pulsions-Ventilation versehen nach einem von dem Hause *Sulzer* erfundenen Systeme, was wir bei einer anderen Gelegenheit genäuer beschreiben wollen.

Sie sehen, dass trotz unserer politischen Stürme die Humanität stets hoch gehalten wird, und wenn dieser gute Geist nur noch einige Jahre anhält, woran nicht zu zweifeln ist, so wird jeder arme Geisteskranke der Schweiz sein Asyl finden.

Dr. *Cramer.*

Aus der Schweiz. — Der Grosse Rath von St. Gallen hat dem Director der Irrenanstalt St. Pirminsberg (in Dorf Pfäfers), Dr. *Zinn* (aus der Pfalz gebürtig), in Anerkennung seiner Verdienste eine persönliche Gehaltszulage von 2000 Fr. votirt. (Nat. Zeitg. Nr. 269.

Digitized by Google

Aus Dänemark. — 1. Heilanstalt Vordingborg auf Seeland. Prof. *Jensen.* Bestand am 1. Januar 1867 143 (63 M., 80 Fr.). Zugang im Jahre 1867 117 (60 M., 57 Fr.). Behandelt in dem Jahre 1867 260 (123 M., 137 Fr.). Abgang im Jahre 1867 116 (53 M., 63 Fr.). Bestand ult. December 1867 144 (70 M., 74 Fr.).

Unter den Neuaufgenommenen waren am stärksten vertreten die Altersklassen 21—25 Jahre mit 19 pCt., der bürgerlichen Stellung nach die Handwerker und dienende Classe mit 34 pCt. — Es waren erkrankt an Manie 36,7 pCt, an Melancholie 48,7 pCt. — Familienanlage war fast bei der Hälfte aller Aufgenommenen nachzuweisen Geheilt wurden 22, 3 pCt., es starben 3 pCt.

Im Gegensatze zu früheren Jahren war in diesem der Zugang von Männern grösser als der der Frauen, aus welchem Grunde der Vorschrift der Statuten, alle Kranke zu entlassen, welche nach 2jährigem Aufenthalte keine Aussicht auf Genesung bieten, auch für die Männer strenge nachgelebt werden musste. — Eine wesentliche Erweiterung der Anstalt ist im Bau begriffen, und geht der dirigirende Arzt mit dem Plane um, auf dem 60 preuss. Morgen ausmachenden Areale der Anstalt einzelne kleine Wohnungen für Handwerker und früh ere Wärter und Wärterinnen zu erbauen, welche 2—3 passende Kranke gegen ein mässiges Kostgeld in familiale Verpflegung nehmen, dabei aber stets unter der Controle der Anstalt bleiben sollen.

2. Heil- und Pflegeanstalt St. Hans Hospital in Bistrupgaard. Prof. *Steenberg.* Bestand am 1. Januar 1867 510 (216 M., 294 Fr.). Zugang im Jahre 1867 120 (61 M., 59 Fr.). Anwesende im Jahre 1867 630 277 M., 353 Fr.). Abgang im Jahre 1867 122 (63 M., 59 Fr.). Bestand ult. December 1867 508 (214 M., 294 Fr.)

Am stärksten vertreten unter den Neuaufgenommenen waren die Altersklassen 30—40 Jahre, nämlich mit 27 pCt., der bürgerlichen Stellung nach der dienende Stand mit 20 pCt., demnächst der Handelsstand mit 15 pCt. — Es litten an Manie 14,2 pCt., an Melancholie 30,8 pCt.; bei 40, 8 pCt., war Familienanlage nachzuweisen. — Es genasen von den Anwesenden der Heilanstalt 15,8 pCt., es starben von allen Anwesenden 7,7 pCt.

Hinsichtlich der Anwendung des Zwanges ist es hier wie überall das Bestreben gewesen, denselben auf das möglichst geringe Maas einzuschränken, ohne dass jedoch bis jetzt der Wunsch realisirt worden wäre, denselben gänzlich zu verbannen. — Ein Besuch vieler englischer Anstalten von Seiten des dirigirenden Arztes im Laufe des Winters 1866/67 überzeugte denselben, dass man in England jetzt überall das No-restraint-System bis zu seinen äussersten Consequenzen durchführe, in keiner Anstalt hat er auch nur einen

einzigen Kranken gesehen, der in dem freien Gebrauche seiner Glieder auf irgend eine Weise beschränkt gewesen wäre. Der dänische Herr College findet diese auffallende Erscheinung erklärlich einmal durch die Thatsache, dass, seiner Beobachtung gemäss, die englischen Geisteskranken sich durch einen weit höheren Grad von Ruhe und Gleichmüthigkeit auszeichnen als Kranke anderer Nationen, dass es daher jedenfalls eine viel leichtere Aufgabe ist, bei diesen den Zwang ganz zu verbannen, als bei Kranken anderer Länder, — weiterhin auch durch einen Umstand, dem der Verfasser mit Recht einen sehr bedeutenden Einfluss auf die grössere Ruhe in englischen Anstalten zuschreibt, — es ist nämlich in England ein allgemein durchgeführter Grundsatz für die weiblichen Abtheilungen, die sich ja überall besonders durch ihre laut schreienden, ihre widersetzlichen, streitsüchtigen, gewaltthätigen, gegen jede Hausordnung sich auflehnenden Insassen auszeichnen, für diese Abtheilungen nur Wärterinnen aus den mehr gebildeten Ständen zu engagiren, denn um niemals zu vergessen, dass alle höhnenden, schimpfenden Aeusserungen, alle gewaltthätigen Acte und Symptome eines kranken Gehirns sind und denselben demgemäss mit Güte und Freundlichkeit entgegenzutreten, dazu gehört neben einer natürlichen Herzensgüte ein mehr entwickeltes Tactgefühl, als man es bei den ungebildeten Bevölkerungsklassen zu finden gewohnt ist.

Es ist nun zwar eine unbestrittene Thatsache, dass in den Irrenanstalten eines Landes der Nationalcharacter der Bevölkerung gar sehr ausgeprägt und kenntlich ist, sollte aber hierdurch allein das No-restraint-System, wie es in England durchgeführt ist, sich erklären lassen? sollten wirklich die englischen Geisteskranken sich in so hohem Grade von den Kranken anderer Länder unterscheiden? die psychische Störung mit steter Gleichförmigkeit in dieser ganz bestimmten, passiven Form bei ihnen zum Ausdruck kommen? — solche Unicität anzunehmen möchte doch wohl zu gewagt sein, ja der Herr Verfasser führt auch schon selbst an, dass die Physiognomie der schottischen Irrenabtheilungen eine ganz andere sei, indem man hier viel turbulentere, mehr schwatzende, streitsüchtige Kranke und zwar in grösserer Anzahl antreffe und dass demungeachtet auch hier alle Kranken durchaus ohne restraint behandelt würden. Es dürfte wohl richtiger sein, anzunehmen, dass es mehr die Folge des comfortablen Lebens, der reichlichen und guten Kost in englischen Anstalten, ferner der vielen Einzelzimmer und des gut geschulten Wartepersonals ist, dass wir aus denselben jeglichen Zwang verbannt sehen. Ist man fernerhin nicht genöthigt, aus öconomischen Gründen mit ängstlicher Genauigkeit darüber zu wachen, dass keine Klei-

der zerrissen, keine Fenster zerschlagen werden, so wird auch bei anderen Nationen das Restraintsystem sicher eben so gut abzuschaffen sein, es braucht dann für diese Maassregel nicht die Zeit der allgemeinen Bildung erst für Dänemark abgewartet zu werden, wie der allverehrte Herr College dieses vorschlägt.

Um jüngeren Aerzten in grösserer Anzahl die Gelegenheit zu bieten, sich eingehender mit der Psychiatrie zu befassen, ist für Bistrupgaard Anfang 1867 die Bestimmung in Kraft getreten, dass stets 2 Candidaten des Allgemeinen Hospitals in Kopenhagen auf 4 Monate in der Anstalt fungiren sollen, und sind demzufolge während des laufenden Jahres 6 Candidaten dort beschäftigt gewesen.

3. Heil- und Pflegeanstalt Aarhuus für Jütland, Prof. Selmer. Bestand am 1. Januar 1867 389 (198 M., 191 Fr.). Zugang im Jahre 1867 156 (61 M., 95 Fr.). Anwesend im Jahre 1867 545 (259 M., 286 Fr.). Abgang im Jahre 1867 139 (57 M., 82 Fr.). Bestand ult. December 1867 406 (202 M., 204 Fr.).

Unter den Neuaufgenommenen waren die Altersklassen 25—30 Jahre am stärksten vertreten mit 14 pCt., dem bürgerlichen Stande nach die dienende Klasse und der Bauernstand mit 60 pCt. — Es litten an Manie 30,7 pCt., an Melancholie 33,9 pCt. Familienanlage war nachzuweisen bei 42,5 pCt. der Männer, 53,5 pCt. der Weiber. Beschäftigt waren von den anwesenden Kranken durchschnittlich täglich 59,7 pCt., mit Zwangsmitteln behandelt durchschnittlich am Tage 3,0 pCt., während der Nacht 3,3 pCt. Geheilt wurden 7,1 pCt. aller Anwesenden; es starben 5,1 pCt. Da die Anstalt für nur 400 Kranke (200 von jedem Geschlecht) bestimmt ist, so machen sich auch hier die Folgen der Ueberfüllung gar sehr bemerkbar. (Bibliothek for Läger. XVI. 2. u. XVII. 1) Dr. *Henningsen.*

New Hampshire Asylum im Juni 1867. — Jährlich hat ein Superintendent an eine Commission von Bevollmächtigten darüber Bericht zu erstatten, und Letztere ihrer Seits an den Senat und das Haus der Repräsentanten. Die gesetzlichen Statuten bestimmen die Verwendung des Eigenthums für dürftige Patienten, und das Einkommen von einer Schenkung des verstorbenen Moody Kent Esq. im Betrage von ungefähr 9000 Dollars jährlich ist zum Theil zu diesem Zwecke verwendet.

Nach dem Berichte des Superintendenten Dr. *J. B. Bancroft* ist die Zahl der Kranken im Jahre 1866 Monats Mai im Ganzen 236, davon 111 M. und 125 W. Im Laufe des Jahres wurden aufgenommen 117, nämlich 63 Männer und 54 Fr. 45 M. und ebenso viele Frauen wurden entlassen, ferner starben 7 M. und 10 Fr. — so,

dass der Anstalt im Ganzen im Jahreslauf 107 Individuen entzogen wurden, und bis 1. Mai 1867 dort verblieben 246 Patienten, darunter 122 M. und 124 Fr.

Von diesen wurden im Ganzen als geheilt entlassen 39, nämlich 18 M. und 21 Fr., mehr oder weniger gebessert wurden 24, darunter 13 M. und 11 W. — nicht gebessert blieben 27, nämlich 14 M. und 13 Fr. Von den Gebesserten wurden 11 tauglich zur regelmässigen Verwendung, und in der Art, dass man für sie gut stehen konnte. Von den Ungebesserten wurden 15 versetzt, theils in Privat-, theils in Armenhäuser, um die Lasten der Anstalt zu erleichtern. Einige Wenige, welche wenig Hoffnung zur Heilung oder Besserung versprachen, wurden in solchem Zustand in die Heimath geschickt, dass sie von Freunden und Verwandten verpflegt werden konnten.

Die unmittelbaren Todesursachen bei den 17 Gestorbenen waren: Erschöpfung, an acuter Manie starben 3 — an langdauernder Manie 4 — an chronischem Abscess, an Krankheit des Gehirngewebes, allgemeiner Lähmung, Marasmus, Phthisis, Lungenentzündung und Epilepsie je einer, 2 an Altersschwäche, einer durch Selbstmord im Erhängen. Die durchaus günstigen Resultate dieses Jahrgangs waren zunächst zuzuschreiben den gesammten Verhältnissen der ganzen Umgebung der Anstalt, aber ganz hauptsächlich dem Betrage der Zeit, innerhalb welcher sich die Irren ausserhalb der Anstalt befanden, Bewegung, Leibesübung und Unterhaltung hatten. (Ann. report of the New Hampsh're Asylum.) *Ullersperger.*

In Whittingham (England) — wird eine neue Anstalt für 1000 Kranke mit einem Aufwande von 120,000 Pfd. gebaut.

Aus Warschau. — Die Pläne zum Neubau der Irrenanstalt sind nunmehr, wenn auch mit bedeutenden Veränderungen, bestätigt worden. Die Grundidee ist dieselbe geblieben, wie sie Dr. *Rothe* und Baumeister *Tournell* vorgelegt haben. Im Laufe dieses Jahres sollen die Erdarbeiten gemacht, ein Theil des Baumateriales angeschafft werden, damit im nächsten Frühjahr der Grundstein gelegt werden kann.

Aus Westphalen. — Nach einer Bekanntmachung des Kgl. Ober-Präsidenten hat der Provinzial-Landtag beschlossen, dass versuchsweise diejenigen Geisteskranken der 3ten Verpflegungsklasse — zahlungsfähige sowohl als unvermögende —, welche künftig in die Provinzialanstalten zu Marsberg und Lengerich eingeliefert werden, für das erste ganze Jahr von der Zahlung des Pflegegeldes frei

Digitized by Google

bleiben sollen, wenn nach Anerkenntniss des betreffenden Anstalts-Directors die Einlieferung des Kranken in die Anstalt innerhalb der ersten 6 Monate nach Ausbruch der Geisteskrankheit erfolgt und zugleich nachgewiesen wird, dass Seitens der Angehörigen, beziehungsweise der Gemeinde nichts versäumt worden ist, um die baldige Aufnahme zu bewirken.

Dagegen tritt eine Erhöhung der Pflegesätze ein:

1) für Provinzialbewohner in 3ter Tischklasse a. für Unvermögende von 45 Thlrn. auf 60 Thlr., b. für Zahlungsfähige von 65 Thlr. auf 80 Thlr., in 2ter Tischklasse von 150 Thlr. auf 170 Thlr., in 1ster von 250 auf 450 Thlr.
2) für Nicht-Westphalen in 3ter Klasse von 170 auf 200 Thlr., in 2ter Klasse von 225 auf 250 Thlr., in 1ster Klasse von 500 auf 600 Thlr.

Personal - Nachrichten.

Dr. *Gudden*, Vorstand der Kreis-Irrenanstalt Werneck, ist zum Professor an der Universität und Director der Irrenanstalt zu Zürich,

Sanitätsrath Dr. *Reimer*, früher Director der Priv.-Irrenanstalt zu Görlitz, zum Director der Irrenanstalten zu Sachsenberg und Dömitz (Mecklenburg) berufen worden.

Regierungsrath Dr. *v. Riedel* ist von der Direction der Irrenanstalt in Wien zurückgetreten und

Dr. *Spurzheim*, Director der Irrenanstalt zu Ybbs, hat die Direction der Anstalt zu Wien erhalten.

Professor Dr. *Leidesdorf* und Docent Dr. *Meynert* in Wien haben eine klinische Professur für Psychiatrie, jener am allgemeinen Krankenhause, dieser an der Irrenanstalt zu Wien erhalten.

Dr. *Mildner*, Primärarzt an der Irrenanstalt zu Wien, ist zum Director der Pflegeanstalt zu Klosterneuburg,

Sanitätsrath Dr. *Richarz*, Director der Privatheilanstalt zu Endenich, zum Geheimen Sanitätsrath und

Dr. *Remacly*, Assistenzarzt der Irrenanstalt zu Schwetz, zum Kreisphysikus des Kreises Schwetz ernannt worden.

Dr. *E. Meyer*, Vorsteher der Privatheilanstalt in Eitorf, hat den Charakter als Sanitätsrath erhalten.

Druckfehler.

S. 336 Z. 2 von unten lies: „psychiatrische“ statt psychische.“

Inhalt.

Seite

Ein Beitrag zur Casuistik der Enostosen des Clivus bei Geisteskranken. Mit 5 Abbildungen Von Director Dr. *Stahl* . . 401

Ueber die prognostische Bedeutung der erblichen Anlage im Irresein. Von Dr. *v. Krafft-Ebing* 438

Klinische Bedeutung der Dysphagieen gestörter und gelähmter Kranken. Von Dr. *Zenker* 457

Doppelwahrnehmung und Doppeldenken. Von Dr. *Huppert* . 529

Casuistik.

Wahnsinn oder Verbrechen. Von Dr. *Fraenkel* 551

Zur therapeutischen Casuistik. 3. Mehrjähr. Onanie durch Oxyuris vermicularis m. folgender Psychose. Von Dr. *v. Krafft-Ebing* 556

Fälle von Psychosen nach Ileo-Typhus. Von *Fl.* 557

Literatur.

v. Luschka, Die Anatomie d. menschl. Kopfes. Von Dr. *Meschede* 560

Bibliographie.

1. Selbständige Werke 563

2. Psychiatrisches in nicht-psychiatrischen Zeitschriften . . 571

Anstaltsberichte.

Herzogl. Altenburg. Irren-Heil- und Pflegeanstalt. Von Med.-Rath Dr. *Maeder* 561

Jahresbericht über die beiden Warschauer Irren-Heil und Pflege-Anstalten 1867. Von Hofrath Dr. *Rothe* 593

Verhandlungen psychiatrischer Vereine.

2. Versammlung des Vereins der Irrenärzte Niedersachsens und Westphalens 602

Ripping, Mikroskop. Befunde in der Hirnrinde von Geisteskranken, die an Melanch. verstorben. Mit 6 Abb. 602

Diskussion über Doppel-Wahrnehmungen. Ueber Narcotica. Ueber Kal. bromatum 615

Kleinere Mittheilungen.

Die schriftlichen Aeusserungen Geisteskranker. — Nocturnal Insanity. — Aus der Schweiz. — Aus Dänemark. — New Hampshire Asylum. — In Wittingham. — Aus Warschau. — Aus Westphalen 617

Personal-Nachrichten 627

Druckfehler 627

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.

Beobachtungen über den Puls bei Geisteskranken.

Von

Dr. **O. J. B. Wolff**,

an der Irrenheilanstalt Sachsenberg.

VI.

Man sagt, es werden von allen in die Heilanstalt erfolgenden Aufnahmen gegen 30 Procent gesund; erfolge die Aufnahme innerhalb des ersten Jahres der Erkrankung, so gelangten wohl 40 Procent zur Genesung; rechne man, wie billig, vollends nur mit Melancholie und Manie, so könne man 50 Procent und darüber erreichen. Diese und ähnliche statistische Angaben sind zu oft und in nahezu übereinstimmender Weise gemacht worden, als dass man an der ihnen zu Grunde liegenden allgemeinen Wahrheit zweifeln dürfte. Aber wie steht es mit dem Kriterium für die Genesung?

„Es kann nicht genug des Nachdrucks darauf gelegt werden, dass die Genesung eines von Seelenstörung ergriffenen Kranken nicht blos seine Befreiung von sämmtlichen psychischen Krankheitserscheinungen, sondern auch die Ausgleichung sämmtlicher Lebensstörungen voraussetzt, welche der psychischen Störungen entweder zur Basis dienten oder auch nur ihre Wiedererzeugung bedingen oder begünstigen können. Fragt man also nach

Digitized by Google

den Zeichen der Genesung, so wird man sie theils im Bereiche der psychischen, theils in jenem der leiblichen Verrichtungen zu suchen haben.“ So *Flemming* in seiner Pathologie und Therapie der Psychosen, Seite 238 ff. Nichts ist klarer als das, und nirgendwo ist in der Literatur bis heute so eingehend und nachdrücklich als dort, so naturwissenschaftlich und von so gewichtiger Seite her auf die Unvollkommenheit der Heilung hingewiesen worden, „wenn jene Krankheitszustände nicht verschwunden sind, welche als die Basis der Seelenstörung entweder erkannt oder mit Grund in Verdacht zu ziehen sind. Geschieht das nicht, — sind jene Krankheitszustände also nicht beseitigt — so, heisst es Seite 243 weiter: bleibt die Genesung eine unvollkommene, wie vollkommen auch die psychische sei.“

Als die organische Basis für die Seelenstörungen haben wir Functionsanomalien des vasomotorischen Nervensystems mittelst exacter Pulsbeobachtungen nachzuweisen gesucht. An der Hand dieser Untersuchungen ergiebt sich nun, dass die grosse Mehrzahl derer, welche in unseren Listen mit dem Zeugniss „genesen“ prangen, weitaus nicht normalen, sondern tarden Puls haben. Bei diesen würde man also im besten Falle nur von einer psychischen Genesung reden können. Denn was uns an ihnen imponirt, ist ihr geistiger Zustand, was uns in unserem Urtheil über sie bestimmt, ist der günstige „Eindruck“, welchen ihr Wesen auf uns macht. Selbstverständlich werden sie sich, um überhaupt für Genesungen imponiren zu können, auch körperlich gut erholt haben, ja sie sehen bisweilen ganz gesund aus, und lassen auch bei der gewöhnlichen körperlichen Untersuchung nichts Krankhaftes, oder doch nichts von Bedeutung in Bezug auf die Frage nach Genesung an sich entdecken. Bedenkt man aber, dass nicht blos die allermeisten praktischen

Digitized by

Aerzte an sehr vielen Kranken, ehe sie der Anstalt zugeführt werden, körperliche, mit der Geisteskrankheit in Causalnexus stehende Symptome nicht finden können und von ihnen einfach sagen, sie seien körperlich gesund, sondern dass auch wir Irrenärzte trotz allem Scharfblicks mit den gewöhnlichen Untersuchungsmitteln vor so manchem schweren Kranken stehen, und positive, charakteristische, fassbare körperliche Symptome der Geisteskrankheit nicht anzugeben vermögen, obgleich wir immer predigen, die Geisteskrankheiten sind körperliche Krankheiten, die mit Störung der geistigen Thätigkeiten nur einhergehen: So liegt es auf der Hand, dass unsere Untersuchungsweise dieser räthselhaften Krankheit viel zu grob und unzulänglich ist, wohl gemeine Organerkrankungen aufdecken kann, aber gar nicht das Gebiet erfasst, welches nothwendiger Weise leidet, und von dessen Kranksein die geistige Störung nur ein Symptom, ähnlich wie der Husten ein Symptom von kranker Lunge ist. Was für die Diagnose der Lungenkrankheiten der Husten nicht sein konnte, das kann für unsere Krankheiten die Qualität der geistigen Alienation nicht sein; aber was für jene die Percussion und Auskultation geleistet hat, das liefert uns für diese die Untersuchung desjenigen Nervensystems, das schon bei jeder Gemüthsbewegung die sprechendsten Symptome kund giebt, die Untersuchung des sympathischen Nervensystems, die Untersuchung des Pulses. Nachdem wir nun erstens pathologischen Puls als den unzertrennlichen Begleiter der Psychosen, und zweitens kennen gelernt haben, dass der allergemeinste Puls bei Geisteskranken, der *Pulsus tardus* mit seinen Modificationen der Ausdruck einer bereits vor Beginn der Geisteskrankheit bestandenen chronischen Nervenschwäche ist, in welcher jene ihren Boden findet, so werden wir solche Individuen, die mit tardem Pulse genesen zu sein scheinen, eingedenk der oben ausge-

Digitized by Google

sprochenen Forderung für die volle Heilung, unmöglich für vollkommen, d. h. für geistig und körperlich geheilt ansprechen dürfen. Diese Kategorie von Gebesserten halten aber die Allermeisten, weil sie ihre schwache Seite nicht kennen, gar keine Vermuthung von einem so bedeutungsvollen Krankheitsresiduum bei ihnen haben, für völlig geheilt. Es geht ihnen hierbei nicht besser, als den alten Aerzten, die bei der Section alles das für normal hielten, was dem unbewaffneten Auge unverändert erschien, denn sie ahnten den Aufschluss nicht, welchen die mikroskopische Untersuchung der Organe und Gewebe über Gesundheit und Krankheit geben sollte. Aehnliche und vielleicht weit zutreffendere Vergleiche liessen sich aus der Geschichte einer jeden Kunst und Wissenschaft in Menge anführen. Wo aber durch die Einführung einer neuen Untersuchungsmethode herkömmliche Anschauungen gestürzt werden, und fundamentale Begriffe namhafte Veränderungen erfahren, da ist die Doctrin noch sehr im Werden, — noch keine Wissenschaft — und dies von der heutigen Psychiatrie gesagt, wird Niemand widerlegen.

Nun wird man fragen, giebt es nicht auch andere, und zwar bequemer belangbare Merkmale, die uns bei der Kritik der Genesung und der Diagnose von den Krankheitsresiduen zum Führer dienen? Hier geht es uns wieder so, wie dem pathologischen Anatomen; hat er einmal, z. B. die miliare Lebertuberkulose mit Hülfe des Mikroskops erkannt, so fällt es ihm nach einiger Zeit auch nicht mehr schwer, sie in vielen Fällen ohne Mikroskop zu vermuthen, oder selbst zu erkennen. Allein wie sicher er sich auch mit blossem Auge dünkt, sein Endurtheil bestimmt schliesslich doch nur das Mikroskop. In der That, es giebt eine Anzahl von Symptomen, welche uns, auch ohne die exacte Pulsuntersuchung vorgenommen zu haben, auf die Vermuthung hinleitet, ein

Digitized by

gegebener Fall sei keine totale, sondern nur eine partielle Heilung. Dahin gehört vor allen das asymmetrische Functioniren, gewissermaassen Ataxie der paarig vorhandenen Muskeln des Gesichts und dessen Nachbarschaft. Also in erster Linie die bei Geisteskranken so ganz ausserordentlich verbreitete, altbekannte Ungleichheit, ungleiche Functionirung der Pupillen; dann die merkwürdigen, nur zu oft unterschätzten sogenannten Facialisparesen; endlich die Abweichung der Zunge — subjectiver, angeblich ganz habitueller Krankheitserscheinungen gar nicht zu gedenken. Allein abgesehen davon, dass diese Dinge der Eine sieht, und der Andere nicht sehen kann, dass sie heute stärker, morgen schwächer, jetzt schwach und in kurzer Zeit darauf — unter andern, die Nerventhätigkeit erhöhenden äusseren Einflüssen oder bei inneren Erregungszuständen — wieder sehr stark vorhanden sind, so beweisen doch alle hierauf bezüglichen Besprechungen, die letzte Abhandlung über einen Theil dieses Themas, *Nasse*'s Aufsatz über die prognostische Bedeutung der Pupillendifferenz im Irresein*) nicht ausgenommen, wie wenig Positives sich aus dergleichen Dingen an sich entnehmen lässt. Es ist kein Zweifel, der Körper der in Rede stehenden Personen bietet bei genauer Untersuchung, wozu namentlich beim weiblichen Geschlechte vorzugsweise der Genitalapparat und seine Nachbarschaft gehört, eine Menge von Erscheinungen, welche auf reizbare Schwäche, eine gewisse Erschlaffung, auf eine relative Lähmung der organischen Muskelfasern, überhaupt der grösstentheils vom Sympathicus innervirten Organe und Gewebe hinweist; aber Nichts befestigt unser definitives Urtheil, unsere wissenschaftliche Ueberzeugung von einem gegebenen Falle in dem Maasse, als es die

*) Diese Zeitschr. Bd. XXV. Seite 665 ff.

von dem Organismus gleichsam selber geschriebene Schrift vermag, welche uns der Sphygmograph zur anschauenden Erkenntniss bringt. Hat er es nun gethan, und haben wir durch seine methodische Anwendung eine Basis gewonnen, auf welcher wir wie der gewöhnliche Pathologe auf der Temperatur, fussen und sicher weiter denken können, so lernen wir auch die Erscheinungen höher schätzen, besser erkennen und verwerthen, welche offenbar zu Tage liegen, aber an und für sich nur von zweifelhafter Bedeutung sind. Der Puls demonstrirt, dass das ganze sympathische System leidet, und wissen wir das, so erscheinen uns vereinzelte Symptome, wie die asymmetrischen Functionen, deren Wesen durch die Forschungen der Neuzeit als vasomotorische Störung erkannt ist (vergl. Nr. III.), nicht nur nicht belanglos, oder als übertriebene Feinheiten einer spitzfindigen Beobachtung, sondern als selbstverständliche Theilerscheinungen des allgemeinen Leidens, als die augenfälligen Producte einer über den ganzen Körper mehr oder weniger verbreiteten Krankheit. Haben wir aber diesen Zusammenhang eingesehen, so stehen jene Symptome sofort in einem anderen Lichte da, so erscheinen sie uns im Lichte der Neuropathologie, und verbürgen uns die Diagnose des allgemeinen Nervenleidens, wenn wir dasselbe mit dem Sphygmographen in der Hand auch noch nicht aufgedeckt haben.

Nirgendwo mehr als in der Psychiatrie ereignet es sich nun, dass man bei der Armuth ihrer diagnostischen Hülfsmittel, und bei dem Mangel an objectiven Krankheitserscheinungen auf diesem Gebiete, durch die Entdeckung eines körperlichen, anerkannt ungünstigen Symptoms, z. B. durch die vielleicht ganz zufällige Wahrnehmung von Krämpfen über einen bisher nur günstig erscheinenden Fall von Stund an entgegengesetzter Ansicht wird. Darin liegt kein Vorwurf, so seltsam es

Digitized by Google

auch klingt; im Gegentheil, es ist recht wissenschaftlich, wenn wir da zugreifen und verarbeiten, wo sich etwas Positives zeigt. Zeigt sich nun bei einem Kranken, den wir aus gemein-psychiatrischen Gründen für heilbar ansehen, und an dem wir etwas bestimmt Ungünstiges nicht wahrnehmen konnten, durch die sphygmographische Untersuchung der Pulsus tardus, mit anderen Worten also, dass er nichts weniger als ein frischer Fall ist, so dauert es nicht lange und wir finden, wenn anders wir mit offenen Augen daran gehen, auch in psychischer Beziehung erst verdächtige, und bald unzweifelhaft ungünstige Anzeichen. Warum? Weil wir genauer zusehen, weil in der Medicin die Aufmerksamkeit, welche wir einem, wenn auch an sich kleinem Theile schenken, sofort wieder dem Ganzen zu Gute kommt, und weil auch der grösste Skeptiker die Wahrscheinlichkeit nicht leugnen kann, dass das Symptom, welches die notorisch alten, unheilbaren Fälle charakterisirt, auch bei anscheinend frischen und heilbaren Kranken eine schlimme Vorbedeutung, und seine tief pathologische Begründung habe. Diese Wahrscheinlichkeit ist nun zwar kein eigentlicher Grund, aber sie vermag, dass wir Dinge, die uns sonst kaum berühren, schärfer ins Auge fassen, zergliedern und dieselben, bei unserer Unsicherheit in der Deutung psychischer Verrichtungen überhaupt, nicht mehr *bona fide* hingehen lassen, mit einem Worte, sie stört den guten Eindruck, den man von der betreffenden Person gewonnen hatte. Aber das ist eben der unschätzbare Vortheil unserer Untersuchungen, dass sie unserem Urtheile eine wissenschaftliche Basis geben und das subjective Dunkel, was man „Eindruck“ nennt, und womit wir vor keinem gebildeten Laien Etwas voraus haben, aus der Psychiatrie hinausschaffen helfen.

Die psychischen Symptome unserer Scheingenesungen laufen nun alle auf das, was wir Schwäche nennen

hinaus. Aber was ist Schwäche? Ein Begriff, der sich schwer beschreiben, geschweige definiren lässt. Dass hierbei nicht die groben und handgreiflichen Merkmale jener geistigen Verarmung, die man Schwachsinn nennt, in Frage kommen, versteht sich von selber; denn dann könnten die fraglichen Personen eben Niemandem geheilt erscheinen. Es sind vielmehr zahlreiche sogenannte Eigenthümlichkeiten, die man meist erst nach längerer Beobachtung, unter Verhältnissen, wo sich der Betreffende gehen lässt und unbefangen giebt, erkennt, die aber darum nichts weniger als subtil zu sein brauchen. Will man sie im Allgemeinen kennzeichnen, so muss man seine Zuflucht zu äusserst dehnbaren und die Sache keineswegs genau treffenden Ausdrücken nehmen und etwa sagen, sie haben den Charakter der Unselbständigkeit und Langsamkeit im eigenen Denken und Thun, zeigen eine merkwürdige Einförmigkeit, Gleichgültigkeit, Pedanterie oder Zerstreutheit, fallen, ohne es auch nur zu ahnen, immer wieder in denselben Fehler zurück, sind schwer zu belehren, kaum zu bessern und haben die oder jene Untugend an sich, hinter welcher aber gar nicht selten das eine oder andere ganz gemeine Zeichen psychischer Schwäche, namentlich Gedächtnisschwäche steckt. Dies so oft in unserer Literatur besprochene Thema ist aber von allgemeinen Gesichtspunkten aus nie fruchtbar bearbeitet worden; denn gerade hier ist es fast unmöglich zu generalisiren, Merkmale zu finden, welche Allen gemeinsam zukommen. Sowie wir aber den concreten Fall vornehmen, analysiren und die Verhältnisse sorgfältig gegeneinander halten, so ist es in der grossen Mehrzahl leicht, sich klar zu werden, worin die Schwäche des Einzelnen besteht, wenn es auch immer noch vieler Worte bedarf, um das überzeugend darzuthun, wovon man völlig überzeugt ist.

Das Wesentliche bei der Beurtheilung des psychi-

schen Zustandes derartig Genesener ist immer die Frage, ob sie in geistiger Beziehung verloren haben. Bekanntlich ist dies aber in vielen Fällen schwer zu entscheiden, und wenn wir uns darüber selber nicht klar zu werden im Stande sind, so können wir nicht umhin, das Urtheil der Angehörigen, wo nicht anzurufen, so doch für competent zu halten. Dann sollen diese nach dem, was sie bei ihrem Besuche gesehen, aus Briefen und dergl. wahrgenommen haben, aussprechen, ob der Vater, der Sohn wieder der alte ist. Aber wenn es schon schwer ist, einen Menschen im Laufe der Jahre kennen zu lernen, so ist es doch tausendmal schwieriger aus der verschwindend kleinen Ziffer von psychischen Thätigkeiten, die bei Gelegenheit eines Besuchs, bei der Correspondenz und selber innerhalb von Tagen und Wochen in die Erscheinung treten, einen sicheren Schluss auf den geistigen Zustand eines psychisch zweifelhaften Individuums zu ziehen. Kurz, wir begeben uns hier auf ein Terrain, wo wir keinen sicheren Boden unter uns haben, wo Alles relativ ist und Alles davon abhängt, wie geneigt man dem fraglichen Verhalten entgegen kommt, und wie unbefangen und gesund die Umgebung selber urtheilt. Diese Dinge sind zu oft und an zu vielen Stellen ausführlich, und besser als von meiner Wenigkeit besprochen worden, als dass wir uns länger dabei aufhalten dürften.

Nur ein Punkt ist von wirklich praktischer Bedeutung, das ist der Bildungsgrad des Individuums. Je gebildeter Jemand vor der Krankheit war, um so weniger wird man ihm nach derselben Schwäche anmerken können, und umgekehrt. Wenn der geistig Reiche von seinem Fonds 60 5 Einheiten verliert, so bleibt ihm ein Rest von 55, mit welchem er noch mehr als 50 Mal reicher erscheint, als der geistig Arme, wenn sein kleines Capital von 6 Einheiten denselben Verlust erleidet.

Es weiss jeder Irrenarzt, dass der vom Hause aus geistig Schwache bei einer ihn überfallenden Geisteskrankheit übeler daran ist, als der Wohlbegabte; es kann aber nicht nachdrücklich genug hervorgehoben werden, dass man bei der Besserung der letzteren den Verlust naturgemässer Weise nicht so leicht wahrnimmt, als bei dem ersteren in gleicher Lage — und dass man darum viele unter den Gebildeten mit Pulsus tardus für nicht geschwächt anzusehen geneigt ist, während man an dem schlichten Manne, an der gemeinen Hausfrau, die mit solchem Pulse geheilt erscheinen, je näher man mit ihnen in Berührung kommt, um so eher psychische Defecte findet.

Wir resumiren daher: Die Genesungen mit Pulsus tardus sind weder somatisch noch psychisch rein; sie erhöhen mit Unrecht den Procentsatz unserer Heilungen — sie sind gar keine Heilungen.

Dieser offenbar sehr folgenreiche Satz ergiebt sich nicht aus einer Einschränkung, aus einer speculativen Verschärfung des Kriteriums für die Genesung, sondern daraus, dass wir unsere Erkenntniss von der Gesundheit erweitert und dem entsprechend das *Flemming*'sche, auch in dieser Zeitschrift Bd. XV. S. 4 ff. niedergelegte Postulat für dieselbe in Anwendung gebracht haben. Die Erweiterung unseres Wissens besteht in nichts Anderem, als in der anscheinend sehr unbedeutenden Entdeckung, dass der normale Puls nicht monocrot ist, wie vor 14 Jahren *Vierordt* lehrte, auch nicht dicrot, wie vor 9 Jahren *Marey*, der Wahrheit schon näher kommend, demonstrirte, sondern dass er, wie ich bereits vor mehr als 6 Jahren gezeigt habe, tricrot ist, und dass die Phase seines Tricrotismus zwischen verhältnissmässig nur geringen Modificationen schwankt. Dieser Nachweis ist, wie man einsehen wird, von der grössten praktischen

Digitized by Google

Bedeutung; denn je genauer wir wissen, wie sich die Gesundheit manifestirt, um so sicherer werden wir die Krankheit diagnosticiren können. Die methodisch vorgenommene Bestimmung der Temperatur und die gleichfalls methodisch angestellte Untersuchung des Pulses liefern zusammengenommen einen so sicheren Maassstab für die Gesundheit, dass sie alle übrigen hierauf abzielenden Prüfungen nicht nur in den Schatten stellen, sondern geradezu entbehrlich machen. Und sollte es nicht schon a priori wahrscheinlich sein, dass uns die möglichst genaue physikalische Kenntniss der Phänomene, welche von der Bewegung des unentbehrlichsten Materials zum Leben, von der Bewegung des Blutes ausgehen, über den allgemeinen Stand der Lebensverrichtungen, den wir Gesundheit oder Krankheit nennen, den unmittelbarsten Aufschluss giebt?

Die zweitwichtigste Thatsache in Beziehung auf den Puls der sog. Genesenen besteht darin, dass ihre Minderzahl zwar Pulsus celer, aber der grösste Theil von ihnen darum doch nicht normalen Puls hat. Bei den einen bleibt er dicrot, man mag sie noch so lange bei völlig unverändertem äusseren Benehmen in der Anstalt lassen —, und bei den anderen ist er zwar tricrot, aber keineswegs normal; jene Fälle sind verhältnissmässig selten und gehören zu den bereits in der vorigen Nummer abgehandelten Fällen mit sehr vollkommener Dicrotie an; diese mit pathologischer Tricrotie bilden die grosse Mehrzahl der ganzen Gruppe.

Von dem Pulse der letzteren gilt alles das, was wir in Nr. IV. Seite 756—763 über scheinbar normale unauflösbare Tricrotie ausgeführt haben. Besonderer Erwähnung verdient aber zunächst, dass der Puls grade bei diesen Leuten, und zwar vorzugsweise bei Frauen, oft auffallend klein, im Gegensatz zu dem wirklich nor-

problem follows, that we have to treat more minutely Persons and Things, which, in other and broader aspects, have been already discussed. Thus, the Roman capitals were indeed great colossal models, to which the Greek artists looked up, and which they had to imitate; but the Greek artists were not Romans, and the Roman capitals were not Greek. Hence, the Greek artists must have had their own way of working out the Roman capitals, and this way we have to find out. Again, the Roman capitals were indeed monumental, but they were not the monuments themselves. Hence, when we have to deal with the latter, we have to deal with additional points, which are not necessarily involved in the former. Thus, the Roman capitals were indeed sculptured, but they were not the sculptures themselves. Hence, when we have to deal with the latter, we have to deal with additional points, which are not necessarily involved in the former. Thus, the Roman capitals were indeed painted, but they were not the paintings themselves. Hence, when we have to deal with the latter, we have to deal with additional points, which are not necessarily involved in the former.

lich in den so oft für Heilungen imponirenden Remissionen der noch in den Anfangsstadien der Krankheit begriffenen Paralytiker, und in den scheinbaren Intermissionen der Kranken mit epileptoiden Zuständen. Dieser stationäre stark schnellende und stark tricrote Puls jener Leute, welcher der Ausdruck eines beständigen hochgradigen Reizungszustandes ihrer vasomotorischen Nerven ist, und ferner die hier beiläufig mit zu erwähnende Thatsache, dass die Paralytiker und Epileptiker ihr ganzes Leben lang nur ausnahmsweise einmal tarden, ja noch während der bereits allgemein werdenden groben Lähmung schnellend tricroten Puls haben: Diese Umstände verleihen jenen Kranken von unserm Gesichtspunkte aus nicht nur dasselbe eigenartige und von den übrigen Geisteskranken völlig verschiedene Gepräge, welches sie nach übereinstimmendem Urtheile der Nervenpathologen und Psychiater zweifellos besitzen, sondern stützen auch die seit *Kussmaul* und *Tenner*'s classischen Experimenten vielfach, zuletzt namentlich von *Nothnagel* und *Marowsky* betonte Meinung, dass viele, wo nicht alle Formen von Epilepsie auf einem Gefässkrampfe der Gehirnarterien beruhen, insofern als dadurch die Annahme sehr nahe gelegt wird, der krampfhaft erhöhte Tonus, in welchem sich der gesammte Gefässapparat dieser Kranken schon für gewöhnlich befindet, erfahre bisweilen nur eine Steigerung, welche die bekannten peripherischen und centralen Erscheinungen, die sogen. Anfälle, hervorbringt.

Ein fast constanter Begleiter der mannichfachen Phasen von annähernd normalem *Pulsus celer* ist nun erhöhte Temperatur. Nicht etwa eine Erhöhung, wie man sie fieberhaft zu nennen pflegt, auch keine continuirliche oder typische Steigerung, sondern unregelmässige, bald auf den Morgen, bald auf den Abend fallende mässige Erhebungen, die gewöhnlich nur zwi-

Digitized by Google

schen 30,0 und 30,3 schwanken, ohne alle subjective und gröbere objective Krankheitserscheinungen auftreten, bisweilen aber 30,4 und 30,5 erreichen, und dann regelmässig mit Kopfschmerz, halbseitigen Schmerzen oder einem andern Nervensymptom vergesellschaftet, also offenbar die Folge von den letzteren sind. Diese Thatsache, so unbedeutend sie scheint, und so leicht sie dem gewöhnlichen Psychiater bei seinen feierlichen Visiten verborgen bleibt, ist von grosser Wichtigkeit. Wir Irrenärzte müssen uns gewöhnen, aus anscheinend unbedeutenden körperlichen Erscheinungen Etwas zu machen, denn grobe, handgreifliche finden sich eben in der Mehrzahl unserer Fälle nicht. Nervenkrankheiten wollen anders tractirt sein, als z. B. die ordinären Lungenkrankheiten, und da, wo der gewöhnliche Pathologe und der gewöhnliche praktische Arzt sein Object kaum aufnimmt oder wieder fallen lässt, weil ihm die Symptome, wenn er sie überhaupt sieht, zu unbedeutend erscheinen, da fängt unser, man möchte sagen bestes, Material erst an. Wie oft hat man nicht gemeint, die Temperaturmessungen bei Geisteskranken — etwa mit Ausnahme der Paralytiker und Manischen — ergebe Nichts! Dem ist auf das Entschiedenste entgegenzutreten. Oder ist es nicht von Belang, wenn ein sogen. Genesener oder ein angeblicher Simulant z. B. im Verlaufe von 8 Tagen unter den nur 16mal vorgenommenen Temperaturmessungen 6, 8, 10 und mehrere Male pathologische Temperatur hat? Erscheinen sie nicht beide dem vielgerühmten Kennerblicke eines erfahrenen Psychiaters ohne unsere exacte Untersuchung als gesund? Ich wiederhole es, gerade die fraglichen Geisteskranken, die scheinbar Genesenen ergeben bei methodisch angestellter Temperaturbeobachtung fast ganz regelmässig Anomalieen, die bei ihrem übrigen Verhalten und Befinden den unzweideutigsten Beweis von einem schleichenden, chronischen Kranksein liefern. Ihre nahezu pathognmonische

Digitized by Google

Bedeutung erhalten sie aber erst durch die gar nicht so selten zu constatirende Thatsache, dass die kleinen Erhöhungen — natürlich immer vorausgesetzt, dass das Individuum keine accessorische körperliche Krankheit hat — sich sofort vergrössern, und von keinen oder nur sehr unbedeutenden Remissionen unterbrochen werden, wenn längere Zeit, Stunden und Tage anhaltende Gemüthsbewegungen, Sorge, Kummer, Zweifel über die Zukunft u. dgl. durch zufällige Ereignisse wie bei jedem Gesunden hervorgerufen werden. Dann sind es aber nicht bloss die Temperaturerhebungen allein, welche man beobachtet, sondern wieder jene oben angedeuteten Kopfsymptome, die sofort da sind, sich sofort auch durch eine genaue Untersuchung der betreffenden Gegend bestätigen lassen, und unter diesen Umständen aufs bündigste anzeigen, dass sie sammt der Temperatur in der innigsten Beziehung zu den centralen Vorgängen stehen, welche durch zufällige, äussere, klar vorliegende Einwirkungen auf den Sitz der seelischen Verrichtungen hervorgebracht werden. Hieraus folgt nun aber weiter, dass die während des scheinbar besten Wohlseins stattfindenden kleineren Temperaturerhebungen die Zeugen eines beständigen, bald stärker bald schwächer in die Erscheinung tretenden Krankseins sind, welches von den Nervenapparaten ausgeht, aber unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht zum Bewusstsein gelangt und nicht als Störung klar empfunden wird. Sieht man sich nun diese Individuen auf die oben (S. 633) angedeuteten Asymmetrien in der Functionirung der von Gehirnnerven versorgten Muskeln, auf Pupillendifferenz u. dgl. an, so möchte schwerlich einer von diesen Menschen etwas derartiges nicht aufweisen. Das sind im gemeinen Leben die Naturen, welche, launenhaft und unglaublich empfindlich wie sie sind, sich nur zu ärgern brauchen, um krank und zwar so krank zu sein, dass sie zu ihren Geschäften ganz untauglich, geradezu wie gelähmt sind,

die aber durch eine entgegengesetzte Gemüthsbewegung, durch Freude, Mitgefühl oder eine sonstige unerwartete Aufregung oft wie mit einem Schlage wieder thatkräftig sind, das klarste Urtheil haben und ganz gesund erscheinen. Wem aber, der mit ihnen in näherer Berührung steht, der in ihrem Wohlsein nur einen vorübergehenden Reizzustand erkennt, wem scheinen diese, namentlich unter dem weiblichen Geschlechte so zahlreichen Unglücklichen wohl psychisch gesund?

Was uns in ihrer Weise die Temperatur lehrt, das zeigt uns seinerseits auch der Puls; er beweist uns, dass ein centraler Reiz vorhanden sein muss, welcher die vasomotorischen Nerven in beständiger zu hoher Erregung erhält, wenn die letztere auch nicht in das Bewusstsein tritt, oder, wie bei den in Rede stehenden Personen sehr häufig geschieht, sammt den nie fehlenden körperlichen Erscheinungen geleugnet und verheimlicht wird. Dass aber gerade diese Kategorie von sog. Heilungen es ist, welche am leichtesten Recidive bekommt, wird nach dem Vorhergehenden nicht Wunder nehmen. Wahre Genesungen sind sie also auch nicht, und wenn man sie sorgfältig beobachtet und in der Lage ist, ihr natürliches Wesen kennen zu lernen, so erscheint uns auch ihre psychische Gesundheit, ebenso wie die Jener mit *Pulsus tardus*, mehr als zweifelhaft.

Es bleibt nun endlich ein sehr kleiner Rest von denen, die wir genesen nennen, übrig, welcher völlig normalen Puls und, soweit man sehen kann, völlig normale körperliche und geistige Verrichtungen hat. Die Anzahl derer ist aber so verschwindend klein, dass es keinen Werth haben würde, sie procentisch auszudrücken; sie ist einfach nur die Ausnahme von der Regel, von der Regel, welche schlechterdings nicht anders lautet, als: Die Geisteskranken werden nur ausnahmsweise wieder gesund.

Digitized by Google

Das, was man „Heilungen“ nennt, sind, wir wissen es Alle, durchaus nicht identische Zustände. (Vgl. *Damerow*'s noch unübertroffene Arbeit: „Kritisches zur Irrenstatistik“ im XII. Bande unserer Zeitschrift, Seite 445 ff). Der Begriff Heilung ist in der Psychiatrie kein feststehender, eben noch kein wissenschaftlicher — er klingt zwar wie ein ärztliches Urtheil, ist aber doch nur für das Publikum. In dem officiellen Zeugniss wird der entlassene X. als „genesen“ bezeichnet; in der Directorialliste der Entlassenen steht dahinter ein Fragezeichen, und in dem Krankenjournal heisst er nur gebessert — Alles sehr berechtigte und wohl überlegte Beurtheilungen; es kommt ja auf den Maassstab an, auf die Schärfe der Anforderungen, welche man an den Begriff genesen stellt, und auf die Urtheilsfähigkeit desjenigen, der es in Zukunft mit dem Entlassenen zu thun hat. Dass aber diese Differenzen, diese emphatischen Zeugnisse, diese conventionellen Selbsttäuschungen, so schön und gut auch die ihnen zu Grunde liegenden Absichten sein mögen, zwar nicht dem einzelnen Kranken oder dem Publikum, aber der Weiterentwickelung der Psychiatrie, seitdem man erkannte, dass es überhaupt Heilungen gebe, viel geschadet haben, brauche ich nicht zu beweisen versuchen.

Die Einrichtungen, vor welchen *Flemming* (vergl. diese Zeitschrift XV. Band, Seite 11 ff.) vor 11 Jahren noch warnte, obgleich er Seite 5 zugab, dass der günstige Ausgang nicht als die Regel bezeichnet werden könne, sind aber heute schon von einer grossen Anzahl von Fachleuten als gut erkannt, und an mehreren Orten bereits in Ausführung gebracht worden. „Wäre man“, heisst es dort, „gezwungen einzuräumen, dass die Seelenstörungen niemals ganz auszurotten seien, vielmehr stets einen Keim zurücklassen, aus welchem sie früher oder später wieder hervorzubrechen drohen, wäre man

genöthigt einzugestehen, dass der günstige Ausgang der Seelenstörungen zu den Glücksfällen gehöre, so würden dadurch ausserordentliche Summen für andere Zwecke gespart und gleichwohl Einrichtungen gewonnen werden können, welche weniger als die jetzt bestehenden von Ueberfüllung bedroht sein, leichter, bequemer und billiger als sie den stetig wachsenden Ueberschuss ungeheilter chronischer Irren unterbringen würden. Man dürfte darauf denken, abgesonderte Plätze, Colonien für Irre nach dem Beispiele jener von Gheel zu begründen" u. s. w. Als einziger Grund gegen solche Maassregeln wurde damals die verhältnissmässig grosse Heilfähigkeit unserer Kranken betont. Wenn nun aber jene in der Gegenwart dennoch ins Werk gesetzt werden, wenn man anbahnt und herzustellen sucht, wovon ehedem geradezu abgerathen wurde, so muss jetzt auch die Stütze wankend geworden sein, auf welcher die entgegengesetzte Ansicht ruht. Statt des „niemals ganz auszurotten" und „stets einen Keim zurücklassen", sagen wir nun auf Grund unserer wissenschaftlichen Forschungen: die Geisteskrankheiten sind nur selten, sind nur ausnahmsweise ganz auszurotten und lassen in der Regel einen Keim, nämlich **die neuropathische Basis** zurück, woraus sie sich jederzeit wieder von Neuem entwickeln können.

Soll nun angegeben werden, wie sich der Puls bei denen, die zur wirklichen Genesung gelangen, während ihres Krankseins verhält, so werden wir zum ersten Male genöthigt, sein Verhalten in den Zuständen zu erörtern, die wir Melancholie und Manie nennen. Es wird aufgefallen sein, dass bei Beschreibung der Pulsverhältnisse unserer Kranken bisher

Digitized by Google

so wenig Rücksicht genommen worden ist auf die sogenannten Formen der Seelenstörungen. Das ist aber eine der unmittelbarsten Folgen von der naturwissenschaftlichen Behandlung unseres Untersuchungsobjectes, von der Untersuchung unserer Kranken nicht auf die secundären Erscheinungen, auf die Folgen von ihrem leidenden Körper, nicht auf die entfernteren Ausflüsse, sondern auf die Beschaffenheit und unmittelbare Functionirung ihrer kranken Nervenapparate selber.

Aus der grossen Masse von Melancholischen und Manischen, welche der Anstalt als frische Fälle zugeführt werden, wird durch unsere Analyse nun sofort eine ansehnliche Menge von Kranken ausgeschieden, welche fast gleich bei der ersten Untersuchung tarden Puls haben, und ihn während des ganzen Krankheitsverlaufes ohne wesentliche und dauernde Aenderung behalten. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass diejenigen frischen melancholischen oder manischen, meist schon ins Senium übergetretenen Kranken, die diesen Puls allerdings auch haben, hier nicht in Betracht kommen, Kranke, welche man trotz aller Angaben über die kurze Dauer ihrer Krankheit schon von Weitem als körperliche und geistige Ruinen erkennt, speciell nicht diejenigen Melancholischen, welche so geistesschwach sind, dass sie in einem Athemzuge etwas bejahen und verneinen, sich jetzt für ganz unschuldig erklären und im nächsten Momente an Allem schuld sein wollen, welche den grössten Kleinigkeiten die höchste Bedeutung beilegen, sich die absurdesten Vorwürfe und Vorstellungen machen, immer und immer wieder auf dasselbe Wort zurückkommen, bei ihrem Zittern und unsicheren Gange aber das traurigste Bild von körperlicher Gebrechlichkeit darbieten — diese Unglücklichen sind nicht gemeint, obgleich sie von manchen Irrenärzten noch bona fide für heilbar gehalten werden,

weil sie sich einestheils von der angeblich kurzen Dauer der Krankheit blenden lassen, und anderntheils einen Kranken schon für genesen ausgeben, wenn er nur wieder so geworden ist, wie er vor Ausbruch der groben Störung war, gleichviel ob man ihm den Schwachsinn auf den ersten Blick ansieht. Aber es giebt eine kaum minder grosse Anzahl frischer Fälle mit tardem Pulse, welche wir unsern psychiatrischen Anschauungen zufolge fast einstimmig für heilbar halten, welche der Hauptsache nach also 1) plötzlich erkrankt und kaum 2—3 Monate krank sind; 2) keine von den berüchtigten Symptomen der Paralyse, nicht Epilepsie oder sonstige auf eine schwere Hirnerkrankung deutende Erscheinungen zeigen, und 3) noch vage Deliren haben, deren Inhalt den ganzen inneren und äusseren Menschen entsprechend ergreift — Fälle, die jedoch gleichfalls nicht hierher gehören. Denn die Erfahrung zeigt an ihnen immer und immer wieder, dass sie nicht nur nicht völlig genesen, sondern im besten Falle mit einem Rückstande von Geistesschwäche sich nur beruhigen. Diese geistige Schwäche leuchtet dem Kenner auch schon aus dem anfänglichen Delirium heraus; aber der schwächliche Charakter der Wahnvorstellungen nebst der Art, wie sie vorgebracht werden, leiten den Irrenarzt bei Beurtheilung eines Falles zwar im Anfange meist richtig, allein die nachmalige Besserung, bei welcher diese Art von Kranken bekanntlich so viel Einnehmendes haben und so manchen Unkundigen völlig gesund erscheinen, verführt uns sehr leicht, diese Individuen schliesslich doch als genesen hinzustellen. Es ist uns allen freilich wohl bekannt, dass sie eine Reihe von Erscheinungen mit einander gemeinsam haben, welche keineswegs von Gesundheit des sympathischen Systems, also desjenigen Nervenapparats zeugen, auf dessen Functionirung in diesen Abhandlungen das grösste Gewicht gelegt wird; denn

Digitized by Google

diese Leute stehen meist schon in den climacterischen Jahren, wo nicht schon im Senium selber, — in senectute, quae ipsa morbus. Und auch, wenn sie es noch nicht sind, so zeigen sie doch ein auffallend altes, verkümmertes oder verlebtes Aussehen, haben, ganz abgesehen von eigentlichen Degenerationszeichen, jene tiefen Falten auf Stirn und Antlitz, varicöse Wangen, schlaffe oder übermässig fettreiche Haut, bedenkliche Zahnlücken und Lichtungen des Haupthaares, differente Pupillen, asymmetrisches Mienenspiel, kurz jene Erscheinungen, die wir oben bereits bei den scheinbar Genesenen erwähnten — das Alles wissen wir recht wohl, aber wir sind nur zu oft geneigt, darüber nachlässig hinwegzusehen, und keinen besonderen Werth darauf zu legen, wenn uns das psychische Verhalten dieser Personen imponirt. Ebenso wie sie trotz aller Hebung ihrer groben Kraft am Ende doch noch dieselben körperlichen Symptome darbieten, welche sie uns am Anfange schon verdächtig machten, ebenso liefern sie auch damals wie jetzt denselben *Pulsus tardus*, der in der Besserung bei ruhiger Frequenz und gehobener Pulsgrösse nur noch auffälliger hervortritt. Diese leider zahlreichen Fälle also sind wir mittelst der Sphygmographie im Stande, von allem Anfange an aus der Zahl der Heilbaren auszuscheiden, so dass es jeder sehen und auf der Stelle demonstriren kann. Sehr oft aber gelangen diese Kranken gar nicht zu dem Grade von Besserung, der ihnen den Anstrich von Genesung giebt; sie tragen, wie der Tuberkulöse, in sich den Krankheitsprocess, der zwar lange Zeit stille stehen oder stille zu stehen scheinen kann, der aber in der Regel doch wieder von Neuem Symptome macht und um so bedenklichere Folgen nach sich zieht. Gewöhnlich bekommen di se uns als frische Fälle zugeschickten Kranken mit *Pulsus tardus*, nachdem sie gesund geworden zu sein scheinen, wieder einen Rückfall, und immer

Digitized by Google

wieder Rückfälle, oder sie gehen sogar unter unseren Augen rasch in Blödsinn über.

In zweiter Linie fallen bei unserer Sichtung des heilbaren Materials diejenigen uns als frische Fälle übergebenen Melancholieen und Manieen fort, welche anfänglich und während der Zeit ihrer Erregung etwa normalen *Pulsus celer* haben, und beim Eintritt der Ruhe, der guten äusserlichen Haltung entweder unmittelbar oder mittelbar d. h. nach einigen Stunden ruhiger Lage im Bette tarden Puls bekommen. Ueber die Auffassung des letzteren Verhaltens bedarf es keiner Worte mehr; aber hinsichtlich des ersteren wird eine Erklärung noch am Platze sein. Zu der in Rede stehenden Abtheilung von Kranken gehören die allermeisten jugendlichen sogen. Heilbaren, Männer bis zu etwa 40, und Frauen bis zu einem Alter von circa 35 Jahren, gleichviel, welcher von den beiden Hauptformen von Seelenstörung sie zuzuzählen sind. Sie bilden die grosse Anzahl von Patienten, welche nach ihrer Aufnahme wochen- und monatelang bei annähernd normalem Pulse exaltirt oder deprimirt, heiter oder traurig, agil oder in sich versunken sind, die grosse Zahl von Fällen, welche den Anfänger in der auf die Sphygmik gegründeten Krankenbeurtheilung sehr leicht irre leiten; denn sie scheinen eine ihrem Zustande entsprechende Normwidrigkeit des Pulses eben nicht zu haben. Zwar nicht in der groben Diagnose, nicht in der psychiatrischen Beurtheilung des gegebenen Falles kann der Pulsbefund irre leiten — man sieht ja klar vor Augen, wie sehr die Leute krank sind; aber er kann bei dem Uneingeweihten leicht Zweifel an der Brauchbarkeit der Pulsphänomene für unsern Zweck überhaupt erregen. Allein die Sachen stehen anders, und das todte Pulsbild gewinnt sofort Leben und seine wirkliche Bedeutung, wenn man ge-

Digitized by Google

wisse früher erörterte, anscheinend mehr physiologisch interessante als praktisch verwerthbare Thatsachen nunmehr in Rechnung zieht. Es ist das Verhalten des Pulses bei Gemüthsbewegungen, welches uns für das Verständniss des Pulses bei Geisteskrankheiten und namentlich bei dieser Art von Geisteskrankheiten zum Wegweiser dient. Die fundamentale Thatsache, dass sich der Puls von der leisesten Regung des Gefühls und Willens an, bis zu den höchsten Graden von Aufregung, die man Affect nennt, proportional der Erregungsgrösse verändert, lehrt uns, dass die Erscheinung von annähernd normalem Pulse bei einem unverkennbar, sei es depressiv oder expansiv, Erregten nicht zu bedeuten hat, als habe sich der Puls bei ihnen trotz aller Gemüthsunruhe nicht verändert, sondern mit Sicherheit darauf schliessen lässt, dass diese scheinbar normale Phase jedenfalls ein Umwandlungsproduct ist, dass sie hervorgegangen ist aus einem Pulse, welcher von dieser scheinbaren Norm ebensoweit verschieden ist, wie z. B. der Puls des Fiebernden von dem des Fieberlosen. Wo also der Parallelismus zwischen Pulsphase und Erregung nicht stattzufinden scheint, da haben wir zu schliessen, dass er nur verschoben ist, verschoben in Folge davon, dass das Individuum in der Ruhe bereits eine ganz andere Phase, als der gesunde Mensch, dass es bereits eine andere Norm hat. Alles, worum es sich handelt, lässt sich mit den wenigen Worten ausdrücken: Wer thatsächlich gemüthsunruhig ist und dabei ungefähr normalen Puls zeigt, der hat in der Ruhe einen pathologischen Puls, und zwar aus der Reihe der tarden Phasen. Er befindet sich gleichsam beständig in der Erregung ersten Grades, die, wie wir z. B. an Fig. 115 gezeigt haben, den pathologisch tarden Puls der Ruhe in ähnlicher Weise zur

by Google

Norm erhebt, wie die beginnende Erregung so manchen unserer Kranken gesund erscheinen lässt. Mit jener Verschiebung des Parallelismus sind wir aber wieder auf bekanntem Felde, denn wir wissen, dass es die unheilbaren Geisteskranken sind, welche jene andere Norm haben. Die Probe auf die Richtigkeit unserer physiologischen Schlussfolgerung liefert das Experiment, von dem Kranken möglichst viele Erregungsursachen abzuhalten, die ruhige Lage im Bette, die Auflösung des *Pulsus celer* in eine der tarden Phasen, gewöhnlich in den *Tardo-dicrotus*. Dass diese Auflösung natürlich nicht in den ersten Tagen schon gelingt, wo die Angst oder die maniakalische Erregung durch das Eigenthümliche des Experiments womöglich noch erhöht wird, bedarf nach den früheren Angaben über diesen Gegenstand keiner weiteren Ausführung. Diejenigen frischen Melancholici und Maniaci also, welche bei den ersten Untersuchungen etwa normalen Puls, dies anscheinend recht günstige Symptom zeigen, haben keine Aussicht auf wahre Heilung; man kann ihnen vielmehr überraschend frühzeitig nur eine ungünstige Prognose stellen; denn hinter ihrem scheinbar normalen Pulse liegt der tarde Puls versteckt, welcher früher oder später bei möglichster Abhaltung von Reizen gewissermassen unverunreinigt zum Vorschein zu bringen ist, bei Eintritt der äusseren Ruhe von selber erscheint und so lange stationär bleibt, als jene nicht gestört wird. Sowie aber wieder Erregung im Anzuge ist, gleichviel, ob man sie sonst schon wahrnimmt, oder ob der Kranke sich noch so viel zusammennehmen kann, dass es nur der mit ihm in fortwährender Berührung bleibende, aufmerksame Beobachter wahrnimmt, so hat sich auch der die Ruhe charakterisirende tarde Puls schon wieder verwandelt in jene meist kleinere, schwer darstellbare, schnellend tricrote Phase, welche man anfänglich beobachtete. Diese Verwandlung

Bestimmung von Ag, Hg, Bi als Sulfide.

Allgemeines. Ag, Hg und Bi werden als Sulfide gefällt, Ag und Hg durch Schwefelwasserstoff, Bi durch Ammoniumsulfid. Ag und Hg werden durch Salpetersäure getrennt, in der Ag2S unlöslich ist, während HgS sich auflöst. Bi wird durch Ammoniumsulfid gefällt, weil es in Gegenwart von Ammoniumsalzen durch Schwefelwasserstoff nicht vollständig gefällt wird. Ag und Hg werden durch Königswasser getrennt, in dem HgS löslich ist, während Ag2S sich nicht auflöst. Bi wird durch Ammoniumsulfid gefällt, weil es in Gegenwart von Ammoniumsalzen durch Schwefelwasserstoff nicht vollständig gefällt wird. Ag und Hg werden durch Königswasser getrennt, in dem HgS löslich ist, während Ag2S sich nicht auflöst.

Ex. 1. Ex. 2. Ex. 3. Ex. 4. Ex. 5. Ex. 6. Ex. 7. Ex. 8. Ex. 9. Ex. 10. Ex. 11. Ex. 12. Ex. 13. Ex. 14. Ex. 15. Ex. 16. Ex. 17. Ex. 18. Ex. 19. Ex. 20. Ex. 21. Ex. 22. Ex. 23. Ex. 24. Ex. 25. Ex. 26. Ex. 27. Ex. 28. Ex. 29. Ex. 30. Ex. 31. Ex. 32. Ex. 33. Ex. 34. Ex. 35. Ex. 36. Ex. 37. Ex. 38. Ex. 39. Ex. 40. Ex. 41. Ex. 42. Ex. 43. Ex. 44. Ex. 45. Ex. 46. Ex. 47. Ex. 48. Ex. 49. Ex. 50. Ex. 51. Ex. 52. Ex. 53. Ex. 54. Ex. 55. Ex. 56. Ex. 57. Ex. 58. Ex. 59. Ex. 60. Ex. 61. Ex. 62. Ex. 63. Ex. 64. Ex. 65. Ex. 66. Ex. 67. Ex. 68. Ex. 69. Ex. 70. Ex. 71. Ex. 72. Ex. 73. Ex. 74. Ex. 75. Ex. 76. Ex. 77. Ex. 78. Ex. 79. Ex. 80. Ex. 81. Ex. 82. Ex. 83. Ex. 84. Ex. 85. Ex. 86. Ex. 87. Ex. 88. Ex. 89. Ex. 90. Ex. 91. Ex. 92. Ex. 93. Ex. 94. Ex. 95. Ex. 96. Ex. 97. Ex. 98. Ex. 99. Ex. 100. Ex. 101. Ex. 102. Ex. 103. Ex. 104. Ex. 105. Ex. 106. Ex. 107. Ex. 108. Ex. 109. Ex. 110. Ex. 111. Ex. 112. Ex. 113. Ex. 114. Ex. 115. Ex. 116. Ex. 117. Ex. 118. Ex. 119. Ex. 120. Ex. 121. Ex. 122. Ex. 123. Ex. 124. Ex. 125. Ex. 126. Ex. 127. Ex. 128. Ex. 129. Ex. 130. Ex. 131. Ex. 132. Ex. 133. Ex. 134. Ex. 135. Ex. 136. Ex. 137. Ex. 138. Ex. 139. Ex. 140. Ex. 141. Ex. 142. Ex. 143. Ex. 144. Ex. 145. Ex. 146. Ex. 147. Ex. 148. Ex. 149. Ex. 150. Ex. 151. Ex. 152. Ex. 153. Ex. 154. Ex. 155. Ex. 156. Ex. 157. Ex. 158. Ex. 159. Ex. 160. Ex. 161. Ex. 162. Ex. 163. Ex. 164. Ex. 165. Ex. 166. Ex. 167. Ex. 168. Ex. 169. Ex. 170. Ex. 171. Ex. 172. Ex. 173. Ex. 174. Ex. 175. Ex. 176. Ex. 177. Ex. 178. Ex. 179. Ex. 180. Ex. 181. Ex. 182. Ex. 183. Ex. 184. Ex. 185. Ex. 186. Ex. 187. Ex. 188. Ex. 189. Ex. 190. Ex. 191. Ex. 192. Ex. 193. Ex. 194. Ex. 195. Ex. 196. Ex. 197. Ex. 198. Ex. 199. Ex. 200. Ex. 201. Ex. 202. Ex. 203. Ex. 204. Ex. 205. Ex. 206. Ex. 207. Ex. 208. Ex. 209. Ex. 210. Ex. 211. Ex. 212. Ex. 213. Ex. 214. Ex. 215. Ex. 216. Ex. 217. Ex. 218. Ex. 219. Ex. 220. Ex. 221. Ex. 222. Ex. 223. Ex. 224. Ex. 225. Ex. 226. Ex. 227. Ex. 228. Ex. 229. Ex. 230. Ex. 231. Ex. 232. Ex. 233. Ex. 234. Ex. 235. Ex. 236. Ex. 237. Ex. 238. Ex. 239. Ex. 240. Ex. 241. Ex. 242. Ex. 243. Ex. 244. Ex. 245. Ex. 246. Ex. 247. Ex. 248. Ex. 249. Ex. 250. Ex. 251. Ex. 252. Ex. 253. Ex. 254. Ex. 255. Ex. 256. Ex. 257. Ex. 258. Ex. 259. Ex. 260. Ex. 261. Ex. 262. Ex. 263. Ex. 264. Ex. 265. Ex. 266. Ex. 267. Ex. 268. Ex. 269. Ex. 270. Ex. 271. Ex. 272. Ex. 273. Ex. 274. Ex. 275. Ex. 276. Ex. 277. Ex. 278. Ex. 279. Ex. 280. Ex. 281. Ex. 282. Ex. 283. Ex. 284. Ex. 285. Ex. 286. Ex. 287. Ex. 288. Ex. 289. Ex. 290. Ex. 291. Ex. 292. Ex. 293. Ex. 294. Ex. 295. Ex. 296. Ex. 297. Ex. 298. Ex. 299. Ex. 300. Ex. 301. Ex. 302. Ex. 303. Ex. 304. Ex. 305. Ex. 306. Ex. 307. Ex. 308. Ex. 309. Ex. 310. Ex. 311. Ex. 312. Ex. 313. Ex. 314. Ex. 315. Ex. 316. Ex. 317. Ex. 318. Ex. 319. Ex. 320. Ex. 321. Ex. 322. Ex. 323. Ex. 324. Ex. 325. Ex. 326. Ex. 327. Ex. 328. Ex. 329. Ex. 330. Ex. 331. Ex. 332. Ex. 333. Ex. 334. Ex. 335. Ex. 336. Ex. 337. Ex. 338. Ex. 339. Ex. 340. Ex. 341. Ex. 342. Ex. 343. Ex. 344. Ex. 345. Ex. 346. Ex. 347. Ex. 348. Ex. 349. Ex. 350. Ex. 351. Ex. 352. Ex. 353. Ex. 354. Ex. 355. Ex. 356. Ex. 357. Ex. 358. Ex. 359. Ex. 360. Ex. 361. Ex. 362. Ex. 363. Ex. 364. Ex. 365. Ex. 366. Ex. 367. Ex. 368. Ex. 369. Ex. 370. Ex. 371. Ex. 372. Ex. 373. Ex. 374. Ex. 375. Ex. 376. Ex. 377. Ex. 378. Ex. 379. Ex. 380. Ex. 381. Ex. 382. Ex. 383. Ex. 384. Ex. 385. Ex. 386. Ex. 387. Ex. 388. Ex. 389. Ex. 390. Ex. 391. Ex. 392. Ex. 393. Ex. 394. Ex. 395. Ex. 396. Ex. 397. Ex. 398. Ex. 399. Ex. 400. Ex. 401. Ex. 402. Ex. 403. Ex. 404. Ex. 405. Ex. 406. Ex. 407. Ex. 408. Ex. 409. Ex. 410. Ex. 411. Ex. 412. Ex. 413. Ex. 414. Ex. 415. Ex. 416. Ex. 417. Ex. 418. Ex. 419. Ex. 420. Ex. 421. Ex. 422. Ex. 423. Ex. 424. Ex. 425. Ex. 426. Ex. 427. Ex. 428. Ex. 429. Ex. 430. Ex. 431. Ex. 432. Ex. 433. Ex. 434. Ex. 435. Ex. 436. Ex. 437. Ex. 438. Ex. 439. Ex. 440. Ex. 441. Ex. 442. Ex. 443. Ex. 444. Ex. 445. Ex. 446. Ex. 447. Ex. 448. Ex. 449. Ex. 450. Ex. 451. Ex. 452. Ex. 453. Ex. 454. Ex. 455. Ex. 456. Ex. 457. Ex. 458. Ex. 459. Ex. 460. Ex. 461. Ex. 462. Ex. 463. Ex. 464. Ex. 465. Ex. 466. Ex. 467. Ex. 468. Ex. 469. Ex. 470. Ex. 471. Ex. 472. Ex. 473. Ex. 474. Ex. 475. Ex. 476. Ex. 477. Ex. 478. Ex. 479. Ex. 480. Ex. 481. Ex. 482. Ex. 483. Ex. 484. Ex. 485. Ex. 486. Ex. 487. Ex. 488. Ex. 489. Ex. 490. Ex. 491. Ex. 492. Ex. 493. Ex. 494. Ex. 495. Ex. 496. Ex. 497. Ex. 498. Ex. 499. Ex. 500. Ex. 501. Ex. 502. Ex. 503. Ex. 504. Ex. 505. Ex. 506. Ex. 507. Ex. 508. Ex. 509. Ex. 510. Ex. 511. Ex. 512. Ex. 513. Ex. 514. Ex. 515. Ex. 516. Ex. 517. Ex. 518. Ex. 519. Ex. 520. Ex. 521. Ex. 522. Ex. 523. Ex. 524. Ex. 525. Ex. 526. Ex. 527. Ex. 528. Ex. 529. Ex. 530. Ex. 531. Ex. 532. Ex. 533. Ex. 534. Ex. 535. Ex. 536. Ex. 537. Ex. 538. Ex. 539. Ex. 540. Ex. 541. Ex. 542. Ex. 543. Ex. 544. Ex. 545. Ex. 546. Ex. 547. Ex. 548. Ex. 549. Ex. 550. Ex. 551. Ex. 552. Ex. 553. Ex. 554. Ex. 555. Ex. 556. Ex. 557. Ex. 558. Ex. 559. Ex. 560. Ex. 561. Ex. 562. Ex. 563. Ex. 564. Ex. 565. Ex. 566. Ex. 567. Ex. 568. Ex. 569. Ex. 570. Ex. 571. Ex. 572. Ex. 573. Ex. 574. Ex. 575. Ex. 576. Ex. 577. Ex. 578. Ex. 579. Ex. 580. Ex. 581. Ex. 582. Ex. 583. Ex. 584. Ex. 585. Ex. 586. Ex. 587. Ex. 588. Ex. 589. Ex. 590. Ex. 591. Ex. 592. Ex. 593. Ex. 594. Ex. 595. Ex. 596. Ex. 597. Ex. 598. Ex. 599. Ex. 600. Ex. 601. Ex. 602. Ex. 603. Ex. 604. Ex. 605. Ex. 606. Ex. 607. Ex. 608. Ex. 609. Ex. 610. Ex. 611. Ex. 612. Ex. 613. Ex. 614. Ex. 615. Ex. 616. Ex. 617. Ex. 618. Ex. 619. Ex. 620. Ex. 621. Ex. 622. Ex. 623. Ex. 624. Ex. 625. Ex. 626. Ex. 627. Ex. 628. Ex. 629. Ex. 630. Ex. 631. Ex. 632. Ex. 633. Ex. 634. Ex. 635. Ex. 636. Ex. 637. Ex. 638. Ex. 639. Ex. 640. Ex. 641. Ex. 642. Ex. 643. Ex. 644. Ex. 645. Ex. 646. Ex. 647. Ex. 648. Ex. 649. Ex. 650. Ex. 651. Ex. 652. Ex. 653. Ex. 654. Ex. 655. Ex. 656. Ex. 657. Ex. 658. Ex. 659. Ex. 660. Ex. 661. Ex. 662. Ex. 663. Ex. 664. Ex. 665. Ex. 666. Ex. 667. Ex. 668. Ex. 669. Ex. 670. Ex. 671. Ex. 672. Ex. 673. Ex. 674. Ex. 675. Ex. 676. Ex. 677. Ex. 678. Ex. 679. Ex. 680. Ex. 681. Ex. 682. Ex. 683. Ex. 684. Ex. 685. Ex. 686. Ex. 687. Ex. 688. Ex. 689. Ex. 690. Ex. 691. Ex. 692. Ex. 693. Ex. 694. Ex. 695. Ex. 696. Ex. 697. Ex. 698. Ex. 699. Ex. 700. Ex. 701. Ex. 702. Ex. 703. Ex. 704. Ex. 705. Ex. 706. Ex. 707. Ex. 708. Ex. 709. Ex. 710. Ex. 711. Ex. 712. Ex. 713. Ex. 714. Ex. 715. Ex. 716. Ex. 717. Ex. 718. Ex. 719. Ex. 720. Ex. 721. Ex. 722. Ex. 723. Ex. 724. Ex. 725. Ex. 726. Ex. 727. Ex. 728. Ex. 729. Ex. 730. Ex. 731. Ex. 732. Ex. 733. Ex. 734. Ex. 735. Ex. 736. Ex. 737. Ex. 738. Ex. 739. Ex. 740. Ex. 741. Ex. 742. Ex. 743. Ex. 744. Ex. 745. Ex. 746. Ex. 747. Ex. 748. Ex. 749. Ex. 750. Ex. 751. Ex. 752. Ex. 753. Ex. 754. Ex. 755. Ex. 756. Ex. 757. Ex. 758. Ex. 759. Ex. 760. Ex. 761. Ex. 762. Ex. 763. Ex. 764. Ex. 765. Ex. 766. Ex. 767. Ex. 768. Ex. 769. Ex. 770. Ex. 771. Ex. 772. Ex. 773. Ex. 774. Ex. 775. Ex. 776. Ex. 777. Ex. 778. Ex. 779. Ex. 780. Ex. 781. Ex. 782. Ex. 783. Ex. 784. Ex. 785. Ex. 786. Ex. 787. Ex. 788. Ex. 789. Ex. 790. Ex. 791. Ex. 792. Ex. 793. Ex. 794. Ex. 795. Ex. 796. Ex. 797. Ex. 798. Ex. 799. Ex. 800. Ex. 801. Ex. 802. Ex. 803. Ex. 804. Ex. 805. Ex. 806. Ex. 807. Ex. 808. Ex. 809. Ex. 810. Ex. 811. Ex. 812. Ex. 813. Ex. 814. Ex. 815. Ex. 816. Ex. 817. Ex. 818. Ex. 819. Ex. 820. Ex. 821. Ex. 822. Ex. 823. Ex. 824. Ex. 825. Ex. 826. Ex. 827. Ex. 828. Ex. 829. Ex. 830. Ex. 831. Ex. 832. Ex. 833. Ex. 834. Ex. 835. Ex. 836. Ex. 837. Ex. 838. Ex. 839. Ex. 840. Ex. 841. Ex. 842. Ex. 843. Ex. 844. Ex. 845. Ex. 846. Ex. 847. Ex. 848. Ex. 849. Ex. 850. Ex. 851. Ex. 852. Ex. 853. Ex. 854. Ex. 855. Ex. 856. Ex. 857. Ex. 858. Ex. 859. Ex. 860. Ex. 861. Ex. 862. Ex. 863. Ex. 864. Ex. 865. Ex. 866. Ex. 867. Ex. 868. Ex. 869. Ex. 870. Ex. 871. Ex. 872. Ex. 873. Ex. 874. Ex. 875. Ex. 876. Ex. 877. Ex. 878. Ex. 879. Ex. 880. Ex. 881. Ex. 882. Ex. 883. Ex. 884. Ex. 885. Ex. 886. Ex. 887. Ex. 888. Ex. 889. Ex. 890. Ex. 891. Ex. 892. Ex. 893. Ex. 894. Ex. 895. Ex. 896. Ex. 897. Ex. 898. Ex. 899. Ex. 900. Ex. 901. Ex. 902. Ex. 903. Ex. 904. Ex. 905. Ex. 906. Ex. 907. Ex. 908. Ex. 909. Ex. 910. Ex. 911. Ex. 912. Ex. 913. Ex. 914. Ex. 915. Ex. 916. Ex. 917. Ex. 918. Ex. 919. Ex. 920. Ex. 921. Ex. 922. Ex. 923. Ex. 924. Ex. 925. Ex. 926. Ex. 927. Ex. 928. Ex. 929. Ex. 930. Ex. 931. Ex. 932. Ex. 933. Ex. 934. Ex. 935. Ex. 936. Ex. 937. Ex. 938. Ex. 939. Ex. 940. Ex. 941. Ex. 942. Ex. 943. Ex. 944. Ex. 945. Ex. 946. Ex. 947. Ex. 948. Ex. 949. Ex. 950. Ex. 951. Ex. 952. Ex. 953. Ex. 954. Ex. 955. Ex. 956. Ex. 957. Ex. 958. Ex. 959. Ex. 960. Ex. 961. Ex. 962. Ex. 963. Ex. 964. Ex. 965. Ex. 966. Ex. 967. Ex. 968. Ex. 969. Ex. 970. Ex. 971. Ex. 972. Ex. 973. Ex. 974. Ex. 975. Ex. 976. Ex. 977. Ex. 978. Ex. 979. Ex. 980. Ex. 981. Ex. 982. Ex. 983. Ex. 984. Ex. 985. Ex. 986. Ex. 987. Ex. 988. Ex. 989. Ex. 990. Ex. 991. Ex. 992. Ex. 993. Ex. 994. Ex. 995. Ex. 996. Ex. 997. Ex. 998. Ex. 999. Ex. 1000.

Ex. 1. Ex. 2. Ex. 3. Ex. 4. Ex. 5. Ex. 6. Ex. 7. Ex. 8. Ex. 9. Ex. 10. Ex. 11. Ex. 12. Ex. 13. Ex. 14. Ex. 15. Ex. 16. Ex. 17. Ex. 18. Ex. 19. Ex. 20. Ex. 21. Ex. 22. Ex. 23. Ex. 24. Ex. 25. Ex. 26. Ex. 27. Ex. 28. Ex. 29. Ex. 30. Ex. 31. Ex. 32. Ex. 33. Ex. 34. Ex. 35. Ex. 36. Ex. 37. Ex. 38. Ex. 39. Ex. 40. Ex. 41. Ex. 42. Ex. 43. Ex. 44. Ex. 45. Ex. 46. Ex. 47. Ex. 48. Ex. 49. Ex. 50. Ex. 51. Ex. 52. Ex. 53. Ex. 54. Ex. 55. Ex. 56. Ex. 57. Ex. 58. Ex. 59. Ex. 60. Ex. 61. Ex. 62. Ex. 63. Ex. 64. Ex. 65. Ex. 66. Ex. 67. Ex. 68. Ex. 69. Ex. 70. Ex. 71. Ex. 72. Ex. 73. Ex. 74. Ex. 75. Ex. 76. Ex. 77. Ex. 78. Ex. 79. Ex. 80. Ex. 81. Ex. 82. Ex. 83. Ex. 84. Ex. 85. Ex. 86. Ex. 87. Ex. 88. Ex. 89. Ex. 90. Ex. 91. Ex. 92. Ex. 93. Ex. 94. Ex. 95. Ex. 96. Ex. 97. Ex. 98. Ex. 99. Ex. 100. Ex. 101. Ex. 102. Ex. 103. Ex. 104. Ex. 105. Ex. 106. Ex. 107. Ex. 108. Ex. 109. Ex. 110. Ex. 111. Ex. 112. Ex. 113. Ex. 114. Ex. 115. Ex. 116. Ex. 117. Ex. 118. Ex. 119. Ex. 120. Ex. 121. Ex. 122. Ex. 123. Ex. 124. Ex. 125. Ex. 126. Ex. 127. Ex. 128. Ex. 129. Ex. 130. Ex. 131. Ex. 132. Ex. 133. Ex. 134. Ex. 135. Ex. 136. Ex. 137. Ex. 138. Ex. 139. Ex. 140. Ex. 141. Ex. 142. Ex. 143. Ex. 144. Ex. 145. Ex. 146. Ex. 147. Ex. 148. Ex. 149. Ex. 150. Ex. 151. Ex. 152. Ex. 153. Ex. 154. Ex. 155. Ex. 156. Ex. 157. Ex. 158. Ex. 159. Ex. 160. Ex. 161. Ex. 162. Ex. 163. Ex. 164. Ex. 165. Ex. 166. Ex. 167. Ex. 168. Ex. 169. Ex. 170. Ex. 171. Ex. 172. Ex. 173. Ex. 174. Ex. 175. Ex. 176. Ex. 177. Ex. 178. Ex. 179. Ex. 180. Ex. 181. Ex. 182. Ex. 183. Ex. 184. Ex. 185. Ex. 186. Ex. 187. Ex. 188. Ex. 189. Ex. 190. Ex. 191. Ex. 192. Ex. 193. Ex. 194. Ex. 195. Ex. 196. Ex. 197. Ex. 198. Ex. 199. Ex. 200. Ex. 201. Ex. 202. Ex. 203. Ex. 204. Ex. 205. Ex. 206. Ex. 207. Ex. 208. Ex. 209. Ex. 210. Ex. 211. Ex. 212. Ex. 213. Ex. 214. Ex. 215. Ex. 216. Ex. 217. Ex. 218. Ex. 219. Ex. 220. Ex. 221. Ex. 222. Ex. 223. Ex. 224. Ex. 225. Ex. 226. Ex. 227. Ex. 228. Ex. 229. Ex. 230. Ex. 231. Ex. 232. Ex. 233. Ex. 234. Ex. 235. Ex. 236. Ex. 237. Ex. 238. Ex. 239. Ex. 240. Ex. 241. Ex. 242. Ex. 243. Ex. 244. Ex. 245. Ex. 246. Ex. 247. Ex. 248. Ex. 249. Ex. 250. Ex. 251. Ex. 252. Ex. 253. Ex. 254. Ex. 255. Ex. 256. Ex. 257. Ex. 258. Ex. 259. Ex. 260. Ex. 261. Ex. 262. Ex. 263. Ex. 264. Ex. 265. Ex. 266. Ex. 267. Ex. 268. Ex. 269. Ex. 270. Ex. 271. Ex. 272. Ex. 273. Ex. 274. Ex. 275. Ex. 276. Ex. 277. Ex. 278. Ex. 279. Ex. 280. Ex. 281. Ex. 282. Ex. 283. Ex. 284. Ex. 285. Ex. 286. Ex. 287. Ex. 288. Ex. 289. Ex. 290. Ex. 291. Ex. 292. Ex. 293. Ex. 294. Ex. 295. Ex. 296. Ex. 297. Ex. 298. Ex. 299. Ex. 300. Ex. 301. Ex. 302. Ex. 303. Ex. 304. Ex. 305. Ex. 306. Ex. 307. Ex. 308. Ex. 309. Ex. 310. Ex. 311. Ex. 312. Ex. 313. Ex. 314. Ex. 315. Ex. 316. Ex. 317. Ex. 318. Ex. 319. Ex. 320. Ex. 321. Ex. 322. Ex. 323. Ex. 324. Ex. 325. Ex. 326. Ex. 327. Ex. 328. Ex. 329. Ex. 330. Ex. 331. Ex. 332. Ex. 333. Ex. 334. Ex. 335. Ex. 336. Ex. 337. Ex. 338. Ex. 339. Ex. 340. Ex. 341. Ex. 342. Ex. 343. Ex. 344. Ex. 345. Ex. 346. Ex. 347. Ex. 348. Ex. 349. Ex. 350. Ex. 351. Ex. 352. Ex. 353. Ex. 354. Ex. 355. Ex. 356. Ex. 357. Ex. 358. Ex. 359. Ex. 360. Ex. 361. Ex. 362. Ex. 363. Ex. 364. Ex. 365. Ex. 366. Ex. 367. Ex. 368. Ex. 369. Ex. 370. Ex. 371. Ex. 372. Ex. 373. Ex. 374. Ex. 375. Ex. 376. Ex. 377. Ex. 378. Ex. 379. Ex. 380. Ex. 381. Ex. 382. Ex. 383. Ex. 384. Ex. 385. Ex. 386. Ex. 387. Ex. 388. Ex. 389. Ex. 390. Ex. 391. Ex. 392. Ex. 393. Ex. 394. Ex. 395. Ex. 396. Ex. 397. Ex. 398. Ex. 399. Ex. 400. Ex. 401. Ex. 402. Ex. 403. Ex. 404. Ex. 405. Ex. 406. Ex. 407. Ex. 408. Ex. 409. Ex. 410. Ex. 411. Ex. 412. Ex. 413. Ex. 414. Ex. 415. Ex. 416. Ex. 417. Ex. 418. Ex. 419. Ex. 420. Ex. 421. Ex. 422. Ex. 423. Ex. 424. Ex. 425. Ex. 426. Ex. 427. Ex. 428. Ex. 429. Ex. 430. Ex. 431. Ex. 432. Ex. 433. Ex. 434. Ex. 435. Ex. 436. Ex. 437. Ex. 438. Ex. 439. Ex. 440. Ex. 441. Ex. 442. Ex. 443. Ex. 444. Ex. 445. Ex. 446. Ex. 447. Ex. 448. Ex. 449. Ex. 450. Ex. 451. Ex. 452. Ex. 453. Ex. 454. Ex. 455. Ex. 456. Ex. 457. Ex. 458. Ex. 459. Ex. 460. Ex. 461. Ex. 462. Ex. 463. Ex. 464. Ex. 465. Ex. 466. Ex. 467. Ex. 468. Ex. 469. Ex. 470. Ex. 471. Ex. 472. Ex. 473. Ex. 474. Ex. 475. Ex. 476. Ex. 477. Ex. 478. Ex. 479. Ex. 480. Ex. 481. Ex. 482. Ex. 483. Ex. 484. Ex. 485. Ex. 486. Ex. 487. Ex. 488. Ex. 489. Ex. 490. Ex. 491. Ex. 492. Ex. 493. Ex. 494. Ex. 495. Ex. 496. Ex. 497. Ex. 498. Ex. 499. Ex. 500. Ex. 501. Ex. 502. Ex. 503. Ex. 504. Ex. 505. Ex. 506. Ex. 507. Ex. 508. Ex. 509. Ex. 510. Ex. 511. Ex. 512. Ex. 513. Ex. 514. Ex. 515. Ex. 516. Ex. 517. Ex. 518. Ex. 519. Ex. 520. Ex. 521. Ex. 522. Ex. 523. Ex. 524. Ex. 525. Ex. 526. Ex. 527. Ex. 528. Ex. 529. Ex. 530. Ex. 531. Ex. 532. Ex. 533. Ex. 534. Ex. 535. Ex. 536. Ex. 537. Ex. 538. Ex. 539. Ex. 540. Ex. 541. Ex. 542. Ex. 543. Ex. 544. Ex. 545. Ex. 546. Ex. 547. Ex. 548. Ex. 549. Ex. 550. Ex. 551. Ex. 552. Ex. 553. Ex. 554. Ex. 555. Ex. 556. Ex. 557. Ex. 558. Ex. 559. Ex. 560. Ex. 561. Ex. 562. Ex. 563. Ex. 564. Ex. 565. Ex. 566. Ex. 567. Ex. 568. Ex. 569. Ex. 570. Ex. 571. Ex. 572. Ex. 573. Ex. 574. Ex. 575. Ex. 576. Ex. 577. Ex. 578. Ex. 579. Ex. 580. Ex. 581. Ex. 582. Ex. 583. Ex. 584. Ex. 585. Ex. 586. Ex. 587. Ex. 588. Ex. 589. Ex. 590. Ex. 591. Ex. 592. Ex. 593. Ex. 594. Ex. 595. Ex. 596. Ex. 597. Ex. 598. Ex. 599. Ex. 600. Ex. 601. Ex. 602. Ex. 603. Ex. 604. Ex. 605. Ex. 606. Ex. 607. Ex. 608. Ex. 609. Ex. 610. Ex. 611. Ex. 612. Ex. 613. Ex. 614. Ex. 615. Ex. 616. Ex. 617. Ex. 618. Ex. 619. Ex. 620. Ex. 621. Ex. 622. Ex. 623. Ex. 624. Ex. 625. Ex. 626. Ex. 627. Ex. 628. Ex. 629. Ex. 630. Ex. 631. Ex. 632. Ex. 633. Ex. 634. Ex. 635. Ex. 636. Ex. 637. Ex. 638. Ex. 639. Ex. 640. Ex. 641. Ex. 642. Ex. 643. Ex. 644. Ex. 645. Ex. 646. Ex. 647. Ex. 648. Ex. 649. Ex. 650. Ex. 651. Ex. 652. Ex. 653. Ex. 654. Ex. 655. Ex. 656. Ex. 657. Ex. 658. Ex. 659. Ex. 660. Ex. 661. Ex. 662. Ex. 663. Ex. 664. Ex. 665. Ex. 666. Ex. 667. Ex. 668. Ex. 669. Ex. 670. Ex. 671. Ex. 672. Ex. 673. Ex. 674. Ex. 675. Ex. 676. Ex. 677. Ex. 678. Ex. 679. Ex. 680. Ex. 681. Ex. 682. Ex. 683. Ex. 684. Ex. 685. Ex. 686. Ex. 687. Ex. 688. Ex. 689. Ex. 690. Ex. 691. Ex. 692. Ex. 693. Ex. 694. Ex. 695. Ex. 696. Ex. 697. Ex. 698. Ex. 699. Ex. 700. Ex. 701. Ex. 702. Ex. 703. Ex. 704. Ex. 705. Ex. 706. Ex. 707. Ex. 708. Ex. 709. Ex. 710. Ex. 711. Ex. 712. Ex. 713. Ex. 714. Ex. 715. Ex. 716. Ex. 717. Ex. 718. Ex. 719. Ex. 720. Ex. 721. Ex. 722. Ex. 723. Ex. 724. Ex. 725. Ex. 726. Ex. 727. Ex. 728. Ex. 729. Ex. 730. Ex. 731. Ex. 732. Ex. 733. Ex. 734. Ex. 735. Ex. 736. Ex. 737. Ex. 738. Ex. 739. Ex. 740. Ex. 741. Ex. 742. Ex. 743. Ex. 744. Ex. 745. Ex. 746. Ex. 747. Ex. 748. Ex. 749. Ex. 750. Ex. 751. Ex. 752. Ex. 753. Ex. 754. Ex. 755. Ex. 756. Ex. 757. Ex. 758. Ex. 759. Ex. 760. Ex. 761. Ex. 762. Ex. 763. Ex. 764. Ex. 765. Ex. 766. Ex. 767. Ex. 768. Ex. 769. Ex. 770. Ex. 771. Ex. 772. Ex. 773. Ex. 774. Ex. 775. Ex. 776. Ex. 777. Ex. 778. Ex. 779. Ex. 780. Ex. 781. Ex. 782. Ex. 783. Ex. 784. Ex. 785. Ex. 786. Ex. 787. Ex. 788. Ex. 789. Ex. 790. Ex. 791. Ex. 792. Ex. 793. Ex. 794. Ex. 795. Ex. 796. Ex. 797. Ex. 798. Ex. 799. Ex. 800. Ex. 801. Ex. 802. Ex. 803. Ex. 804. Ex. 805. Ex. 806. Ex. 807. Ex. 808. Ex. 809. Ex. 810. Ex. 811. Ex. 812. Ex. 813. Ex. 814. Ex. 815. Ex. 816. Ex. 817. Ex. 818. Ex. 819. Ex. 820. Ex. 821. Ex. 822. Ex. 823. Ex. 824. Ex. 825. Ex. 826. Ex. 827. Ex. 828. Ex. 829. Ex. 830. Ex. 831. Ex. 832. Ex. 833. Ex. 834. Ex. 835. Ex. 836. Ex. 837. Ex. 838. Ex. 839. Ex. 840. Ex. 841. Ex. 842. Ex. 843. Ex. 844. Ex. 845. Ex. 846. Ex. 847. Ex. 848. Ex. 849. Ex. 850. Ex. 851. Ex. 852. Ex. 853. Ex. 854. Ex. 855. Ex. 856. Ex. 857. Ex. 858. Ex. 859. Ex. 860. Ex. 861. Ex. 862. Ex. 863. Ex. 864. Ex. 865. Ex. 866. Ex. 867. Ex. 868. Ex. 869. Ex. 870. Ex. 871. Ex. 872. Ex. 873. Ex. 874. Ex. 875. Ex. 876. Ex. 877. Ex. 878. Ex. 879. Ex. 880. Ex. 881. Ex. 882. Ex. 883. Ex. 884. Ex. 885. Ex. 886. Ex. 887. Ex. 888. Ex. 889. Ex. 890. Ex. 891. Ex. 892. Ex. 893. Ex. 894. Ex. 895. Ex. 896. Ex. 897. Ex. 898. Ex. 899. Ex. 900. Ex. 901. Ex. 902. Ex. 903. Ex. 904. Ex. 905. Ex. 906. Ex. 907. Ex. 908. Ex. 909. Ex. 910. Ex. 911. Ex. 912. Ex. 913. Ex. 914. Ex. 915. Ex. 916. Ex. 917. Ex. 918. Ex. 919. Ex. 920. Ex. 921. Ex. 922. Ex. 923. Ex. 924. Ex. 925. Ex. 926. Ex. 927. Ex. 928. Ex. 929. Ex. 930. Ex. 931. Ex. 932. Ex. 933. Ex. 934. Ex. 935. Ex. 936. Ex. 937. Ex. 938. Ex. 939. Ex. 940. Ex. 941. Ex. 942. Ex. 943. Ex. 944. Ex. 945. Ex. 946. Ex. 947. Ex. 948. Ex. 949. Ex. 950. Ex. 951. Ex. 952. Ex. 953. Ex. 954. Ex. 955. Ex. 956. Ex. 957. Ex. 958. Ex. 959. Ex. 960. Ex. 961. Ex. 962. Ex. 963. Ex. 964. Ex. 965. Ex. 966. Ex. 967. Ex. 968. Ex. 969. Ex. 970. Ex. 971. Ex. 972. Ex. 973. Ex. 974. Ex. 975. Ex. 976. Ex. 977. Ex. 978. Ex. 979. Ex. 980. Ex. 981. Ex. 982. Ex. 983. Ex. 984. Ex. 985. Ex. 986. Ex. 987. Ex. 988. Ex. 989. Ex. 990. Ex. 991. Ex. 992. Ex. 993. Ex. 994. Ex. 995. Ex. 996. Ex. 997. Ex. 998. Ex. 999. Ex. 1000.

Ex. 1. Ex. 2. Ex. 3. Ex. 4. Ex. 5. Ex. 6. Ex. 7. Ex. 8. Ex. 9. Ex. 10. Ex. 11. Ex. 12. Ex. 13. Ex. 14. Ex. 15. Ex. 16. Ex. 17. Ex. 18. Ex. 19. Ex. 20. Ex. 21. Ex. 22. Ex. 23. Ex. 24. Ex. 25. Ex. 26. Ex. 27. Ex. 28. Ex. 29. Ex. 30. Ex. 31. Ex. 32. Ex. 33. Ex. 34. Ex. 35. Ex. 36. Ex. 37. Ex. 38. Ex. 39. Ex. 40. Ex. 41. Ex. 42. Ex. 43. Ex. 44. Ex. 45. Ex. 46. Ex. 47. Ex. 48. Ex. 49. Ex. 50. Ex. 51. Ex. 52. Ex. 53. Ex. 54. Ex. 55. Ex. 56. Ex. 57. Ex. 58. Ex. 59. Ex. 60. Ex. 61. Ex. 62. Ex. 63. Ex. 64. Ex. 65. Ex. 66. Ex. 67. Ex. 68. Ex. 69. Ex. 70. Ex. 71. Ex. 72. Ex. 73. Ex. 74. Ex. 75. Ex. 76. Ex. 77. Ex. 78. Ex. 79. Ex. 80. Ex. 81. Ex. 82. Ex. 83. Ex. 84. Ex. 85. Ex. 86. Ex. 87. Ex. 88. Ex. 89. Ex. 90. Ex. 91. Ex. 92. Ex. 93. Ex. 94. Ex. 95. Ex. 96. Ex. 97. Ex. 98. Ex. 99. Ex. 100. Ex. 101. Ex. 102. Ex. 103. Ex. 104. Ex. 105. Ex. 106. Ex. 107. Ex. 108. Ex. 109. Ex. 110. Ex. 111. Ex. 112. Ex. 113. Ex. 114. Ex. 115. Ex. 116. Ex. 117. Ex. 118. Ex. 119. Ex. 120. Ex. 121. Ex. 122. Ex. 123. Ex. 124. Ex. 125. Ex. 126. Ex. 127. Ex. 128. Ex. 129. Ex. 130. Ex. 131. Ex. 132. Ex. 133. Ex. 134. Ex. 135. Ex. 136. Ex. 137. Ex. 138. Ex. 139. Ex. 140. Ex. 141. Ex. 142. Ex. 143. Ex. 144. Ex. 145. Ex. 146. Ex. 147. Ex. 148. Ex. 149. Ex. 150. Ex. 151. Ex. 152. Ex. 153. Ex. 154. Ex. 155. Ex. 156. Ex. 157. Ex. 158. Ex. 159. Ex. 160. Ex. 161. Ex. 162. Ex. 163. Ex. 164. Ex. 165. Ex. 166. Ex. 167. Ex. 168. Ex. 169. Ex. 170. Ex. 171. Ex. 172. Ex. 173. Ex. 174. Ex. 175. Ex. 176. Ex. 177. Ex. 178. Ex. 179. Ex. 180. Ex. 181. Ex. 182. Ex. 183. Ex. 184. Ex. 185. Ex. 186. Ex. 187. Ex. 188. Ex. 189. Ex. 190. Ex. 191. Ex. 192. Ex. 193. Ex. 194. Ex. 195. Ex. 196. Ex. 197. Ex. 198. Ex. 199. Ex. 200. Ex. 201. Ex. 202. Ex. 203. Ex. 204. Ex. 205. Ex. 206. Ex. 207. Ex. 208. Ex. 209. Ex. 210. Ex. 211. Ex. 212. Ex. 213. Ex. 214. Ex. 215. Ex. 216. Ex. 217. Ex. 218. Ex. 219. Ex. 220. Ex. 221. Ex. 222. Ex. 223. Ex. 224. Ex. 225. Ex. 226. Ex. 227. Ex. 228. Ex. 229. Ex. 230. Ex. 231. Ex. 232. Ex. 233. Ex. 234. Ex. 235. Ex. 236. Ex. 237. Ex. 238. Ex. 239. Ex. 240. Ex. 241. Ex. 242. Ex. 243. Ex. 244. Ex. 245. Ex. 246. Ex. 247. Ex. 248. Ex. 249. Ex. 250. Ex. 251. Ex. 252. Ex. 253. Ex. 254. Ex. 255. Ex. 256. Ex. 257. Ex. 258. Ex. 259. Ex. 260. Ex. 261. Ex. 262. Ex. 263. Ex. 264. Ex. 265. Ex. 266. Ex. 267. Ex. 268. Ex. 269. Ex. 270. Ex. 271. Ex. 272. Ex. 273. Ex. 274. Ex. 275. Ex. 276. Ex. 277. Ex. 278.

Der gütige Beamte der Art 51 Gattung 185 sieht

gütigen Leuten zu. Er ist gütig. Er ist gütig. Er ist gütig

Saturday Night, Dec. 30, 1837, and was repeated Monday, Jan. 1, 1838. The following cast was announced: Sir Edward Mortimer, Mr. Macready; Lieut. Worthington, Mr. Warde; Lieut. Rolando, Mr. Anderson; Lieut. Oakley, Mr. Hield; Lieut. Wilson, Mr. Hemmings; Lieut. Hall, Mr. Ryder; Lieut. Ellis, Mr. Lee; Lieut. Hall, Mr. Lane; Lieut. Hall, Mr. Lane; Lieut. Hall, Mr. Lane

kaum der Erwähnung, dass dieser Typus an sich etwas den heilbaren Fällen ausschliesslich Zukommendes durchaus nicht ist; denn dieser sowohl wie auch jener mit leichter Verstärkung der normalen Tricrotie sind ja, wie so oft betont, nur zu häufig nichts als intercurrente, von einem vorübergehenden Reize abhängige Erscheinungen bei Kranken, die man kaum für heilbar halten kann, und deren Norm ein arger Dicrotismus ist. Wenn aber Jemand, den man übrigens allen Grund hat für heilbar zu halten, unter gewöhnlichen Verhältnissen, wenn nichts Besonderes auf ihn einwirkt, wenn er sich in seiner relativen Ruhe befindet, obgleich er nichtsweniger als gesund erscheint, die tetracrote Modification des Dicroto-celer, und ein anderer unter denselben Voraussetzungen jenen leicht verstärkt tricroten *Pulsus celer* hat, so darf man nach den bisherigen von *Nötel* und mir gemachten Erfahrungen in der That hoffen, dass diese Kranken genesen, und zwar bald, in wenigen Wochen oder Monaten genesen werden. Jener Kranke repräsentirt die Manie und dieser die (agile) Melancholie. Giebt es aber eine besondere Erregungsursache, gleichviel ob sie auf der Hand liegt oder nur schwer zu entdecken ist, so hat sich die Pulsphase auch, und zwar nach den Regeln der Umgestaltung des Pulsus im Affecte, verändert. Daher weist die Pulsgeschichte eines solchen Kranken die mannichfaltigsten Metamorphosen auf. Bald wird die Phase — und vorzugsweise bei zunehmend heiterer Erregung — stärker dicrot und schwächer tetracrot, Fig. 135, wird auch wohl vorübergehend, wie in

Fig. 135.

Ma. Ah see mother Bonny Ah will see mother

Bonny Sure Ah will mother Ah will see mother

Mother Bonny Ah will see mother Ah will see mother Bonny Ah will see mother Ah will see mother Bonny Ah will see mother Ah will see

Fig. 1. Ost- und Nordgrenze der Weinlese.

Weinlese. Ferner: Ostgrenze der Weinlese (Fig. 1), Ostgrenze der Kartoffelernte, Ostgrenze der Kornernte, Ostgrenze der Obsternte, Ostgrenze der Haferernte, Ostgrenze der Heuernte, Ostgrenze der Grummeternte, Ostgrenze der Ernte der Sommerfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Wintergetreide, Ostgrenze der Ernte der Hackfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Futterkräuter, Ostgrenze der Ernte der Handelsgewächse, Ostgrenze der Ernte der Gemüse, Ostgrenze der Ernte der Gespinnstpflanzen, Ostgrenze der Ernte der Ölgewächse, Ostgrenze der Ernte der Farbepflanzen, Ostgrenze der Ernte der Arzneipflanzen, Ostgrenze der Ernte der Gewürzpflanzen, Ostgrenze der Ernte der Gartenfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Waldfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Wiesenfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Ackerfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Feldfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Bodenfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Baumfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Strauchfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Krautfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Rankenfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Schlingfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Kletterfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Schmarotzerfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Parasitenfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Epiphytenfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Saprophytenfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Humusfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Torffrüchte, Ostgrenze der Ernte der Moorfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Sumpffrüchte, Ostgrenze der Ernte der Wasserfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Luftfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Erdfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Steinfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Sandfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Lehmfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Tonfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Kalkfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Mergelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Gipsfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Salzfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Laugenfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Säurefrüchte, Ostgrenze der Ernte der Basenfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Neutralfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Amphoterfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Indifferentfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Edelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbunedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelhalbunedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelhalbunedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Unedelhalbedelunedelhalbedelfrüchte, Ostgrenze der Ernte der Halbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhalbedelunedelhal

Kleine Mitteilungen.

Die Ausgrabungen auf dem Gräberfelde von Hallstatt.

Seit dem Jahre 1846 wurden auf dem Gräberfelde von Hallstatt 1045 Gräber geöffnet. Die Zahl der Grabhügel, welche noch unberührt sind, beträgt 1000. Die Ausgrabungen wurden in den Jahren 1846—1863 von Johann Georg Ramsauer, in den Jahren 1863—1877 von Eduard Freiherrn von Sacken geleitet. Seit 1877 ist Dr. Moritz Hoernes mit der Leitung betraut. Die Ausgrabungen werden in diesem Jahre fortgesetzt. Es ist zu wünschen, daß sie noch recht lange fortgesetzt werden, denn sie sind von großer Wichtigkeit für die Kenntnis der Hallstattperiode. Leider sind die Ausgrabungen nicht immer mit der nötigen Sorgfalt vorgenommen worden. Es wurden viele Gräber geöffnet, ohne daß man sich die Mühe nahm, die Lage der Gräber und der Funde genau zu notieren. Es ist daher sehr schwer, die Gräber und Funde nach Perioden zu ordnen. Ramsauer hat zwar eine Karte des Gräberfeldes angefertigt, aber diese ist nicht genau. Es ist daher sehr zu wünschen, daß eine neue Karte des Gräberfeldes angefertigt wird, auf welcher alle Gräber genau eingezeichnet sind. Ferner wäre es sehr wünschenswert, daß eine Publikation über die Ausgrabungen erscheint, welche alle Gräber und Funde nach Perioden geordnet enthält. Leider ist bis jetzt nur ein Teil der Ausgrabungen publiziert worden.

Ramsauer hat in den Jahren 1846—1863 in 980 Gräbern Nachgrabungen vorgenommen. Er hat 1045 Gräber geöffnet, weil 65 Gräber zwei- bis dreimal geöffnet wurden. Ramsauer hat 1846 in 19 Gräbern, 1847 in 18 Gräbern, 1848 in 15 Gräbern, 1849 in 16 Gräbern, 1850 in 19 Gräbern, 1851 in 19 Gräbern, 1852 in 19 Gräbern, 1853 in 19 Gräbern, 1854 in 19 Gräbern, 1855 in 19 Gräbern, 1856 in 19 Gräbern, 1857 in 19 Gräbern, 1858 in 19 Gräbern, 1859 in 19 Gräbern, 1860 in 19 Gräbern, 1861 in 19 Gräbern, 1862 in 19 Gräbern, 1863 in 19 Gräbern Nachgrabungen vorgenommen. Von Sacken hat 1863 in 19 Gräbern, 1864 in 19 Gräbern, 1865 in 19 Gräbern, 1866 in 19 Gräbern, 1867 in 19 Gräbern, 1868 in 19 Gräbern, 1869 in 19 Gräbern, 1870 in 19 Gräbern, 1871 in 19 Gräbern, 1872 in 19 Gräbern, 1873 in 19 Gräbern, 1874 in 19 Gräbern, 1875 in 19 Gräbern, 1876 in 19 Gräbern, 1877 in 19 Gräbern Nachgrabungen vorgenommen. Hoernes hat 1877 in 19 Gräbern, 1878 in 19 Gräbern, 1879 in 19 Gräbern, 1880 in 19 Gräbern, 1881 in 19 Gräbern, 1882 in 19 Gräbern, 1883 in 19 Gräbern, 1884 in 19 Gräbern, 1885 in 19 Gräbern, 1886 in 19 Gräbern,

The air expansion and cell accommodation, Table 1 and Figure 1, were measured in the air thermometer. The air expansion was measured at 0 °C and 100 °C. The cell accommodation was measured at 0 °C and 100 °C. The air expansion and cell accommodation were measured at 0 °C and 100 °C.

Sitzung

des

deutschen Vereins der Irrenärzte

zu Innsbruck, am 20. September 1869.

Der Präsident, Geh. Rath Dr. *Flemming*, theilt der Versammlung mit, dass der Vorstand in einer am 21. Mai d. J. zu Eisenach abgehaltenen Berathung beschlossen habe, die Vereinsmitglieder zu einer Sitzung während der Naturforscherversammlung in Insbruck zusammenzuberufen, um den Wünschen derer Rechnung zu tragen, welche die bisher angewendete Weise, vor der Naturforscherversammlung mehrere Tage den Vereinssitzungen zu widmen, den Interessen der Section nachtheilig erachteten, begrüsst die Versammlung und widmet dem Andenken der verstorbenen Mitgliedern *Griesinger*, *Löwenhardt*, *Kern*, *Humann* einige ehrende Worte.

Zu Schriftführern wurden Dr. *Brosius* und Dr. *Roller* jun. erwählt.

Der Präsident entschuldigt die Abwesenheit des Vorstands-Mitgliedes Prof. Dr. *Jessen*, verliest telegraphische Begrüssungen der Aerzte zu Leubus und der Anstalt zu St. Petersburg, von welch' letzteren zugleich die von allen Anwesenden freudig begrüsste Nachricht mitgetheilt wurde, dass um dieselbe Stunde der Grundstein zu einer besonderen Tobabtheilung gelegt werde.

1. Der Präsident theilt mit, dass vom Kanzleramt des norddeutschen Bundes an den Vorstand des Vereins deutscher Irrenärzte ein Exemplar des für den Norddeutschen Bund aufgestellten Strafgesetz-Entwurfes nebst Motiven und Anlagen zugegangen sei, damit „allen denen, welche die Aufforderung und den Beruf in sich empfinden, an dem nationalen Werke mitzuarbeiten, die Möglichkeit und der Anlass geboten wird, sich über den aufgestellten Entwurf vernehmen zu lassen und zu seiner Verbesserung mitzuwirken."

Digitized b

Er fordert auf, in Berathung darüber einzutreten.

Nach längerer Discussion, an der sich vorzugsweise *Solbrig*, *Nasse*, *Dick*, *Mendel* betheiligen, wird, nachdem *Flemming* seine Vorlage zurückgezogen, beschlossen, diesen Gegenstand für eine besondere Berathung zurückzustellen.

2. Nachdem laut Beschlusses der Vereins-Versammlung zu Dresden im Jahre 1868 an die dem Vorstande bekannt gewordenen etwa 16 deutschen Lebensversicherungs-Anstalten die damals beschlossene „Darlegung über die Beziehungen deutscher Lebensversicherungs-Institute zu geisteskranken Selbstmördern“ mit der Einladung zur Erwägung der darin empfohlenen statutarischen Bestimmungen verabreicht worden war, haben 11 dieser Versicherungs - Anstalten eine bezügliche Erklärung abgegeben und dem Vorstande zugehen lassen. Die Gothaer Lebensversicherungs-Bank hat mit anerkennenswerthem Eifer sich selbst der Mühe unterzogen, in einer eigenen Broschüre „Zur Frage über die Behandlung der Selbstmordfälle von Versicherten bei den Lebensversicherungs-Anstalten. Gotha, 1869. p. 31“ ihren Ansichten Ausdruck gegeben.

Nicht eine dieser Anstalten ist auf den Antrag des Vereins eingegangen, welcher dahin ging: die Statuten der betreffenden Gesellschaft dahin abzuändern, dass nach Abweisung der wegen anscheinender Disposition zu Geistes- oder Gemüthsstörung als verdächtig erkannten Versicherungs-Anträge, alle jene Todesfälle, welche nach Ablauf eines Intervalls von 6 Monaten seit Abschluss der Versicherung durch Selbstmord in Folge von Geistes- oder Gemüthsstörung eintreten, mit Einschluss derjenigen Fälle, in welchen beim Abschluss der Versicherung die Geistesstörung verkannt, und dieselbe erst nachher constatirt ist, als solche betrachtet werden sollen, die durch zufällige Krankheiten herbeigeführt worden sind, — sofern die Geistesstörung als Ursache des Selbstmordes durch ärztliches, motivirtes Gutachten erwiesen ist.

Solche Ablehnung ist motivirt worden

theils von einigen Anstalten, nämlich:

der Lebens-, Pensions- und Leibrenten-Versicherungs-Anstalt Iduna in Halle a/S.,

der Leipziger Gesellschaft „Gegenseitigkeit“,

der Hannoverschen Lebens-Versicherungs-Anstalt,

der Braunschweigischen Lebens-Versicherungs-Anstalt

durch Hinweisung auf die Uebereinstimmung ihrer Statuten mit den Grundsätzen der Darlegung, wodurch der Verwaltungsrath ermächtigt wird, bei nachgewiesenem Ursprung des Selbstmords aus Geistesstörung die volle Versicherungssumme auszuzahlen, was wenigstens für die Praxis einigermassen genügt und nur insofern unbefriedigend

ist, als die der medicinischen Wissenschaft entsprechende Handhabung der Statuten der subjectiven Ansicht eines wechselnden Verwaltungsrathes in die Hand gelegt, nicht durch feste statutarische Bestimmungen geregelt ist;

theils durch Hinweisung auf die Natur des Versicherungs-Vertrages, als eines freien Uebereinkommens;

theils durch Hinweisung auf die Schwierigkeiten der Nachweisung der Geistesstörung als Ursache des Selbstmordes, und auf das Erforderniss, langwierigen Processen auszuweichen;

theils endlich sogar durch die Behauptung, den Versicherungs-Anstalten liege die moralische Verpflichtung ob, durch Erschwerung der Zahlung in Selbstmordfällen die Häufigkeit des Selbstmordes zu vermindern und die Sorgfalt in Bewachung und Pflege der Geisteskranken zu verschärfen.

Der Vorsitzende schlägt vor, „weiteren Erklärungen bis zum Schlusse des laufenden Jahres entgegenzusehen, alsdann das Gesammtresultat nebst einer kritischen Würdigung der Erklärungen durch den Vorstand mittels der Zeitschrift zu veröffentlichen und weitere Schritte der nächsten Versammlung des Vereins vorzubehalten."

Angenommen mit dem Zusatze von *Laehr*, dass, wenn inzwischen das Versicherungswesen aus dem Ministerium des Innern dem Bundeskanzleramte übertragen werden und der letztere eine Reorganisation des Versicherungswesens ins Werk setzen sollte, der Vorsitzende bevollmächtigt werde, alsdann die Verhandlungen der Gesellschaft über diesen Gegenstand dem Bundes-Kanzleramte zur Erwägung zu überweisen.

3. Auf einem 1867 zu Paris veranstalteten internationalen psychiatrischen Congresse war ein zweiter für 1869 beschlossen worden und derselbe sollte nach einigen anderen fehlgeschlagenen Versuchen zu Ende September d. J. in Brüssel abgehalten werden, ist jedoch nach Ablehnung von Seiten der Brüsseler Aerzte nicht zu Stande gekommen und auf das Jahr 1870 verschoben worden.

Inzwischen hatte Herr Dr. *Lunier* zu Paris an den Vorstand des Vereins deutscher Irrenärzte den Antrag gestellt auf Betheiligung an diesem internationalen psychiatrischen Congresse:

theils durch Beschickung und Theilnahme an demselben,

theils durch Erwägung eines vorgelegten, von dem Hrn. *Lunier* auftragsmässig ausgearbeiteten „Projèt de statistique appl. à l'étude des maladies mentales" und Mittheilung der dabei sich ergebenden Bemerkungen.

Der erste Theil dieses Antrages ist durch das Ausfallen des Congresses hinfällig geworden. Behufs des zweiten Theils hat der Vor-

Digitized b

Ich bin so ziemlich in Bekanntschaft mit allen, die diesen Winter hier gewesen sind, gekommen, und habe mich mit ihnen, wie es sich gehört, unterhalten. Ich habe mich auch mit Ihrem Freunde, dem Herrn Professor Kant, unterredet, und ihn, wie Sie mir befohlen haben, gegrüßt. Er hat mir auch seine Freundschaft versprochen, und ich habe ihm die meinige versprochen. Ich habe ihn auch gebeten, mir seine Freundschaft zu beweisen, und ihm die meinige zu beweisen. Er hat mir auch seine Freundschaft versprochen, und ich habe ihm die meinige versprochen. Ich habe ihn auch gebeten, mir seine Freundschaft zu beweisen, und ihm die meinige zu beweisen.

Ich habe auch mit dem Herrn Professor Kant über die Philosophie gesprochen, und er hat mir gesagt, daß er die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Ich habe ihm gesagt, daß ich die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Er hat mir auch gesagt, daß er die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Ich habe ihm gesagt, daß ich die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige.

Ich habe auch mit dem Herrn Professor Kant über die Philosophie gesprochen, und er hat mir gesagt, daß er die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Ich habe ihm gesagt, daß ich die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Er hat mir auch gesagt, daß er die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Ich habe ihm gesagt, daß ich die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige.

Ich habe auch mit dem Herrn Professor Kant über die Philosophie gesprochen, und er hat mir gesagt, daß er die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Ich habe ihm gesagt, daß ich die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Er hat mir auch gesagt, daß er die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Ich habe ihm gesagt, daß ich die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige.

Ich habe auch mit dem Herrn Professor Kant über die Philosophie gesprochen, und er hat mir gesagt, daß er die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Ich habe ihm gesagt, daß ich die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Er hat mir auch gesagt, daß er die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige. Ich habe ihm gesagt, daß ich die Philosophie für eine Wissenschaft halte, die sich mit den Gründen der Erkenntnis beschäftige.

durch die Aufnahme in die Irrenanstalt des betreffenden Bezirks, als durch den Transport nach der Hauptstadt bewirken.

3. In der untersten Instanz — den Kreisphysikern — ist als Bedingung zur Anstellung der Nachweis einer praktischen Vorbildung in der Psychiatrie zu verlangen, sei es durch klinischen Unterricht auf Universitäten, oder durch vorübergehende praktische Beschäftigung in Irrenanstalten.

Motiv für den ganzen Antrag:
dass bei Beurtheilung zweifelhafter Fälle von Seelenstörung in allen Instanzen nur diejenigen Aerzte als Sachverständige gelten können, welche Geisteskrankheiten durch Studium und Beobachtung kennen gelernt haben, dürfte keiner weitern Motivirung bedürfen, ist auch wiederholt auf der Versammlung des deutschen Vereins der Irrenärzte in Frankfurt und Hildesheim ausgesprochen.

Der Antrag wird angenommen.

5. Der Antrag *Laehr*'s, dass der Secretär des Vorstandes (§. 2. des Statuts: „Fünftes ständiges Mitglied ist der Hauptredacteur der psychiatrischen Zeitschrift.") künftig ebenfalls durch Wahl ernannt werde, wird abgelehnt.

6. Dr. *Flemming* und Dr. *Nasse*, die durch Loosentscheidung (§. 2. d. Stat.) aus dem Vorstande austreten, werden durch Acclamation wiedergewählt.

7. Ueber den zuerst gestellten Antrag Betreffs des Strafgesetzentwurfs für den norddeutschen Bund entspinnt sich nochmals eine Discussion, an der sich *Laehr*, *Besser*, *Mendel* betheiligen. Schliesslich wird folgender Antrag *Besser*'s angenommen:

a. Der Vorsitzende wird beauftragt, dem Bundeskanzleramte mitzutheilen, dass einerseits bis zum 1. October d. J. (an welchem Tage die zur Prüfung des Gesetzentwurfs erwählte Commission in Berlin zusammentritt) der Verein nicht in die Möglichkeit versetzt sei, ein Votum abzugeben, andererseits aber eine solche Vorlage bis zum 1. December d. J. erfolgen werde;

b. Der Vorstand wird beauftragt, einen diesen Gegenstand betreffenden Auszug des Entwurfs des Strafgesetzbuches drucken zu lassen, den Mitgliedern des Vereins zuzusenden und sie aufzufordern, ihre Ansichten darüber binnen 14 Tagen dem Vorsitzenden des Vorstandes mitzutheilen, der die Pflicht habe, einen Bericht über die abgegebenen Aeusserungen dem Bundeskanzleramte zu erstatten.

Der Vorsitzende dankte den Anwesenden für die Theilnahme an

Digitized by Google

Von
Dr. Staudinger und Rössler.

Separatabdruck aus: Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Jahrgang 1870. Seite 283–316.

Mit Genehmigung der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien.

Wien, 1870.
Gedruckt bei Carl Gerold's Sohn.

lichkeit etc. Ferner vermisst Referent bei einigen andern Verhältnissen die Erwägung einflussreicher Beziehungen, z. B. das Lebensalter beim Civilstande. Dann dürften die empfohlenen Methoden, so richtig sie auch theilweise sind, theilweise nicht die höchsten Gesichtspunkte mit umfassen, theilweise irrthümlich sein. Endlich heben wir noch einen äussern, doch sehr wichtigen Umstand hervor, die zu minutiöse Detaillirung, die nicht hinreichende Berücksichtigung des Verhältnisses von Arbeit und Gewinn. So umfassen die medic. Tabellen des internat. Schemas pr. 7500 Einzelfächer, während die Vorschläge des Referenten mit dem wesentlichen Inhalt jener und einer grossen Reihe anderer Gesichtspunkte, ca. 2900 umfassen. Referent bemerkt noch, dass er für diejenige Ausdehnung, welche die Tabellen seiner Vorschläge zu umfangreich finden, diejenigen Tabellen und Gesichtspunkte angegeben hat, welche bei genauer Abwägung der Arbeit und des Erfolges, die meiste Ausbeute versprechen und daher in den Vordergrund zu stellen sind. Sie ergeben 888 Einzelfächer.

Die Formen bilden eine der wichtigsten Gruppenbildungen, welche sich zum Theil wenigstens, durch alle psychiatrischen Tabellen hindurch ziehen. Sie verdienen daher in hohem Grade die Aufmerksamkeit, welche ihnen in dem internationalen Schema zugewendet ist. Wendet man sich daher der Tabelle I, welche die Classifikation am Ausführlichsten enthält zu, so treten zunächst folgende Hauptgruppen auf: Einfache Geistesstörung (folie simple), epileptische Geistestörung (f. epil.), paralytische Geistesstörung (f. paral.), Altersblödsinn (démence senile), Organischer Blödsinn (démence organique), Idiotie (mit 3 Einzelzeilen), Cretinismus (mit 3 Einzelzeilen), Schlecht bestimmte Formen und andere Formen. Anhangsweise finden sich dann einige Formen, welche nur hier in der Tabelle der Bewegung erwähnt, übrigens aber, wo sie sich finden, nicht weiter verfolgt werden, das delir. tremens, delir. der akuten Krankheiten und traumatisches delir., Epilepsie ohne Geistesstörung. Es ist nun die einfache Geistesstörung hier für die Tabelle der Bewegung, nicht für die übrigen Tabellen, wo nur die genannten Hauptformen gelten, vielfach weiter unterabgetheilt in Manie, Lypemanie beide mit vielen, einer unbestimmten Zahl von Einzelzeilen; in folie mit 3 Zeilen: f. circulaire, f. à double forme; f. des persécutions; f. raisonnante, f. avec conscience; in Monomanie mit vielen, an Zahl unbestimmten Einzelzeilen, und in sekundären Blödsinn (démence consécutive aux vésanies) mit und ohne Aufregung. Diese Classifikation hat nun, trotz der Zustimmung in manchen Theilen, manche Ausstellungen erfahren. Man hat die Verschiedenheiten

Digitized by Google

des Gesichtspunktes derselben hervorgehoben. Bald sei es der einfach symptomatologische (z. B. manie simple), bald der ätiologische (m. hystérique), bald der der Abstraktion von supponirten Krankheitsentitäten, (m. épileptiforme, Epilepsie larvée), bald endlich der anatomische (démence organique). Man würde von jener Seite erwiedern, dass sich jene Gruppen und Varietäten auch zugleich symptomatologisch und durch den Verlauf differenzirten. Dass dies jedoch so charakteristisch geschähe, um in allen Fällen eine sichere, übereinstimmende und daher für statistische Zwecke brauchbare Classifikation verschiedener Statistiker herbei zuführen, kann man nicht zugeben. Ein anderer, noch gegründeterer Einwurf ist der, dass sich die dort aufgestellten Unterabtheilungen der einfachen Geisteskrankheit vielfach decken, also bei der Rubricirung verschiedener Statistiker unter demselben Namen nicht dieselben charakteristischen Krankheitsbilder, sondern eine wahre Confusion entstehen würde. So würde beispielshalber die folie raisonnante, folie avec conscience von verschiedenen Statistikern bald unter dieser Zeile, bald unter irgend einer Form der Manie, oder Melancholie, oder Monomanie untergebracht werden, die folie des persécutions bald hier, bald unter Melancholie, bald unter Monomanie etc. Was nun die eigne Classifikation betrifft, so hält Referent allerdings die Annahme des grössten Theils der Hauptgruppen des Schemas für statistische Zwecke für einen grossen Fortschritt, nämlich der einfachen, paralytischen (d. h. dementia paralytica) der epileptischen (d. h. ausgesprochene Epilepsie mit Geistesstörung) und der Idiotie (mit Cretinismus). In Betreff der letzten Zusammenfassung stellen wir von vorn herein die Forderung auf, dass bei allen diesen, für die Allgemeinheit berechneten Tabellen nur Verhältnisse von allgemeinem Vorkommen maassgebend sein können, dass daher weder solche von bloss lokalem Vorkommen, noch solche von so grosser Seltenheit, dass sie vielleicht in Jahresfrist in ganzen Ländern nicht registrirt werden, eine Stelle finden können, dass man die Erweiterung der Tabelle für solche Fälle, welche keine Fessel sein kann, den sachverständigen Statistikern schon überlassen kann. Es ist jene Forderung ein Ausfluss des allgemeinen Grundsatzes, dass eine Verkürzung einer Tabelle, ohne Preisgebung wesentlicher Data, eine Verbesserung derselben sei, mag die Verkürzung nun in einer Fortlassung überflüssiger, nicht ausgefüllter Zeilen bestehen, in welchem Falle wenigstens die Uebersichtlichkeit, hier jeder folgenden Tabelle gewinnt, oder in einer Vereinigung mehrerer Positionen zu einer einzigen, in welchem Falle zugleich die ganze Arbeit, die Sammlung der Data und Vorarbeitung der Tabelle erleichtert wird. In welchem Grade Letzte-

Digitized by Google

res stattfindet, werden wir am Schlusse der Arbeit sehen. Von demselben, genannten Gesichtspunkte aus, ist der Altersblödsinn aus dem Register der überall wiederkehrenden Formen fortzulassen. Er dürfte nämlich in dem grössten Theil der deutschen Anstalten sehr selten vorkommen, und daher in den Anhang zu verweisen sein, der nur hier, in der Tabelle der Bewegung, seine Stelle findet. Was die letzte Zeile, schlecht charakterisirte andere Formen betrifft, so glauben wir nicht, dass man bei unserer Classifikation zu ihr zu greifen nöthig hätte, am wenigsten von vornherein durch ihre Aufstellung neue Classificirungsversuche provociren solle, ihre Aufstellung denen, die Bedürfniss dazu haben, überlassen könne. — Die démence organique hat bei deutschen Irrenärzten mehrfach eine nicht zustimmende Beurtheilung erfahren. Da ausser dieser Position und dem den akuten Geisteskrankheiten folgenden Blödsinn keine weitere Zeile für den Blödsinn sich findet, so sollte man glauben, dass der primäre Blödsinn im Allgemeinen unter dém. org. untergebracht werden solle. Erwägt man jedoch die nähern Bedingungen, unter denen der primäre Blödsinn vorkommt, also nach Insolation, Kopfverletzungen, nach Typhus, bei hochgradig erblich Veranlagten (Morel), Krankheitszuständen der Hirngefässe, nach geistiger und körperlicher Ueberanstrengung, nach Trunksucht, nach Erschütterung auf Eisenbahnen etc.; wenn man ferner die speciellen Formen erwägt, unter denen der primäre Blödsinn auftreten kann, zunächst das am meisten angeführte Bild, das der stupiden Melancholie, dann jedoch auch geistige Schwäche ohne melancholische Beimischung und ohne motorische Gebundenheit, Zerstreutheit, Apathie, Gedächtnissschwäche, endlich jedoch auch melancholisch und maniakalisch gefärbte Aufregungszustände mit grosser Unbesinnlichkeit und raschem Uebergang in dauernden Blödsinn: so ergibt sich, dass man in manchen Fällen, speciell noch aus dem Verlaufe und der Sektion die Diagnose auf primären Blödsinn machen kann, jedoch nicht im Anfang und im einzelnen Fall, dass man daher diese Fälle unter die primären Formen, wenigstens unter die einfache Geisteskrankheit in statistischer Hinsicht unterbringen müsse. Auch lehrt die Durchlesung der Motive, dass jene Voraussetzung, die Referent absichtlich so weit ausgeführt hat, dem Verfasser nicht vorgeschwebt hat. Es soll nämlich die dém. org. veranlasst sein, „durch eine organische, fast immer lokale Läsion des Gehirns und als beinahe konstante Symptome mehr oder weniger ausgebreitete hemiplegische Symptome" darbieten. In Betreff der letztern ist zu bemerken, dass auch in Tab. XIV bei den Zeichen der Unheilbarkeit nur von „lokaler Lähmung aus organischer Ursache" die Rede ist. Es ergibt

Digitized by Google

sich, dass unter jener „organischen Läsion", eine gröbere, makroskopische, materielle Veränderung des Gehirns gemeint sei. Es ist nun in dieser Hinsicht Folgendes zu bemerken. Es können mehr lokal begrenzte und diffuse Veränderungen (grob materielle) des Gehirns vorhanden sein, bald mit lokalen, halbseitigen und beiderseitigen Lähmungen, bald, je nach dem Sitze und der Ausdehnung der anatomischen Läsion, ohne solche. Die letzteren können nach denselben Schädlichkeiten (Insolation, Kopfverletzung, Gefässveränderungen etc.) vorkommen, können dasselbe Krankheitsbild darbieten, wie die leichteren Gehirnveränderungen, wie sie sich nach andern Formen des primären und sekundären Blödsinns finden (leichtere Atrophie der Windungen, Verdickung der pia m., hydroceph. int. etc.). Man hätte also 3 Reihen von Zuständen: 1. Leichtere Hirnveränderungen mit Blödsinn. 2. Schwere Hirnveränderungen mit Blödsinn. 3. Schwere Hirnveränderungen mit Blödsinn und Lähmung. Die 1. und 2. Gruppe lassen sich symptomatologisch meist nicht trennen. Die 3. Gruppe nun allein für die dém. org. zu verwenden, würde offenbar Zusammengehöriges von einander reissen. Es sind jedoch selbst bei dieser offenbar künstlichen Beschränkung noch einige Bedenken zu äussern. In der grössten Mehrzahl wird allerdings die Voraussetzung des Schemas zutreffen, dass bei dem gleichzeitigen Vorhandensein von Psychose und begrenzter Lähmung durch dieselbe anatomische Störung einerseits die motorische Lähmung, andererseits die psychische Störung, meist in irgend einer Form mehr und weniger hochgradigen Blödsinns bedingt werde. Es gibt jedoch auch Fälle von in den 1. Lebensjahren erworbener Lähmung, sei es vom Hirn, sei es vom Rückenmark aus, zu denen in späteren Jahren eine Psychose, oft mit dem Ausgang in Genesung hinzutritt. Letzteres kann auch bei in späteren Lebensjahren eingetretenen Lähmungen (nach Schlaganfällen etc.) stattfinden. In noch anderen Fällen dürfte der meist eintretende Blödsinn doch nicht mit Nothwendigkeit durch die ursprüngliche Hirnverletzung gegeben sein, sich erst durch kollaterale, auf das Gefässsystem von der ursprünglich afficirten Stelle aus reflectirte Cirkulationsstörungen, durch Fortschreiten des anatomischen Processes in der Contiguität etc. veranlasst sein und ebenso wohl einen Stillstand resp. Rückbildung erfahren können, wie dies z. B. mit der Neuro-retinitis durch Galvanisation etc. der Fall ist. Allen diesen Umständen trägt die Aufstellung der dém. org. keine Rechnung. Ferner ist hervorzuheben, dass Lähmungen, sowohl lokale, als allgemeine, durchaus nicht immer den Schluss auf gröbere Hirnverletzungen erlauben. Es ist das bekannt von den Lähmungen nach Bleivergiftung, Hysterie, nach Typhus, nach Erschöpfungszuständen. Zu allen diesen Zuständen kön-

nen nun auch Geistesstörungen treten, theils unheilbare, theils heilbare, und letztere auch nicht gerade immer mit dem Gepräge der Heilbarkeit. Wiederum trägt diesen Zuständen die Aufstellung der dém. org. keine Rechnung. Noch eine Beziehung wollen wir hervorheben. Es treten im Verlauf wohl diagnosticirter theils einfacher, theils paralytischer Geisteskrankheit, oft nach sehr langer Dauer derselben, Zustände auf, welche in anatomischer und symptomatischer Beziehung, der dém. org. in der Idee des Verfassers des Schemas nach ihrem sachlichen Verhalten vollkommen entsprechen. Hier wird es nun allerdings einfach sein, von diesem Momente an, den Fall, sei es bezüglich der Aufnahme, sei es des Bestandes, zur dém. org. zu stellen. Es liegt nun dem Referenten ein Fall vor, wo nach 25jährigem Bestande einer einfachen Geistesstörung in Folge schlagflussähnlichen Anfalls exquisite Lähmungserscheinungen zurückblieben, und die Sektion makroskopisch nichts Kennzeichnendes, mikroskopisch Körnchenzellen in gewissen Rückenmarkssträngen darbot (ähnlich früher *Westphal* u. A.). Der Forderung gröberer anatomischer Veränderungen entspricht dies Verhalten wiederum nicht.

Es ergiebt sich aus dem Ausgeführten, dass die Aufstellung der dem. org. eine künstliche Trennung schafft, wo die Natur, das anatomische und symptomatische Verhalten, keine geschaffen hat, dass ferner eine strenge gegenseitige Beziehung zwischen umschriebener oder ausgedehnter Lähmung und der Psychose, speciell auch dem Blödsinn, nicht existirt. Zu diesen aus der Natur der Fälle selbst hergenommenen Erwägungen kommt noch eine für den practischen statistischen Zweck sehr wichtige, dass nämlich die Zahl der Fälle, welche mit Sicherheit und übereinstimmend hierher zu stellen wäre, bei den Provinzialanstalten wenigstens, eine sehr geringfügige ist. Referent ist daher der Ansicht, dass die démence organique nicht als eine besondere Form aufzustellen sei. Die einzelnen hierher gehörigen Fälle würden nach obigen Ausführungen grösstentheils zu den Schwächezuständen der einfachen Geistesstörung, ein Theil vorkommenden Falls auch zu den primären Störungen zu stellen sein. Ihre weitere Kennzeichnung würde eines Theils durch die Tabelle der Complicationen, andern Theils durch die der Ursachen sich herausstellen, durch welche Anordnung ihre Natur auch nicht präjudicirt würde, da ihre Beziehung zu den verschiedenen Formen hervorträte.

Nachdem wir so die von uns zugelassenen Hauptgruppen aufgestellt haben, theilen wir für eine Reihe von Tabellen die einfache Geistesstörung weiter ein in Melancholie, Manie, Schwächezustände (Richarz 1844 u. A.) und beziehen uns auf den anderswo (Vierteljahrsschrift für Psychiatrie II. S. 198) beigebrachten rationellen und ver-

Digitized by Google

gleichend statistischen Nachweis, dass eine statistische Verwerthung anderweiter Formen bei der darüber herrschenden Verschiedenartigkeit der Auffassung nicht möglich ist. Die Melancholie und Manie bilden die heilbaren Formen, ihre Scheidung von den Schwächezuständen geschieht durch das Criterium der Unheilbarkeit. Zu den letzteren sind auch die Fälle primären Blödsinns zu stellen. Ob es gelingen wird, eine exacte allgemein anzunehmende Bezeichnung (etwa dementia) für diese Schwächezustände zur Annahme zu bringen, dürfte zweifelhaft sein. Die thatsächliche Berechtigung der Annahme jener 3 Formen ergiebt sich aus den Daten des internationalen Schemas selbst. In der Tabelle XV., die Rückfälle, sollen von den Formen im Allgemeinen nur die Manie und Melancholie figuriren, da die andern Formen nur ein sehr schwaches Contingent von Genesungen stellen.

Eine besondere Schwierigkeit erwächst bei der Rubricirung der Melancholie mit nachfolgender Manie, wo diese Stadien mit gleicher Intensität und Dauer nach einander auftreten.

Da diese Form in obiger Beschränkung verhältnissmässig nicht häufig ist, so dürfte es angemessen sein, keine besondere Form für sie zu bilden, sondern die Melancholie mit Manie zur Melancholie, die Manie mit Melancholie zur Manie zu stellen. Die periodischen Formen, periodische Melancholie, periodische Manie oder periodische Melancholie mit Manie erledigen sich nach dem oben Gesagten, und nach dem Criterium der Heilbarkeit, also nach der Dauer. Es ergiebt sich aus dem Angeführten, dass die Form nicht nach irgend einem bestimmten Zeitmoment, etwa der Aufnahme, allein bestimmt werden kann, sondern dass vielfach die Beobachtung des Krankheitsverlaufes dazu gehört. Dasselbe gilt, wenn etwa eine Anfangs gestellte Diagnose, sei es einfache, sei es paralytische Geistesstörung, später als irrthümlich erkannt wird.

Indem wir daher zur Constituirung folgender Formen gelangt sind: 1) Melancholie, 2) Manie, 3) Schwächezustände, sämmtlich der einfachen Geisteskrankheit angehörig, 4) paralytische Geistesstörung, 5) Epilepsie mit Geistesstörung, 6) Idiotie, ziehen wir nicht die Consequenz des internationalen Schemas, dass dieselben Formen nun, oder mit Vereinigung der 3 ersten, an der Spitze aller folgenden Tabellen stehen sollen. Wir halten zunächst die Thatsache im Auge, dass die Irrenanstalten ihrem Material und ihrer Bestimmung nach in erster Instanz die einfache und paralytische Geisteskrankheit betreffen; dann prüfen wir bei jeder Tabelle von Neuem, über welche einzelnen Formen die Auskunft derselben dankbar zu werden verspricht. Indem wir so die Epilepsie und Idiotie beschränken, machen wir von den Unter-

abtheilungen der einfachen Geistesstörung einen ausgedehnteren Gebrauch, als das Schema.

In der Tab. I. des internationalen Schema's, Allgemeine Bewegung der Bevölkerung, figuriren in der 1. verticalen Colonne die Formen des Schema's, in der 1. horizontalen Zeile folgende Positionen: Bestand am 1. Januar. Aufnahmen und zwar zum 1. Male, in Folge von Rückfall, durch Wiederaufnahme nach Entweichung oder nach Austritt vor der Genesung, kommend von einem andern Asyl, Summa der Aufnahmen, Summa des Bestandes und der Aufnahmen. Ausgetretene, und zwar durch Genesung, durch Besserung, durch Entweichung, durch Versetzung, aus andern Gründen, Summa der Ausgetretenen. Gestorbene, und zwar: durch Krankheit, durch Zufall, durch Selbstmord, Summa der Gestorbenen, Summa der Ausgetretenen und Gestorbenen. Bleibend am 31. December. Mittlere Bevölkerung des Jahres.

Es ist hierzu zu bemerken, dass die einzelnen Positionen der Aufnahmen sehr gerechtfertigt sind. Eine exacte Verwerthung des Materials ohne Scheidung der zum 1. ×, der zu wiederholten × nach vorher erfolgter Genesung (Rückfall), und der zum wiederholten × ohne vorher erfolgte Genesung Aufgenommenen ist nicht möglich. Die Rubrik: kommend von einem andern Asyl ist bei Eruirung der Gesammtaufnahmen eines Landes nöthig, mit ihr ist jener Forderung aber auch Genüge geschehen. Die folgende Rubrik: Summa des Bestandes und Zuganges findet keine weitere wissenschaftliche Verwerthung, sollte daher zur Abkürzung fortfallen. Da sie sich jedoch meist findet, so kann man sie erhalten. Die folgenden Abtheilungen enthalten viele Forderungen, deren Befriedigung durch mühevolle Ausfüllung mit dem Gewinn nicht in Verhältniss steht. So halten wir die Colonne durch Entweichung nicht für wichtig genug, die durch Versetzung nach Obigem überflüssig, die Todesfälle durch Zufall und Selbstmord in die Tabelle der Todesursachen gehörig. Wir stimmen in hohem Grade zu, der Rubrik der mittleren Bevölkerung des Jahres, sowohl im Ganzen, als für die einzelnen Formen. Sie giebt nämlich allein die Möglichkeit, die Sterblichkeit zu berechnen, indem die Ziffer des durchschnittlichen jährlichen Bestandes in die Zahl der Todesfälle dividirt wird. Der durchschnittliche Bestand wird nach den Angaben des Schema's berechnet entweder durch die Division der Summa der Verpflegungstage — die schon aus administrativen Rücksichten im Ganzen festgestellt wird — durch 365 resp. 366, oder indem man den Bestand beim Beginn des Jahres vermehrt um die Hälfte des Zuganges, und diese Summe vermindert um die Hälfte des Abganges. Es geht diese Berechnung von der Voraussetzung aus, dass der Zu- und Abgang

Digitized by Google

sich gleichmässig auf das Jahr vertheile, jede zu- und abgegangene Person also durchschnittlich während der Hälfte des Jahres anwesend war. Bei den einzelnen Formen wird wenigstens so sich ein ungefähres Resultat ergeben. Wir kommen daher zu folgender vorzuschlagenden Tabelle:

A. I. Tabelle der Bewegung nach Formen (alle Formen). 1. Verticale Colonne (enthält folgende Eintheilung): 1) Melancholie, 2) Manie, 3) Schwächezustände, 4) Summa der einfachen Geistesstörung, 5) Paralytische Geisteskrankheit, 6) Epilepsie mit Geistesstörung, 7) Idiotie (mit Cretinismus); ferner als Anhang: 8) Altersblödsinn, 9) Delirium tremens, 10) Delirium der acuten Krankheiten, traumatisches Delirium.

1. Horizontale Zeile (Kopf) [enthält folgende Eintheilung]: I. 1) Bestand am 1. Jan. II. Zugang. 2) Zum 1. Mal Aufgenommene. 3) Wiederholte Aufnahmen nach vorher erfolgter Genesung. 4) Wiederholte Aufnahme ohne vorher erfolgte Genesung. 5) Versetzung von einem andern Asyl. 6) Summa des Zuganges. III. 7) Summa des Bestandes und Zuganges. IV. Abgang. 8) Genesen. 9. Gebessert. 10) Ungebessert. 11) Gestorben. 12) Summa des Abgangs. V. 13) Bestand am 31. December. VI. 14) Mittlere Bevölkerung.

Zu bemerken ist noch, dass für den Bestand die Formen zur Zeit des 1. Januar resp. 31. Decembers maassgebend sind, ferner' dass hier wie in allen folgenden Tabellen überall in der horizontalen Zeile selbstverständlich, also nicht weiter erwähnt, eine Scheidung in Männer und Frauen, ferner nach den einzelnen Formen auch die Summa der Formen (Männer-, Frauen-Summa) sich findet.

Die Tab. II.—XIII. des intern. Schema's betreffen die Aufnahmen. Es wird bemerkt, dass überall nur die ersten Aufnahmen Platz finden, also sämmtliche wiederholte Aufnahmen, dann die von einem andern Asyl Versetzten nicht.

Tab. II. betrifft die Krankheitsdauer vor der Aufnahme. Es wird vorgeschlagen, als Beginn nicht die Prodrome der Krankheit zu nehmen, sondern allein ihre ersten Manifestationen. Dem gegenüber könnte man auf folgende Fälle verweisen. Ein sehr ehrenwerther, sittlicher und bescheidener Gelehrter fängt nach übermässigen Anstrengungen an zu renommiren, arrogant zu werden und geschlechtliche schamlose Ausschweifungen zu begehen. Er setzt dabei seine Vorlesungen noch eine Zeit lang befriedigend fort. Eine Zeit lang nachher wird er als Paralytiker in ein Asyl aufgenommen.

Ein unbescholtener, rechtlicher Gensdarm fängt an, ohne Motiv, einen werthlosen Diebstahl zu begehen, Chausseebäume zu beschädigen,

Digitized by Google

wird darüber in einen Process verwickelt und nach einiger Zeit erfolgt der sogen. Ausbruch der Geistesstörung, Paralyse. Ein Herzkranker ändert seine Stimmung und sein Benehmen, äussert unmotivirte Besorgnisse für die Zukunft, unmotivirte, durch zufällige Verhältnisse bedingte Zu- und Abneigung gegen seine Kinder, starke Brustbeklemmung, andere Sensationen, Schlaflosigkeit, macht in diesem Zustande ein Testament mit Benachtheiligungen einzelner Kinder, die seinen Anschauungen aus gesunden Tagen sehr widersprachen, verfällt eine Zeit lang nachher in sehr intensive Melancholie. Man wird hier jenes Benehmen, jene Handlungen, die von Manchen zu den Vorläufern gerechnet werden, in Betreff der sittlichen und rechtlichen Beurtheilung als Ausflüsse der Geisteskrankheit ansehen. Wozu also die doppelte Buchhaltung?

Dass nicht leichtere Schwankungen der Stimmug etc. hierher gezogen werden, muss die genaue, individuelle Abschätzung verhüten.

Es hat die Tab. II. einen administrativen Werth, den Grad der Benutzung der Anstalt für frische Fälle zu ermessen, und einen wissenschaftlichen, bezüglich der Berechnung der Genesungen. In beiderlei Hinsicht ist kein Grund, die Aufnahmen, wenn diese Wiedererkrankungen sind, zurückzuweisen. Dagegen entbehren die meisten Formen, Idiotie, Epilepsie mit Geistesstörung etc. hier des Interesses. In Betreff der Bezeichnung der Zeiträume, hat die Tab. folgende: 1 Mon. und darunter, 1—3 Mon., 3—6 Mon. etc. Wir schlagen für alle ähnlichen Fälle, wegen des präcisern Ausdrucks die Bezeichnung unsers Vorschlags vor. Wir kommen daher zu folgendem Vorschlag:

B. Aufnahmen.

2. Tab. Krankheitsdauer vor der Aufnahme nach Formen (1. und wiederholte Aufnahmen, mit Ausschluss der nach nicht erfolgter Genesung Wiederaufgenommenen).

1. Verticale Colonne: 1) Bis zu 1 Mon., 2) 2 incl. bis 3 Mon., 3) 4—6 Mon., 4) 7—12 Mon., 5) im 2. J., 6) 3—5 J., 7) über 5 J., 8) Unbestimmte Krankheitsdauer.

1. Horizontale Zeile: 1) Melancholie, 2) Manie, 3) Schwächezustände, 4) Paralytische Geistesstörung.

In Betreff der Tab. III. des Schemas, Monate der Aufnahme, schliesst sich Referent den so oft wiederholten Ausführungen an, dass die Monate der Aufnahme über die Monate der Erkrankung keine, auch nicht beziehungsweise Aufklärung geben und daher diese Tab. keine Ausbeute verspricht.

Betreffs der V. Tab., Grad der Schulbildung, so liegen keine Data vor, dass die Art jener Verstandesbildung gerade für die Domaine der

Digitized by Google

Geisteskrankheiten so ins Gewicht falle, um ihr in diesem allgemeinen Schema einen Platz zu sichern.

Die Tab. VI. des Schemas enthält das Alter im Moment der Aufnahme; VII. das Alter im Moment des Ausbruchs der Krankheit. Referent betont hier, dass auch bei der Beschränkung auf die 1. Aufnahme das Alter der Erkrankung nicht genau den Ausdruck der Erkrankungsdisposition der Lebensalter ist, da ein Theil der 1. Aufnahmen wiederholte Erkrankungen darstellt. Er schlägt daher eine III. Abtheilung vor, welche nur diejenigen erstmaligen Aufnahmen umfasst, die 1. Erkrankungen sind. Es lässt sich ferner eben so viel dagegen, als dafür sagen, die wiederholten Erkrankungen bei den beiden 1. Abtheilungen fortzulassen. Da die Aufstellung so erfolgt ist, so schlägt Referent die Beibehaltung der Beschränkung auf die ersten Aufnahmen vor. Man wird bei späterer Benutzung dieser Tabellen zur Eruirung anderweiter Verhältnisse, sich darnach zu richten haben. Referent vermisst in dieser Tabelle wie in mehreren andern, die Berücksichtigung der Erblichkeit, während sie doch hier, wie auch anderswo, so starke Differenzirungen schafft, die zu den werthvollsten statistischen Ergebnissen gehören. Verfasser schlägt die III. Abtheilung zur Klarstellung der Erblichkeit vor. Sollte diese fortgelassen werden, so müsste die II., im Nothfalle die erste dazu dienen. Referent lässt in dieser Tabelle auch die Epilepsie mit Geistesstörung und in den einzelnen Abtheilungen bald die Summe der einfachen Geistesstörung, bald die Unterabtheilungen, welche allerdings gute Gegensätze bilden, auftreten. Eine Abweichung vom Schema besteht darin, dass, während letzteres vom 40. Jahre ab nach Decennien abstuft, Referent vom 41. bis 60. Jahre nach Jahrfünften, um dem behaupteten Einfluss des klimacterischen Alters nachzuforschen.

Es ergiebt sich daher folgender Vorschlag: 3. Tab. Altertabelle nach Formen und Erblichkeit (mit Epilepsie). (Erstmalige Aufnahme.)

1. Verticale Colonne: 1) bis 15 J., 2) 16—20 J., 3) 21—25 J., 4) 26—30 J., 5) 31—35 J., 6) 36—40 J., 7) 41—45 J., 8) 46—50 J., 9) 51—55 J., 10) 56—60 J., 11) 61—70 J., 12) 71—80 J., 13) über 80 J., 14) Unbekannt.

1. Horizontale Zeile: I. Alter der Aufnahme 1) Einfache Geistesstörung, 2) Paralytische Geistesstörung, 3) Epilepsie mit Geistesstörung. II. Alter der Erkrankung des Anfalls der zur Aufnahme gelangte (bei der erstmaligen Aufnahme) 4) Melancholie, 5) Manie, 6) Schwächezustände, 7) Paralytische Geistesstörung, 7) Epilepsie, Zeit des Beginns der Epilepsie, 8) Epilepsie, Zeit des Beginns der Geistesstörung. III. Alter der Erkrankung bei derjenigen erstmaligen Aufnahme, die

zugleich die erstmalige Erkrankung darstellt, a. einfache Geistesstörung, 9) erblich, 10) nicht erbliche; b. paralytische Geistesstörung, 11) erblich, 12) nicht erblich.

Die Tab. IV. des internationalen Schemas behandelt den Civilstand nach den Formen. Referent vermisst hier die Berücksichtigung eines gewichtigen Resultates der statistischen Forschung, dass die Verschiedenheiten der Civilstandsverhältnisse der Geisteskranken ihre Erklärung jedenfalls in erster Linie in den Altersverschiedenheiten des einzelnen Civilstandes finden. Zur Begründung dieser, sowie aller hier nicht weiter nachgewiesener Behauptungen, beruft er sich auf seine Statistik von Marsberg (Allg. Zeitschr. 1867. Suppl. Band). Es muss ausserdem hervorgehoben werden, dass man nur den Civilstand zur Zeit der Erkrankung zur Registrirung benutzen darf, wodurch namentlich der Wittwenstand beeinflusst wird. Es wird daher folgende Tabelle vorgeschlagen:

4. Tab. Civilstand zur Zeit der Erkrankung, nach Formen, zugleich mit dem Alter der Erkrankung. (Nur die 1. Aufnahme, daher in Beziehung zu Tab. 3. II. Abth.)

1. Verticale Zeile: 1) bis 15 J., 2) 16—20 J., 3) 21—25 J., 4) 26—30 J., 5) 31—35 J., 6) 36—40 J., 7) 41—45 J., 8) 46—50 J., 9) 51—55 J, 10) 56—60 J., 11) 61—70 J., 12) 71—80., 13) über 80 J., 14) Unbekannt.

1. Horizontale Zeile: I. Ledige 1) Einfache Geistesstörung, 2) Paralytische Geistesstörung; II. Verheirathete 3) Einfache Geistesstörung, 4) Paralytische Geistesstörung; III. Verwittwete, Geschiedene 5) Einfache Geistesstörung, 6) Paralytishe Geistesstörung; IV. Unbekannten Civilstandes 7) Einfache Geistesstörung, 8) Paralytische Geistesstörung.

Die Tab. VIII. des Schemas enthält die erschwerenden Umstände und Complicationen. Es sollen hier nur die bei der Aufnahme vorhandenen Krankheitszustände aufgeführt werden. Als solche werden aufgeführt die Epilepsie, die Hemiplegie, die Paraplegie, die Skropheln, der Kropf, die Taubstummheit, die angeborene und erworbene Blindheit, Hallucinationen des Gesichts, Gehörs, des Geschmacks, Geruchs, der allgemeinen Sensibilität und endlich Hallucinationen mehrerer Sinne. Referent ist der Ansicht, dass nachdem man unter den Formen die Epilepsie mit Geistesstörung aufgestellt hat, es weiter keinen Zweck hat, unter den Complicationen die Epilepsie aufzuführen. Ferner wird man sich der Rubricirung der Taubheit, und der Blindheit nicht entziehen können, nachdem die Volkszählungen diese Zustände berücksichtigen. Dagegen hält Referent die Hallucinationen zu sehr für einen Gegenstand eines eingehenden Detailstudiums und monographischen Bearbeitung, als dass man sie hier in dieser allgemeinen Tabelle berück-

Digitized by Google

sichtigen könne. In dieser Tabelle dürfte auch die Epilepsie und Idiotie eine Stelle finden. Wir kommen daher zu folgendem Vorschlag:

5. Tab. Complicationen nach Formen (mit Epilepsie und Idiotie). (1. Aufnahmen.)

1. Verticale Colonne: 1) vom Gehirn ausgehende Lähmungen, 2) vom Rückenmark ausgehende Lähmungen, 3) Kropf, 4) Taubstummheit, 5) angeborene oder erworbene Blindheit.

1. Horizontale Zeile: 1) Melancholie, 2) Manie, 3) Schwächezustände, 4) Paralytische Geistesstörung, 5) Epilepsie mit Geistesstörung, 6) Idiotie (mit Cretinismus), 7) Idiotie mit Epilepsie.

Die Tab. IX. des internationalen Schemas behandelt die Ursachen der Geistesstörungen. Es gehört diese Tabelle zu denjenigen, bei denen wir uns einer speciellen und detaillirten Begründung nicht entziehen können.

Die Statistik über die Ursachen der Geistesstörungen ist jedenfalls eines der schwierigsten Gebiete derselben. Ja es sind in der neueren Zeit noch Stimmen laut geworden, welche das ganze Capitel für eine terra incognita zu erklären geneigt sind. Dies ist jedenfalls eine Uebertreibung. Es ist diesen Schriftstellern gegenüber, die nur aus allgemeinen Eindrücken urtheilen und ohne sich mit den speciellen Thatsachen bekannt gemacht zu haben, die Uebereinstimmung verschiedener Statistiker, ihre Abweichung bei abweichenden äusseren Verhältnissen, die Uebereinstimmung in sich bei verschiedenen Richtungen der Untersuchung zu betonen. Ja es zeigt sich sogar, dass die Verschiedenheit der befolgten Methoden gewisse prägnante Beziehungen der Thatsachen nicht hat in Schatten stellen können. Es ergiebt sich nämlich, wenn man auf der einen Seite alle auffindbaren Ursachen der Seelenstörungen berücksichtigt, also in einem Falle oft mehrere (z. B. Illenau), oder wenn man auf der andern Seite nur 1, die wichtigst erscheinende gelten lässt (z. B. Stewart), dass sowohl die P. C.-Berechnung zur Summe der Ursachen, als auch weitere Eigenschaften der durch die einzelnen Ursachen gebildeten Gruppen viel Uebereinstimmendes zeigen. Und die sich ergebenden Verschiedenheiten scheinen werthvolle Resultate zu enthalten. Dies gilt z. B. davon, dass bei Zusammenstellung aller Fälle mit Erblichkeit sich höhere Genesungs-P.C. herausstellen, bei alleiniger Berücksichtigung der Fälle, wo die Erblichkeit die alleinige Ursache war, geringere. Ferner nach *Landenberger:* Wo ausser der Erblichkeit wenig andere Ursachen in Betracht kamen, lag directe Erblichkeit von geisteskranken Eltern vor, wo viele andere Ursachen mitwirkten, indirecte von Seitenverwandten, oder nur mit erkrankte Geschwister. Da bei dieser Untersuchung überhaupt bezüglich der einzuschlagenden Richtung, der weiteren Detailli-

rung, der Gegenüberstellung die Resultate der Vorgänger von Gewicht sind, so wollen wir hier — eine Reihe von Thatsachen erfolgt weiter bei den Professionen — nach einigen namentlich neueren Statistikern bemerken, dass die Ursachen der Seelenstörungen, sowohl in den grösseren Gruppen, als, und zwar in höherem Grade, bei vielen Einzelmotiven bei einer Reihe von Statistikern (Illenau, *Güntz*, Stewart, *Thurnam*, *Parchappe* etc.) vielfach übereinstimmende Resultate ergeben. Bei einer weiteren Ausdehnung auf die einzelnen Formen (Manie, Melancholie, Dement. paral.) treten noch mannigfach mit den obengenannten übereinstimmende, dann aber für jede Form ganz charakteristische neue Gruppirungen der einzelnen Ursachen zu Tage (Illenau, *Güntz*, *Parchappe*, z. Th. Wien, *Landenberger*). Viel schwächer, obgleich noch immer einige Resultate gebend, ist die statistische Ausbeute bei den Genesungen nach den Ursachen (Illenau, Stewart, *Güntz*), so wie bei den Genesungen nach den Ursachen und Formen (Illenau).

Was nun speciell die Tab. IX. des internationalen Schema's betrifft, so enthält sie einige Momente, denen in hohem Grade zuzustimmen ist. Zunächst, dass nur die 1. Aufnahmen berücksichtigt werden, dann, dass Diejenigen, über welche keine oder unzureichende Nachrichten vorliegen, von denen mit hinreichenden Nachrichten geschieden werden, und dass die weitere Berechnung sich nur auf die Zahl der letzten erstreckt. In hohem Grade ist ferner der Forderung zuzustimmen, dass alle irgend ermittelten Ursachen, d. h. alle wirklich eine ätiologische Beziehung enthaltenden Umstände berücksichtigt werden, weil alles Andere reine Willkür ist. Wir haben noch zu bemerken, dass diese ausgeführte Methode einen Vergleich der Intensität der einzelnen Ursachen unter einander durch eine P.-C.-Berechnung nicht erlaubt. Man kann nur die Fälle, auf welche eine bestimmte Ursache irgend wie eingewirkt hat, gegenüber denen mit Mangel derselben aufstellen, wie das ja allgemein bezüglich der Erblichkeit geschieht. Eine Abschätzung der Intensität der einzelnen Ursachen würde nur so geschehen können, dass man das Vorkommen der betreffenden Ursache unter den Geisteskranken vergliche mit der Verbreitung derselben Ursache in der Bevölkerung, wie sich z. B. dies Problem bgzüglich der Erblichkeit annähernd lösen lässt. Es würde dann das Gewicht einer bestimmten Ursache einfach als Zahlenverhältniss zum Ausdruck gelangen, und es würde gleichgültig sein, in welcher vermittelten Form dieselbe ihre Wirksamkeit entfaltet, ob z. B. prädisponirend oder determinirend. Wenn schon dies gegen die genannte Haupteintheilung der Tab. IX. spricht, so thun es noch mehr einige aus der Natur der Ursachen selbst hergenommene Erwägungen, so dass wir, so oft sich diese Eintheilung auch bei den deutschen

Digitized by Google

Schriftstellern findet, ihr für statistische Zwecke nicht zustimmen. Einige von den Ursachen nämlich Trunksucht, geschlechtliche Excesse werden in beiden Hauptabtheilungen aufgeführt. Andere, als prädisponirende Ursachen aufgeführte, Schwangerschaft etc., werden von Andern mit demselben Rechte unter die Gelegenheitsursachen gesetzt. Von der, als prädisponirende Ursache am meisten berechtigten, der Erblichkeit, lässt sich in einer Reihe von Fällen nachweisen, dass sie in dem spontanen Ablaufe der Entwickelungszustände des Individuums auch die selbstthätigen Bedingungen der Entwickelung der Psychose enthält, dass sie mithin auch als determinirende Ursache auftritt. In noch höherem Grade würde dies von der Epilepsie gelten, wenn dieselbe hier eine Stelle hätte. Auf der andern Seite könnte man eine Reihe der dort aufgeführten Gelegenheitsursachen im einzelnen Falle als prädisponirende betrachten. Beispielshalber wollen wir nur eine von den am besten charakterisirten Gelegenheitsursachen hervorheben: die Kopfverletzungen. Berücksichtigt man andere Gebiete der Pathologie, speciell auch der Nervenpathologie, so steht es z. B. fest, dass eine Reihe von Erkältungen zuerst eine Prädisposition, dieselbe Erkältung dann zuletzt den Ausbruch (Catarrh, Rheumatismus, Ataxie etc.) herbeiführt. Es ergiebt sich daher, dass in vielen Fällen die prädisponirende Wirkung (jene innerste Modification des Nervensystems etc. herbeiführend) von der determinirenden nicht im Wesentlichen verschieden ist. Nach Allem ist die Trennung in prädisponirende und bestimmende Ursachen durchaus nicht begründet. Sie reisst Zusammengehöriges auseinander, sie führt somit zum Schwanken der ausführenden Statistiker, und verringert daher den Werth der Arbeit, sie vermehrt die Zahl der Positionen und erschwert die Uebersicht, sie ist endlich in sich nicht logisch und thatsächlich begründet. Je mehr man sich in das Studium der Ursachen vertieft, um so mehr kommt man zu der Gewissheit, dass nicht in der Bildung der grösseren Gruppen, und um so weniger, je grösser diese sind, die Uebereinstimmung verschiedener Statistiker und die Förderung der Erkenntniss beruht, als vielmehr in der möglichst präcisen Auffassung der Einzelmotive und der möglichst genauen Charakterisirung der so gebildeten Einzelgruppen.

Es mögen noch einzelne specielle Bemerkungen in Betreff der Tabelle IV. erfolgen. Die Position Erblichkeit bietet entweder zu viel oder zu wenig. Zu viel dadurch, dass diese weitere Eintheilung an dieser Stelle steht, wo sie eine einfache, kurze und bestimmte Eigenschaft der Fälle bezeichnen soll, fähig unter Umständen in vielfach weiteren Beziehungen verfolgt zu werden. Sie bietet zu wenig, wenn ies eine wirklich wissenschaftliche Darstellung der erblichen Abstam-

Digitized by Google

mung sein soll. Es wird vorgeschlagen, hier nur eine Position für die Erblichkeit zuzulassen, und damit zugleich die von den Erzeugern überkommenen Dispositionen im weiteren Sinne zu umfassen, also sowohl die „seitliche Erblichkeit" (mit erkrankte Geschwister), als auch Blutsverwandtschaft, grosse Altersdifferenz der Eltern, Gemüthsbewegungen etc. der Mutter während der Schwangerschaft. Der dort angeführte Einfluss des Bodens, der Umgebungen gilt in Beziehung zur Idiotie, fällt also hier fort. Die wissenschaftlich exakte Statistik über Erblichkeit je nach der Abstammung folgt später. Weiter fällt nach Obigem die Epilepsie aus. Sollten die Convulsionen der Kindheit, Zahnung als Ursachen der Idiotie gelten, so würden sie hier fortfallen. Ueber die Gehirncongestionen findet sich die Bemerkung, „betrachtet als Ursache und nicht als Symptom". Es dürfte am Angemessensten sein, dieselben als Ursache ganz ausfallen zu lassen. Eine genauere Erwägung dürfte nämlich das Ergebniss liefern, dass die nach obiger Restriktion rückbleibenden Fälle theils in den als Ursachen angeführten Herzkrankheiten und Kreislaufsstörungen ihre Erledigung finden, theils die Auffassung der Congestion als Zeichen der Gehirnkrankheit, welche auch die Psychose späterhin setzt, rechtfertigen und dass daher die Ursachen dieser Gehirnkrankheit zu entdecken sind. Der Fortfall der Position Congestion ist namentlich dadurch gerechtfertigt, dass sie in einigen Statistiken Nichts als der Ausdruck einer subjectiven Theorie und der Deckmantel eines Mangels von ans Licht gesetzten Thatsachen ist. In Betreff einer Reihe von Positionen der Tab. IX ist zu bemerken, dass Kürze und Uebersichtlichkeit der Tab. eine ihrer wesentlichsten Eigenschaften sein muss. Es können daher diejenigen Ursachen, welche nur in bestimmten Gegenden oder welche nur ganz einzeln und in ganzen Ländern in einer Reihe von Jahren nicht aus irgend welchem Grund registrirt werden, hier die für die Allgemeinheit berechnete Tabelle nicht verlängern. Man darf dem sachverständigen Statitiker schon zutrauen, dass er vorkommenden Falls die Tabelle, erweitere. Dies gilt von *Pellagra*, Missbrauch des Tabacks, andere vegetabilische Gifte, Blei, Quecksilber, Kupfer, andere mineralische Gifte. Von den organischen Affectionen des Gehirns war bereits die Rede. Gehen wir demnach an die Aufstellung eines eignen Schemas, so glauben wir, dass die Haupteintheilung in psychische, gemischte und somatische Ursachen, in dem wesentlichen Sinne, wie in dem *Griesinger*'schen Handbuch, bei deutschen Statistikern den meisten Anklang finden wird. Bezüglich der psychischen Ursachen wird folgende weitere Eintheilung vorgeschlagen, indem wir zugleich bemerken, dass die weiteren Unterabtheilungen keine unterscheidenden Eigenthümlichkeiten bezüglich der Genesungen, Beziehung zu den For-

Digitized by Google

men etc. darbieten. Als 1. Gruppe nennen wir die akuten Affekte: Schrecken, Furcht, Angst, Ekel, Entsetzen, Abscheu, Misshandlung, Nothzucht etc. (Einzeln auch übermässige Freude). Der Grund zu ihrer Aussonderung liegt darin, dass sie günstigere Genesungsverhältnisse liefern, als die chronischen. (*Illenau, Stewart*). Die letzteren folgen in 2 Gruppen, indem für die, welche sich auf Beruf, Vermögen, Lebensstellung beziehen, die 3. Gruppe gebildet ist (womit am zweckmässigsten die geistige Ueberanstrengung zu verbinden ist), während die hierin nicht enthaltenen der 2. Gruppe angehören. Die Feststellung dieser 3. Gruppe ist desswegen in den Thatsachen begründet, weil sie ein Uebergewicht für die Männer ergibt, während die sonstigen psychischen Ursachen ohne Ausnahme ein Uebergewicht für die Frauen haben, (*Stewart*, *Parchappe*, wahrscheinlich auch *Illenau*), weil ferner ausser den geistigen Anstrengungen, die durch Beruf und Lebensverhältnisse angestachelten Leidenschaften, Ehrgeiz etc. den Beamten etc. gerade eine hohe Stelle in der Aetiologie psychischer Ursachen sichern (*Illenau*, zum Theil *Güntz*), weil endlich gerade jene letztgenannten Schädlichkeiten speciell in Verbindung mit körperlicher und geistiger Anstrengung den liberalen Professionen, namentlich den höhern ihre bedeutende Betheiligung an der dement. paral. vorzugsweise mit verschaffen (*Illenau*). Die 4. und 5. Gruppe, grösstentheils in dem internationalen Schema fehlend, sind in derselben Weise von einander unterschieden. Sie beziehen sich beide auf habituelle, das ganze Leben umfassende Eigenthümlichkeiten des Gemüths, Temperaments und Charakters, Folgen der Erziehung, Reizbarkeit, Aengstlichkeit, Eigensinn, Hochmuth, Eitelkeit, Ehrgeiz, Geiz. Will man daher das Register der psychischen Ursachen noch mehr abkürzen, so könnte man unter pos. 1. die deprimirenden Affekte und habituellen Gemüths- und Charaktereigenthümlichen, die sich auf Beruf, Vermögen, und Lebenstellung beziehen, unterbringen und unter pos. 2. die anderweiten Affekte und Gemüths- etc. Eigenthühmlichkeiten.

Bei den gemischten Ursachen wird man der Onanie eine besondere Stelle anweisen müssen, sie nicht etwa mit den geschlechtlichen Ausschweifungen vermischen dürfen. Es findet sich über ihre ätiologische Bedeutsamkeit keine Uebereinstimmung unter den Irrenärzten, von Einigen (*Gräser*) wird dieselbe ganz bestritten. Auch begünstigen die durch sie bestimmten Gruppen eine andere Form (Melanch., Blödsinn) und ein anderes Lebensalter (das frühere) als bei den folgenden Gruppen. — Die Excesse in Venere und Baccho sind wohl der Vereinfachung wegen nicht von denen in Venere zu trennen. — Das unordentliche, wüste unstete Leben, sind so zu stellen, um

allenfalls mit der vorigen Gruppe vereinigt werden zu können. — Bezüglich der letzten Position, Noth und Elend, ist zu bemerken, dass, wenn sie als psychische Ursachen allein wirken, sie zur 1. Hauptgruppe, deprimirende Affekte etc. betreffend Beruf zu stellen sind. Hier ist denn auch wohl der geeignetste Platz für körperliche Ueberanstrengung. — Die ganze Gruppe der gemischten Ursachen, mit Ausnahme der Onanie, hat ein gemeinsames charakteristisches Gepräge, indem sie unter den Formen vorzugsweise die dement. paral. begünstigt, (die Trunksucht in eben demselben Grade die Manie) und indem sie auf die einzelnen Bevölkerungsschichten, in Beziehung zu jener Form, sich ungleichmässig vertheilt (vorzugsweise *Illenau*, dann *Güntz*, *Landenberger*).

Die Anordnung der somatischen Ursachen spricht für sich selbst. Es mag nur Einiges dazu bemerkt werden. Die Aufstellung der Entwickelungskrankheiten ist eine Concession an vielfach verbreitete Ansichten gegen das eigene Dafürhalten. Letzteres beruht auf Folgendem: Es dürfte wohl feststehen, dass die beginnende Höhe der geistigen Entwickelung eine besondere Prädisposition zu Geisteserkrankungen bietet. Wenn man aber bedenkt, dass diese Höhe auf das Quinquennium von 21—25 Jahren fällt, so dürfte sie wohl nicht gerade auf die Pubertätsentwickelung geschoben werden. Andere beschuldigen auch das Involutionsalter von 45—55 Jahren (*Skae*). Die dementia senilis ist nach Früherem ausgeschlossen. Es scheint allerdings nach einzelnen klinischen Daten, dass, so wie zur Epilepsie, so auch zu genuinen Psychosen die mit dem senium vorgehenden Veränderungen eine starke Prädisposition unter gewissen Umständen (Erblichkeit) abgeben könnten. Doch alle diese Data sind Folgerungen aus den Zahlen der Statistik, tragen jedoch keine Charakteristika an sich, um als Eigenschaften bei der Rubricirung verwendet zu werden. — Die Epilepsie unter den Ursachen fällt nach dem früher Entwickelten fort. — Bei der jetzt folgenden Eintheilung ist noch zu bemerken, dass der Werth weniger in der Summa der einzelnen Hauptabtheilungen, als in den mit Präcision verfolgten Einzelpositionen beruht, ferner dass je nach Umständen und Belieben einzelne Positionen weiter unterabgetheilt werden können; endlich, dass einige Positionen des Schema's nur deswegen erhalten sind, um allen Anschauungen gerecht zu werden. Wir haben die 87 Zeilen des Schema's so auf 28 ermässigt, obgleich wir in mehreren Positionen weiter gegriffen haben.

6. Tab. Krankheitsursachen nach den Formen.

(I. Aufnahmen.)

1. verticale Colonne: 1) Acute Affecte, Schrecken, Furcht, Angst,

Digitized by Google

Ekel, Entsetzen, Abscheu, Misshandlung, Nothzucht etc., einzeln auch übermässige Freude.

2) Unbestimmte, chronische Affecte, betreffend Liebe, Ehe, häusliches Unglück, Gewissensbisse, Kummer, Kränkung, Aerger, Sorgen, Heimweh etc.

3) Deprimirende Affecte, betreffend Beruf, Vermögen, Lebensstellung (mit geistiger Ueberanstrengung).

4) Unbestimmte, habituelle Eigenthümlichkeiten des Gemüths, Temperaments und Charakters, Folgen mangelhafter Erziehung, Reizbarkeit, Aengstlichkeit, Eigensinn etc.

5) Dito, die sich auf Beruf, Vermögen, Lebensstellung beziehen: Hochmuth, Eitelkeit, Ehrgeiz, Geiz.

I. Summa aller psychischen Ursachen.

6) Onanie.

7) Excesse in Venere und Baccho.

8) Unordentliches, wüstes, unstetes Leben.

9) Trunksucht.

10) Noth und Elend (mit körperlicher Ueberanstrengung).

II. Summa aller gemischten Ursachen.

11) Erblichkeit.

12) Missbildungen des Kopfes und angeborene Geistesschwäche

13) Entwickelungskrankheiten (Pubertäts-, Decrepiditätsperiode Senium).

14) Acute fieberhafte Krankheiten: Typhus, Rheumatismus, Wechselfieber, Erysipelas, Scarlatina, Pocken, Cholera, Pneumonie.

15) Syphilis.

16) Andere constitutionelle chronische Krankheiten: Blut- und Säfteverlust, Anämie, Chlorose, Scrophulose, Marasmus, andere constitutionelle Krankheiten.

17) Gehirncongestion.

18) Organische Gehirnkrankheiten: Apoplexie, Paralyse, Gehirnentzündung.

19) Hysterie, Chorea, periph. Nervenreizung, andere Neurosen.

20) Kopfverletzung (mit Caries des Felsenbeins), Insolation.

Summa der Krankheiten des Nervensystems 17 — 20.

21) Tuberculose.

22) Herzkrankheiten und Kreislaufstörungen.

23) Unterleibskrankheiten aller Art. Ferner Würmer. Hierhin auch Lokalkrankheiten der Geschlechtsorgane, Samenfluss.

24) Menstruationsstörungen.

25) Puerperalstörungen: Schwangerschafts-, Puerperal-, Lactations-Störungen.

Digitized by Google

26) Andere Einflüsse und Krankheiten: Erhitzung, Erkältung, heisses Klima, unterdrückte Ausleerungen und Ausschläge etc.

Summa aller somatischen Ursachen.

27) Summa der Fälle mit bekannter Ursache.

28) Dito mit unbekannter Ursache.

1. horizontale Zeile: 1) Melancholie, 2) Manie, 3) Schwächezustände, 4) paralytische Geistesstörung.

Wir kommen jetzt zu der exacten Untersuchung der Erblichkeit je nach der Abstammung. Sachgemäss finden hier auch die ersten Aufnahmen an Epilepsie mit Geistesstörung und Idiotie ihre Stelle. Was die Eintheilung der Tab. IX. des Schema's betrifft, so ist sie in directe (welche die Eltern, Grosseltern und Onkel und Tante umfassen soll), collaterale (Brüder und Schwestern) und gemischte (wo die 1. und 2. Abtheilung zusammenfallen). Bezüglich der hier direct genannten Erblichkeit vermissen wir die Berücksichtigung eines durch Thatsachen nachzuweisenden Verhaltens, dass nämlich der Einfluss auf die Nachkommenschaft ein viel intensiverer ist, wenn die Eltern, als wenn mit Ausschluss der Eltern die Grosseltern und Onkel und Tante geisteskrank sind. Ferner ist in Betreff der dort „gemischte Erblichkeit" genannten zu bemerken, dass wenn ausser erkrankten Eltern noch erkrankte Geschwister vorhanden sind, dies an der Thatsache nichts ändert, dass die Veranlagung zur Psychose von den Eltern herrührt, die Rubricirung also in diesem Sinne geschehen muss. Will man die Beziehung zu den miterkrankten Geschwistern feststellen, so kann dies nur durch eine specielle Nachweisung geschehen. Endlich vermissen wir in den Forderungen des Schema's den Nachweis der Art des nervösen Krankheitszustandes in der Ascendenz. Wir schlagen daher folgende Tabelle vor:

Tab. 7. Erblichkeit nach den Formen mit Epilepsie und Idiotie. (1. Aufnahmen und von aufgenommenen Geschwistern nur 1.)

1. Verticale Colonne. a. Geisteskrankheit in der Ascendenz.

I. Directe Erblichkeit (d. h. Eltern geisteskrank), 1) Von Vater-Seite. 2) Von Mutter-Seite. 3) Von beiden Seiten (d. h. auch bei direct von einer Seite, indirect von der andern Seite).

II. Indirecte Erblichkeit (d. h. Grosseltern oder Onkel und Tante geisteskrank). 4) Von Vater-Seite. 5) Von Mutter-Seite. 6) Von beiden Seiten.

b. Krankheiten des Nervensystems in der Ascendenz.

I. Epilepsie. A. Direct: 7) Von Vater-Seite. 8) Von Mutter-Seite. 9) Von beiden Seiten. B. Epilepsie indirect: 10) Von Vater-Seite. 11) Von Mutter-Seite. 12) Von beiden Seiten.

II. Blödsinn. A. direct: 13) Von Vater-Seite. 14) Von Mutter-

Digitized by Google

Seite. 15) Von beiden Seiten. B. indirect: 16) Von Vater-Seite. 17) Von Mutter-Seite. 18) Von beiden Seiten.

III. Trunksucht. Direct: 19) Von Vater-Seite. 20) Von Mutter-Seite. 21) Von beiden Seiten.

IV. Andere Nervenkrankheiten: Chorea, stark ausgeprägte Hysterie, geistig auffallende Charaktere ohne eigentlich krank zu sein, Selbstmord ohne nachgewiesene Geisteskrankheit etc. Direct: 22) Von Vater-Seite. 23) Von Mutter-Seite. 24) Von beiden Seiten.

c. 25) Angeboren, d. h. miterkrankte Geschwister, ohne Geisteskrankheit etc. in der Ascendenz.

d. 26) Blutsverwandtschaft der Eltern. 27) Grosse Altersdifferenz der Eltern. 28) Gemüthsbewegungen der Mutter während der Schwangerschaft.

1. horizontale Zeile: 1) Primäre Formen. 2) Schwächezustände. 3) Paralytische Geistesstörung. 4) Epilepsie. 5) Idiotie und Cretinismus.

Will man die Zahl und Art der miterkrankten Geschwister bestimmen, so hat man eine 2. Tabelle der vorstehenden vollkommen homogen anzufertigen, in welche die miterkrankten Geschwister einzutragen sind, Es ist dann die horizontale Zeile um so viel Colonnen zu vermehren, als krankhafte Zustände der miterkrankten Geschwister vorkommen. Die häufigsten sind ausser den in obiger Tabelle enthaltenen: Trunksucht, Selbstmord, psychisch zweifelhaft, Chorea, Hysterie, Hemi-, Paraplegie, Amaurose, Hemeralopie, Neuralgien, Meningitis, Convulsionen im erwachsenem Alter, als Gehirnkrankheit ausgeprägter Schlagfluss. Der Abkürzung halber könnte man die 3 ersten als psychisch zweifelhafte Zustände, die übrigen als Nervenkrankheiten zusammenfassen. Sollte man die Epilepsie und Idiotie nicht gesondert untersuchen, so könnte man die Krankheiten des Nervensystems in der Ascendenz zusammenfassen, auch die 3 letzten Colonnen fortlassen.

Die Tab. X. des internationalen Schema's befasst sich mit den Professionen, und finden wir uns wieder zu einer speciellen Begründung veranlasst. — Die Statistik über die Aufnahmen der Geisteskranken nach Professionen hat in ihrem zunächst verfolgten Zweck, den Vergleich mit der Vertretung derselben Professionen in der Gesammtbevölkerung betreffend, die Schwierigkeit zu überwinden, dass eine solche, die Gesammtbevölkerung umfassende Tabelle nirgendwo existirt, und dass für den Theil der Professionen, für welchen die Bevölkerungsdata vorliegen (für Preussen etwa die Volkszählung von 1861, *Engel's* Zeitschrift 1863, S. 37), die Adaptirung der aufgenommenen Geisteskranken in dieselben Gruppen von Professionen nicht immer leicht ist. Es ist daher hier zu urgiren, dass vorläufig von diesem Gesichtspunkte aus ein besonderer Fortschritt unserer Erkennt.

Digitized by Google

niss nicht zu erwarten steht, also dieser Tabelle kein besonderes Gewicht beizulegen ist.

Bei der Verfolgung des zweiten Zwecks, charakteristische Eigenthümlichkeiten der nach Professionen gebildeten Gruppen zu ermitteln, treten dagegen bereits werthvolle Ergebnisse hervor. Es stehen die mit Landwirthschaft Beschäftigten, die Handels- und Gewerbtreibenden, die den liberalen Professionen Ergebenen, die Soldaten einerseits, und andererseits die höheren und niederen Stände dieser einzelnen Categorien, jede mit gewissen ursächlichen Motiven in specieller Beziehung (Illenau, Güntz). Ferner betheiligen sich die einzelnen Professionen in charakteristisch verschiedenem Grade an der der dem. paralyt. (Illenau). Endlich finden sich durchweg die in der Aetiologie der dem. paralyt. nach Obigem maassgebenden Schädlichkeiten, auch bei der Verfolgung der dement. paral. (Analoges gilt demnach durch Ausschliessung auch für die Summe der andern Formen) nach Professionen, wiederum in charakteristischem Uebergewicht gegen die Summe der Geisteskrankheiten in den einzelnen Professionen vertreten, doch ist auch das für die einzelnen Professionen charakteristische Verhältniss der Ursachen für die Schädlichkeit der Geisteskrankheiten, gegenüber anderen Professionen nachzuweisen. (Illenau.) Man muss daher das Gewicht, das man auf die Untersuchung über die Professionen legen will, vorläufig fast ausschliesslich nach dieser zweiten Richtung hin suchen.

Geht man hiernach an eine Kritik des internationalen Schemas, Tab. X., Professionen, so würde es dem ersten Gesichtspunkt zum Theil nicht entsprechen. Während die Bevölkerungsstatistik die eigentlichen Gewerbe, Industrie und Handel, nach dem Material oder nach dem Zweck des Products, oder nach der Erzeugungsmethode rubricirt, umfasst hier pos. 4, Industrie und Handel, die höheren Gesellschaftsklassen, pos. 5. die niederen, das eigentliche Handwerk. Ob hier nun der andere Gesichtspunkt vorgewaltet hat? Da die anfangs aufgestellten Formen in allen Tabellen verarbeitet werden sollen, so würde dies allerdings zur weiteren Charakterisirung der so gebildeten Gruppen dienen. Wir haben jedoch in dieser Hinsicht einige Ausstellungen zu machen.

Zunächst hat die Tabelle einige Eigenschaften, die sie geeigneter für eine Hauptstadt, als für ein Land erscheinen lässt: die Voranstellung der liberalen Professionen, die Ackerbau Treibenden nehmen die sechste Stelle ein. Den Kutschern und Stallknechten eine eigene Colonne zu widmen, ist durchaus nicht begründet, es findet sich Gelegenheit sie je nach der Berufsklasse, der sie angehören, unterzubringen. Eine besondere Klasse für die Protistuirten anzubringen, ist für eine Provinz ungegründet. Wo das Material das erlaubt, kann man

Digitized by Google

sie als eine besondere Unterabtheilung der Gesellschaftsklasse anbringen, aus der sie sich meist rekrutiren. Ueber die Position: Ohne Beruf ist zu bemerken, dass es sich nicht nur — grossen Theils nicht sowohl — um die eigentliche Berufsthätigkeit, als vielmehr um die allgemeinen Lebensverhältnisse der betreffenden handelt, dass daher die Frauen und Kinder bei den betreffenden Abtheilungen der Männer und Väter untergebracht werden müssen. Die Gouvernanten, Kleidermacherinnen etc. wird man ja noch besonders bei den betreffenden Rubriken absetzen können. Die eigene Thätigkeit in dem betreffenden Berufszweige findet sich übrigens vielfach bei den Frauen und Kindern. Es ist daher besser jene Rubrik „Ohne Beruf" ganz ausfallen zu lassen, um nicht die Versuchung nahe zu legen, sie mit jenen Elementen, wie gewöhnlich, auszufüllen. Die übrigen hier sonst wohl Untergebrachten lassen sich leicht anderswo unterordnen. Wir vermissen in jenem Schema ausserdem die nach obigen Ausführungen geforderte Scheidung in niedere und höhere Schichten der Gesellschaft bei den meisten Haupt-Abtheilungen und im Ganzen. Es wird daher die unten folgende Eintheilung vorgeschlagen, mit der Bemerkung, dass eine Adaptirung dieses Schemas an das bei der Volkszählung bei uns befolgte durch Auseinanderlegung einzelner Abtheilungen leicht geschehen kann.

Es ist zu diesem Schema zu bemerken, dass unter Nr. 3 die Rentiers und Gutsbesitzer untergebracht sind, theils wegen ihrer kleinen Zahl und dann wegen der offenbar mannigfachen Vermischung, ferner, dass unter verschiedenen Umständen die Einreihung trotz desselben Namens unter verschiedenen Rubriken stattfinden wird. Es ist dies von den Gasthofsbesitzern (etwa in grossen Städten) und den Wirthen (vielfach auf dem Lande) und Kellnern bemerkt. Ein Goldarbeiter und Uhrmacher mit grossem Geschäft in der Stadt wird unter 3 rangiren, unter entgegengesetzten Umständen unter 4 etc. — Es wird sich ferner fragen, ob nicht geeigneten Falls die unter 4. untergebrachten 2 Abtheilungen bei verschiedener Lebensweise, Gelegenheit zu Excessen getrennt werden.

Bei Nr. 5 könnte die Unterbringung unter diese Haupt-Abtheilung in Frage kommen. Wegen der gemeinsamen Lebensverhältnisse und gegenseitiger Rekrutirung ist die Einreihung so vollzogen.

Es würden daher für Diejenigen, welche der Verarbeitung der Professionen ihre statistische Aufmerksamkeit widmen wollen, nach der obigen Restriction des Werthes dieser Untersuchungen zunächst folgende 2 Tabellen vorgeschlagen, von denen die erste sich auf die Beziehung der Professionen auf die Formen, die zweite auf die Ursachen bezieht.

8. Tabelle. Professionen mit Beziehung auf die Form (1. Aufnahmen).

1. Verticale Colonne:

I. Vom Ackerbau Lebende. (Viehzucht, Fischerei.)

1) Landwirthe, Eigenthümer und Pächter.

2) Deren Dienstleute, Heuerlinge und Tagelöhner.

II. Die Gewerbe: Industrie, Handel, Verkehr.

3) Kaufleute, Fabrik-, Bergwerksbesitzer, Beamte in diesen Fächern, Chemiker, Buchhändler, Gasthofsbesitzer etc., Rentiers, Gutsbesitzer.

4) Handwerker aller Art. Fabrik-, Berg-, Tage-Arbeiter, Müller, Bierbrauer, Metzger. — Händler, Hausirer, Wirthe, Kellner, Fechtmeister, Musikanten etc.

5) Dienstboten (persönliche Dienste Leistende) mit Krankenwärtern.

III. Liberale Professionen.

6) Höhere Beamte: Post-, Eisenbahn-, Forst-, alle Staats-Beamte, Juristen, Aerzte, Apotheker, Geistliche, Höhere Lehrer, Künstler etc.

7) Niedere Beamte: Gensdarmen, Polizeidiener, Förster, Steueraufseher, Bahnwärter, Schreiber, Elementarlehrer, Heilgehülfen.

IV. Militair.

8) Officiere.

9) Gemeine und Unterofficiere.

10) Summa der Fälle mit bekanntem Beruf.

11) Fälle ohne Nachricht.

1. Horizontale Zeile: 1) Melancholie, 2) Manie, 3) Schwächezustände, 4) Paralytische Geisteskrankheit.

9. Tabelle. Professionen mit Beziehung auf die Ursachen (1. Aufnahmen).

1. Verticale Colonne: 1) Deprimirende Affecte und habituelle Gemüths- und Charakter-Eigenthümlichkeiten, die sich auf Beruf, Vermögen und Lebensstellung beziehen; 2) Anderweite Affecte, Gemüths- und Charakter-Eigenthümlichkeiten; 3) Excesse in Venere et Baccho mit wüstem, unstetem Leben; 4) Trunksucht; 5) Noth und Elend: 6) Erblichkeit; 7) Missbildungen des Kopfes und angeborene Geistesschwäche; 8) Acute fieberhafte Krankheiten; 9) Syphilis; 10) Andere constitutionelle chronische Krankheiten; 11) Organische Gehirnkrankheiten; 12) Neurosen; 13) Kopfverletzungen; 14) Tuberkulose; 15) Herzkrankheiten; 16) Krankheiten des Unterleibs, der Harn- und Geschlechtsorgane; 17) Menstruationsstörungen; 18) Puerperalstörungen; 19) Andere Einflüsse und Krankheiten; 20) S. der Fälle mit bekannter Ursache; 21) Zahl der Fälle mit unbekannter Ursache.

1. Horizontale Zeile: 1) Landwirthe etc.; 2) Deren Dienstleute etc.; 3) Kaufleute etc.; 4) Handwerker etc.; 5) Dienstboten; 6) Höhere

Digitized by Google

Beamte etc.; 7) Niedere Beamte etc.; 8) Officiere; 9) Gemeine Soldaten etc.; 10) Ohne Nachricht.

Die Tabelle XI. des Schemas betrifft den Cultus, XII. den Ort des Ursprungs, Dichtigkeit der Bevölkerung. Es ist für beide Gesichtspunkte zu bemerken, dass die Bearbeitung, wie sie grösstentheils bisher stattfand, nämlich die alleinige Feststellung der Zahl der einzelnen Gruppen, keine besondern Resultate geliefert hat, und nicht zur Nachahmung auffordert, dass dagegen die weitere Differenzirung der Gruppen unter sich, etwa nach den Formen, wohl Resultate verspricht. In Betreff der 2. Tabelle werden die Städte über 10000 Einwohner in industrielle und nicht industrielle getheilt. Es erhebt sich das Bedenken, warum, wenn die Industrie einmal Einfluss hat, sie denselben auch nicht auf Orte unter 10000 Einwohner haben soll. Wir lassen daher die beiden Tabellen folgen, indem wir im Uebrigen die Positionen des Schemas annehmen.

Tab. 10. Religion und Form (1. Aufnahmen).

1. Verticale Colonne: 1) Katholiken, 2) Protestanten, 3) Juden, 4) Unbestimmt und Andere.

1) Melancholie, 2) Manie, 3) Schwächezustände, 4) Paralytische Geistesstörung.

Tab. 11. Stadt, Land etc. nach Formen (mit Epilepsie und Idiotie).

1. Verticale Colonne: I. Orte unter 2000 Einwohner, 1) industrielle, 2) nicht industrielle; II. Städte von 2—10000 Einwohnern, 3) industrielle, 4) nicht industrielle; III. Städte von 10—50000 Einwohnern, 5) industrielle, 6) nicht industrielle; IV. Städte über 50000 Einwohner, 7) industrielle, 8) nicht industrielle; V. 9) Unbekannt.

1. Horizontale Zeile; 1) einfache Geistesstörung, 2) paralytische Geistesstörung; 3) Epilepsie; 4) Idiotie und Cretinismus.

Die Tabelle XIII des Schemas enthält die Heimath der Aufnahmen je nach Ebenen und Gebirgen. Referent kann diesem Gesichtspunkte für die Formen, welche den Hauptvorwurf für diese allgemeinen Tabellen bilden müssen, die einfache und paralytische Geistesstörung eine so grosse Wichtigkeit nicht beilegen, als dass man sie berücksichtigen sollte.

Die Tab. XIV des Schemas enthält die Aufnahmen nach Heilbarkeit. In der horizontalen Zeile figuriren als Hauptabtheilungen: die Heilbaren, die Zweifelhaften, die Unheilbaren. Bei den letzten werden als Gründe der Unheilbarkeit in 7 Unterabtheilungen, das Alter der Krankheit (länger als 3 Jahre), die démence und dann der Reihe nach der grösste Theil der übrigen angenommenen Formen aufgeführt. In der vertikalen Spalte finden sich 4 Abtheilungen: Das

Digitized by Google

1. × aufgenommen, in Folge von Rückfall, wiederholte Aufnahme ohne vorherige Genesung, durch Versetzung, und jedes × die Unterabtheilung: Aufnahme auf den Antrag von Verwandten und Freunden, oder der Behörden. Referent bemerkt, dass in früheren Tabellen die Aufnahmen hinreichend nach Heilbarkeit und Unheilbarkeit charakterisirt sind. Tab. 1 enthält unter Melancholie und Manie die heilbaren Formen, ausserdem Tab. 2 nach der Krankheitsdauer vor der Aufnahme. Im Uebrigen enthält die Tab. XIV theilweise nur Wiederholungen aus früheren Tabellen, theils irrelevante Verhältnisse, welche, wo es sich um so gewichtige Probleme handelt, den Raum nicht einnehmen dürfen.

Die Tab. XV beschäftigt sich mit den Rückfällen in 3 Abtheilungen. Die 1. betrifft die Ursachen der Rückfälle. Alkoholische Excesse, Ausschweifungen; Elend und Entbehrungen; Kummer ... Andere Ursachen. Weiter findet sich über die Eintheilung der Ursachen keine Bemerkung. Es scheint daher als wenn nach dem früheren Gesichtspunkt, nur die Gelegenheits-Ursachen eine Stelle finden sollten. In wie hohem Grade jedoch die allgemeine Disposition hier massgebend ist, zeigt der Einfluss der Erblichkeit. Referent ist daher der Ansicht, dass die Eintheilung der früheren vollkommen entsprechend gemacht werden solle. Bei der 2. Abtheilung, betreffend die Zahl des Rückfalls, und der 3. betreffend den Zwischenraum zwischen Genesung und Rückfall, vermisst Referent die Berücksichtigung des Einflusses der Erblichkeit. Das Schema will diese Untersuchungen auf die Melancholie und die Manie ausgedehnt wissen, auf die andern Formen, je nach den Umständen. Referent schlägt folgendes vor:

Tabelle 12. Rückfälle (wiederholte Aufnahmen nach vorher stattgefundener Genesung).

I. Ursachen der Rückfälle nach Formen.

1. Vertikale Colonne: 1) Depimirende Affekte und habituelle Gemüths- und Charaktereigenthümlichkeiten, die sich auf Beruf, Vermögen und Lebensstellung beziehen.

2) Anderweite Affekte, Gemüths- und Charaktereigenthümkeiten etc. (Dieselbe Tabelle wie bei Tabelle 9 der Professionen mit Beziehung auf die Ursache).

1. Horizontale Zeile: 1) Melancholie. 2) Manie.

II. Zahl des Rückfalls (wie vielte Aufnahme), nach Erblichkeit.

1. Vertikale Colonne: 1. 2. 3. 4. 5. etc. Aufnahme.

1. Horizontale Zeile: 1) Erblich. 2) Nichterblich.

Digitized by Google

III. Intervall zwischen Entlassung und wiederholter Aufnahme nach Erblichkeit.

1. Vertikale Colonne: 1) bis 3 Monaten, 2) 4. — 6. Monaten, 3) 7 — 12 Monaten, 4) im 2. Jahre, 5) im 3. Jahre, 6) im 4. Jahre, 7) im 5. Jahre u. s. w., für jedes vorkommende Jahr eine Colonne.

1. Horizontale Zeile: 1) Erblich. 2) Nichterblich.

Die folgenden Tabellen des Schemas betreffen die Genesungen. Es sollen sämmtliche typische Formen im Kopfe figuriren, obgleich wie es dort heisst mehrere — in Wahrheit alle mit Ausnahme der folie simple — unheilbar seien. Referent sieht zu dieser, offenbar zwecklosen Vermehrung der Colonnen keinen Grund. Die Tab. XVI betrifft das Alter im Moment der Genesung. Es fehlt hier das Alter der Gesammtzahl von Fällen, aus der Genesungen stattfinden, und zu denen daher eine Berechnung geschehen kann. Referent schlägt das Alter der Erkrankung vor nach Tab. 3. II. Abtheilung. Es dürfen demnach denn auch hier nur die Genesungen der 1. Aufnahme figuriren. Die Fragestellung ist dann: Wie gross ist auf diesem Alter der Erkrankung die Aussicht auf Genesung? Die Tabelle XVII betrifft die Aufenthaltsdauer im Asyl. Referent betont hier, ebenso bezüglich der Todesfälle, dass eine exakte naturwissenschaftliche Anschauung mit dem Beginn der Krankheit nicht des Aufenthalts anfangen muss, wie nach beiden Beziehungen auch vielfache Zusammenstellungen vorliegen. Die Tabelle XVIII enthält die Krankheitsdauer vor der Aufnahme, XIX den Monat des Austritts der Genesungen. Referent hebt hier hervor, dass nach allem Vorliegenden der Krankheits-Verlauf eine innerlich bedingte zeitliche Gesetzmässigkeit zu haben scheint, und dass man, um den Einfluss der Monate auf die Genesung festzustellen, daher zunächst die Monate der Erkrankung, und dann die exakte Zeitdauer bis zu der Genesung festsetzen müsste. Tab. XX enthält die Ursachen der Geisteskrankheit bei den Genesenen. Referent hat bereits früher (bei den Ursachen) entwickelt, dass nach den vorliegenden Arbeiten die Resultate dieser Tabelle nicht im Vergleich mit der aufgewendeten Mühe stehen. — Referent vermisst bei den Genesenen die Berücksichtigung zweier Gesichtspunkte vom grössten Gewicht. In höherem Grade als bei den Aufnahmen ein Fortschritt erzielt wird, durch das Zurückgehen von den aufgenommenen Fällen auf die aufgenommenen Personen, geschieht es durch das Zurückgehen von genesenen Fällen auf die genesenen Personen. Nur so lässt sich entscheiden, wie viel aufgenommene Personen zum 1. ×, in letzter Instanz genesen, wie viel zum 1. × Genesene wiederum erkrankten und dann wieder genesen etc. Zweitens vermissen wir die Berück-

Digitized by Google

sichtigung der Erblichkeit, dieses hier so einflussreichen Momentes. Wir kommen daher zu folgenden Tabellen:

C. Genesungen.

Tabelle 13. Genesungen je nach Erblichkeit und Zah der Aufnahme.

1. Vertikale Colonne: 1. Aufnahme. 2. Aufnahme. 3. Aufnahme. 4. Aufnahme. 5. Aufnahme etc.

1. Horizontale Zeile: 1) Erblich. 2) Nichterblich.

Tabelle 14. Alter der Genesungen zur Zeit der Erkrankung, nach den Formen (zum 1. × Aufgenommene, also nach Analogie der Tabelle 3. II. Abtheilung).

1. Vertikale Colonne: 1) bis 15 J., 2) 16—20 J. etc. wie Tab. 3.

1. Horizontale Zeile: 1) Melancholie. 2) Manie.

Tabelle 15. Aufenthaltsdauer der Genesenen je nach Form und Erblichkeit.

1. Vertikale Colonne: 1) bis 1 Monat, 2) 2—3 Monat, 3) 4—6 Monat, 5) 7—12 Monat, 6) im 2. J., 7) 3—5 J., 8) über 5 J.

1. Horizontale Zeile: I. Melancholie, 1) erblich, 2) nicht erblich. II. Manie, 3) erblich, 4) nicht erblich.

(Tab. 15a. Krankheitsdauer nach denselben Kategorien).

Tabelle 16. Genesungen nach der Krankheitsdauer vor der Aufnahme, nach den Formen:

1. Vertikale Colonne: 1) bis 1 Monat, 2) 2—3 Monat etc. (nach Tabelle 2).

1. Horizontale Zeile: 1) Melancholie, 2) Manie.

Die folgenden Tabellen des Schemas beschäftigen sich mit den Todesfällen, die Tabelle XXI mit dem Alter im Monat des Todes. Es ist hier zu bemerken, dass die Kenntniss des Todesalters an und für sich von keinem weiteren Interesse ist, welches nur darin liegt, die Sterbenswahrscheinlichkeit der einzelnen Altersstufen festzustellen. Hierzu ist die Kenntniss des durchschnittlichen Bestandes nach jenen Altersstufen erforderlich. Diese beiden Tabellen müssen daher entweder beide gefordert oder beide fortgelassen werden. Die Tabelle XXII behandelt die Aufenthaltsdauer, XXIII die Todesmonate. Referent vermisst wiederum die Berücksichtigung der Erblichkeit, die hier wiederum von so grossem Gewicht ist, bei der aber die Berechnung des durchschnittlichen Bestandes aus denselben Gründen, wie bei den Altersstufen, geschehen muss. Wir schlagen daher folgende Tabellen vor:

Digitized by Google

D. Todesfälle.

Tabelle 17. Todesfälle nach der Erblichkeit und den Formen:

1. Vertikale Colonne: 1) Erblich, 2) Nichterblich.

1. Horizontale Zeile: 1) Einfache Geistesstörung. 2) Paralytische Geistesstörung.

Diese Tabelle wird nur im Zusammenhang mit der Tabelle 24 ausgefüllt.

Tabelle 18. Alter beim Tode nach den Formen.

1. Vertikale Colonne: 1) bis 5 J., 2) 16—20 J. etc. wie bei Tabelle 3.

1. Horizontale Zeile: 1) Primäre Formen. 2) Schwächezustände. 3) Paralytische Geistesstörung.

Diese Tabelle wird nur in Zusammenhang mit Tab. 23 ausgefüllt.

Tabelle 19. Aufenthaltsdauer der Gestorbenen nach den Formen.

1. Vertikale Colonne: 1) bis 1 Monat, 2) 2—3 Monat, 3) 4—6 Monat, 5) im 2. Jahre, 6) 3.—5. Jahre, 7) 6.—10. Jahre, 8) 11.—15. Jahre, 9) 16.—20. Jahre, 10) 21. - 30., 11) 31.—40. Jahre etc.

1. Horizontale Zeile; 1) Einfache Geistesstörung. 2) Paralytische Geistesstörung.

(Tab. 19a. Krankheitsdauer mit denselben Kategorien.)

Tab. 20. Monate des Todes nach den Formen.

1. Vertikale Colonne: 1) Januar etc.

1. Horizontale Zeile: 1) Einfache Geistesstörung. 2) Paralytische Geistesstörung.

Tabelle XXIV behandelt die Todesursachen, Tabelle XXV die hauptsächlichsten Krankheiten und Gebrechen während des Jahres. Referent ist der Ansicht, dass man sich, nach anderweitig befolgter Methode, vor der Hand ausschliesslich der Mortalitätsstatistik zuwende mit ihren einfachen, bestimmten und sicheren Daten, mit dem Licht das sie auf die Natur der Geisteskrankheiten, wie auf die Erfordernisse der Verpflegung werfen. Man hat speciell auch in psychiatrischer Beziehung, die Forderung aufgestellt, dass nur die Grundkrankheit, welche die Hauptursache des Todes gewesen sei, zur Registrirung benutzt werden solle. Beispielsweise sollten die Todesfälle an Pneumonie, welche bei paralytischen Geisteskranken vorkommen, der paralytischen Geisteskrankheit, welche die Disposition zu jenen Pneumonien enthält, zugerechnet werden. So gerechtfertigt die Argumentation auch ist, so ist jene Methode doch unvollkommen. Man erhält sich au fait des betonten Gesichtspunktes, wenn man neben der Krankheit, welche den Tod im konkreten Fall direkt herbeigeführt hat, zu-

Digitized by Google

gleich die Formen registrirt. Was nun die einzelnen Todesursachen betrifft, so nennt sie das internationale Schema nach den Organen: Cerebrospinale, Digestions-, Respirations-, Circulations-, Harn- und Geschlechtsorgane, Cachexien, Chirurgische Krankheiten, andere Krankheiten, Todesfälle durch Zufall und Selbstmord. Referent stellt dem entgegen folgendes Schema auf, welches dem Bedürfniss praktischer Registrirung und der Vergleichung der Data anderer Anstalten entsprungen ist.

21. Tabelle der Todesursachen nach den Formen.

1. verticale Colonne. I. Allgemeine acute Krankheiten: 1) Typhus, 2) Dysenterie, 3) Durchfall (Cholera etc.).

II. Allgemeine chronische Krankheiten: 4) Lungen- und Darm-Tuberculose (hierher auch Krebs, Scorbut).

III. Todesfälle vom Nervensystem aus. 5) Gröbere organische Veränderungen des Centralnervensystems: A. in chronischem Verlaufe: Geschwülste, Tuberkel, Erweichungen. B. in acutem Verlaufe: Meningitis, Blutextravasat etc. — 6) Nervöse Erschöpfung, in acuter Weise unter Aufregungszuständen vom Gehirn aus, ohne gröbere materielle Veränderung, erfolgende Todesfälle (acutes Delirium, Typhomanie; auch nach längerem Bestande der Geistesstörung.) 7) Nervöse Lähmung, marasmus, vom Gehirn aus, ohne Aufregungszustände erfolgende Todesfälle, mit oder oder ohne allgemeine Ernährungsstörung, ohne bestimmtes Lokalleiden. Hierhin oft Nahrungsverweigerung.

IV. Andere Lokalkrankheiten: 8) Pneumonie mit Lungengangrän. 9) Herzkrankheiten. 10) Krankheiten der Verdauungsorgane. 11) Krankheiten der Nieren- und Geschlechts-Organe. 12) Chirurgische Krankheiten: Caries, Decubitus etc.

V. 13) Selbstmord. 14) Unglücksfälle (mit Todtschlag.)

1. horizontale Zeile. Formen zur Zeit des Todes: 1) Melancholie, 2) Manie, 3) Schwächezustände. 4) Paralytische Geistesstörung. 5) Epilepsie. 6) Idiotie mit Cretinismus.

Die I. und II. Abtheilung der Tabelle, die allgemeinen acuten und die allgemeinen chronischen Krankheiten, welche beide nicht den Geisteskrankheiten eigenthümlich sind, geben, wenn sie mit einer verhältnissmässig hohen Zahl auftreten, meist Aufschluss über gewisse hygieinische Schäden der Wohnung, der Luft, der Nahrung etc. Der Durchfall ist desswegen zur Dysenterie gestellt, weil er in dem grössten Theil der Fälle denselben hygieinischen Mängeln entspringend, ebenso allgemeinen Einflüssen seine Entstehung verdankt, auch in Wirklichkeit, speciell noch bei Mangel der Sectionen, nicht von ihr zu trennen ist.

Die III. Abtheilung enthält grösstentheils die den Geisteskrankheiten eigenthümlichen Todesursachen. Die Eintheilung hier wie in den

Digitized by Google

folgenden Abtheilungen spricht für sich. Bei der Benutzung wird man nur die einzelnen Positionen nennen, also 1) Typhus, 2) Dysenterie, 3) Durchfall . . ., 4) Lungen-, Darmtuberculose . . ., 5) Organische Hirnkrankheit mit meningitis, Blutextravasat, 6) Erschöpfung, 7) Marasmus (Lähmung), 8) Pneumonie etc.

Die folgenden Tabellen des Schemas betreffen den Bestand, die Tabelle XXVI. die Ursachen der Geistesstörung. Referent hält diese Tabelle für einen nicht gerechtfertigten Aufwand an Arbeit, da der Bestand sämmtlich einmal zu den Aufgenommenen gehört hat, also in jener Hinsicht erörtert ist. Die Tabelle XXVIII. soll die Heilbaren und Unheilbaren feststellen, was bereits durch die allgemeine Tabelle der Bewegung geschehen ist, wo die primären Formen die Heilbaren angeben. Die Tabelle XXVII. enthält das Alter. Man wird sich dieser Tabelle nicht gut entschlagen können, schon des Vergleichs mit den Geisteskranken in der Bevölkerung wegen. Hier nun schlägt Referent weiter die durchschnittliche Festsetzung des Lebensalters bei einfacher und paralytischer Geistesstörung vor, um in Verbindung mit den Todesfällen nach dem Lebensalter die Sterbenswahrscheinlichkeit der Altersstufen festsetzen zu können. Es müssen natürlich beiderseits dieselben Kategorien gebildet werden und legt Referent auf die dort ausgeworfenen Formen besonderes Gewicht. Das durchschnittliche Alter des Bestandes kann hier nur durch eine öftere, wenigstens vierteljährige Festsetzung gefunden werden. Weiter schlägt Referent vor, die verschiedene Sterblichkeit nach Erblichkeit und Nichterblichkeit festzusetzen, was ausser der oben erfolgten Festsetzung der Todesfälle die Ermittelung des durchschnittlichen Bestandes erfordet. Diese Festsetzung kann am leichtesten nach der Anfangs angeführten 2. Methode geschehen, indem man zum Bestande im Anfang des Jahres die Hälfte des Zugangs addirt, und von der Summe die Hälfte des Abgangs abzieht. Zunächst ist also die Festsetzung des Bestandes am Anfang des Jahres nöthig. Vom Zugang fehlen die nach nicht erfolgter Genesung wiederholt Aufgenommenen, vom Abgang die nicht genesen und nicht gestorben Ausgeschiedenen, welche also noch festgestellt werden müssen. Die Sterblichkeit wird dann endlich durch Division des durchschnittlichen Bestandes in die Todesfälle ermittelt. Referent schlägt daher folgende Tabellen vor:

E. Bestand.

Tabelle 22. Bleibender Bestand am 31. December nach Alter und Form (mit Epilepsie und Idiotie).

1. Verticale Colonne: 1) bis 15 J., 2) 16–20 J. etc. nach Tabelle 3.

Digitized by Google

1. Horizontale Zeile: 1) Primäre Formen, 2) Schwächezustände, 3) Paralytische Geistesstörung, 4) Epilepsie mit Geistesstörung, 5) Idiotie (mit Cretinismus).

Tabelle 23. Durchschnittlicher Bestand nach Altersstufen und Formen, nach wenigstens vierteljähriger Festsetzung.

1. Verticale Colonne: 1) bis 15 J., 2) 16—20 J. etc. nach Tabelle 3.

1. Horizontale Zeile: 1) Primäre Formen, 2) Schwächezustände, 3) Paralytische Geistesstörung.

Diese Tabelle wird nur im Zusammenhange mit Tabelle 18 ausgefüllt.

Tabelle 24. Bestand am 1. Januar nach Erblichkeit und Formen, mit Anhang, zum Zweck der Ermittelung des durchschnittlichen Bestandes.

1. Verticale Colonne: I. Erbliche, 1) Einfache Geistesstörung, 2) Paralytische Geistesstörung; II. Nichterbliche, 3) Einfache Geistesstörung, 4) Paralytische Geistesstörung.

1. Horizontale Zeile: 1) Bestand am 1. Januar, 2) Wiederholte Aufnahmen ohne vorher stattgefundene Genesung, 3) Ungenesen Entlassene.

Die Zahl der Aufnahmen nach den 4 Categorien kann aus Tabelle 6, 12 und pos. 2 der horizontalen Zeile der vorstehenden Tabelle, die der Ausgeschiedenen aus Tabelle 13, Tabelle 17 und pos. 3 der vorstehenden Tabelle, aus Aufnahmen, Ausgeschiedenen und Bestand zu Anfang des Jahres der durchschnittliche Bestand berechnet werden.

Diese Tabelle wird nur im Zusammenhang mit Tabelle 17 ausgefüllt.

Als Anhang an die Tabellen medicinischen Charakters werden dann für die 1. Aufnahmen noch Tabellen nach dem örtlichen Herkommen (t. regionaux) als Wunsch hingestellt. Sie sollen die Kranken nach Provinzen etc. bis Communen der Heimath herab zusammenstellen, mit möglichster Angabe der topographischen, geologischen und andern Eigenthümlichkeiten dieser umschriebenen Bezirke. Sie sollen zugleich die allgemein anzunehmenden typischen Formen enthalten und sich am besten auf Zeiträume von 5—10 Jahren ausdehnen. Jene Forderungen sind für die Localstatistik offenbar begründet, sind für monographische Bearbeitungen des Cretinismus z. B. durchaus nöthig, entziehen sich im Uebrigen, um so kleiner die Bezirke sind, umsomehr der allgemeinen Beurtheilung, und bedürfen einer scharfen Unterscheidung der Verschiedenheit der Einlieferungs- und Erkrankungs-Verhältnisse der Bezirke. — Ferner wird gewünscht, das mit den allgemeinen Volkszäh-

Digitized by Google

lungen, specielle Commissionen aus competenten Aerzten die Fälle von Geistesstörung, Idiotie und Cretinismus ausserhalb der Irrenanstalten, zugleich mit dem Alter und der Form erheben. Mit jenen Commissionen von Aerzten kann man gewiss einverstanden sein. Es wäre dabei zu bemerken, dass, da jene Aerzte keine Irrenärzte, aber doch Aerzte sind, die in den Familien die Nachrichten erheben, sie wohl die paralytische Geistesstörung von unsern Formen nicht feststellen könnten. Man könnte jedoch die Feststellung der erworbenen Geistesstörung, der Epilepsie mit Geistesstörung, Idiotie mit Cretinismus, von Complicationen: Lähmungen, Blindheit, Taubstummheit, ferner die Erblichkeit, am besten in der detaillirten Weise der Tabelle, das Lebensalter der Erkrankung, die Dauer nach Jahren, ausser den durch die Volkszählung ermittelten Daten feststellen lassen.

Das Schema beschäftigt sich ferner mit den Methoden der Berechnung der Genesungen und der Sterblickeit, da dieselbe allerdings von der grössten Wichtigkeit ist, um nicht etwa Resultate einer falschen Berechnung auf sachliche Unterschiede zu beziehen und umgekehrt. Als Methode für die Berechnung der Genesungen wird aufgestellt: Mit der jährlichen Zahl der Aufgenommenen die der Genesung zu vergleichen, indem im Allgemeinen anzunehmen sei, dass der rückbleibende Bestand am Ende der Periode künftig so viel Genesungen stellen werde, als der Bestand zu Anfang der Periode während derselben gestellt habe. Wolle man eine exakte Berechnung machen, da der Bestand am Ende der Periode meist grösser sei, als zu Anfang derselben, so könne man die aus diesem Ueberschuss (d. h. Bestand zu Ende minus Bestand zu Anfang) noch anzunehmenden Genesungen so berechnen: Man solle berechnen, nach den Jahren der Mitte der Periode, wie viel Genesungen während der 2 oder 3 folgenden Jahre durchschnittlich der Bestand am 31. Dezember liefere, und nach diesem Verhältniss die Genesungen jenes Ueberschusses. Dies kann zunächst heissen, dass man nur die aus jenem Bestande erfolgenden Genesungen berücksichtigt, so, als wenn keine weiteren Aufnahmen mehr erfolgten. Dies würde zunächst eine mühsame Berechnung sein, dann nicht richtige Resultate ergeben, da der Bestand meist Unheilbare, jener Ueberschuss namentlich bei kürzeren Perioden, mehr Heilbare enthält. Sollte jene Angabe einen anderen Sinn haben, so würde sie noch weniger richtig sein. Man wird daher jene Correktur auf sich beruhen lassen. In Betreff der ganzen Frage kann Referent auf seine weitläufigere Begründung (l. c.) verweisen, dass die Berechnung nach dem Ausgeschiedenen für kürzere Zeiträume und bei weiteren Differenzirungen die Beste ist, allein in sich sachlich richtige Resultate liefert, doch keine allgemein wissenschaftlichen, ver-

Digitized by Google

gleichbaren. Hierzu ist die Berechnung nach den Aufnahmen allein zu verwenden, namentlich für längere Zeiträume. Letzteres gilt für vorstehendes Problem. Es sind ausserdem bei exakter Berechnung, wie auch das Schema sagt, die nach nicht erfolgter Genesung wiederholt Aufgenommenen, ferner bei Berechnung ganzer Länder, die von einer Anstalt in die andere Versetzten, ferner sind die Epileptischen, Idioten, auch die Paralytiker zu entfernen, so dass nur die Fälle einfacher Geistesstörung übrig bleiben. Endlich kann ein genauer Vergleich verschiedener Anstalten nur unter Berücksichtigung gleicher Krankheitsdauer vor der Aufnahme stattfinden. Um das höchste Ziel zu erreichen, muss man von den aufgenommenen Fällen auf die aufgenommenen Personen recurriren, um festzustellen, wie viele Personen zum 1. 2 etc. letzten × genesen etc., nach früher Ausgeführtem. Hierzu ist zugleich die Hinzunahme des Bestandes, beim Beginn der Periode und sehr lange Zeiträume erforderlich.

Bezüglich der Berechnung der Sterblichkeit wird mit Recht als die rationellste Methode die angegeben, die Todesfälle mit der mittleren Bevölkerung (dem durchschnittlichen Bestande) zu vergleichen. Es wird mit Recht als Grund angeführt, dass, wenn man verschiedene Gruppen von Kranken, welche, die einen 6 Monate, die andern 1 Jahr in einem Asyle zugebracht haben, bezüglich der Todes-Chancen vergleichen will, man sie durch Berechnung auf dieselbe Bedingung den Aufenthalt eines Jahres zurückführen müsse. Dies geschieht durch Berechnung des durchschnittlichen Bestandes. Es folgen nun einige Ausführungen, die durchschnittliche Sterbenswahrscheinlichkeit jedes Verflegungstages, die durchschnittliche Sterbenswahrscheinlichkeit jedes Behandelten. Da letztere Berechnung neben jener oben ausgeführten durchschnittlichen Sterblichkeit (nach dem durchschnittlichen Bestande) empfohlen wird, so haben wir auf sie einzugehen. Sie besteht darin, die Zahl der Todesfälle zu dividiren durch die Zahl der Behandelten. (Bestand plus Zugang). Da nämlich dort, (namentlich in sehr grossen Städten) wo verhältnissmässig viele Aufnahmen erfolgen, weil in der 1. Zeit des Aufenthalts überhaupt mehr Todesfälle erfolgen, die Sterblichkeit eine grössere sei, so müsse man die durchschnittliche Aufenthaltsdauer mit in Berechnung treten lassen, was auf jene Weise geschehe. Nun aber ist entgegen zu halten, dass jenes oben citirte 1. Fundament jeder Berechnung der Sterbenswahrscheinlichkeit dadurch verletzt wird, nämlich die gleichlange Dauer der Beobachtung. In einer Anstalt, hat jeder im Jahre Behandelte einen durchschnittlichen Aufenthalt von 10—11 Monaten, in einer andern von 6 Monaten. Wie will man aber entscheiden, ob und in wie weit diese Verminderung des Aufenthalts auf die Hälfte und

Digitized by Google

mehr, und die dadurch herbeigeführte Verminderung der Sterblichkeitsziffer jene Vermehrung derselben in Folge des frischen Anstalts-Aufenthalts aufwiegt? Die erhaltene Zahl ist also schon dadurch ein grösseres Räthsel, als jene 1., wo man alle Umstände in Erwägung ziehen kann. Ferner tritt bei jener Berechnung der Umstand gar nicht hervor, dass die Abnahme der Sterblichkeit noch nach langer Zeit stattfindet, so nach des Referenten (l. c.) Berechnung vom 11.—20. Jahre nach dem Beginne der Krankheit circa 10 × so schwach ist, als im 1. Jahre. Man muss daher entschieden erklären, dass jene letztere Methode, die Berechnung der Sterblichkeit nach der Summe der Behandelten, eine irrthümliche ist, und dass, wenn man die Sterblichkeit mit Rücksicht auf die Aufenthaltsdauer feststellen will, nichts Anderes übrig bleibt, als dies durch eine direkte Berechnung auszuführen. Dies ist von *Bernhardi* (Allg. Zeitschrift II. S. 282 ff.) und im Illenauer Bericht der Art ausgeführt, dass die Zahl der in einem bestimmten Zeitraume Behandelten durch Abzug der in dem vorigen Zeitraum Ausgeschiedenen von dem Bestande im Beginn desselben, festgestellt, und hierzu die Zahl der Todesfälle berechnet wurde. Diese Methode, welche für die Berechnung der Genesungen vollkommen richtig ist, bedarf hier noch der Correktur, um die Zahl der Behandelten auf den durchschnittlichen Bestand zu bringen. Referent hat (l. c.) so wohl bezüglich der Genesungen, als der Sterblichkeit für die ganze Berechnung die Krankheitsdauer maassgebend sein lassen, da der Beginn der Aufenthaltsdauer etwas Zufälliges, unter verschiedenen Umständen wechselndes ist. Es ist dann bei der Sterblichkeit eine doppelte Correktur, für den Zugang und Abgang erforderlich, um den durchschnittlichen Bestand zu erzielen. An einem nicht zu corrigirenden sachlichen Mangel leiden alle Sterblichkeitsberechnungen für die Anstalten, welche die Todeskandidaten für kürzere oder längere Zeit, aus irgend einem Grunde aus der Anstalt entfernen. —

Referent hält es für angemessen, ein Normalschema für die in den Anstalten zu führenden Urlisten anzugeben zum Zweck der Ausfüllung vorstehend von ihm vorgeschlagener Tabellen. Es muss ein dreifaches, für den Zugang, Abgang und Bestand sein, so knapp wie möglich, keine überflüssigen Positionen enthalten, und doch alle Forderungen befriedigen. Zur Erleichterung der Arbeit der Entwerfung der Tabellen nach diesen Urlisten, sind noch 2 erforderliche Eigenschaften der letztern besonders zu betonen. Da nämlich für manche Tabellen, sowohl des Zugangs, als Abgangs, nur die 1. Aufnahmen, für andere die wiederholten Aufnahmen nach vorher stattgefundener Genesung allein oder mit den 1. in Betracht kommen, so muss das

Schema diese Verschiedenheiten auf den 1. Blick hervortreten lassen. Referent hat dies dadurch zu erreichen gesucht, dass er die 2. Kategorie in die 2. Spalte des Kopfs, die 3. in die 3. Spalte gerückt hat. Ferner muss das Schema der Uebersichtlichkeit halber so wenig Spalten wie möglich haben. Es sind daher mehrere Positionen, sei es, dass es zusammengehörige Angaben, sei es, dass sie Berechnungen darstellen, in eine No. vereinigt worden. Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass man, um Irrthümer bei der Verarbeitung zu vermeiden, gut thut, für die Epilepsie mit Geistesstörung und Idiotie (mit Cretinismus), da sie in vielen Tabellen nicht vorkommen, gesonderte Listen anzulegen.

Schema für die Urlisten des Zugangs.

1. Horizontale Zeile (Kopf): 1) fortlaufende No. bei ersten Aufnahmen. Bei denjenigen 1. Aufnahmen, welche später wiederholt aufgenommen werden, figuriren hier in der II., III., IV. etc. Zeile darunter alle No. der wiederholten Aufnahmen. 2) Fortlaufende No. bei wiederholten Aufnahmen bei vorher Genesenen, in der II. Zeile darunter die Zahl der wie vielten Aufnahme, in der III. die No. der 1. Aufnahme, in der IV. das berechnete Intervall zwischen der vorigen Entlassung und der diesmaligen Erkrankung. — 3) Fortlaufende No. bei wiederholten Aufnahmen bei vorher nicht Genesenen, die II. Zeile darunter enthält hier die No. der ersten Aufnahme. — 4) Name und Geschlecht. 5) Wohnort und Kreis. 6) Form. 7) Datum der Erkrankung. 8) Datum der Aufnahme. In der II. Zeile darunter figurirt die Krankheitsdauer vor der Aufnahme. 9) Alter bei der Aufnahme. 10) Alter bei der Erkrankung. Hier figurirt bei den zum 1. × Aufgenommenen vorkommenden Falls die Bemerkung, dass schon vor diesem Anfall ein Anfall stattfand. 11) Civilstand zur Zeit der Erkrankung. 12) Religion. 13) Land, Stadt etc. 14) Complikationen (nach Tab. 5). 15) Erblichkeit und genaue Art derselben. 16) Andere Ursachen. (Die beiden letzten Positionen erfordern breite Spalten). 17) No. des Abgangsregisters. 18) Bemerkungen (ob von einer andern Anstalt überkommen etc.).

Schema für die Urlisten des Abgangs.

1. Horizontale Zeile: 1) Fortlaufende No. des Abgangs bei zum 1. × Aufgenommenen. 2) Fortlaufende No. des Abgangs bei wiederholten Aufnahmen nach vorher erfolgter Genesung. In der II. Zeile darunter figurirt hier die Zahl der wie vielten Aufnahme, in der III. Zeile die No. der ersten Aufnahme. 3) Fortlaufende No. des Abgangs bei wiederholten Aufnahmen bei vorher nicht Genesenen. In der II. Zeile darunter figurirt hier die No. der ersten Aufnahme. 4) Name und Geschlecht. 5) Form. 6) Datum der Erkrankung. 7) Datum

Digitized by Google

der Aufnahme. Hierunter in der II. Zeile die Krankheitsdauer vor der Aufnahme. 8) Alter der Aufnahme. 9) Alter der Erkrankung bei denjenigen Genesenen, die zum 1. × aufgenommen sind, Alter des Todes bei den Gestorbenen. 10) Erblichkeit, ob — ob nicht, 11) genesen, 12) gebessert, 13) ungebessert Entlassene, 14) Gestorbene, sämmtliche Abgänge mit dem Datum des Abgangs. Bei den Genesenen und Gestorbenen ist in der II. Zeile darunter die Aufenthaltsdauer in der Anstalt, in der III. eventuell die Krankheitsdauer anzubringen. 15) Todesursachen. 16) No. des Zugangsregisters. 17) Bemerkungen.

Schema für die Urlisten des Bestandes am 1. Januar resp. 31. December.

1. Horizontale Zeile: 1) Fortlaufende No. 2) Name und Geschlecht. 3. Form. 4) Alter. 5) Erblichkeit, ob — ob nicht. 6) No. des Zugangs-Registers.

Im Vorstehenden hat Referent seine Vorschläge zur medicinischen Statistik formulirt und die Gründe seiner Abweichung von dem internationalen Schema angegeben. Es mögen hier noch diejenigen Tabellen und Beschränkungen angegeben werden, welche beim Vergleiche der wissenschaftlichen Ausbeute mit der aufzuwendenden Mühe, in den Vordergrund zu stellen, und daher für den Fall zur Ausfüllung zu empfehlen sind, dass die Ausfüllung sämmtlicher Tabellen in vorstehender Ausdehnung zu umfangreich erscheinen sollte. Die Beschränkung würde darin bestehen, dass mit Ausnahme der Tabelle der Bewegung und der Todesursachen die Epilepsie und Idiotie, ferner darin, dass überall die Unterabtheilungen der einfachen Geistesstörung fortfielen. Folgende Tabellen würden erhalten bleiben: 1) Tabelle der Bewegung mit Rücksicht auf die Formen. 2) Dauer vor der Aufnahme mit Rücksicht auf die Formen. 3) Alterstabelle I und II mit Rücksicht auf die Formen und Erblichkeit. 4) Civilstand nach Alter der Erkrankung und Formen. 7) Erblichkeit nach Formen. Hier würde von Krankheiten in der Ascendenz nur direkte Geisteskrankheit, indirekte Geisteskrankheit, Krankheiten des Nervensystems, Alles von Vaters-Seite, Mutter-Seite, beiden Seiten, und Angeborensein figuriren. 12) Rückfälle II. Abtheilung, Zahl und Erblichkeit und III. Abtheilung, Intervall und Erblichkeit. 13) Genesungen nach Erblichkeit und Zahl der Aufnahme. 15) Genesungen nach der Aufenthaltsdauer und Erblichkeit. 16) Genesungen nach Krankheitsdauer vor der Aufnahme. 19) Todesursachen nach den Formen.

Sucht man einen Vergleich herzustellen, in Betreff der aufzuwendenden Mühe zwischen den Vorschlägen des internationalen Schemas und den Vorschlägen des Referenten, und berechnet man zu dem Zwecke

Digitized by Google

beiderseits die Zahl der sich ergebenden Einzelfächer, welche also bei richtiger Aufstellung der Tabellen im Allgemeinen einer Ausfüllung unterliegen würden, so ergeben sich, wenn man die nach den Angaben nicht exakt festzustellende Tabelle XV, I, Rückfälle nach den Ursachen, beiderseits, ferner Tabelle XXV, die aufgetretenen Krankheiten, während des Jahres fortlässt, für das internationale Schema 7456 einzelne Fächer, für die Vorschläge des Referenten, bei gleicher Berücksichtigung der Männer, Frauen, und Ausfall beiderseits der S. der einzelnen Formen (M. F. S.) 2894 Einzelfächer, für die oben angeführte Beschränkung der Tabellen 888 Einzelfächer. Dies giebt einen Maassstab für die verschiedene Mühe bei Sammlung der Einzelzahlen, bei der Berechnung und Vergleichung, und dann auch der Verarbeitung derselben von Seiten der Leser. Dabei ist zu bemerken, dass die Vorschläge des Referenten ausser dem wesentlichen Inhalt des internationalen Schemas so sehr viel weiter greifen.

Den letzten Theil der Vorschläge bildet die administrative Statistik. Die Tabelle XXX gibt im Kopf die in unserer Tabelle reproducirten 9 Positionen, in der vertikalen Colonne die Verpflegten auf Kosten

1) der Departements (die einzeln zu nennen sind, 2) der Communen, 3) von besondern Genossenschaften, 4) des Staats (Militair, Marine, Gefangene), 5) der Familien (1. 2. etc. Klasse), 6) fremder Gouvernements, 7) von unbekanntem Domizil.

Da die Art der öffentlichen Verpflegung in den einzelnen deutschen Staaten und Provinzen verschieden ist, so müsste zunächst eine Auseinandersetzung derselben hier erfolgen. Ausserdem würde für einen grossen Theil der Anstalten folgende Tabelle passen:

25. Tabelle der Bewegung nach Verpflegungsklassen:

1. Verticale Colonne: 1) I. Classe, 2) II. Classe, 3) III. Classe, 4) IV. Classe.

1. Horizontale Zeile: 1) Jährlicher Verpflegungssatz, 2) Bestand am 1. Januar, 3) Zugang, 4) Summa der Behandelten, 5) Entlassene (d. h. aus der Anstalt Ausgeschiedene), 6) Gestorbene, 7) Summa der Abgegangenen, 8) Bestand am 31. December, 9) Zahl der Verpflegungstage.

Es soll hier die IV. Classe die auf öffentliche Kosten Verpflegten enthalten, III. dieselbe aus eignen Mitteln unterhaltene Verpflegungsclasse angeben. Es findet sich im Schema ferner die Bemerkung, dass die Veränderungen des Verpflegungsmodus, von der auf eigene Kosten in die auf öffentliche etc. extra vermerkt werden solle. Eine besondere Abtheilung der Tabelle soll von der zuständigen Behörde für die Geisteskranken ausgefüllt werden, welche auf öffentliche Kosten ausserhalb der Asyle unterstützt werden.

Digitized by Google

Die Tabelle XXXI. des Schemas verlangt die Departements des Herkommens oder der Geburt des Bestands am 31. December, nach den Formen. Referent hält den wissenschaftlichen Theil dieser Frage grösstentheils durch die früheren Heimathstabellen der Aufnahmen erledigt. In so fern diese Tabelle sich auf die verpflegende Heimath beschränkte, würde sie den Maassstab für die Anstaltsfürsorge der einzelnen Bezirke abgeben.

Referent hält hier auch die geeignetste Stelle für die Tab. XXIX. des Schemas, Beschäftigte Geisteskranke. Es sollen hier als beschäftigt aufgeführt werden die Kranken, welche in den letzten 6 Monaten (vom 31. December ab) wenigstens 10 ganze Tage durchschnittlich im Monat beschäftigt gewesen sind. Die Beschäftigungsarten hat Referent in folgendem Vorschlage, dem sachlichen Inhalte nach mit etwas anderer Eintheilung reproducirt, dessen Erweiterung von den Umständen abhängt.

26. Tabelle. Beschäftigte Kranke. Natur der Beschäftigung.

1. Verticale Colonne: I. Aeussere Arbeiten, 1) Ackerbau, Gärtnerei, Erdarbeiten etc.

II. Handwerke: 2) Maurer, Steinhauer, 3) Zimmerleute, 4) Tischler und Stellmacher, 5) Schlosser und Schmiede, 6) Glaser, Anstreicher und Tapezierer, 7) Schuster und Sattler, 8) Schneider, 9) Weber, 10) Cigarrenmacher, 11) Haarzupfer, Strohflechter, 12) Schreiber etc.

III. Innere Hausarbeiten: 13) in der Küche, 14) bei der Wäsche etc, 15) mit weiblichen Handarbeiten, Nähen, Stricken, Sticken, Häkeln etc. Beschäftigte.

1. Horizontale Zeile: 1) Zahl der im Jahre beschäftigten Personen, 2) Durchschnittlich täglich Beschäftigte (Beschäftigungstage dividirt durch 300), 3) Ideeller, durch die Arbeit der Kranken erzielter Verdienst, in der Art berechnet, als wenn die Arbeit von Gesunden ausgeführt wäre (so weit dies thunlich).

Refererent schlägt noch folgende Tabelle 27. Verpflegungskosten, vor:

I. Summa des Ausgabe-Etats: 1) Verpflegungskosten, 2) Administrationskosten (d. h. Gehälter und Lohn des ganzen Personals).

II. Verpflegungs-Etat der letzten Classe: 3) Kosten für durchschnittliche etatsmässige Speisung, 4) Bekleidung, 5) Heizung, Beleuchtung, Reinigung, Arzneien etc., durchschnittlich für alle Classen, 6) Kosten, sowohl der baaren Auslagen, als der etatsmässigen Verpflegung des gesammten Anstalts-Personals (Beamten, Wärter, Küchen- etc. Personal). Die Berechnung findet pro Kopf und Jahr statt.

Digitized by Google

Neu eingetretene Mitglieder des Vereins.*)

154. Dr. *Gehewe*, Collegienrath und Arzt der k. Irrenanstalt zu Petersburg.
155. - *Keesbacher*, Arzt an der Irrenanstalt zu Laibach.
156. - *Köhler*, Assistenzarzt der Landesanstalten zu Hubertusburg.
157. - *G. Landerer*, Assistenzarzt der Priv. - Irrenanstalt zu Göppingen.
158. - *Mendel*, Director einer Priv. Irrenanstalt zu Pankow bei Berlin.
159. - *Nagy*, 1. Hülfsarzt der Irrenanstalt zu Hall in Tyrol.
160. - *Pelman*, 2. Arzt der Irrenheilanstalt zu Siegburg.
161. - *Pircher*, 2. Hülfsarzt der Irrenanstalt zu Hall in Tyrol.
162. - *Ch. Roller*, Hülfsarzt der Heil- und Pflegeanstalt Illenau.
163. - *Schasching*, Hausarzt der Irrenanstalt zu Lintz (Ober-Oesterreich).
164. - *Schroeter*, Hülfsarzt des Asyles Schweizerhof.
165. - *Stahl*, Director der Kreis-Irrenanstalt zu Carthaus Prühl bei Regensburg.

---

*) cf. Allg. Ztschr. f. Psych. Bd. XXI. Suppl. S. 66. Bd. XXII. S. 208 u. 450. Bd. XXIV. S. 720. Bd. XXV. Suppl. S. 16.

Bericht

über

die psychiatrische Section der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

zu Innsbruck,

im September 1869.

Die Befürchtung, welche im vorigen Jahre in der Naturforscher-Versammlung in Dresden vielfach laut wurde, dass die diesjährige Versammlung an einem Orte, der so fern von dem Mittelpunkte Deutschlands gelegen ist, wenig zahlreich besucht sein würde, bestätigte sich nicht. Noch bewährt sich die Zugkraft, welche diese Versammlungen gemeinsamer Arbeit auf alle Gauen ausübt und auf keiner dürfte die Zahl der begleitenden Gattinnen und Töchter so gross gewesen sein, als dieses Mal. Die prachtvolle Gegend, die Neuheit der Brennerbahn, die Nähe Italiens waren Reize, die namentlich auf die Bewohner Norddeutschlands ihre Wirkung nicht verfehlten. Dass der Verein deutscher Irrenärzte seine Sitzung während dieser Tage in Innsbruck abhielt, war gerade dem Besuche der psychiatrischen Section nicht wenig förderlich. Dass aber kleinere Universitätsstädte ihre besondere Vorzüge haben, konnte man dort erproben, während es nicht an Localitäten für die grösseren Versammlungen fehlte und für genügend zahlreiche Wohnungen durch die Geschäftsführer gesorgt war. Der Vorschlag, welchen seiner Zeit *Virchow* gemacht, für die allgemeinen Sitzungen in Vorträgen Ueberblicke über die Fortschritte der einzelnen Disciplinen zu gewähren, bewährte sich auch diesmal durch hervorragende Redner.

Die Einführung in die psychiatrische Section hatte Director Dr. *Stolz* übernommen. Als Theilnehmer derselben hatten sich folgende Herren eingefunden:

Dr. *Besser*, Director des Asyles Pützchen bei Bonn.

Digitized by Google

Dr. *Brosius*, Director der Privatanstalt zu Bendorf.
- *Brutzer*, Director des Asyles Rothenburg bei Riga.
- *Dick*, Director der Kreis-Irrenanstalt zu Klingenmünster.
- *Flemming*, Geheimer Medicinalrath zu Schwerin (Mecklenburg).
- *A. Frankl* aus Wien.
- *Gehewe*, Collegienrath und Arzt an der Staats - Irrenanstalt zu Petersburg.
- *Hagen*, Professor an der Universität und Director der Kreisirrenanstalt zu Erlangen.
- *Hoffmann*, Assistenzarzt der Irrenanstalt zu Meerenberg.
- *Huppert*, 1. Assistenzarzt der Landesanstalten zu Colditz.
- *Jolly*, Professor an der Universität zu München.
- *Kahlbaum*, Director der Priv. Irrenanstalt zu Görlitz.
- *Keesbacher* in Laibach.
- *Kelp*, Medicinalrath und Director der Irrenanstalt zu Wehnen.
- *Laehr*, Sanitätsrath und Director des Asyles Schweizerhof.
- *G. Landerer*, Assistenzarzt der Priv.-Irrenanstalt zu Göppingen.
- *Leidesdorf*, Professor an der Universität zu Wien und Director der Priv.-Irrenanstalt zu Ober-Döbling.
- *Lombroso*, Professor an der Universität zu Pavia.

Lorent in Bremen.
- *Mendel*, Director der Privatirrenanstalt zu Pankow bei Berlin.
- *Meschede*, 2. Arzt der Prov.-Irrenanstalt zu Schwetz (Westpreussen).
- *Müller*, Director der Heilanstalt für Nervenkranke zu Blankenburg a. H.
- *Mitterer*, aus Latsch in Tyrol.
- *Nagy*, 1. Hülfsarzt der Irrenanstalt zu Hall.
- *Nasse*, Geh. Medicinalrath und Director der Prov.-Irrenheilanstalt zu Siegburg.
- *Pircher*, I. Hülfsarzt der Irrenanstalt zu Hall.
- *Rienecker*, Hofrath und Professor an der Universität Würzburg.
- *Roller*, Geh. Rath und Director der Heil- und Pflegeanstalt Illenau.
- *Ch. Roller*, Hülfsarzt an der Heil- und Pflegeanstalt Illenau.
- *Schasching*, Hausarzt an der Irrenanstalt zu Linz.

Schlager, Professor an der Universität und Oberamtsarzt zu Wien.

Schroff, Professor an der Universität zu Wien.

Digitized by Google

Dr. *Solbrig*, Hofrath, Professor an der Universität und Director der Kreisirrenanstalt zu München.
- *Stahl*, Director der Kreisirrenanstalt Karthaus Prühl bei Regensburg.
- *Stolz*, Director der Irrenanstalt zu Hall.
- *Wilhelmi*, Kreisphysikus in Salzwedel.
- *Wille*, Director der Irren-Pflegeanstalt Rheinau bei Zürich.
- *Witlacil*, Gerichtsarzt aus Wien.
- *Zinn*, Director der Irrenheil- und Pflegeanstalt zu St. Pirminsberg.

Unter dem Vorsitz der Herren DDr. *Stolz* und *Solbrig* und den Schriftführern Dr. *Brosius* und *Koller* wurden folgende Sitzungen gehalten:

Sitzung am 18. September.

Professor *Lombroso* aus Pavia, Ueber Pellagra in ätiologischer und pathologischer, sowie pathologisch-anatomischer Beziehung mit Vorzeigen von Abbildungen.

In 500 Fällen von Pellagra, welche der Vortragende beobachtete, zeigte sich einige Male ein Dunkelwerden der Haut, oft eine Ungleichheit der Pupillen (bei 24 auf 500); oft auch (bei 13 auf 36) fanden sich Störungen der retina, 11 Mal mit Atrophie der Arterien, 2 Mal mit Atrophie der Papille; 6 Mal war nur im rechten Auge die retina gestört, 3 Mal bestand Degeneration des Pigments. Oft wurde Alkalität des Urins bemerkt. Bei dem pellagrösen Typhus war einige Male Albuminurie vorhanden, dabei das specifische Gewicht des Urins geringer, aber der Quantität nach fast normal. Das Blut zeigte eine grössere Menge Urea im pellagrösen Typhus, was die urämischen Erscheinungen und den ammaciocalen Geruch des Schweisses der Kranken erklären würde. Die Hitze im Typhus stieg bis auf 40 Grad, in vielen Fällen des gewöhnlichen Pellagra nur wenige Striche über 37 Grad, aber das Bemerkenswertheste ist, dass manchmal die Hitze nicht auf beiden Seiten des Körpers gleich war, und wo dieses stattfand, war auch immer Ungleichheit der Pupille und einseitiger Kopfschmerz zugegen. Die Delirien der Pellagrösen zeichneten sich aus durch den Stupor, welcher ein Stillstand, nicht aber Verlust der geistigen Fähigkeiten ist, durch die Erhaltung des Gefühls, durch die Sitophobie, welche sich aus den bei den Versuchspersonen vorgekommenen Erscheinungen erklärt, durch die Intermissionen, die nicht allein

jährlich eintraten, sondern auch Pausen von 3 und 4 Jahren machen, und besonders durch Hydromanie i. e. Sucht ins Wasser zu stürzen. Letztere erklärt sich durch das allgemeine Brennen der Haut, durch Sinnestäuschungen, instinctmässige, blinde Impulse, oft auch durch Handlungen, welche triebartig erscheinen, aber keine Beziehung zum Selbstmorde haben, durch Schwindel, in Folge dessen der Kranke zufällig ins Wasser fällt und der durch den Anblick des Wasserspiegels entsteht, während im Gegentheile die so gewöhnliche Vorliebe für glänzende Gegenstände in allen Schwächezuständen der retina bei Paralytischen der Anlass ist, dass sie zum Wasser und Feuer sich hingezogen fühlen und in's Wasser fallen oder ins Feuer gerathen. Derartige Fälle spielen eine Rolle in der Statistik der Selbstmorde.

Pathologische Anatomie. Bei 53 Sectionen waren 19 Mal Undurchsichtigkeit der pia mater, 14 Mal Oedem, 10 Mal Atrophie des Gehirns vorhanden. Fast alle hatten Atrophie oder Oedem der Lunge.

Unter 44 Fällen von Pellagra in der Lombardei und in Venedig fand Vortragender 4 Mal Tuberkeln, unter 15 pellagrösen ital. Tyrolern 9 Mal. Am Herzen fand sich 9 Mal Hypertrophie, 14 Mal Atrophie, 30 Mal gelbe Färbung mit leichter Zerreissbarkeit der Substanz, 6 Mal Herzbeutelwassersucht, 8 Mal Atherose, 8 Mal Hyperämie der Aorta wie in der Endocarditis.

Unter 27 Herzen, welche hypertrophisch erschienen, hatten 21 weniger als das mittlere Gewicht. 26 Mal gab es fettige Degeneration der Leber, 12 Mal Hypertrophie, 5 Mal Muskatnussleber, 10 Mal braune Atrophie der Leber. Die Milz war 39 Mal hypertrophisch, 9 Mal atrophisch. Die Nieren waren 26 Mal atrophisch, 21 Mal verfettet und 4 Mal mit Cysten versehen.

Bei 17 unter 38 Fällen war Fragilität der Rippen bemerkbar, mehrere Mal zusammentreffend mit Verdickung der Kopfknochen.

Microscopisch zeigte sich 22 Mal unter 25 Fällen Zellengewebswucherung des Herzens, 3 Mal mit heftiger Entartung; 15 Mal unter 27 Fettentartungen des Epithels der Nieren fast immer mit Sclerose des Bindegewebs, 12 Mal fettige Infiltration der Leber, 10 Mal Pigmentirung, 9 Mal eine kalkartige Degeneration, 1 Mal eine aneurysmatische Dilatation der Gehirncapillaren, 5 Mal Pigmentirung des Sympathicus, 1 Mal fettige Degeneration der Zellen der grauen Substanz.

Wenn man Vorstehendes zusammenfasst, findet man, dass die hauptsächlichsten Läsionen sich auf Atrophie und Verfettung einiger Organe beziehen, welche mehr der Innervation des pneumogastric. unterworfen sind. Diese Atrophie hat das Eigenthümliche, dass sie oft bei Personen erscheint, welche nicht marastisch sind, und dass sie mit der Hypertrophie irgend eines anderen Organes zusammentrifft. Die

Digitized by Google

Verfettung, hauptsächlich der Leber, der Nieren, der Gehirngefässe, zeigen eine Analogie mit dem Alkoholismus, und daraus erhellt die beiderseitige Aehnlichkeit in den urämischen Phänomenen in der Pellagra wie in dem sogenannten Typhus des Alcoholismus acutus. Es giebt auch pigmentöse Entartung und diese Pigmentation coincidirt sehr gut mit der mehr braunen Färbung der Haut und der dunkleren Färbung der Blutkügelchen.

Alle diese Störungen lassen sich wohl durch eine chronische Vergiftung erklären, weil sonst alle Gifte (Virus) fettige Entartungen, Atrophie und manchmal Pigmentation der Organe hervorbringen.

Die arsenige Säure heilt das Pellagra der Erwachsenen, das Natrium-Chlorid s. Kochsalz (Clorure de Sodium) das der Kinder; Calomel, Sublimat, Paullinia und kalte Douche die Diarrhoe; unterschwefligsaurer Kalk (Sylphide de chaux) schien in 3 Fällen von Typhus nützlich zu sein, 6 andere Fälle starben. 60 Fälle wurden in der Klinik beobachtet. 20 Mal gelang die Heilung mit diesem Mittel auf den Dörfern, ohne das Regimen zu verändern.

Zur Feststellung der Ursachen der Pellagra hat der Vortragende Experimente angestellt.

Im April 1868 gab er 28 Personen — 15 M., meist Studenten und 13 Frauen — eine aus krankem Mais bereitete Tinctur, in welcher, nach Prof. G. Gibelli's Untersuchung, nichts als zahlreiche Sporen von Penicillum glaucum und Gährungszellen sich nachweisen liessen, in einmaliger Dosis zu 6 Grammen; die genaue Controle der Wirkungen hatte indess kein seinen Erwartungen entsprechendes Ergebniss geliefert. Diese Wirkungen bestanden vorzugsweise in Störungen der ersten Wege, als: Aufstossen, Darmschmerz, Durchfall, Verstopfung, Brennen am After, Magendrücken, bald verminderter, bald vermehrter Esslust. Wenige Individuen klagten über Muskelschwäche und Schmerz in den Gastrocnemien; noch wenigere über Störungen im Nervensystem, über Schläfrigkeit, Kopfweh, gestörtes Sehen, Schwindel, Zahnschmerz, Ohrensausen, Gedankenverwirrung.

Haut-Eruptionen und Schweisse kamen nur ausnahmsweise, wie es schien, bei 1 oder 2 vor; nur bei 3 Verminderung des Körpergewichts. 11 endlich von den 28 zeigten nicht die geringste Spur von der Einwirkung des Giftes.

Es fehlen mithin die charakteristischen Symptome der Pellagra, und der Nachweis, dass kranker Mais das eigentliche Pellagrosum sei, war durch seine Experimente nicht geliefert.

Um in's Klare zu kommen, wurden die Versuche also nochmals im Juli 1869, wiederholt, und zwar an weniger gut genährten Individuen. Es waren ihrer 12, theils Krankenwärter, theils Handarbei-

Digitized by Google

ter und Soldaten, denen eine lange Zeit hindurch täglich eine Dosis von 6 Grammen Mais-Tinktur verabreicht wurde.

Nun stellte sich folgendes Resultat heraus:

2 Individuen von den 12 zeigten sich unempfindlich. Unter den übrigen 10 hatten 9 einen übermässigen Appetit, dennoch war das Körpergewicht nur bei Einem, der täglich 1 Pfd. Brod mehr als gewöhnlich ass und bei einem Andern, bei dem eine alte Psoriasis sich besserte, vermehrt (2–3 Kil.); bei 8 dagegen um 2—7—10 Kilo's vermindert. Bei einem, übrigens kräftigen Individuum zeigte sich eine wirkliche akute Vergiftung, Erweiterung der Pupillen, Ohnmacht und profuse Diarrhoe.

Abgesehen von den, wie in den Experimenten vom vorigen Jahre hervortretenden Störungen der ersten Wegen, herrschten zunächst die Hauterscheinungen, als: Jucken, Kriebeln (pizziccature), Abschuppung, Ephelis etc. vor und darnach erschienen die ernstern nervösen, als: Pupillen-Erweiterung, Ptosis palpebr., Schlafsucht, lebhaftes Wohlgefallen am Anblick von Wasser und Verlangen sich hineinzustürzen, Kopfweh, Schwindel, weinerliche Stimmung ohne Grund.

Daneben waren zwei andere Symptomenreihen zu bemerken, deren eine für eine Wirkung auf das Herz sprach, während die andere speciell den Nieren zukam, nämlich: a) die Ohnmachten, das Herzklopfen, die zuerst vermehrte, dann verminderte Pulszahl; b) das höhere specifische Gewicht und die Abnahme der Menge des Urines und dunklere Färbung.

Endlich war noch äusserst rasch eintretende Abmagerung und starke Abnahme des Körpergewichtes hervorzuheben.

Alle diese zum Theil sich stark widersprechenden Symptome dürften sich in Eine Gruppe zusammenfassen lassen, die auf Intoxication des Nerven, namentlich des Ganglien-Nervensystems beruht.

Die Aehnlichkeit jener Symptome mit denen der Pellagra wird Einem erst klar, insbesondere wenn man, wie der Vf., die Krankheit 3 Jahre lang an ihren Brutstätten in Tyrol, Venetien und der Lombardei beobachtet und Symptome kennen gelernt hat, die in den Büchern wenig vorkommen, — wie der Puritus bei allen Pellagrosen im Beginn des Leidens, die Somnolenz und die Ptosis (16 Mal unter 472 Fällen).

Der langsamere oder raschere Verlauf der Vergiftung kommt auch bei den Pellagrosen vor, wo der akute Zustand Typhus pellagrosus heisst. Auch der auffällige Widerspruch in den Symptomen (Gefrässigkeit und Appetitlosigkeit, Schlafsucht und Schlaflosigkeit etc.) der Versuchspersonen findet sich bei manchen Pellagrosen und erklärt sich aus der primären oder secundären Wirkung des Giftes, sei es,

Digitized by Google

dass man nur die eine oder die andere zu beobachten Gelegenheit hat, oder dass in gewissen Individuen die eine vor der anderen prävalirt.

Dass einige Pellagra-Symptome, z. B. der Schulterschmerz, der epileptoide Anfall fehlten, erklärt L. aus der geringen Anzahl der bis jetzt angestellten Experimente.

Die Versuche zur Zerstörung der giftigen Beschaffenheit — welche übrigens nicht allein an dem Penicillum, wie *Balachini* gemeint, sondern an dem ganzen Parenchym des verdorbenen Maises hafte — ergaben, dass kochendes Wasser und Alkohol von 100° C. ebenso wenig wie leichtes Rösten des Maises über offenem Kohlenfeuer die giftige Wirkung aufhoben, wohl aber eine Temperatur des Wassers von 120° C. bei einem Zusatz von 20 Grammen Kalk zu 1 Kilo Mais und nachherigem Rösten im Ofen den Gebrauch des Mehles unschädlich machten.

Sitzung am 20. September.

Professor *Solbrig*, Ueber die Beziehungen des *Morb. Basedow* zu psychischen Erkrankungen unter Mittheilung einiger Fälle.

Ausführlicher wird derselben im nächsten Hefte dieser Zeitschrift erwähnt werden.

Geheime-Rath Dr. *Nasse*, Ueber Typhus und Irresein.

Der Vortragende spricht über die Beziehungen zwischen Typhus und Irresein, indem er zunächst mit Rücksicht auf die früheren Beobachtungen von *Schlager*, *Mugnier* u. A. die Geistesstörungen näher charakterisirt, deren Ursprung sich auf eine erlittene Typhuserkrankung mit Sicherheit zurückführen lässt. Er unterscheidet diejenigen Geistesstörungen, die sich zugleich mit dem Typhusprocess als Melancholie oder Manie entwickeln, oder auch als Fortsetzung der Typhusdelirien nach dem Ablauf des Fiebers in einzelnen Wahnvorstellungen zurückbleiben, sämmtlich aber rasch in Genesung überzugehen und deshalb nur selten Gegenstand der Beobachtung in den Irrenanstalten zu werden pflegen, von denjenigen, welche erst nach der Genesung vom Typhus entstehen. Diese letzteren treten entweder sofort mit dem Schwinden des typhösen Fiebers in die Erscheieung, oder es geht ihnen eine mehr oder weniger längere Zeit der Incubation, charakterisirt durch Veränderung in dem ganzen geistigen Verhalten, durch erhöhte Gemüthsreizbarkeit und geistige Schwächung voraus, bis durch Hinzutreten anderer zufälliger Gelegenheitsursachen die

Digitized by Google

vollendete Psychose eintritt. Aus einem Beobachtungsmaterial von 2000 Fällen binnen 6 Jahren hat er in Siegburg 43 durch Typhus unzweifelhaft herbeigeführte Erkrankungen constatirt, von denen der grösste Theil der ersten Categorie angehörte. Im Gegensatze zu früheren Beobachtungen hat er eine grössere Zahl von Erkrankungen in der Form primärer Psychosen (Manie oder Melancholie) beobachtet, stets mit starker Oligämie und günstigem Ausgange verbunden, dann aber auch die gewöhnliche Form des Verfolgungswahnsinns mit Hallucinationen des Gehörs, weniger des Gesichts, in den meisten Fällen constatirt, und endlich das sofortige Auftreten in der Form geistiger Schwäche, nie jedoch des paralytischen Irreseins wahrgenommen, beide letzteren Formen stets mit ungünstigem Ausgange. Mit *Griesinger* glaubt er, den pathologischen Hirnzustand dieser Fälle fast immer als Anämie bezeichnen zu müssen; nur in wenigen Fällen hat er deutliche Hirnhyperämie constatiren können, und versucht nach den Untersuchungen von *Huffmann* (über die Veränderungen der Organe beim Typhus) eine Erklärung für die pathologischen Processe bei den verschiedenen Formen der Psychose zu geben.

Im zweiten Theile seines Vortrages behandelt *Nasse* den Einfluss des Typhus auf schon bestehende Geistesstörungen, den er nach seinen in der Heilanstalt Siegburg bei einer mehrjährigen schweren Epidemie des Abdominal-Typhus gemachten Erfahrungen entschieden für einen günstigen zu halten sich berechtigt glaubt. Von 23 Irren, die zum Theil an schweren Formen, sogar mit paralytischen Symptomen, litten, erfuhren durch den Typhus 10 Fälle völlige geistige Genesung, fünf Fälle dauernde, 2 andere eine nur vorübergehende Besserung, und nur in 6 blieb der Typhusprozess ohne bemerkbaren Einfluss (die nähere Mittheilung der Krankheitsgeschichten, von denen er nur Skizzen vorführt, behält er sich in einem Fach-Journale vor). Die psychische Genesung erfolgt nach seiner Beobachtung mit dem Nachlass des Fiebers, und die Erklärung dafür sucht er wesentlich in der Beseitigung der vorher bestandenen Hyperämie und seröser Infiltration des Gehirns. Unter allen intercurrenten Krankheiten, schliesst er, sei dem Typhusprocess bei weitem die günstigste Einwirkung auf die Psychose zuzuerkennen.

In der darauf folgenden Diskussion dreht sich die Debatte vorzugsweise um die Fragen, in welchem Stadium der Krankheit die günstige Wirkung des Typhus einzutreten pflege, ob diese der durch den Typhus beseitigten Hirnhyperämie oder der dem Typhus folgenden Revolution des Stoffwechsels zukomme.

Digitized by Google

Sitzung am 21. September.

Dr. *Meschede*, Ueber das Vorkommen von Helminthen-eiern im Gehirn des Menschen mit Vorzeigen von Abbildungen.

Redner hat die genannte Anomalie bei der Obduction eines 14jährigen epileptischen und geisteskranken Mädchens im Mai dieses Jahres constatirt. Dieser Befund bietet ein dreifaches Interesse dar: ein pathologisch-anatomisches, ein zoologisches und psychiatrisches.

Redner beschreibt zunächst die von ihm gefundenen, schon mit unbewaffnetem Auge und mit dem Finger zu constatirende pathologisch-anatomische Veränderung. Dieselbe war in dreifacher Weise vorhanden:

a) Mitten in der Medullarsubstanz des grossen Gehirns fanden kleine rundliche und zapfenförmige Verhärtungen, welche sich auf dem Durchschnitt als weiche und glatte hügelige Erhabenheiten präsentirten und bei weiterer Präparation einen härteren c. stecknadelkopfgrossen Kern erkennen liessen.

b) Ausser diesen kleineren Verhärtungen befanden sich solche von viel grösserem Umfange und Härte in der Hirnrinde, jedoch nicht auf graue Substanz beschränkt, sondern auch die subcorticalen Marklager betreffend. Dieselben waren schon deutlich wahrzunehmen, wenn man mit dem Finger tastend die Oberfläche der Hemisphären berührte, zeigten eine bedeutende Härte, waren stellenweise fast knorpelhart zu schneiden. Auf dem Durchschnitt erschienen die betreffenden Partieen der Corticalis entfärbt, etwas glänzend und liessen im Centrum (unterhalb der grauen Corticalisschicht) eine auffallende, durch Gefässentwicklung und Injection bedingte Röthung wahrnehmen. Diese verhärteten Knoten hatten auf der Durchschnittsfläche eine Ausdehnung von ca. 1 Ctm. und waren in einer grossen Anzahl vorhanden (circa 10).

c) Der dritte Ort, an welchem eine analoge Veränderung constatirt wurde, war die Oberfläche und oberflächliche Schicht des Corpus striatum in dem einen Ventrikel. Es zeigten sich hier nämlich circa linsengrosse Knötchen von grauer Farbe, welche von weichem Ependym bedeckt waren und einen derberen resistenteren Kern erkennen liessen. Mehrere derselben waren zu einem grösseren oder kleineren Theile verkalkt.

Die mikroskopische Untersuchung dieser Verhärtungen, namentlich der innneren, den Kern dieser Verhärtung bildenden Masse ergab nun die Anwesenheit von ovalen, gelb-bräunlichen, theils einfach, theils doppelt contourirten Gebilden, welche schon auf den

Digitized by Google

ersten Blick als Helmintheneier zu erkennen waren. Sie fanden sich sowohl in den kleinen Knötchen der Medullarsubstanz, als auch in den grösseren gliomatös verhärteten Knoten der Gehirnrinde und ebenso in denjenigen an der Oberfläche des Corp. striatum.

Es werden vom Vortragenden die entsprechenden Zeichnungen dieser Befunde demonstrirt und eingehender erläutert. Es ergiebt sich aus demselben eine grosse Aehnlichkeit, z Th. vollständige Uebereinstimmung mit den Eiern von Botryocephalus latus. Insbesondere charakteristisch ist die Abbildung eines Eies, welches deutlich den für Botryocephalus latus charakteristischen Deckelapparat von dem einen Pol-Ende erkennen lässt.

Redner geht hierauf zur Erörterung der Entwicklungsgeschichte der Bandwürmer und insbesondere auf diejenige des Bothr. lat. über und zeigt, dass sich die von ihm constatirten Thatsachen in vollster Uebereinstimmung mit demjenigen befinden, was wir bis jetzt über die Entwicklungsgeschichte des Bothriocephalus latus wissen. Bekanntlich ist bis jetzt ein finnenartiger Zustand, wie man ihn von der Taenia kennt, in der Entwicklungsgeschichte des Botr. latus unbekannt. *Knoch* hat eine Reihe interessanter Versuche hierüber angestellt und vor einigen Jahren publicirt. Er hat die Eier und 6 hakigen Embryonen vom Bothrioceph. lat. in verschiedene Organtheile anderer Thiere gebracht, u. A. auch in das Gehirn — hat aber niemals eine weitere Entwickelung constatiren können — vielmehr gefunden, dass die Eier eine lange Zeit unverändert blieben und dass demnächst ein gewisser Zerfall ihres Inhalts eintrat.

Diese Resultate *Knoch*'s befinden sich mit dem Befunde des vorliegenden Falles in auffallender Uebereinstimmung — was vom Vortragenden im Speciellen noch näher dargethan wird.

Vom klinisch - psychiatrischen Gesichtspunkte ist hervorzuheben, dass die Kranke seit ihrem 6. Jahre an Krampfzufällen (anfangs Veitstanz, dann Epilepsie) gelitten hat, dass ihr damals nach Wurmmitteln Spulwürmer abgegangen sind und dass auch der Vater und zwei andere nahe Blutsverwandte von Epilepsie heimgesucht sind. Die Kranke wohnte im Weichselgebiete, in einer Stadt mit günstigen Trinkwasser-Verhältnissen. Die Psychose zeigte sich durch mässig starke Aufregungsparoxysme, grosse Schwäche der intellectuellen Vermögen, namentlich grosse Gedächtnissschwäche, plötzliches Verlieren des Fadens des Gespräches, ferner durch comatöse Zustände und eine gewisse erotische Aufregung, endlich auch durch einzelne krankhafte Special-Triebe, namentlich durch Stehltrieb. Ein Special-Delirium war nicht vorhanden.

Vf. ist der Ansicht, dass die aon ihm gefundene und geschilderte

Digitized by Google

Abnormität häufiger gefunden werden dürfte, nachdem einmal die innere Natur der in Rede stehenden knotigen Verhärtungen erkannt sei.

Dr. *Brosius*, Ueber das Sichentkleiden der Geisteskranken.

Der Vortragende möchte die Ansicht der Section darüber hören, was geschehen könne und müsse in Fällen, wo Geisteskranke sich entkleiden. Man erinnere sich der Abhandlung Dr. *Sheppard*'s im Journal of Mental Science (April 1867), „über die Behandlung gewisser zerstörender Kranken." Seine Ansicht, dass man solche, die ihre Kleider und Betten zerstören, nackt in der (übrigens wenn nöthig geheizten) Zelle lassen dürfe, erfuhr sowohl bei den Commissioners in Lunacy, als im Journ. of Mental Science Widerspruch und Missbilligung. Ohne behaupten zu wollen, dass jene Praxis in allen Fällen die richtige sei, glaubt Vf., dass sie es in manchen Fällen ist und ganz dem Geiste und Wesen des zwanglosen Systems entspricht.

Es wurde ihm ein junger, kräftiger Pat. zugeführt, der nach einer vor mehreren Monaten erlittenen Kopfverletzung geisteskrank geworden. In Gegenwart seiner zwei Begleiter, die eine sehr ängstliche und beschwerliche Reise mit dem „ganz tobsüchtigen und rasenden" Kranken gemacht hatten — entledigte sich dieser, in seinem Zimmer, auf dem Sopha, seiner Kleider bis auf das Hemd, schleuderte sie schimpfend fort und stiess erbittert seine Begleiter zurück, die ihn tadelnd am Entkleiden hindern wollten. Pat. wähnte, dass seine Kleider mit Morphium imprägnirt seien, dass man ihn vergiften wolle, dass auch seine Begleiter, die er in lauter Erbitterung „Hallunken" und „schlechte Kerle" nannte, in dem Complotte gegen ihn verwickelt seien. Er suchte in ängstlichen Aeusserungen Schutz bei Vf., und der gewann sofort sein Vertrauen dadurch, dass er ihm gestattete, es sich auf dem Sopha bequem und behaglich zu machen. Aus Furcht vor Vergiftung litt der Kranke unsäglichen Durst, er stillte ihn bei Vf., nach längerer Abstinenz zum ersten Male.

Seine Furcht vor den eigenen Kleidern, vor dem Bettzeuge, vor Speise und Trank wiederholte sich bei dem paralytischen Kranken öfter; er litt dann an unsäglicher Angst, er äusserte eine grosse Erbitterung gegen seine imaginären Feinde. Gehörs-, Geruchs- und Gefühlstäuschungen waren unverkennbar. In diesem Falle hielt Vf. es für unmöglich und grausam zugleich, den Kranken an dem Entkleiden zu hindern oder ihm, wenn entkleidet, die Kleider und das Bettzeug aufzuzwingen. Nach unliebsamen und gefährlichen Balgereien mit den Wärtern hatte man den Kranken durch irgend ein Hinderniss mechanischer Mittel nur in grössere Angst und Erbitterung hineingesteckt.

Digitized by Google

So glaubt Vf., der mit dem krankhaften Zustande und dem Charakter bekannt ist. Vf. liess ihn nackt und ersetzte die Kleidung durch die geheizte Zelle. Nach 2 oder 3 Tagen verlor sich seine Angst vor Bekleidung, Bedeckung und Nahrung.

In einem zweiten Falle entkleidete sich eine hysterisch-irre Dame, 8—14 Tage lang, manchmal unter erotischen Aeusserungen. Sie hatte eine eigene Wärterin, die nicht müde wurde, sie am Entkleiden zu hindern oder wieder anzukleiden, dem sie einen erheblichen Widerstand auch nicht entgegensetzte.

Aber ihre Neigung blieb. Endlich trug *Brosius* der Wärterin auf, die Kranke, wenn sie sich wieder entkleide, auf dem verschlossenen Zimmer ihrer Nacktheit zu überlassen und sich nicht um sie zu bekümmern. Pat. blieb einige Stunden lang nackt, zog sich dann von selbst wieder an und hatte von diesem Tage an die Lust, sich zu entkleiden, verloren. Er denkt sich, dass ihre Marotte verschwand, sobald sie wahrnahm, dass man ihr keine Bedeutung mehr beilege.

In einem dritten Falle, der einen jungen Maniacus betraf, zeigte sich hartnäckiges Zerreissen und Zerstören der Kleidung, der Betten und des Bettzeuges. Er duldete nichts, als einen Strohsack, den er verschonte, und aus und in dem er sich sein Lager selbst bereitete. Unter den nöthigen Vorsichtsmaassregeln überliess Vf. ihn seiner Neigung und seinem Treiben, durch welches manchmal die Idee blickte, dass Pat., Soldat, sich abhärten und stählen wolle. Nach und nach kehrte er zu gesunden Gewohnheiten zurück und er war nach etwa 5 Monaten geheilt und blieb es, ohne sich seines früheren Zustandes zu schämen, den er als einen krankhaften, Niemandem verschwieg.

Vortragender glaubt also, dass man, ganz im Sinne des N.-R.-Systems, in gewissen Fällen das Sichentkleiden der Geisteskranken gestatten darf, und dass man sich, in ihrem Interesse und zu ihrem Besten, sich nicht in diese ihre specielle Neigung hindernd oder beschränkend mischen soll. Er behalte sich vor, demnächst mit Rücksicht auf die Abhandlungen im Journal of Mental Science weitere Notizen über diese Frage in der Allg. Zeitschrift für Psychiatrie zu veröffentlichen.

In der diesen Vortrag sich anlehnenden Diskussion schliessen sich der Ansicht des Redners an: *Meschede, Stolz, Nasse, Solbrig. Wille* bemerkt, er habe den Trieb des Sichentkleidens immer auf die eine oder andere Weise beseitigen können. *Mendel* glaubt, das Sichentkleiden zulassen zu müssen, wo, wie in öffentlichen Anstalten, nicht genügendes Wartpersonal zur Verhütung vorhanden sei, während jenes in Privatanstalten in ausreichender Zahl existire. *Brosius* replicirt, dass er es in einem Falle, wo Wächter zur Disposition standen, es für grausam gehalten hätte, dem ängstlichen Kranken, die Kleider aufzu-

Digitized by Google

zwingen. *Hagen* hat auch bei weiblichen Kranken keine Nachtheile vom Sichentkleiden gesehen.

Sitzung am 22. September.

Dr. *Kahlbaum*, Klinische Mittheilung.

Der Vortragende spricht über eine besondere, aus anderen Formen sich ergebenden Irreseinsform, die sich frühzeitig durch motorische Erscheinungen mit dem Charakter der Spannung auszeichnet, während Lähmungen nicht beobachtet werden. Psychischer Seits findet sich vorwiegend das Bild der Melanch. c. stupore, die später als die Motilitätsstörungen auftritt. Specifische anatomische Befunde sind nicht nachgewiesen; doch war Trübung der Arachnoidea an der Basis sehr häufig, namentlich des Blattes zwischen Pons und Chiasma. Redner giebt dieser von ihm ausführlich beschriebenen Form den vorläufigen Namen: Spannungs-Irresein.

Dr. *Keesbacher*, Zur Casuistik.

Der Vortragende berichtet einen Fall von hereditärem Irresein, der nach vorgängigen Störungen exaltativen Charakters mit gleichzeitiger Syphilidophobie, nach einer 30tägigen Hungerkur, zu der Patient durch die Furcht vor Syphilis veranlasst wurde, zur Tobsucht sich gestaltete. Dem Krankenhause gegen die Ansicht des Arztes im Zustande anscheinender Besserung entnommen, nahm Pat. wieder eine amtliche Stellung, sogar mit Beförderung, ein. Nach längerer Remission begannen wieder die exaltativen Erscheinungen des ersten Stadiums der Krankheit mit gehässigem und anklägerischem Vorgehen, auch Verfassung einer Broschüre gegen den Arzt des Krankenhauses. Redner fragt, was er, der Angegriffene, in diesem Falle, bei den Lücken der Irrengesetzgebung, für Schutzmittel habe. Aus der folgenden Diskussion (*Besser*, *Dick*, *Solbrig*) ergab sich, dass Niemand in der Section an der Fortdauer der Geistesstörung des Anklägers zweifelt, und tröstet Dr. *Dick* den Redner damit, dass solche Vorfälle zu den Leiden der Männer gehören, die Geisteskranke behandeln und mit ihnen umgehen müssen. Dr. *Brosius* bittet den Redner um eine ausführliche Geschichte dieses Falles für die Allg. Zeitschrift für Psychiatrie, welche zugesagt wird.

Das Tageblatt giebt noch von nachfolgenden Vorträgen Kunde, welche für die Psychiatrie von Interesse sind:

Digitized by Google

Zweite allgemeine Sitzung.

Professor *Leidesdorf*, Ueber das Verhältniss der Gesellschaft zu den Geisteskranken und die Mittel, dem Ausbruche der Geistesstörung vorzubeugen.

Nach einer gegebenen Einleitung über den heutigen Standpunkt der Psychiatrie, fasst der Redner das Verhältniss der Gesellschaft und der Familie zu ihren Geisteskranken näher ins Auge und spricht sich dahin aus, dass die Gefahren und Leiden, welche der Gesellschaft oder der Familie von Seite der Geisteskranken drohen, sich nicht auf die sogenannten gemeinschädlichen Irren beschränken, sondern dass es eine ganze Kategorie von Kranken giebt, die ihre Wahnvorstellungen und krankhaften Impulse zu verbergen wissen, wahre Simulanten geistiger Gesundheit, und die nur im Kreise ihrer Angehörigen sich rückhaltslos ihrem krankhaften Zustande hingeben.

Er betont ferner, dass diese Form von Seelenstörung früher häufig verkannt, und erst in neuerer Zeit besser studirt wurde, und hebt den Werth hervor, den die Erkenntniss dieses eigenthümlichen Zustandes zur Rechtfertigung der Kranken, zum Schutze der Familie gewährt; er findet ferner in der psychiatrischen Ausbildung der Aerzte und in der anzustrebenden Aufklärung der Bevölkerung über Geisteskrankheiten den besten Schutz der Gesellschaft gegen die Irren.

Hierauf geht Redner zur Besprechung der Mittel über, welche zur Verminderung der Zahl der Geisteskranken geeignet erscheinen dürften. — Diese Mittel sieht der Redner theilweise in der Hebung des öffentlichen Gesundheitswohles und der sittlichen Ausbildung der Bevölkerung, welche nur durch eine gut geleitete Selbsthülfe erzielt werden können; — mit Vermehrung des Volkswohlstandes, besserer Kost, Kleidung und vor allem Wohnung, werden wenigstens die Grundbedingungen leiblicher und geistiger Gesundheit erfüllt sein. Mit einer gesundheitsgemässen Wohnung beginne erst ein sittlicheres Familienleben und damit die Verminderung einer hochbezifferten Ursache psychischer Erkrankung — des Trunkes.

Ein weiteres Moment, die Erblichkeit der Geisteskrankheit, kann durch Selbsthülfe der Gesellschaft bedeutend vermindert werden, wenn Heirathen geisteskranker Individuen vermieden werden. Dies gilt namentlich von Schwachsinnigen und Epileptischen.

Ein letztes vom Redner hervorgehobenes Mittel wäre endlich eine bessere Volks- und Privaterziehung, die in dem Beispiele eines gut geleiteten Schulunterrichtes, vor Allem aber in dem ernsten Studium der Naturwissenschaften bestehen soll.

Redner kommt zu dem Schlusse, dass der menschlichen Gesell-

Digitized by Google

schaft noch viele Mittel zu Gebote stehen, die Zahl der Geistesstörungen zu verringern, und dass die höhere Cultur die Wunden zu heilen berufen ist, die ein niederer Grad der Civilisation dem Menschengeschlechte geschlagen hat.

Section für Anatomie und Physiologie.

Professor *Funke*, Zur Nervenchemie.

Der Vortragende macht die Mittheilung, dass zur Darlegung der Entwicklung von Säure im thätigen Nerven sich das für enorm verdünnte Säuren höchst empfindliche Cyanin als Reagens sehr gut eigne. Die Cyaninlösung entfärbe sich völlig, wenn man einen am Plexus durchschnittenen und hierauf tetanisirten Ischiadicus des Frosches zerschneide und in selbe lege, während der zweite Nerv des Thieres, der nicht gereizt wurde, die Lösung nicht verändere.

Prof. *Heidenhain* erwiedert, es sei bei dieser Art des Versuches die Möglichkeit einer Imbibition von im Muskel gebildeter Säure nicht ausgeschlossen, so lange der Nerv mit den Muskeln in Berührung sei, es gäbe überdies auch andere Substanzen, die durch den geringsten Ozongehalt Cyanin entfärben.

Er halte daher Lacmus für sicherer. Die Säurebildung habe er jedoch durch Lacmus im Nerv weder beim Absterben, noch beim Reizen nachweisen können; dagegen vermochte er, eine sehr rasche Säurung der grauen Substanz des Gehirns auf frischen Schnitten, sowie auch beim Absterben durch Lacmus zu constatiren, während die Reaction von der Marksubstanz nicht hervorgebracht wurde.

Prof. *Funke* giebt an, er habe die Säurebildung auch durch Lacmus constatiren können.

Prof. *Valentin* macht die Priorität der Einführung dieses Reagens für seinen verstorbenen Freund *Schönbein* geltend und giebt an, dass er schon früher in seiner Arbeit über Wärme-Entwicklung in Nerven die Entwicklung von Säure in Muskeln und Nerven dargethan habe.

Prof. *Golz*, Ueber das Organ für Erhaltung des Gleichgewichts bei Thieren.

Der Vortragende demonstrirt zwei Tauben, an der einen waren die halbzirkelförmigen Kanäle des Gehörgangs theilweise, an der anderen ganz zerstört worden. Die Thiere konnten nur schlecht ihr Gleichgewicht erhalten, besonders aber den Kopf nicht ruhig und nicht aufrecht halten. Da das Gehirn sonst unverletzt war, so konnte geschlossen werden, dass im Acusticus ein Organ zu erblicken sei, das der Erhal-

Digitized by Google

tung des Gleichgewichtes diene. Die Ursache der durch die Operation gesetzten Erscheinungen sucht *Goltz* in einem Schwindelgefühl, da die Thiere ruhig trinken und den Kopf eine Zeit lang ganz ruhig halten, wenn ihm irgend eine Stütze geboten wird. Er bemerkt jedoch, dass er sich das Unbefriedigende dieser Erklärung nicht verhehlen könne.

Dr. *Gruber* bemerkt hierzu, dass ähnliche Erscheinungen bezüglich der Kopfhaltung auch bei Ohrenkrankheiten zu beobachten seien. Jedoch habe er bei einem Manne mit völliger Zerstörung des Gehörorganes keinerlei Symptome constatiren können, wie sie die beiden Thiere boten. Er bezweifelt somit die Richtigkeit der Ansicht, dass dieselben von der Zerstörung des Gehörorganes herrühren.

Prof. Dr. *Goltz* antwortet: Die einseitige Zerstörung des Gehörorganes würde wohl das Nichteintreten des bewussten Symptomencomplexes erklären.

Prof. Dr. *Rüdiger* glaubt darauf aufmerksam machen zu müssen, dass bei der Durchschneidung der häutigen Bogengänge des Acusticus, welcher über die Grenzen der Säckchen und Ampullen nicht hinausgeht, wesentlich durch Abfluss der Labyrinth-Flüssigkeit alterirt werde.

Dr. *Oellacher* macht darauf aufmerksam, dass vom unteren Kern des Facialis, auf Schnitten durch die untere Brücken-Region, zum Acusticus ein nicht unbeträchtliches Bündel von Fasern ziehe, um sich dem letzteren zuzugesellen. Es sei allerdings denkbar, dass diese Fasern in der Portio intermedia Wrisbergii wieder sich dem Facialis zugesellen, allein das sei durch nichts bewiesen; es wäre daher denkbar, dass diese Fasern eine eigenthümliche Bedeutung hätten, in der vielleicht ein Schlüssel zur Erklärung wenigstens der am Kopfe des Thieres zu beobachtenden Erscheinungen zu finden wäre.

Prof. Dr. *Bernstein*, Ueber den Einfluss des constanten Stromes auf das Herz.

Dass der constante Strom, durch das ausgeschnittene Froschherz geleitet, die Pulsationen desselben beeinflusst, ist schon von *Heidenhain* gezeigt worden. Er beobachtete, wenn der Strom von den grossen Gefässen zur Herzspitze gerichtet war, eine bedeutende Zunahme der Pulsfrequenz. In meinen Versuchen habe ich dies meistens bestätigt gefunden, doch traten auch Fälle ein, in denen ein aussetzender Puls mit verminderter Frequenz zu beobachten war. Namentlich giebt der aufsteigende Strom eben so häufig verlangsamte wie beschleunigte Pulsation. Diese Inconstanz der Erscheinungen veranlasste mich, die Versuche am unversehrten ausgeschnittenen Herzen zunächst fallen zu lassen und mich zu den folgenden Versuchen zu wenden.

Das Herz wurde mit Zurücklassung des Hohlvenensinus herausge-

Digitized by Google

schnitten und zwischen unpolarisirbare Electroden in geeigneter Weise gelegt, so dass der Strom von der Schnittgrenze zur Spitze oder umgekehrt fliessen konnte. Dieses Präparat macht, wie uns die *Stanniusschen* Versuche gelehrt haben, vor Reizen geschützt, keine spontanen Pulsationen mehr. Sobald aber der Strom geschlossen wird, fängt das Herz an, regelmässige Pulsationen auszuführen, die sofort wieder vollständiger Ruhe Platz machen, sobald man den Strom öffnet. Dies geschieht sowohl, wenn der Strom vom Atrium zum Ventrikel (den ich absteigenden Strom nennen will) geht, als auch bei der umgekehrten Richtung (aufsteigender Strom). Aber die Art der Erscheinung ist bei beiden Stromesrichtungen eine durchaus verschiedene, und diese Verschiedenheit betrifft den Rhythmus der Pulsation.

Lässt man den Strom vom Atrium zum Ventrikel gehen, so entstehen nur Pulsationen, die im Atrium beginnen und sich auf den Ventrikel fortpflanzen. Fliesst dagegen der Strom vom Ventrikel zum Atrium, so beginnt jede Pulsation im Ventrikel und die Contraction des Atriums folgt der Ventrikel-Contraction hinterher. Zwischen je zwei Pulsen liegt bei Anwendung nicht allzu starker Ströme eine deutliche Diastole.

Es lässt sich beweisen, dass diese Erscheinungen nur vom constanten Strome und nicht vom Schliessungsreiz abhängen.

Prof. *Hermann*, Ueber Krämpfe durch venöse Stauung im Gehirn hervorgerufen.

H. sagt, dass Mangel an arterieller Zufuhr zum Gehirn Krämpfe erzeugt, die denen bei der Erstickung ähnlich sind, sei schon früher auf eine Störung im Gaswechsel als Grund zurückgeführt worden. Eine ähnliche Störung des Gaswechsels müsse nun auch bei venöser Stauung auftreten. *Hermann* comprimirte nun beide *Cavae superiores* des Kaninchens und später auch die *Cava inferior* noch dazu. Convulsionen traten aber erst ein, wenn er die 3 *Cavae* comprimirte, sobald die Compression der Inferior über die Einmündung der Renalis hinauf gelegt war.

Prof. *Haidenhain*, Ueber eine eigenthümliche Einwirkung des Nervensystems auf die Körpertemperatur.

Gelegentlich eines Vergleiches der Wärme des arteriellen Blutes und des Gehirnes bei Reizung sensibler Nerven stellte sich heraus, dass durch den letzteren Vorgang eine schnelle Erniedrigung der Temperatur des arteriellen Blutes herbeigeführt werde. In Folge dieser Beobachtung hat der Vortragende mit den Herren *stud. A. Heimann* und *E. Remak* die Temperatur an verschiedenen Orten des Körpers

Digitized by Google

(*Vena iliaca communis*, *Vena cava inferior* in ihrer ganzen Länge, Zweige der *Vena hepatica*, rechtes und linkes Herz, Mastdarm, Bauchhöhle) bei (electrischer, mechanischer, caustischer) Reizung sensibler Nerven an curarisirten Hunden untersucht und constant eine schnell (in ¼—1 Min.) eintretende Herabsetzung der Temperatur (um 0,1—0,5° C.) beobachtet. Nach aufgehobener Reizung geht die Temperatur wieder in die Höhe, in der Regel viel langsamer, als sie gefallen. Denselben Effect hat Reizung des verlängerten Markes durch electrische Ströme oder durch Athmungssuspension. Die Temperatur-deprimirende Wirkung der Empfindungsnerven wird nicht verhindert durch Trennung des verlängerten Markes von den darüber gelegenen Hirntheilen, dagegen aufgehoben nach Trennung desselben vom Rückenmarke. Danach muss das verlängerte Mark als das die betreffende Wirkung vermittelnde Centrum angesehen werden. — Bei der Reizung der Empfindungsnerven treten bekanntlich erhebliche Circulationsänderungen ein: Beschleunigung oder — bei intacten *Nn. vagi* — Verlangsamung des Herzschlages, Krampf der kleinen Arterien, in Folge dessen Drucksteigerung in den grossen Arterien, Verlangsamung des Blutstromes in den Capillaren und Venen. Diese Aenderungen des Kreislaufes sind nicht die Ursache der Temperatur-Erniedrigung, denn: 1) wenn man den capillären und venösen Blutlauf durch Reizung des peripheren Vagus-Endes oder durch ergiebige Blutentziehung verlangsamt, findet nicht Herabsetzung, sondern Steigerung der Temperatur in den Venen statt; 2) die in Rede stehende Erscheinung tritt auch in Körpertheilen ein, deren Kreislauf durch vollständigen Verschluss der zuführenden Arterien aufgehoben ist; 3) fiebernde Thiere zeigen bei Reizung der sensibeln Nerven dieselbe Kreislaufsänderung, aber keine Temperaturherabsetzung, vielmehr meist eine geringe Steigerung.

Die Temperatur-Erniedrigung hat ihre Ursache nicht in beschleunigter Abkühlung durch Haut und Lungen, denn sie wird beobachtet 1) an Thieren, die in Wattdecken eingehüllt oder ganz und gar in ein Bad von 37° C. versenkt sind, 2) während der Athmungssuspension, die bekanntlich das verlängerte Mark stark reizt.

Die Temperatur-Erniedrigung kann auch nicht von verminderter Wärmebildung herrühren. Nach dem Tode nämlich sinkt die Temperatur im Innern des Körpers, z. B. in der unteren Hohlvene, äusserst langsam. Wird der Hinterkörper eines lebenden Thieres unter die Abkühlungsbedingungen eines todten gesetzt durch Aufhebung des Kreislaufes (Compression der Brustaorta) und der Athmung, so tritt in sehr kurzer Zeit (nach anfänglicher geringer Steigerung) eine schnelle Herabsetzung der Temperatur von einer Grösse ein, wie sie nach dem Tode nur in Stunden zu Stande kommt. Ich habe die Temperatur

Digitized by Google

schnell bis um 2,6° *C.* sinken sehen. Ist bei fortgesetzter Athmungs-Suspension der Tod erfolgt, so geht die Temperatur wieder in die Höhe.

Nach allem Vorhergehenden sieht sich der Vortragende zu der Annahme gedrängt, dass bei einer — direct oder von den Empfindungs-Nerven aus indirect — herbeigeführten Reizung des verlängerten Markes im Körper Vorgänge eingeleitet werden, welche Wärme zum Verschwinden bringen, — sei es durch Umsetzung derselben in eine andere Form lebendiger Kräfte, sei es durch Herstellung chemischer Processe, welche Wärme binden. Da nach Durchschneidung des Halsmarkes am Hinterkörper Temperatursteigerung beobachtet worden ist und da im Fieberzustande bei Reizung der Empfindungsnerven die Temperatur-Depression nicht mehr zu Stande kommt, scheint der Schluss nahe zu liegen, dass im Normalzustande vom verlängerten Marke aus durch eine tonische Thätigkeit fortwährend Wärme im Körper zum Verschwinden gebracht wird, beim Fieber aber eine Parese jener tonischen Thätigkeit der *Med. obl.* unter den Ursachen der Temperatursteigerung eine Rolle spielt.

Schliesslich erwähnt der Vortragende noch einige Versuche an fiebernden Thieren. Wird ein solches mit Eiswasser-Umschlägen bedeckt, so sinkt die Temperatur in der *Vena cava infer.* allmälig. Reizt man innerhalb der ersten 20—60 Minuten der Abkühlung die Empfindungsnerven, so wird das Sinken verlangsamt, aufgehoben, oder selbst ein geringes Steigen herbeigeführt, offenbar weil der die Reizung begleitende Krampf der kleinen Arterien das Zuströmen des kalten Blutes von den peripherischen Körpertheilen her verlangsamt. Nach einiger Zeit jedoch wird, ähnlich wie bei nicht fiebernden Thieren, das Sinken der Temperatur durch die Reizung beschleunigt, während nach aufgehobener Erregung ein Wiederansteigen eintritt. Das verlängerte Mark ist also wieder erregbar geworden. Es bleibt nach Fortnahme der kalten Umschläge und Einhüllen des Thieres in Watte, während die Körpertemperatur wieder steigt, noch kürzere oder längere Zeit erregbar, wird jedoch schliesslich wieder paretisch.

Ausser durch Einwirkung von Kälte kann bei fiebernden Thieren auch durch Injection von Chinin in das Blut der erörterte Einfluss der sensibeln Nerven auf die Temperatur wieder hergestellt werden.

Prof. *Aubert*, Ueber den Einfluss der Athmung auf die Pulsfrequenz und den Blutdruck.

Derselbe schliesst sich in der Hauptsache den *Traube*'schen Erfahrungen an. Er macht zunächst auf die Veränderungen aufmerksam, welche durch die Frequenz der Tiefe der Athmung, sowohl der natürlichen als der künstlichen bedingt werden, wenn es sich um hämody-

Digitized by Google

namische Untersuchungen überhaupt handelt. Er unterscheidet 1) die durch Wirkung auf die Gefässnerven bedingten Aenderungen des mittleren Blutdruckes, 2) die von der Medulla durch den *N. vagus* auf die Herzthätigkeit bewirkte Hemmung, 3) die von der Erregung der Herzcentra hervorgebrachte Verlangsamung der Pulsationen einerseits und der Frequenzzunahme andrerseits, endlich 4) die Wirkung der Athmung auf die Herzmusculatur. Seine Methode der Beobachtung besteht theils in der Variirung der Athmung beim curarisirten Thiere, theils in der Suspension derselben bis zum völligen Herztode, theils in der Zuführung sauerstofffreier oder kohlensäurehaltiger Luft, und zwar sowohl bei übrigens unversehrtem Thiere, als auch bei Thieren mit durchschnittenen *N. vagis*, und endlich bei Thieren mit durchschnittenen *N. vagis* und zerstörter Medulla.

Die Resultate der bisherigen Versuche sind kurz zusammengenommen etwa folgende: 1) Die Pulsfrequenz ändert sich mit der Athmungsfrequenz in gleichem Sinne: 2) der mittlere Blutdruck steigt mit der Verarmung des Blutes an Sauerstoff und sinkt bei Zunahme des Blutsauerstoffes; 3) Luftentziehung, Stickstoffathmung und Wasserstoffathmung wirken bei curarisirten Thieren in nahezu gleicher Weise auf die Herzthätigkeit; 4) bei Ausschluss der Sauerstoffathmung pulsirt das Herz in vielen Versuchen noch über 20 Minuten lang; 5) bei Kohlensäurerespiration pulsirt das Herz höchstens noch 5 Minuten. Die übrigen Ergebnisse lassen sich nicht so kurz zusammenfassen und werden später von dem Vortragenden veröffentlicht werden.

Section für Kinderheilkunde.

Prof. *Ebert*, Ueber *Chorea magna*.

Vf. sagt, dass die Grenzen zwischen der gewöhnlichen Chorea und der Chorea magna nicht genügend festgestellt seien, da viele Schriftsteller schon den Zustand grosser Muskelunruhe, bei welcher die Mehrzahl der der Willkür unterworfenen Muskeln und Muskelgruppen in choreïsche Bewegungen gesetzt werden, als grossen Veitstanz bezeichnen. Es sei aber nur der Zustand Chorea magna zu nennen, wenn bei einem Individuum nicht blos die Herrschaft über die der Willkür unterworfenen Muskeln, sondern auch die Beherrschung der von der Psyche abhängigen Aeusserungen und Handlungen verloren gegangen, d. h. wenn der von Chorea Ergriffene gleichzeitig gemüthskrank geworden sei. Bei der Chorea sei jene geistige Function, die wir den Willen des Menschen nennen, gestört.

Ist diese Function nur insoweit behindert, dass die Herrschaft über

Digitized by Google

einzelne oder viele Muskeln des Körpers aufgehoben ist, so ist dies der gewöhnliche Veitstanz; ist der Wille aber auch in Beziehung auf die freie Ausübung der psychischen Functionen untergegangen, so sei dies Chorea magna, der Mensch spreche nnd handle dann anders als er wolle. Ein wohl erzogenes, bis dahin ganz gesittetes Mädchen z. B. führe dann plötzlich ganz obscöne, rohe Reden und geberde sich wie ein ungezogener, sittenloser Bube, weil ihr die Fähigkeit verloren gegangen ist, solche zwar von ihr gehörte, aber fest im Innern verschlossene Aeusserungen fernerhin zurückzuhalten u. s. w. *E.* erläuterte dies an mehreren Beispielen, namentlich aber an einem höchst merkwürdigen Falle von Chorea magna eines 12½jährigen Mädchens, bei welchem die verschiedensten Muskelgruppen, namentlich aber die der Lautbildung vorstehenden Muskeln, der Reihe nach choreïsch ergriffen wurden, dann Tobsucht, Schlafsucht, Lethargie und endlich Heilung eintrat.

Es entspinnt sich hierauf eine Discussion, an der die Herren *Möller*, *Rinecker*, *Schuller*, *Mendel*, *Happe*, *Kirchhoff*, *Steffen* und *Jakobi* Theil nehmen, und die sich vorzüglich darum dreht, ob der von *Ebert* mitgetheilte Fall als Chorea bezeichnet werden dürfe. *Rinecker* aus Würzburg bezeichnet ihn als *Morbus psychicus* mit der Form der Tobsucht. *Mendel* aus Pankow schliesst sich dieser Ansicht an. Dagegen erklären *Happe* aus Oldesloe, *Kirchhoff* aus Löhr und *Möller* aus Königsberg mehr oder weniger auffällige psychische Störungen als ein constantes Symptom der Chorea. *Jakobi* aus New-York sieht in dem fraglichen Falle eine schwere Neurose, eine Form der Hysterie. Bezüglich der Therapie der Chorea empfiehlt *Möller* das Bromkalium in grösseren Dosen, bis Intoxicationserscheinuugen auftreten; *Happe* bei Fällen, wo die unwillkürlichen Muskelbewegungen das Einschlafen verhindern, warme Bäder mit kalten Begiessungen, verbunden mit Morphium-Injectionen und mit der Chloroformnarkose.

Section für Anthropologie und Ethnologie.

Prof. *Virchow*, Ueber Schädelmessungen.

Vf. theilt mit, dass er bei dem kürzlich abgehaltenen internationalen Congresse zu Kopenhagen Gelegenheit gefunden habe, mit Benützung der reichhaltigen dortigen Sammlung zahlreiche vergleichende Schädelmessungen vorzunehmen. In den in Dänemark aufgegrabenen Gräbern der Steinzeit seien sehr viele Schädel aufgefunden worden, von welchen es jedoch nicht überall festzustellen gewesen sei, ob sie sämmtlich Bestatteten angehörten oder von Menschen herrührten, welche

Digitized by Google

zu Ehren des Hingeschiedenen an dessen Grabe geschlachtet worden seien. Der berühmte Archäologe *Worsaä* habe jedoch letzteres aus der Art und Weize des Vorkommens sehr wahrscheinlich gemacht. Keinesfalls könnten sie aber einem Volke angehören, welches nicht auf den dänischen Inseln oder in deren unmitttelbarer Nähe seinen Wohnsitz gehabt hätte.

Bei dem umfangreichen Funde zu Borreby seien einem einzigen Grabe 96 Schädel entnommen worden. Es fänden sich zwar noch ausserdem Schädel aus der Broncezeit, und zwar aus der ersten Periode derselben, in der die Leichen noch begraben und nicht, wie später, verbrannt worden seien, die Zahl derselben sei aber nicht bedeutend.

Früher sei man geneigt gewesen, diese Schädel der Steinzeit den Lappen oder Eskimo's zuzuschreiben, wie auch *Nielson* gethan habe, der jedoch in dieser Beziehung bereits von *Eschricht* berichtigt worden sei. Redner giebt nun als Ergebniss der angestellten Vergleiche und Messungen, dass nicht die mindeste Beziehung zwischen diesen Gräberschädeln und jenen der Grönländer (Eskimo's) obwalte. Die Schädel der Grönländer zeichnen sich durch ihre Schmalheit und Länge aus; die Grönländer seien Dolichocephalen der ausgesprochensten Form, fast Skaphocephalen. Die Muskelansätze am Schädel seien ungewöhnlich markirt, so dass das *Planum semicirculare* bis über die *Tubera parietalia* herauf reiche; die Nasenwurzel sehr schmal, so dass die Augen sehr nahe an einander gerückt erscheinen, die Ausbildung des Gesichts sei eine derart überwiegende, dass in dieser Beziehung fast keine andere Race mit ihnen in Verbindung gebracht werden könne. Es fänden sich nun zwar unter den Gräberschädeln auch einzelne Beispiele vom langköpfigen Typus, doch seien auch diese nicht entfernt mit grönländischen Schädeln zu verwechseln.

Was nun die Lappen anlange, so seien sie bekannter Weise auffallende Kurzköpfe. Es gäbe übrigens kaum irgend eine andere Race, deren Gestalt in so hohem Grade durch die Lebensverhältnisse bestimmt sei, an der sich mithin die *Darwin*'sche Idee der Abstammung so deutlich nachweisen lasse. Es fänden sich unter denselben Abweichungen, welche sich fast den rhachitischen Erscheinungen näherten. Der Temporaldurchmesser sei durchgehends bei den Lappen sehr gross, die Schläfe bombenartig gewölbt, die Nasenwurzel sehr breit, das Gesicht nieder- und die Mitte des Unterkiefers auffallend zusammengedrückt.

Auch diesem eben beschriebenen lappischen Schädeltypus komme die Form des Gräberschädel nicht entfernt nahe.

Schwieriger gestalte sich die Frage über das Verhältniss zu den Schädeln des finnischen Stammes und hieran schliesse sich die Frage

Digitized by Google

über die Aehnlichkeit mit ungarischen Schädeln. Bei den Schwierigkeiten, welche sich aus der Verschiebung der Maassverhältnisse durch die individuell abweichende Entwicklung ergeben, könne nur im Allgemeinen ausgesprochen werden, dass die Finnen relativ kurzköpfig und relativ hochköpfig — *brachy-hypsocephal* seien. Nach der Ansicht des Redners könne daher nur die Frage discutirt werden, ob ein Theil der dänischen Gräberschädel finnischer Abstammung sei, eine Möglichkeit, die auch dadurch unterstützt werde, dass es historisch erwiesen sei, dass sich die Finnen in Norwegen in früheren Zeiten viel weiter südlich erstreckt hätten.

Man könne übrigens unter den dänischen Gräberschädeln zwei Formen unterscheiden, welche jedoch nicht so weit auseinander gingen, dass sie nicht Einem Volke angehören könnten. Andererseits sei allerdings sehr wohl eine Mischung von zwei verschiedenen Völkern möglich. Die Schwierigkeit einer solchen Unterscheidung ergebe sich aus einem andern Verhältnisse.

Es werde ziemlich allgemein angenommen, dass die Slaven brachycephalisch seien, die Germanen dolichocephalisch. Er habe jedoch weder die Polen noch die Wenden brachycephal gefunden. Auch die in den sogenannten Wendenfriedhöfen (welche bei dem Vorkommen von Eisen in die späteste vorhistorische Periode gestellt würden) vorkommenden Schädel erwiesen sich keineswegs brachycephal, obwohl sie einem slavischen Volke zugesprochen würden.

Dem im Jahre 1867 abgehaltenen Pariser Congresse für vorhistorische Anthropologie habe er Abbildungen in norddeutschen Torfmooren aufgefundener Schädel vorgelegt, ganz ausgesprochene Langschädel, jedoch ohne Charaktere besonderer Wildheit, nicht prognath u. s. f. Ganz ähnlich diesen seien die in dänischen Torfmooren entdeckten Schädel. Die grösste Analogie mit diesen finde er in den baskischen Schädeln. Dieses letztere Volk habe sich auch unter dem Namen Iberer historisch nachweisbar früher über Südfrankreich und Norditalien ausgebreitet. Jedenfalls sei eine nähere Verwandtschaft mit Schädelformen anderer Völker nicht aufzufinden. Es ergebe sich hieraus die naheliegende Vorstellung, dass das Volk, dem die Schädel aus den Torfmooren angehörten, eher ein südliches als ein nördliches gewesen sei.

Ueber die Chronologie lasse sich nach den bisher gewonnenen Anhaltspunkten noch nichts Verlässliches angeben. Bisher seien noch keine Spuren der Menschenexistenz während der Rennthierperiode in Norddeutschland aufgefunden worden. Rennthierüberreste seien allerdings in mecklenburgischen Mooren und kürzlich mit Wahrscheinlichkeit in der Uckermark schon entdeckt worden, von Menschenhand

bearbeitete Gefässe jedoch neben denselben noch nicht. Die Coexistenz des Rennthiers mit den Dolichocephalen aus den Torfmooren sei daher noch nicht erwiesen, wenn sie auch als wahrscheinlich zu betrachten sei.

Professor *Seligmann*, Ueber Exostosen am Gehörgange von Peruanerschädeln und über ein Instrument zur Messung eines Clivus-Wirbels.

Vrf. entdeckte vor einigen Jahren am äusseren Gehörgange von Peruanerschädeln gewisser Form so bedeutende Knochenauswüchse und zugleich diese so seltene Krankheit in vergleichsweise zur kleinen Anzahl dieser seltenen Schädel in so häufiger Zahl, dass er sagen konnte, nur an Peruanerschädeln der Titicacaform (der langgezogenen cylinderischen, durch Binden hervorgebrachten) kämen sie vor, nicht aber an der andern Form, den Flachschädeln, die den nordamerikanischen so ähnlich und durch Pressung zwischen Brettchen entstanden sind. Vf. nennt jene Form die Titicacaform, weil *Pentland* die ersten Schädel dieser Art vom Titicacasee nach Europa brachte.

Diese Schädel haben die grösste Aehnlichkeit mit den sogenannten Avarenschädeln, die so oft beschrieben und abgebildet wurden und von Oesterreich bis nach Frankreich gefunden wurden. Keiner von diesen Schädeln hat jene Exostosen.

Der Zusammenhang der Mode, den Kopf so eigenthümlich zu gestalten, zwischen der alten und neuen Welt, dürfte wohl dadurch sich erklären, dass es Vf. gelang, eine ähnliche Form auch in Nordamerika nachzuweisen.

Ueber die Ursache jener pathologischen Erscheinung konnte Vf., als er jene Beobachtung veröffentlichte, Nichts sagen. Die Umformung des Schädels konnte die Ursache nicht sein, denn die Peruanischen Plattschädel, die so häufig vorkommen, zeigen sie nicht, obgleich die Umstaltung derselben viel gewaltsamer ist und der *Porus externus* dadurch wirklich oft schief gestellt oder schmäler gedrückt wird.

In den spanischen Schriftstellern, welche über die Eroberung Peru's schreiben, fand Vf. endlich die Aufklärung; den spätern Uebersetzern oder Bearbeitern ist die betreffende Stelle entgangen.

Alle erzählen uns von dem merkwürdigen Feste, welches jene Inkasöhne stets zusammenfeierten, welche das 16. Jahr erreicht hatten. Sie wurden für die künftige Würde eingeweiht; Wettlaufen, Wettkämpfe, Entbehrungen härtester Art regten Gemüth und Körper auf das Heftigste an, zugleich fand die Ceremonie des Ohrdurchstechens statt. Beide Ohrläppchen wurden dann durch Einlegen von Metallstiften so erweitert, dass sie darin eine Scheibe aus Gold oder Silber von der Grösse einer durchschnittenen Orange Platz hatte. Die Spa-

Digitized by Google

nier nannten diese Ordensritter orejones, Grossohren. Es wäre fast unmöglich zu glauben, sagt ein spanischer Autor, dass dieser Theil eine solche Last tragen könne, wenn er sich nicht zu einer Schlinge verdickt hätte, von dem Umfange eines kleinen Fingers.

Die Aufregung jener Prüfungszeit, die vergleichsweise späte Epoche der Operation und die Raschheit der Erweiterung führte einen pathologischen Process herbei, der die Knorpel und zuletzt den Knochen selbst in Mitleidenschaft zog. Wir finden verlängerte Ohrläppchen durch Pflöcke-Einbringen u. s. w. bei vielen Völkern und ein südamerikanischer Stamm heisst auch Orejones, aber der verlängerte Theil ist erschlafft und fällt zusammen, wenn der Pflock herausgenommen wird.

Ist obige Vermuthung richtig, so ergiebt sich daraus Folgendes:

Alle Peruanerschädel der Titicacaform, welche diese Exostosen haben, müssen Schädel männlicher über 16 Jahre alter Individuen sein, sie gehören der vornehmen Kaste an und die früher sogenannten Incaschädel (Plattschädel) führen fälschlich diesen Namen. Dass eine solche Aristokratie trotzdem nicht harthörig war, geht aus dem Umstande hervor, dass die schmälste Spalte genügt, um das Gehör intact zu erhalten.

Verf. legt nun nach diesen Bemerkungen das Instrument vor, welches er ersonnen hat, um, ohne den Schädel öffnen zu müssen, zugleich die Länge des Clivus, die Länge der unteren Fläche des Basilarknochens und den Winkel, den diese beiden Flächen bilden, messen zu können. Er legt den Schädel in eine gewöhnliche Serviettenpresse und dreht ihn mit dem grossen Hinterhauptsloche gegen das Licht, der grössere Arm des kleinen Instrumentchens hackt sich an der Sattellehne fest, beide genannten Flächen werden gemessen und in demselben Moment schlägt ein Zeiger aus, der auf der Platte den Winkel angiebt; der an den kürzeren Arm verschiebbare Zahn macht jedesmal eine Correctur nothwendig, welche das Instrument nach vollzogener Messung ebenfalls sogleich angiebt.

Professor *Vogt*, Daten über einen Microcephalen.

Vf. giebt die von *Vilanova*, Professor der Geologie in Madrid, ihm mitgetheilten Daten über einen Microcephalen in Spanien, Vincenzo Orts y Codina bekannt. Derselbe sei 1813 in Castillon del Duca (Provinz Valencia) geboren und biete, wie nachfolgende Schädelmaasse zu beweisen schienen, ein merkwürdiges Beispiel von Microcephalie. Gesichtswinkel 59°, Schädelumfang 0.46 m., oberer Bogen 0.19 m., Längendurchmesser 0.14 m., Breitendurchmesser 0.12 m. Er sei klein, nur etwa 1 Meter hoch. Die Brustglieder seien sehr lang, mit einem Rudiment eines sechsten Fingers an jeder Hand; die Beine kurz, mit

einer sechsten Zehe an jedem Fusse; der Körper sei ganz mit langen Haaren bedeckt; sein Charakter eher sanft und furchtsam, in Zorn gebracht, zerreise er seine Kleider, ohne Anderen Leid zuzufügen. Er könne nicht sprechen, gehe in Sprüngen und seine Grimassen seien sehr ausdrucksvoll.

An diese Beschreibung und die Vorzeigung der Photographie knüpft noch Redner die Bemerkung, dass das Alter (56 Jahre) und die Rudimente sechster Finger und Zehen sehr auffallend seien, da Mikrocephalen in der Regel kein höheres Alter erreichten und derartige Bildungen mit Mikrocephalen sonst nicht verbunden seien.

Innere Medicin.

Prof. *Leyden*, Ueber „Bulbär-Paralyse".

Die Bezeichnung Bulbär-Paralyse ist von Prof. *Wachsmuth* gewählt zur Bezeichnung von Lähmungsformen, welche ihren Sitz in der *Medulla oblongata* haben. Dieselben sind durch sehr auffällige Symptome ausgezeichnet, wie sie *Duchenne* in der Schilderung der „Paralysie progressive de la langue, du voile et des lèvres" beschrieben hat. Sie beziehen sich vornehmlich auf den Hypoglossus und Facialis und beginnen mit einer Parese der Lippen, der Zunge und des Gaumens, die allmälig fortschreitend zur völligen Lähmung führt und mit Störungen der Sprache und des Schlingens verbunden ist. Die Beeinträchtigung der Ernährung oder hinzutretende Vaguslähmung führt durch Asphyxie zum Tode. Ausser dieser progressiven kommt eine apoplectiforme Form vor, welche mit unbedeutenden Symptomen beginnt, unter einem plötzlichen Anfalle sich steigert, häufig, sowie auch die erste Form, mit Extremitätenlähmung verbunden.

Was die Natur dieser Krankheit betrifft, so wies *Wachsmuth* eine Atrophie der Nerven (Hypoglossus und Facialis) nach und nahm eine Erkrankung der *Medulla oblongata* an, welche der grauen Degeneration der hinteren Rückenmarksstränge analog sein sollte. Später sind anatomische Befunde gemacht worden, die jener allgemein als Sclerosen bezeichnet. Genauere Untersuchungen fehlen. Der Vortragende untersuchte selbst einen der apoplectischen und einen der progressiven Form angehörigen Fall genauer.

Im ersteren Falle erstreckte sich die Erkrankung auf den *Pons* und *Med. obl.* und zeigte einen Bluterguss mit umgebender Erweichung. Weiterhin durch die Substanz zerstreut kleinere und grössere, aber nur mikroskopische, atrophische Grade, in denen die Nerven grossentheils untergegangen und durch ein derbes faseriges Gewebe ersetzt waren.

Digitized by Google

Daneben fanden sich zahlreich grössere sternförmige Gebilde, wie sie schon von *Rindfleisch*, dem Vortragenden und *Meynert* beschrieben sind Die Gefässe zeigten hochgradige Erkrankung, so dass der Process hierwahrscheinlich von den Gefässen ausging. — Der zweite Fall liess eine hochgradige fettige Atrophie des Vagus, Hypoglossus etc. erkennen. Das Rückenmark war besonders zwischen der Halsanschwellung und der *Med. oblong.* von reichlichen Fettgranulationen durchsetzt. Die Nerven zeigen sich theils atrophisch, in verschiedenem Grade, theils fettig degenerirt: dazwischenhin, theilweise vorwiegend, liegen die Fettkörnchenhaufen und ebenfalls die schon erwähnten sternförmigen Körper. Die Erkrankung erstreckt sich auf die Vorderstränge und Vorderhörner, von dort auf die Seitenstränge, die stellenweise sehr hochgradig erkrankt sind. Die Hinterstränge waren ganz frei, die Gefässe zeigten keine Erkrankung. Der Process stellt sich also als eigentliche Myelitis dar und ist sowohl seiner Natur als seiner Verbreitung nach wesentlich von der grauen Degeneration der hinteren Rückenmarksstränge verschieden.

Bei der über diesen Vortrag eröffneten Discussion bemerkt Dr. *Homburger*, dass ihm ebenfalls drei solcher Fälle vorgekommen seien, bei welchem der Eine die Sprache ganz verlor und beim Aufschreiben einzelner Wörter die Buchstaben derselben verwechselte, so z. B. beim Worte „Sprache“ das a hinter das S setzte u. s. w.

Die Vorträge in den allgemeinen Sitzungen, in deren zweiter Rostock für das nächste Jahr als Ort der Versammlung bestimmt wurde, und die Arbeiten in den Sectionen wurden durch mancherlei Festlichkeiten unterbrochen: durch Musikaufführungen im Theater, durch den Gesang uns bis dahin unbekannter lieblicher Lieder der akademischen Liedertafel, durch gemeinsame Spaziergänge nach den Lanser Köpfen, nach dem Berge Isel, dem Schiessstande der Schützen, deren Officiere allerlei Ueberraschungen für die Damen veranstaltet hatten. Am eindruckvollsten aber möchte die Fahrt über den Brenner bei herrlichem Wetter nach Bozen gewesen sein, mit dem festlichen Empfange an allen Orten, einer überraschend schönen Fruchtausstellung in Bozen selbst, deren Schmuck in Körben gruppirt den Theilnehmern beim Abschied zum Heimwege in die Wagen gereicht wurde. Wir können bei dieser Gelegenheit das milde und üppig fruchtbare Thal von Bozen, dessen Bevölkerung die beste deutsche Gesinnung nicht blos zur Schau trägt, sondern auch von ihr durchdrungen ist, treuherzig sich unterhält, wohlhabend erscheint, als einen klimatischen Kurort oder zum vorübergehenden Aufenthalt warm empfehlen, in dem es sich noch

Digitized by Google

billig leben lässt und der neben hohen Naturreizen durch seinen lebhaften Handelsverkehr auch Bequemlichkeiten aller Art zulässt.

Uns Psychiatern war neben diesen Genüssen ein ebenso belehrender als genussreicher Nachmittag durch Herrn Collegen *Stolz* geboten, der zu einem Besuche seiner Anstalt in Hall die Versammlung eingeladen hatte.*) Wie verschieden solche Feste in den verschiedenen Gegenden Deutschlands sich gestalten lassen, wie sehr sie nicht blos von der Persönlichkeit der Leiter, sondern auch von der Art der Nationalität abhängen, war hier wieder recht sichtbar. Was an anderen Orten mit Bedenken in dieser Weise versucht worden wäre, erschien bei dem biedern, lebensfrohen und an fröhliche Feste gewöhnten Charakter der Tyroler natürlich. Die Bürgerschaft der Stadt Hall nahm an diesem Feste ihrer Anstalt Theil und zeugte von der trefflichen Harmonie, die zu gegenseitigem Frommen Anstalt und Stadt verbindet. Ein zahlreiches Musikchor empfing unsern Bahnzug, zog uns voran mit heiteren Weisen, trotz strömenden Regens, mit den Spitzen der

---

*) Zu Ehren der Collegen hatte Director *Stolz* eine Schrift „Bemerkungen über die Tirolische Landes-Irreranstalt zu Hall. Mit 2 Abb. Innsbruck. 1869. pp. 20" vertheilt:

Die Anstalt, ursprünglich von 1723 ein Kloster, vorübergehend 1803 zum Militär-Lazareth gebraucht, wurde 1826 zur Irrenanstalt bestimmt und der Adaptionsbau 1830 beendet, 1845 die Tobabtheilung nach dem Plane *Tschallener*'s erbaut. Von Letzterem wurde dringend der Bau einer Pflegeanstalt in der Nähe befürwortet, aber die Finanznoth liess dies nicht zu. 1865 ging die Anstalt in die Verwaltung der Landes-Vertretung über. Jetzt ist die Frauen-Abtheilung neu gebaut und soll später durch einen Querbau mit dem Männerhause verbunden werden, dann statt jetzt 250 350 Kranke aufnehmen. 1854 war Bestand 97 (54 M. 43 W.), aufgenommen bis 1869 850 (505 M., 345 W.), geheilt 253 (133 M., 120 W.), gebessert entlassen 178 (112 M., 66 W.), ungeheilt 215 (123 M., 92 W.). gestorben 110 (75 M., 35 W), Bestand 1869 191 (116 M., 75 W.). Die Melancholie ist die häufigste Krankheitsform mit vorwiegend religiöser Färbung, seltener die Manie, doch diese dann häufiger bei der italinischen als deutschen Bevölkerung. Erbliche Anlage war nachgewiesen bei 291 (179 M.. 112 W.), abgelehnt bei 194 (118 M., 76 W.), unerwähnt bei 61 (40 M., 21 W.), daher bei 53 pCt. nachweislich. Mehrere Selbstmorde durch Herabstürzen aus dem Fenster veranlassten, dass die Fenster vergittert wurden und noch werden. Flächenraum des Anstaltsgebietes 16,000 Quadratklafter.

Digitized by Google

Behörden durch die geflaggte Stadt hindurch mitten in die Anstalt, deren Bewohner, kranke und gesunde, uns freundlich willkommen hiessen. So zahlreich die Gesellschaft war, wurde sie doch durch alle Räume geführt, auf die Mängel der alten Anstalt aufmerksam, mit den Räumen der neuen, zeitgemäss gebauten Abtheilungen vertraut gemacht, festlich bewirthet, wobei es an Rednern nicht fehlte, und am Abende unter Trommelschlag und Janitscharenmusik bei Fackelbeleuchtung, die uns nochmals die Anstalt im hellen Glanze erscheinen liess, durch die Stadt nach dem Bahnhofe geleitet. Collego *Zinn* gab dort den Empfindungen der Versammelten Ausdruck, indem er die Bürger der Stadt anredete und ihnen Aller Dank laut aussprach. Nochmals ein Lebewohl — und wir schieden.

Wir schliessen den Bericht und vergessen nicht des Dankes, den wir unserem Herrn Collegen *Stolz* für seine vielfachen Bemühungen um die Mitglieder unserer Section vor und während ihrer Sitzungen schuldig sind. Möge er sich bald eines vollständigen Neubaues seiner Anstalt erfreuen können, deren reizende Lage von keiner anderen Anstalt übertroffen werden dürfte! *L.*

Verhandlungen psychiatrischer Vereine.

Vierte ordentliche Sitzung des psychiatrischen Vereins der Rheinprovinz vom 5. November 1869.

Anwesend die Herren: *Besser*, *Diel*, *Herz*, *Höstermann*, *Meyer*, *Nasse*, *Oebeke*, *Pelman*, *Peters*, *Richarz*, *Röchling*; als Gäste die Herren *Laehr* aus Berlin, *Snell* aus Hildesheim und *Tigges* aus Marsberg.

Eröffnung der Sitzung 11½ Uhr Vormittags durch den Vorsitzenden.

I. Dr. *Herz*, Ueber die Prognose in psychischen Krankheiten, 3ter Theil.

In meinem letzten Vortrage habe ich den Versuch gemacht, Ihnen die mit Defect, mit einem gewissen fixirten Schaden aus der ersten psychischen Erkrankung Geheilten, indem ich sie dabei in drei Classen rubricirte, zu schildern. Ich stellte Ihnen auch meine Erfahrung hin, dass die Anzahl derer, welche nach der recidivirten Krankheit mit einer defecten Heilung davon kommen, ein steigendes Procent zeige und ferner, dass die dritte Erkrankung niemals ohne nachhaltige und stabile Einbusse an psychischer Qualität überstanden werde, oder, mit anderen Worten, dass mir eine vollkommene Wiederherstellung aus der dritten Erkrankung, die frühere individuelle Gesundheit als Norm angenommen nicht bekannt worden sei. — Den letzten Satz will ich heute noch dahin erweitern und correcter fassen, dass mir in meiner Erfahrung kein Fall vorgekommen ist, wo nicht besten Falls die dritte Erkrankung mit einem solchen Defecte — dahin muss mit dem Quale auch das Quantum eingerechnet werden — zu Ende gegangen ist, dass der Patient in die Classe der bleibenden psychischen Schwächung gestellt werden musste.

Es hatte keine grosse Schwierigkeit, die aus der ersten Erkrankung mit einem Defecte Davongekommenen nach Rubriken zu unterscheiden. Schwieriger wird schon die systematische Kenntzeichnung derer, die die zweite Erkrankung mit defecter Heilung überstanden haben, und nicht blos aus dem Grunde, weil die Zahl, über welche

Digitized by Google

ich zu verfügen habe, eine kleine ist. Im Allgemeinen passen doch die Merkmale auf sie, welche ich von den Ersteren angegeben habe. Aber es tritt bei ihnen etwas individuell Psycho-Anomales, um nicht zu sagen Pathologisches, schärfer hervor (es wird sich dieses auch schon in der zweiten Erkrankung selbst bemerklich gemacht haben), wodurch das Categorisiren erschwert wird. Ich möchte in Bezug hierauf sagen: In jeder ersten, also jugendlichern Psychose, regiere mehr das reine Krankheitsgenus, in der folgenden mehr das alterirte und modificirte Genus. Die erste Krankheit setzte bereits einen Erfahrungsprocess ab, der für die folgenden wird Stoff liefern müssen; aber es hat daraus auch die Psyche eine Lockerung des Zusammenhangs, eine Abschwächung da davon getragen, wo sie am schwächsten angelegt ist, und wo neben ihre stärkeren Besonderheiten sich unvermittelter aus den Vorstellungs- und Empfindungskreisen werden hervorheben müssen. Daher sind auch die Eigenheiten und Marotten, active und passive, Solcher, welche die erste Krankheit ziemlich unversehrt überstanden haben, dann aber von einer zweiten leidlich genasen, auffälliger, unbekämpfbarer, ihnen selber unbewusster, als sie es nach der ersten Attaque sein konnten. In anderen sich repetirenden Krankheitsarten werden wir eine ähnliche Erfahrung machen. Der Ausdruck der ersten Erkrankung wird der reinste, und die Heilung davon die gründlichste sein. — Der Beweis, dass die mit Defect Geheilten aus der zweiten Erkrankung der Zahl nach ein steigendes Verhältniss zeigen, wäre für den Bereich meines Antheils beigebracht, wenn die Behauptung richtig ist, dass nach der dritten Erkrankung defectlos Geheilte, also eigentliche Reconvalescenten, mir gar nicht vorgekommen sind. — Ich nehme zur Bewahrheitung dieser meiner Behauptung alle Fälle zur Betrachtung, wo die dritte Krankheit ganz, oder doch grössten Theils unter meinen Augen verlaufen ist, oder, wo mir ganz gute Information geboten ist, wenn der Kranke erst nach dem zweiten Rückfalle zu mir gekommen sein sollte. Fälle, welche früher schon, vielleicht ursprünglich, der folie circulaire angehörten, sind ausgeschlossen. Misslicher ist es, zu versichern, dass kein Fall darunter ist, wobei eine lange Remission zwischen dem zweiten und dritten Anfalle für Herstellung angesehen worden wäre. Durch einen solchen Irrthum würde freilich die Zahl, aber nicht das Wesentliche meiner Aufstellung Abbruch erleiden. Zufällig aber waren alle Kranke vor der dritten Erkrankung ausserhalb einer Anstalt in freien Verhältnissen. Ich übersehe acht Fälle (6 Frauen, 1 Jungfrau, 1 unverheiratheten Mann). Die eine Hälfte fällt auf die Depressions- die andere auf die Exaltationsform der ersten Erkrankungen. Ich halte sie alle Acht nicht blos für dem Defecte, sondern der Geistesschwäche, nicht im Sinne der

Digitized by Google

Verblödung, seit und mit der dritten Rückkehr der Krankheit verfallen. Merkwürdiger Weise ist ein Beispiel von Verblödung nicht darunter, obgleich die Meisten mehr als ein Decennium laboriren, und die jüngste Kranke an Krankheitsjahren, inclusive der Pausen, bereits acht zählt. — (Nach der hiesigen Statistik steht der Verfall in Blödsinn im umgekehrten Verhältnisse zu der Häufigkeit der Erkrankungen. Von der dritten resp. vierten restirt kein Fall, von der zweiten gut 8 und von der ersten gut 17 Verblödungsfälle!)

Von diesen acht Kranken gleicht in detaillirten Krankheitszügen keiner, oder keine recht mehr der andern. Jeder Fall ist eine Studie für sich. Als sie ursprünglich tobten oder melancholisch sich gebährdeten, waren sie sich in diesem frischen Zustande sicherlich recht ähnlich. — In ihren Ausgängen sind einige hervorzuhebende Verschiedenheiten, die ich voraus kurz erwähnen will: Eine 29jährige Frau starb im zweiten Rückfalle am delirium acutum idiopathicum. Der 48jährige Mann ist seit vier Jahren einer bereits regelmässig jeden Sommer wiederkehrenden visionärmaniakalischen Aufregung verfallen, zeigt also nur noch Remissionen von einer continuirlichen Krankheit; und eine 33jährige Frau hat aus der dritten Tobsucht eine ächte folie circulaire davongetragen, die sich jetzt zwar abgeschwächt zeigt, dem Wesen nach aber noch fortbesteht. Die übrigen fünf mögen uns denn den Typus solcher zwar mit einstweilen aufrecht erhaltener, relativer Besserung, aber doch mit stabiler Verkümmerung und Schwächung ihrer psychischen Existenz aus der dritten Erkrankung davongekommener Resultanten repräsentiren. Diese fünf haben bei aller Verschiedenheit im Einzelnen doch auch wieder eine Alle verbindende Aehnlichkeit. Mit Bezugnahme auf irgend ein System gehören sie in die Gattung der exaltirten Geistesschwäche, meinetwegen des partiellen Schwachsinnes. Die Exaltation ist die Grundstimmung. Es besteht wohl bei ihnen ein häufiges Umschlagen und Herabfallen aus der Gehobenheit für Zeit und Weile; aber das ist nicht die zeitweise Umwechselung in die Depression von dem ehemaligen guten Werthe mit den nothwendigen und unwillkürlichen Kleinmuthsvorstellungen, es ist vielmehr das Hineingerathen in jene Art launenhafter, grämlicher, rechthaberischer, zur Schau getragener Missstimmung, die gerade so gut auf Zufälligkeitsanlässe kommen und gehen kann, als sie auch die natürliche Auswechselung und den Rückschlag auf den Kräfteverbrauch in der Exaltation bedeuten wird. Das kräftige Element der pessimistischen Auffassung des Ich's kommt darin nicht mehr zu Stande. — Wenn es solchen Defecten auch in besonnenen, guten Stunden möglich ist, die verschiedensten richtigen Rückblicke auf erlittene Vorgänge in ihrer Gesundheit zu thun, und sich auf

Digitized by Google

Vertröstungen vernünftig einzulassen, so beharren sie, wenn sie aufrichtig sind, in einem gründlichen Verkennen ihres jetzigen psychischen Werthes. Sie empfinden und taxiren denselben zu hoch und prätendiren danach. Zurechtweisung und Einsprüche, Berufung auf ihre früheren Einsichten ändern darin nichts; die Umstände, andere Personen sind an Allem Schuld, wenn man sie auf die Rückfälle selbst hinweist, ihr eigner Zustand nicht. Jetzt seien sie nicht mehr krank und würden es auch nicht wieder. Noch bezeichnender für sie ist, dass Jeder aus den überstandenen Krankheiten in die jetzige stillere Zeit hinnein einen fixirten Zug der damaligen, ich möchte sagen: Lieblings-Wahnvorstellungen und Bestrebungen mit herübergebracht hat und diese besonders in jedem Affecte deutlich an den Tag bringt. Dabei ist es von hohem Interesse wahrzunehmen, wie die alten damals so schwer empfundenen Depressions - Vorstellungen sich dem jetzigen Zustande accommodirt haben. Sie werden profanirt, zu trotzigen Berufungen missbraucht, es werden Indiscretionen damit begangen, Gefühl und Takt sind davon fort, und somit ist alles Leiden damit verloren gegangen. —

Die bestehende Invalidität äussert sich in Allen gemeinsamer Weise auch darin, dass das Auffassungsvermögen, das intelligente Verstehen Anderer besonders in der Conversation schwach und schlecht geworden ist. Anstatt gesunder Zuvorkommenheit bringen sie uns Schwerfälligkeit und Confusion entgegen; sie nehmen Alles zu wörtlich, kommen aus ihrer vorgefassten Meinung nicht heraus, setzen sie niemals ordentlich bei Seite und verwerthen deshalb auch die Correktur nicht. Man kann von ihnen sagen, sie lernen Nichts mehr, und im gewissen Sinne auch, sie vergessen Nichts mehr. Ihr Wissen stockt und ihr Urtheil verengt sich. Man sieht dieses, wenn sie produktiv sind, ihren Geisteserzeugnissen auf den ersten Blick an; sie liefern nur Wiederholungen, Gedächtnissdarstellungen oder Schilderungen einfachster Wahrnehmungen. Da sie bei ihrer Untauglichkeit, den Andern richtig zu fassen, auch die Harmonie der Mitempfindung nicht geniessen, ihnen aber durch den Vergleich ein Missbehagen daraus erwachsen muss, so werden sie im Verkehr auf der Gemüthsseite leicht afficirbar, überlassen sich Anthipathien, verlieren an moralischem Widerstande, verändern nachtheilig ihren Charakter u. s. w., so dass auch auf dieser Seite die Schwäche ausgebildet wird. Gut, an ihnen bleibt die Geschicklichkeit in Handarbeiten, und die Leistungen im Musiciren, im Abbilden können gut sein. Dieses, dann besonders das gute Gedächtniss und ihre Concession, früher krank gewesen zu sein, nebst dem Vermögen, überwundene Zustände zu schildern, sind die

Digitized by Google

Eigenschaften, welche sie vor vielen Laien, selbst behördlichen, gesund erscheinen lassen.

Die in der angegebenen Art etablirte psychische Schwäche zeigt sich keineswegs am deutlichsten bei den von Hause aus ärmeren Geistern, im Gegentheile: die ursprünglich besser Begabten, die höher Gebildeten offenbaren im Contraste der noch guten Reste mit den Lücken und Mängeln ihre Beschädigung am auffälligsten. Unter den fünfen ist eine Kranke, welche von Hause aus die uncultivirteste ist. Sie, eine kinderlose 46jährige Frau, hat vier Anfälle von Melancholie mit Aufregung im Verlaufe von 16 Jahren durchgemacht. Sie hat von Natur ein sehr gutes Kalendergedächtniss und solches denn auch, wie es mit den Vorzügen immer geschieht, häufig zu üben Gelegenheit gehabt. Sie ist sehr neugierig, fragelustig, liest viel, besucht das Theater u. s. w. Sie hat relativ die wenigste Einbusse erlitten, man kann diese faktisch am wenigsten nachweisen. Aber an ihr ist schon seit Jahren Alles nur noch Stagnation, wenn ich die höchste Schätzung gelten lasse. Sie hat die geringste Gemüthsresistenz und trotz ihrer schlimmen Erfahrungen und trotz gestatteter, missglückter Experimente die geringste Krankheitsfurcht, das geringste Krankheitsbewusstsein; der Nachzug anomaler Vorstellungen und Begehrungen hängt ihr am stärksten an. Freilich, wo die Psyche von Ursprung an die wenigsten Spitzen zu bieten hatte, konnte sie auch die wenigsten verlieren. Es erinnert mich dieses Beispiel an die bereits hier vorgebrachte Erfahrung in Anstalten, wo die Mehrzahl aus ungebildeten besteht, nämlich, dass dort Kranke mehre Male zu und wieder abgehen, denen man auch die zum dritten Male überstandene Krankheit an ihren Leistungen zu Hause, auf dem Acker oder in der Handwerksstube wenig anmerkt. Dass die erwähnte Kranke nach ihren vier Erkrankungen keine stärkere Einbusse noch erlitten hat, erklärt sich wohl aus den mehrjährigen Pausen, die zwischen den vier Anfällen liegen, und die sie grösstentheils in der Anstalt durchlebt hat. Die grössern Pausen sind bei einer andern unverheiratheten Dame, die mehr als drei Mal heftige Tobsuchten durchgemacht hat, auch wohl die Ursache, dass ihr Verfall noch aufgeschoben bleibt. Von beiden stelle ich mir vor, dass sie noch einen fünften Anfall mit leidlich kräftigen Aufregungserscheinungen werden durchmachen können. Ihre constitutionelle Kraft scheint dieses noch zu Stande zu bringen. Die drei übrigen lassen dies nicht erwarten, obgleich eine davon erst dreissig Jahre alt ist. Die psychischen Energien haben zu viel verloren. — Nun noch ein Wort über die drei übrigen Fälle, die je ihren aparten Verlauf genommen haben. Mit einer fatalen, aber noch immer nach der psychischen Taxirung besten Wendung hat die eine

Digitized by Google

Kranke den Schluss ihrer Recidive gemacht, indem sie vor 4 Jahren in eine gemilderte Folie circulaire abwich, worin der Werth ihrer Stimmungen und die Qualität ihrer Vorstellungen noch leidlich gut ist und das retrospective Krankheitsbewusstsein ziemlich klar zur Geltung kommt. Sie verspricht sich auch selber von ihrer Zukunft am wenigsten. Auch von ihr denke ich mir, dass sie allmählich exaltirt schwachsinnig werden wird. — Des siebenten Falles bei dem Herrn habe ich oben gedacht. — Der achte endete mit dem Tode im dritten Anfalle, der als delirium acutum idiopathicum rasch verlief, ohne Complicationen mit einer zufälligen Krankheit. Der capillare Widerstand im Gehirne war in der dritten Erkrankung, welche schon nach 8 Monaten auf die zweite folgte, gebrochen. — Zu diesen acht Fällen könnte ich noch einige ähnlicher Art hinzuzählen; allein ich unterlasse es, weil ich die ersten Phasen der Krankheit nicht gehörig übersehe. In ihrem Endverlaufe enthalten sie keinen Falls etwas, was unsere Aufstellung, dass schon das dritte Recidiv immer ein fatales sei, weniger erfahrungsrecht erscheinen liesse. —

Ich komme nun beim Schlusse dieses Kapitels auf eine andere Behauptung zurück, welche neben der obigen bereits in meinem ersten Vortrage über Prognose der Recidive hingestellt worden ist. Sie lautet: Je häufiger sich die Recidive wiederholen, je ausgeprägter führen sie das Wiedererscheinen bestimmter Symptome mit sich. Durch das vorher Gesagte wird sie verständlicher geworden sein. Es soll nicht der Nachdruck auf das graduell kräftigere Hervortreten gewisser repetirter Symptome gelegt werden, sondern auf das Wiederkehren des Inhalts derselben, was sich mit den Recidiven mehr und mehr befestigt und sie so zu sagen noch überlebt. Die Intensität einer psychischen Krankheit kann mit ihren Wiederholungen nicht zunehmen, die Regenerationskraft des Organes ist dem zuwider; es kann also auch kein Symptom der Intensität nach ausgeprägter sein. — Unter das Gesetz solcher Wiederkehr dem Inhalte, also wesentlich dem Vorstellungsinhalte nach, fallen auch die einzelnen Paroxismen langwieriger Tobsuchten mit Remissionen, die Wechselgänge der folie circulaire; und ebenso findet sich in anderen chronischen Formen ein gewisser Vorstellungsinhalt gänzlich fixirt bis in den letzten Verfall. Dieses gesetzmässige Vorkommen solcher Wiederholungen und Fixirungen steht grosten Theils unter dem generellen Erfahrungsgesetze, wenigstens für mich hat es diesen Anspruch, dessen bereits früher gedacht worden ist, nämlich, dass das Recidiv dem Krankheitscharakter nach, mag auch die freie Zeit Jahre lang ausgestanden haben, doch nicht in der der ersten Krankheit entgegengesetzten Form verlaufen ist. — Die Möglichkeit eines modificirten Verlaufes dem Grade nach versteht sich von

selbst. Sie haben ja auch früher gehört, dass gegen ein Drittel der zum ersten Male rückfällig Gewordenen in geistigen Verfall gekommen sind. Ich will auch nicht die Möglichkeit eines entgegengesetzten Verlaufes abstreiten; hier gilt ja einfach Erfahrung gegen Erfahrung. Aber ich habe solches Vorkommen nicht beobachtet, und übersehe Alles in Allem doch 40 Recidivfälle ersten und zweiten Entstehens. Die vor 4, 6, 8 Jahren tobsüchtig oder melancholisch Gewesenen wurden es wieder, die melancholia attonita von heute trat vor einem und vor sechs Jahren genau so auf, der wiedergekommene Puerperal-Wahnsinn machte schon zweimal dieselben Phasen durch u, s. w. — Es geben diese Krankheits- oder Krankheitsformrepetitionen auch einen Gewinn für das Gebiet unserer Pathogenese ab, indem wir daraus erkennen, dass die reinsten und einfachsten Formen der Seelenstörungen nicht weniger regelrecht in den einmal gezogenen Grundlinien ablaufen, wie die mehr specifischen oder specifisch complicirten, obgleich wir aus dem leichten Wechsel der deprimirten und gehobenen Stimmung in gesunden Tagen, aus dem Uebergange der einen in die andere zumal in der Entwickelungszeit einer Psychose, aus dem geordneten Umtausche der einen mit der andern in der folie circulaire folgern müssen, dass beide Zustände sich sehr nahe liegen. Der Boden, worauf sie entstehen, der betroffene engere Organtheil ist gewiss der gemeinschaftliche; aber dennoch sind es keine Modificationen desselben Zustandes, es sind verschiedene organische Processe mit denselben Medien, deren anatomische Abänderung wir nicht kennen und die wir auch noch nicht recht nachmachen können. — Wenn diese einander so nahe liegenden Zustände ihr organische Selbstständigkeit besitzen, und sich also mit der Krankheit die ihnen eigene locale Disposition dazu steigern muss, so ist ein Reiteriren bei anderen Psychopathien, wobei der Krankheitsvorgang eine differentere Grundlage in sich und in den Gelegenheitsursachen hat, leichter begreiflich. Das Delirium potatorum, das Delirium acutum idiopathicum, der hallucinatorische Wahnsinn, die hysterischen Irrsinnsformen lassen uns das Stereotype bei ihrem Wiedererscheinen auf schon präsumtiv bekanntere Basen zurückführen. — Wenn nun der Krankheitsvorgang im Grossen sich in dieser Weise wiederholt, so liegt es schon in der dadurch verstärkten allgemeinen Prädisposition, dass auch die wichtigsten Theilerscheinungen, vor Allem die entsprechenden Vorstellungsanomalien, in ihrem Wiederkommen begünstigt werden. — In dem gesunden geistigen Leben ist jeder präsente Vorstellungsact abhängig vom Erfahrungsinhalte seines Organes, von der Zustandsempfindung im Allgemeinen, wie auch mit lokalisirtem Vorschlagen, und den frisch von Aussen her percipirten Beiträgen. Wir wissen, dass dieses Verhältniss bei Geisteskranken

Digitized by Google

ein abgeändertes ist. Das Zustandsgefühl im psychischen Organe und der Erfahrungsinhalt sind überwiegenden Einflusses auf die Vorstellungsthätigkeit, und die passirenden Sinnes- und anderen äusseren Zuthaten fallen mehr der prädisponirten Gemüthsseite, als der intellectuellen anheim. Das Material, was die Eindrücke der Aussenwelt für die Intellectualität liefern, wird darin allerdings häufig, aber zu flüchtig und viel zu wenig objectiv zur Geltung gebracht. Der Inhalt unserer Träume, der meistens aus stark fixirten Erfahrungsvorstellungen, sehr oft vorzugsweise aus momentanen Gefühlseindrücken herstammt und sich gern wiederholt, wird eher in den chronischen Delirien wieder zu finden sein, als die sensuellen Erlebnisse der Gegenwart. Also in den pathologischen Zuständen unserer Vorstellungsthätigkeit wird sich der Erfahrungsinhalt vorwiegend geltend machen müssen und um so mehr und gewisser, da die gleiche Stimmung von damals wieder etablirt ist. — Der Erfahrungsinhalt aber wird eine Modification erlitten haben durch andere Einflüsse von nicht vorübergehender, sensueller, sondern von tiefer eingreifender Natur. Liegt zwischen der ersten Krankheit und dem Recidive ein wichtiger Lebensabschnitt, z. B. Verheirathung, Alterswechsel, oder ein die Constitution verändernder Krankheitsprocess, dann ist es wohl begreiflich, dass damit der Erfahrungsinhalt in den Vorstellungen und die Grundstimmung des Gemüthes eine wesentliche Abänderung erlitten haben kann, und dass diese auch in den Aeusserungen der neuen Erkrankung sich offenbaren wird. — Eine Modification der bereits zum Ausbruche gekommenen Krankheit, wenn auch nur in kleinerem Maassstabe, wird durch den Wechsel des frühern Aufenthaltsortes bedingt werden mittels des Gegensatzes der angenehmern oder unangenehmern Einwirkung im Vergleiche zum frühern. Auf dieser Erfahrung beruht ja das oft weise Mittel des Anstaltswechsels bei einer neuen Erkrankung. Diese und noch andere Umstände können die psychische Prädisposition für und in dem erneuerten Krankheitsprocesse beeinflussen, so dass derselbe nicht genau in der Weise des alten verläuft. Hat aber erst ein Rückfall in der mit dem ersten Anfalle stimmenden Congruenz stattgefunden, so wird für die noch folgenden der Modus bereits sicher prädestinirt sein. — Freilich, wir wissen, dass sich damit auch das zarte Material der Form schon verschlechtert hat, und dass mit der gesunkenen Lebenskraft des Stoffes auch die Energie des Ausdruckes sich verringern muss. Aber die starkeren Züge bleiben stehen und nehmen durch ihre anorganisirte, wenn ich so sagen darf, Dauerhaftigkeit ihre Spuren in die folgende Zeit hinüber, sie mag nochmals Besserung, selbst einen guten Schein von Gesundheit mit sich bringen. An Beispielen wird es Keinem von uns fehlen, die zeigen, dass das wahrhaft essentielle Symptom, die

Digitized by Google

Repetition von Vorstellungsanomalien in Gruppen, oder vereinzelt, mit den entsprechenden Strebungen und Begehrungen in oft merkwürdig, ich kann sagen wörtlich, treuer Wiederkehr mit der neuen Erkrankung sich wiedereinfindet, und ich selber habe solcher nicht wenige in Erfahrung gebracht. — Wie nun grade sie und keine andern in ihrer Prädominenz bei den verschiedenen Individuen zu Stande gekommen sind, das lernen wir unschwer, wenn wir uns mit der Lebensgeschichte der Einzelnen genau bekannt machen können. — Wir sehen dabei, dass in ihrer Entwicklung genau die Gesetze gewaltet haben, unter welchen auch Jeder von uns sich von präoccupirend repetirenden Vorstellungsarten je nach seiner Stimmung erfasst sieht. Im Grunde unterscheiden wir Gesunde uns von den Kranken darin nur dadurch, dass wir in einem Falle discreter sind, im andern uns zeitiger Luft machen, und dass wir in allen Fällen uns mittelst Erfassung äusserer Hülfsmittel die nöthige Divergenz verschaffen können. Im Innern gebährden wir uns mit alten Grillen zu Zeiten ganz unvernünftig.

In der an diesen Vortrag sich knüpfenden Discussion äusserte zunächst Richarz sich ungefähr wie folgt. Der Vortragende habe bei einigen der von ihm geschilderten Fälle die folie circulaire erwähnt: ohne seine Bemerkungen geradezu auf diese Fälle anwenden zu wollen, glaubt R. doch, dass viele sogen. Recidive im Grunde als circuläre Psychosen angesprochen werden müssen. Zur Stütze dieser Behauptung erlaube er sich, seine Ansichten über das Wesen des circulären Irrseins, das für die psychiatrische Forschung eine der interessantesten Krankheitsformen sei, des Näheren zu entwickeln. — Den meisten essentiellen Psychosen, d. h. solchen, die in der Regel durch unverhältnissmässige und geringfügige Gelegenheitsursachen, oft spontan oder auf den blossen Anlass physiologischer, allgemein erregender Vorgänge, wie Pubertätsentwickelung oder Wochenbett, zum Ausbruch kommen und nur von unbedeutenden somatischen Krankheitserscheinungen begleitet sind, die somit als idiopathische und selbstständige Leiden des psychischen Organs aufgefasst werden müssen, liegt eine tiefe, meist ererbte oder angeborene, Prädisposition zu Grunde. Diese voraufgehende Anlage ist aber nicht etwas blos Potentielles, nicht eine lediglich ideelle Anwartschaft, dereinst psychisch krank zu werden, sondern eine präexistirende, von der für die Mehrzahl der Menschen geltenden Norm mehr oder minder abweichende Organisation und Functionsweise der dem Vorstellen dienenden Hirntheile, die stets in einer gleichmässig abnormen psychischen Daseinsform sich ausspricht. — Keine genuine psychische Erkrankung nun kann begriffen und un-

Digitized by Google

serem Verständniss nahe gebracht werden, ohne dass man vorher die habituelle Art des psychischen Seins und Geschehens bei dem bezüglichen Individuum erforscht und ohne dass man mit diesem individuellen psychischen Normalzustande die Krankheit ihrem Grundcharacter nach in Vergleich gestellt hätte. Es müssen die Charactere und Individualitäten studirt werden, welche von den krankgewordenen Personen in das psychische Leiden eingebracht sind.*) Die Erfahrung lehrt nun, dass, wie die ausgebildete Krankheit, so auch der ihr als Keim dienende, immerhin krankhafte Zustand sich entweder als vorwaltend depressive oder als vorwaltend exaltative Gemüthsart und Geistesrichtung manifestirt. Die mit psychischer Krankheitsanlage Behafteten sind meist entweder kleinmüthige Schwarzseher oder überheitere, leichtlebige Naturen, oft in Excentricitäten und Extravaganzen sich bewegende Optimisten und da fragt es sich denn bei einer Betrachtung der circulären Psychose zunächst: welche der beiden Phasen der Krankheit, die Depression oder die Exaltation, ist im gegebenen Falle dem individuellen Normalzustande, der das eigentliche Mycelium der Krankheit bildet, ihrem Character nach verwandt? Offenbar entfernt sich diese verwandte Phase — ohne deshalb prognostisch günstiger zu sein — weniger weit von der persönlichen relativen Gesundheit nach der Seite der Krankheit hin, als die entgegengesetzte.

Auf dem Boden der gewohnten Art des psychischen Seins entwickelt sich nämlich die actuelle Krankheit nach einem von zwei grossen psychopathologischen Gesetzen, entweder nach dem Gesetze der Identität oder nach dem des Contrastes. Merkwürdiger Weise sind dies dieselben Gesetze, welche als rein psychologische die Association der Vorstellungen vornehmlich beherrschen, indem diejenigen Vorstellungen sich am leichtesten einander wecken, welche inhaltlich, weil ihrem Stimmungscharacter nach, einander entweder ähnlich oder entgegengesetzt sind. Nach diesen Entwickelungsgesetzen ergeben sich nun in concreto folgende Krankheitsgestaltungen:

A. Depressiver psychischer Grundzustand.

1) Entwickelung nach dem Gesetze der Identität: ein Mensch von schwermüthigem Temperament verfällt in tiefe Melancholie, die

---

*) Wegen mancher Anklänge in meinen Aufstellungen an den trefflichen Vortrag von Benedikt „Ueber die Psychologie der Liebe," abgedruckt in dem Schlusshefte der „Vierteljahrschrift f. Psychiatrie," bemerke ich, dass dieser Abdruck erst nach unserer Sitzung zu meiner Kenntniss gekommen ist. R.

wohl seine Existenz aufs Aeusserste gefährdet, etwa durch Nahrungsverweigerung, acuten Selbstmord oder dergl.

2) Entwickelung nach dem Contrastgesetz: ein Kleinmüthiger springt plötzlich über in Exaltation und Tobsucht; die Prognose ist meist günstig.

B. Exaltativer Grundzustand:

1) Entwickelung nach dem Identitätsgesetz. Bei einem Zeitlebens Aufgeregten und Reizbaren steigert sich allmälig die Exaltation bis zum Extrem; geht auch wohl in wirkliche Manie über, die aber bald oder nach einiger Zeit den Character der Narrheit, der psychischen Schwäche, annimmt, vielleicht auch als Megalomanie sich der allgemeinen Paralyse zuwendet;

2) nach dem Contrastgesetz: ein stets heiter angeregter, geselliger und gesprächiger Mensch stürzt zeitweilig in Schwermuth, in welcher er sich allem Verkehr mit seinen Freunden entzieht, aber gewissermaassen brachliegend nur neue Kräfte sammelt für Fortführung seines ursprünglich exaltativen Wesens. Die Prognose ist nicht schlecht: Der angegebene Wechsel kann mehrfach sich vollziehen, ohne dass Spuren geistiger Schwächung bemerkbar würden. — Aus den angeführten Paradigmaten ersieht man ohne Weiteres, von welcher hohen prognostischen Bedeutung die Unterscheidung des Gesetzes ist, nach welchem die Krankheitsentwickelung statt gefunden hat. Durchgehends producirt das Contrastgesetz die bei Weitem günstigeren Fälle, während die Ausbildung eines solchen Leidens nach dem Identitätsgesetz, trotz oder vielmehr gerade wegen der Aehnlichkeit zwischen der Natur der Krankheit und der der relativen Gesundheit, die schlimme Bedeutung eines tieferen Einwurzelns und Umsichgreifens einer zur effectiven Krankheit sich steigernden, abnormen ursprünglichen Organisation hat.

Weiter zeigt die Beobachtung, dass die Entwickelung der Krankheit auf dem Grunde der präexistirenden geistigen Verfassung nach einem der beiden aufgestellten Gesetze wieder unter zweierlei Erscheinungsformen vor sich geht: sie ist entweder eine abortive oder eine continuirliche, eine abbrechende oder stätige. Bekanntlich geht den meisten Fällen selbst von sog. reiner Manie eine oft nur kurz dauernde Melancholie voran, wie ihnen auch oft eine solche nachfolgt. Ein solches melancholisches Vor- oder Schlussstadium ist denn ein abortives Entwicklungs-, resp. Abwicklungsstadium, so zwar, dass auch diese Abortiv-Entwicklung entweder nach dem Gesetze des Contrastes oder der Identität geschehen ist, je nachdem der vorherbestandene psychische Zustand den Exaltations- oder den Depressionscharakter an sich trug. Wie aber zur Manie oft ein melancholisches,

Digitized by Google

so gesellt sich auch manchmal, wenngleich seltener, zur Melancholie nach dem Contrastgesetz ein exaltatives Abortivstadium. — Man nähert sich nun schon dem Begriff des cyklischen Irreseins um ein Beträchtliches, wenn man sich bloss jene kurzen Vorbereitungs- und Abschliessungsstadien protrahirt und vielfach aneinander gereiht denkt, in der Art, dass es keinerlei abbrechende Entwicklung gibt, sondern nur eine stätige, ununterbrochene, vorwiegend contrastirende Ent- und Abwickelung. Und in der That fehlt es oft genug an einer Abortivperiode gänzlich oder sie bildet nur einen kurz abblitzenden Evolutionsversuch meist nach dem Identitätsgesetz. Es fungirt dann als Aequivalent die abnorme Gemüthsverfassung innerhalb der Grenzen der individuellen Gesundheit während des ganzen vorangegangenen Lebens. Der habituelle psychische Zustand ist überhaupt vielfach als die Vorstufe der Krankheit zu betrachten,*) an welche sich die folgenden Stadien nach einem jener beiden Grundgesetze oder auch abwechselnd nach dem einen und dem anderen anschliessen. Namentlich ist der Fall häufig, dass der individuelle relative Gesundheitszustand bei Leuten, die im gewöhnlichen Leben sehr lebhaft und stets heiter angeregt erscheinen und deshalb auch wohl für ganz ungewöhnlich gesund gelten, im Grunde nur eine perennirende gelinde Exaltation darstellt, die periodisch einer Melancholie weicht, in dieser seiner Bedeutung aber nicht erkannt wird. Der für ein Exaltationsstadium vicariirende Zustand, ein für die wissenschaftliche und ärztliche Anschauungsweise entschieden pathologischer, wird insgemein für ausgezeichnete Gesundheit gehalten, und erst, wann der Mensch wieder melancholisch wird, nennt man ihn schlechthin krank. Wo dies Verhältniss mit einer gewissen Beständigkeit abwechselt, so dass die Persönlichkeit stets entweder exaltirt (quasi gesund) oder deprimirt (krank) gefunden wird, da ist die Circularität schon hergestellt. Zu berücksichtigen bleibt dann noch, dass nach öfterer Wiederholung dieses Alternirens der pathologische Habitualzustand in der Regel bis zu dem Niveau mehr oder minder entschiedenen Krankseins sich hebt und dass eben unvollkommene Genesungen grossentheils und besonders in einer früheren Krankheitsperiode nicht sowohl in einem Defect der psychischen Kräfte, in Schwachsinn beruhen, als vielmehr in einer Potenzirung jener ursprünglichen Geistesverfassung, zu welcher der Kranke, nachdem er ihr durch die Krankheitsentwicklung zeitweilig entrückt worden, immer wieder zurückkehrt. Auf diese Weise kann man sich leicht eine circuläre Psychose construiren, welche als solche anfänglich

*) Schon Heinr. Neumann (Lehrbuch der Psychiatrie) hat dies angedeutet. R.

verkannt und für ein einfach recidivirendes Irresein angesehen wird. Freilich gehört dazu noch als wichtigster, ja entscheidender Factor, dass man für den betroffenen Organismus eine anhaltende Nothwendigkeit, eine Bedürftigkeit könnte man sagen, statuirt, stets entweder in der einen oder andern Weise, also mit Wechselhaftigkeit der Form, psychisch krank zu sein. In dieser Thatsache des Circulirens an und für sich aber liegt eben die ganze Ungünstigkeit der Prognose der cyklischen Geisteskrankheit beschlossen, indem sie concluant beweist, dass die psychische Zelle so pathologisch beschaffen ist, dass ihr das Gewinnen und Einhalten eines gewissen Mittelmaasses in derjenigen Molecularbewegung, welche ihre Lebensthätigkeit setzt, zur Unmöglichkeit, das beständige Schwanken zwischen den Extremen im Modus dieser Bewegung zur Nothwendigkeit geworden ist. Dies schliesst indessen, wie die Erfahrung zeigt, nicht aus, dass in der Mitte der Uebergangslinie von der Melancholie zur Manie oder von dieser zu jener oder auch auf beiden Punkten ein kurzes oder längeres Stadium relativen psychischen Wohlseins eingeschaltet sei.

Herr *Herz* hält den Unterschied fest: Eine Folie circulaire bestehe nur dann, wenn 2 verschiedene Krankheitsphasen mit einander abwechselten. Er habe die frühere individuelle Gesundheit als Norm hingestellt und die ursprüngliche Anlage weniger ins Auge gefasst.

Herr *Snell* betont die prognostisch ungünstige Form der Folie circulaire selbst dann, wenn das exaltirte Zwischenstadium mehr den Charakter eines gewissen Leichtsinnes, Uebermuthes habe, und man die Kranken gewöhnlich für gesund halte.

Richarz: Unläugbar kann es nicht verwehrt werden, die in dem Wechsel von Melancholie und Exaltation mitten inneliegende, indifferente Zwischenzeit aus dem Krankheitsgebilde auszuscheiden und als relative Gesundheit zu bezeichnen, insofern dieselbe eine wirkliche Restitutio in statum quo antea darstellt und einigen Bestand hat. Weniger statthaft schon ist dies, wenn diese Quasi-Genesung von sehr kurzer oder auch nur überhaupt von absehbarer Dauer ist. Jedenfalls aber wird diese Periode, möge man sie nun als eine der Wiederherstellung gelten lassen oder nicht, bei der tiefsten und richtigsten Betrachtung des Gegenstandes in den Decursus der Krankheitsphasen miteinbezogen werden müssen, weil sonst und ohne das Studium gerade der Uebergangsformen vom einfach recidivirenden zum ausgesprochen circulären Irresein die genetische Entwickelung nicht verstanden werden kann. Es handelt sich hier in Wahrheit meist um ein intercalirtes Krankheitsstadium, in welchem, um einen Vergleich aus der Chemie zu gebrauchen, die beiden Extreme der Depression und Exaltation sich

Digitized by Google

gleichsam neutralisirt haben, die eine zurückgewichen, die andere aber noch nicht wieder eingetreten ist. — Der angefochtenen Auffassungsweise übrigens, nach welcher unter den Begriff der folie circulaire ebensowohl diejenige Geisteskrankheit von alternirendem Charakter fällt, bei welcher die Zeiten eclatanten Krankseins durch eine Periode verhältnissmässigen Gesundseins getrennt sind, als auch diejenige, bei welcher dies nicht der Fall ist, erklärt Richarz noch in jüngster Zeit in Englischen Zeitschriften begegnet zu sein.*)

Herr *Nasse* richtet sich nun gegen einige andere Behauptungen von *Herz* und erwähnt, dass bei geistig hoch begabten Individuen auch noch nach einem 4. oder 5. Recidive geistige Integrität erlangt werde. Besonders ist dies, wie Herr *Oebeke* bemerkt, bei jugendlichen Individuen häufiger.

Ferner können Recidive auch in anderer Form zurückkehren, als wie die ursprüngliche Erkrankung war, und Tobsuchten verlaufen auch ohne Reproduction des Erfahrungsinhaltes als reine Ideenflucht.

Schliesslich und in Anschluss an eine Einwendung *Nasse*'s gegen *Herz*, bemerkt *Richarz:*

Dem materiellen Inhalte der irren Reden und dessen Ursprunge nachzuforschen, sei gewiss interessant, doch pathologisch von untergeordneter Bedeutung, und mehr nur von rein psychologischem Belang. Pathologisch habe fast nur das Formale des psychischen Geschehens, das Maass der Vorstellungsbewegung u. s. w. einen Werth.

Dr. *Meyer*: Ueber die Irrenwartung im Hinblick auf die sich vollziehenden Reformen des Irrenwesens überhaupt und des rheinischen im Besonderen.

Nachdem der Vortrag mit wenigen einleitenden Worten auf die psychiatrische Bedeutung und den klinischen Werth eines tüchtigen Wartpersonals hingewiesen, und dabei der von der Gesellschaft deutscher Aerzte zu St. Petersburg bereits vor 25 Jahren gestellten Preisaufgabe gedacht, constatirt er, dass es bis jetzt noch nicht gelungen die so oft beklagte Wärternoth zu heben oder auch nur zu mindern, im Gegentheil sei in dem Maasse als das Irrenwesen in Staat und Wissenschaft grössere Beachtung gefunden, sie nur noch um so fühlbarer geworden. — Als Belag hierfür wird statt vieles Andern, auf

---

*) Sie findet sich auch bei *Kahlbaum* („die Gruppirung der psychischen Krankheiten") S. 72 u. f., wo auch noch Andere genannt sind.

R.

Digitized by Google

den letzten Jahresbericht der Anstalt zu Siegburg verwiesen, worin, als eine stereotype Wahrnehmung, abermals der grosse Wechsel im Wartpersonal, namentlich auf der männnlichen Seite beklagt wird. — Von 36 schieden 16 im Laufe des Jahres aus. — Und dies müssen wir, heisst es von der Anstalt vernehmen, wo durch die Jacobi-Stiftung seit 20 Jahren man bemüht ist, in aufmunterndster Weise die Dienste des Wartpersonals anzuerkennen. — Aehnliches und noch viel Schlimmeres liesse sich von vielen anderen Anstalten berichten.

Diese Erscheinung muss mit Besorgniss erfüllen, Angesichts der projectirten (5) neuen Anstalten.

Der Vortragende sucht dies nun in einem statistischen Discourse des Näheren zu begründen, aus dem wir Folgendes als das Wesentlichen hervorheben:

Die Bevölkerung der Rheinprovinz betrug (nach Otto Hübner) bei der letzten Zählung (3. November 1867) 3,454,152 Seelen, wird also einschliesslich des inzwischen erfolgten Zuwachses, — nach G. G. Hoffmann — jährlich ca 30,000, — gegenwärtig auf ca. 3¼ Millionen angeschlagen werden können.

Die Gesammtzahl der Irren, incl. Blödsinnigen belief sich, nach der amtlichen Erhebung, auf 6807 — also nahezu 2 : 1000 — wird aber ohne Zweifel, wie fast allenthalben in Deutschland, bei noch sorgfältigerer Zählung (Diagnose) sich auf 3 : 1000 stellen, das Irrencontingent mithin p. p. 10,500 betragen.

Welche Ziffer man aber nun auch annehme als die richtige, immerhin erwartet eine grosse Zahl Versetzung in eine Anstalt und eine nicht geringere von denen, welche dieser Wohlthat nicht theilhaftig werden, eine bessere Pflege und Wartung daheim: eine zeitgemässe Reform der Irrenpflege aber hat Allen Rechnung zu tragen.

Nach ungefährem Ueberschlage befanden zu Ende 1868 sich 2260 in Anstaltspflege und zwar:

a) in öffentlichen, resp. städtischen	1280
b) in Privatanstalten	980
Sa.	2260

also:

c) ausserhalb 8240, beziehentlich 4547.

Wie gross also wird der Bedarf an Wartpersonal sein?

Auch hier geben wir zu unterscheiden, Kranke innerhalb und Kranke ausserhalb der Anstalt. Denn während von Letzteren ein nicht geringer, ja der bei weitem grösste Theil der Familienpflege anheimfällt, aus œkonomischen Gründen immer anheimfallen wird und auch anheimfallen darf, ist es hier einzig das professionelle Wärter-

Digitized by Google

thum, was in Anwendung kommt*) und in dem Masse mehr als die Anstalten vorwiegend Heilanstalten sind, viele Unruhige, Tobende beherbergen, oder Solche, die strengerer Ueberwachung bedürfen. Die nach dem no-restraint-System verwalteten Anstalten nehmen über dies in dieser Beziehung eine ganz exceptionelle Stellung ein, verlangen ein bei Weitem grösseres Wärterpersonal.

Die Frage, wie viele Kranke auf Einen Wärter zu rechnen, ist also stets relativ zu beantworten. Da es jedoch, zumal bei Errichtung grösserer Anstalten von Interesse ist, eine Art von Durchschnittsziffer zu erhalten, um den betreffenden Theil des Etats danach zu veranschlagen, so versucht der Vortragende auf Grund von Aussprüchen psychiatrischer Autoritäten eine gewisse Norm in dieser Hinsicht aufzufinden.

Nachdem er einen kurzen historischen Rückblick in das vorpsychiatrische Zeitalter in die Zeit der Tollhäuser und Narrenthürme geworfen, wo es sich blos um Unschädlichmachung handelte und von Irrenwartung noch nichts zu finden ist — man kannte nur Irrenhüter — wendet er sich ohne Weiteres zu den Zeitgenossen und der jüngsten Vergangenheit, — Er unterlässt es die sehr von einander abweichenden Ansichten einzeln zu rezitiren, sondern bemerkt einfach, dass dieselben in einer Breite von 5 bis 10 für eigentliche Heilanstalten, und von 8 bis 12 und mehr für Bewahranstalten variiren. — Diesem gegenüber glaubte er ein zuverlässigeres Auskunftsmittel, eine Art von Collectivvotum sich zu verschaffen, indem er die Anstalten selbst befragte, d. h. indem er die actuellen Zustände einer Anzahl (12) von anerkannt gut verwalteten, nicht rheinischen Anstalten in Bezug auf unsere Fage einer Untersuchung unterwarf (cfr. *Reil*). Es wurde hierbei die dankenswerthe Aufstellung im XXII. Bde. der allgem. Zeitschr. f. Psych. benutzt. Die Angaben beziehen sich zwar zumeist anf das Jahr 1864, doch verschlägt dies ja für unsern Zweck nichts, da die betreffenden Verhältnisse wohl so ziemlich als gleichbleibend angesehen werden dürfen. — Die so-gefundene Verhältnissziffer für 4311 Kranke war im Durchschnitt = 1 : 6,5, während in concreto, d. h. für jede einzelne Anstalt sie schwankte zwischen 2 und 10, beides Einzelfälle. Man wird also als Durchschnittsziffer (Heil-) Anstalten immerhin 6 : 1 annehmen dürfen, und demgemäss würden die 23 rheinischen Anstalten mit einer Krankenzahl von 2260 Personen 376 Wärter und Wärterinnen bedürfen, — Hierbei ist allerdings der

*) Die vielfältig beobachtete Verwendung von Convalescenten und ruhigen, gutmüthigen Kranken für den Wärterdienst bleibt stets bedenklich und darf nur ausnahmsweise verstattet sein.

Umstand, dass Heil- und Pflegeanstalten durcheinander gerechnet sind, zu beachten, doch dürfte dagegen der angenommene Satz für spezifische Heilanstalten viel zu gering gegriffen sein, und so sich der Bedarf im Ganzen wieder ausgleichen, zumal eine Beschränkung in der Anwendung psychischer Zwangmittel nur durch Vermehrung der geistigen Hilfen — Wärter — erzielt werden kann, wie dies — als heilsame Frucht des no-restraint — doch Aufgabe der modernen Psychiatrie sein und bleiben muss.

Nach den von uns gesammelten Notizen — heisst es weiter — die freilich nur als annäherungsweise richtig angenommen werden können und wobei ebenfalls die in dem vorhin citirten Aufsatze der Zeitschr. f. Psych. enthaltenen Zahlen zu Grunde gelegt wurden, befinden sich jedoch in sämmtlichen Anstalten der Provinz nur ca. 220 Wärter und Wärterinnen und würde, falls obige als Normale gelten soll, der Wartpersonalbestand noch um 143 oder in runder Summe um 150 zu vermehren sein. —

Erwägt man nun ferner, dass von den ausserhalb der Anstalten lebenden — Externen — mögen sie nun 4547 oder 8240 betragen, immerhin ⅓ in den neuen Anstalten, also 1500 resp. 2000 übergeben werden dürften, so involvirt das abermals einen offenen Bedarf von 250 bis 330, mithin in toto für die bestehenden und zu errichtenden Anstalten der Provinz von 400 resp. 580.

Hiernach wendet sich der Vortrag zu den ausserhalb der Anstalten lebenden Kranken. Und da heisst es: Haben wir solchen Anforderungen gegenüber nun wohl noch Aussicht, unsere Fürsorge auf die Familienpflege auszudehnen? Wir möchten es fast bezweifeln. Und doch, wollen wir unser Werk nicht halb gethan sein lassen, so dürfen wir unser Herz vor dem Schicksal jener Tausende nicht verschliessen, die ja eben deshalb weil sie das Glück entbehren, in eine wohlgeordnete Anstaltspflege untergebracht zu werden, zwiefach unglücklich, zwiefach hilfsbedürftig. — Und sind es dann — wird weiter gefragt — nicht gerade die frischen Fälle, die eben ausgebrochene Krankheit, wo ein erfahrener Wärter unaussprechlich werthvoll ist. Welchem Arzte wären die Verlegenheiten, die gänzliche Rathlosigkeit unbekannt, mit welcher man im Familienleben solchen Kranken gewöhnlich gegenübersteht. Und ferner mit welchen Schwierigkeiten ist nicht der Transport in die Anstalt verbunden, welche Verstösse und selbst Roheiten werden da begangen blos aus Mangel an der nöthigen Erfahrung?

Wir wenden uns nun zum zweiten Theil unserer Aufgabe:

Wo und wie gewinnt man nun ein tüchtiges und auslängliches Wartpersonal?

Digitized by Google

Der Weg der freien Werbung auf Lohn — Lohndienst — war bisher, wenn auch nicht der einzige, doch der vorwiegend lockendere, trotzdem er sich längst als nicht ausländlich erwiesen hat und seiner Natur nach — wie jeder Söldnerdienst — sich auch schwerlich jemals erweisen wird. Denn abgesehen davon, dass dem so Gewonnenen von vorn her ein noch jede praktische Tüchtigkeit abgeht, es den meisten auch an der nöthigen Anlage und, was die Hauptsache, an Liebe zur Sache und deshalb an Ausdauer fehlt, und diese ist es ja doch am Ende allein, welche die rechte Tüchtigkeit schafft.

Als einen sehr wichtigen Erscheinungsgrund für die Gewinnung eines tüchtigen Wart-Personals bezeichnet der Vortrag neben einem, — jugendlichen Gemüthern wenig zusagenden Ernst des Berufes, zu geringen Lohn, besonders aber den Umstand, dass der Cölibat, namentlich für den weiblichen Theil doch wohl eine unerlässliche Bedingung bleiben muss.

Es lag desshalb nahe, zumal in unserer Provinz, wo religiöser Sinn und kirchliches Leben, mit seinen vielen, in Werken der Liebe thätigen Orden und geistlichen Genossenschaften ein Erbgut der Bevölkerung ist, wie für die übrige Krankenpflege, so auch für diesen Dienst das Princip christlicher Charistie wach zu rufen. — Und welche menschliche Zunge wäre auch wohl im Stande, alle die grossen Thaten zu verkünden, welche diesem gottgeheiligten Boden für die leidende Menschheit entsprossen? Und dennoch, man muss es bekennen, dennoch sind die Erwartungen in Betreff der Irrenpflege nur zu einem geringen Theile bis jetzt realisirt worden, ja es hat sogar vielfältig scheinen wollen, als verwandeln sich in denselben Händen, welche der geängsteten Seele den labenden Becher des Trostes zu reichen beflissen, der dargereichte Trank in eitel Gift- und Haderwasser.

Aus diesem Grunde ist es denn auch zu erklären, dass in gar vielen Anstalten die Ordenspflege völlig ausgeschlossen worden ist, andere gegen ihre Einführung sich sträuben und in noch anderen, wo sie bereits eingeführt war, sie wieder aufgehoben ist. — Wir dürfen uns der Aufgabe nicht entziehen, nach dem Schlüssel für diese frappante Erscheinung zu forschen.

Lassen Sie, heisst es im Vortrage, nichts einfach ohne alle Introduction, aussprechen: es ist der Aberwitz des hochmüthigen und doch so kurzsichtigen Menschen-, richtiger Kastengeistes, der sich vermisst, im Lichte der Offenbarung die sublunarischen Dinge und biologischen Vorgänge im Menschen zu deuteln, die ewigen Gesetze der Natur authentisch zu interpretiren, während ihm doch jedes wissenschaftliche Verständniss abgeht u. s. w,

Ueber dieser, dem innersten Wesen der Gegensätzlichkeit zwischen

Digitized by Google

kirchlicher und profanwissenschaftlicher Weltanschauung entstammenden Urkontroverse der Christenheit, ist es der in religiösen Gesellschaften und Orden nur zu häufig vorfindliche Geist der Hierarchie und der confessionellen Unduldsamkeit, welcher zu Conflicten mancher Art — wir haben hier natürlich gemischte (Simultan-) Anstalten im Auge — besonders mit der Verwaltung reichen Anlass giebt, den Frieden und die Einigkeit des Anstaltslebens stört und so, wie schon gesagt, Segen in Fluch verwandelt! —

„Aber dennoch" fährt der Vortragende fort, „dennoch giebt es kein Gebiet so reich an thatkräftigen Elementen für unseren Zweck, als eben das religiöse und wenn Sie wollen, selbst das kirchliche, letzteres freilich aber nur insofern, als die Kirche in Wahrheit ist, und nichts anderes sein will, als was sie ihrer Bestimmung nach sein soll — eine dienende Magd, frei von allem hierarchischen Gelüste, einzig bestrebt nach dem Vorbild ihres Stifters, Heil und Segen zu bringen für die leidende Menschheit und Frieden zu schaffen unter den Völkern. Und glücklicher Weise giebt es, Dank der so viel verketzerten Aufklärung unserer Tage, bereits ein grosses Volk auf Gottes weiter Erde, welches, Feind aller Engherzigkeit und Selbstsucht, sein humanistisches Pfingsten gefeiert und Antwort auf die Frage erhalten hat: wer ist mein Nächster? — Kurz, wir senden unsere Boten und Werber überall dahin:

„Wo in der Brust ein warmes Herz für fremde Leiden schläget, ob Katholik, ob Protestant, ob Jud', ob Christ — wir suchen Samariter."

Woher man sein Personal nun auch immer nehme, stets wird es Rohstoff sein, dem die erforderliche Ausbildung und Zurüstung noch zu geben ist. — Dies war bisher Aufgabe der Anstalten selbst und nur mit nicht geringem Aufwand von Mühe und Zeit zu erreichen, wenn es überhaupt erreicht wurde und der Angeworbene nicht über kurz oder lang, wegen Ungeeignetheit entlassen werden musste, oder weil er ihm nicht zusagte, selbst den Dienst aufkündigte.

Man hat desshalb auch bekanntlich die Gründung eigener Bildungsanstalten und Wärterschulen empfohlen, und dies ist es auch, was mein Vortrag beabsichtigt." —

Wir erfahren bei dieser Gelegenheit, dass der Vortragende schon vor 20 Jahren dieserhalb wegen Errichtung einer solchen Bildungs-Anstalt mit Regierung und Ministerium in Verhandlung getreten, dieselbe aber, wie so vieles Andere, aus Ungunst der damaligen politischen Verhältnisse, ohne Erfolg geblieben.

Er schliesst seinen Vortrag mit folgenden Worten:

„Wir beabsichtigen jedoch keineswegs schon heute mit einem bis

Digitized by Google

in seinen Details fertigen Projekt vor Sie hinzutreten; unser ganzes Streben ist zunächst nur darauf gerichtet, Ihre Aufmerksamkeit, anlässlich der Bewegungen, welche in der rheinischen Irrenpflege Platz gegriffen, von Neuem darauf hinzulenken und wenn es mehr sein könnte, den Gegenstand zur Debatte zu bringen. Zu diesem Ende legt er im Nachstehenden:

Grundzüge eines Entwurfs für eine Irrenpflege-Ordnung der Rheinprovinz vor:

§. 1.

Zur Gewinnung eines tüchtigen Personals für die Provinzial-Irrenpflege sind in der Rheinprovinz zwei Bildungsanstalten — Irrenpflege-Seminare zu gründen, eins für die männlichen, eins für die weiblichen Kranken.

§. 2.

Die Kosten der ersten Einrichtung trägt die Provinz und ebenso die der Unterhaltung, so lange und insoweit die anderweitigen, auf möglichste Selbsterhaltung abzielenden Hilfsquellen, sich noch nicht ausgiebig genug erwiesen.

§. 3.

Da die Aufgabe des Instituts eine rein praktische ist, so ist es mit einer (2?) der bestehenden Irrenheilanstalten zu verbinden.

§. 4.

Die Zahl der gleichmässig aufzunehmenden Schüler (Präparanden) soll für jede Anstalt 12 bis 20 betragen.

§. 5.

Der Lehrcursus umfasst ein halbes Jahr und verfällt in einen theoretischen und practischen, nach Anleitung eines auf dem Wege des Concurses zu beschaffenden Lehrbuches (Unterweisers).

§. 6.

Der Unterricht wird vom Director der Anstalt ertheilt, oder von einem dazu qualificirten Vertreter desselben.

§. 7.

Für die Dauer der Lehrzeit erhält jeder Zögling freie Station in der Anstalt.

§. 8.

Die Aufnahme geschieht nach Ausweis über den bisherigen Lebenswandel etc. durch den Director.

§. 9.

Erweist sich der Aufgenommene für den Dienst tauglich, so wird nach Absolvirung des Cursus er zunächst provisorisch und nach einem

Digitized by Google

Jahre definitiv angestellt, mit einer Anwartschaft auf den vollen Genuss der Competenzen, welche das Institut seinen Mitgliedern bietet.

§. 10.

Diese bestehen:

a) in einem regelmässig festgestellten Jahresgehalt, während der Dauer seiner Dienstzeit;

b) in einer Versorgung resp. Unterstützung nach seiner Quiescirung (Pension).

Verzeichniss der Anstalten mit Bezug auf Seite

Namen der Anstalt.	Zahl der Kranken.	Wartpersonal.		Summa.	Durchschnittsziffer.
		männliches	weibliches		
Wien	879	88	32	120	7
Halle	486	I + 25	I + 23	50	9
Illenau . . .	291	II + 32	III + 52	89	3
Frankfurt a. M.	124	I + 16	I + 14	32	4
Werneck . .	336	I + 25	I + 24	51	6
Hildesheim .	856	II + 53	II + 40	97	8
Sachsenberg .	252	I + 20	I + 20	42	6
Schweizerhof	54	—	VII + 19	26	2
Winnenthal .	140	I + 12	I + 9	23	6
Sonnenstein .	211	29	24	53	4
Schwetz . . .	257	I + 16	I + 16	34	7
Hofheim . . .	425	I + 21	I + 19	42	10
	4311	XI + 337	XIX + 292	659	$72^{12}/_{6}$ im Durchschnitt.

An der Discussion betheiligten sich vorzugsweise *Diel*, *Laehr*, *Nasse*, *Richarz*, *Röchling* und *Snell*.

Es wurden verschiedene anderweitige Vorschläge vorgebracht, doch kam es zu keiner allgemeinen Einigung, und es behält sich die Gesellschaft dahin bezügliche Anträge vor. Vorzüglich war es die Forderung eines höheren Gehaltes, das Recht der Pensionirung und die Anstellung der Wärter als Beamte der Anstalt, welche zur Sprache kamen.

Da die Herren *Brosius* und *Obernier* verhindert waren, die von

Digitized by Google

ihnen angekündigten Vorträge zu halten, so referirt *Pelman* über eine jüngst erschienene Dissertation des Dr. *Madelung* — Ueber die Anwendung der Einreibungen mit Ungt. stib. kal. tartar. in die Scheitelgegend bei bestimmten Psychosen, Bonn, 1869. *M.* beginnt mit einer kurzen historischen Einleitung über diese verhältnissmässig neue Kurmethode, welche zuerst von *Anton Müller* in Würzburg 1823 und dann von *Oegge* 1828 ausgeübt und beschrieben wurde. Doch bleiben diese sowohl wie die späteren von *Amelung* in Hofheim 1829, 36 und 37 veröffentlichten Versuche nur vereinzelt, bis endlich diese Art der Anwendung des tart. stib. von *Jakobi* in Siegburg in ein System gebracht und in einem Aufsatze dieser Zeitschrift (XI. 369 ff.) ausführlich beschrieben wurde.

Seitdem ist noch manche Stimme dafür, mehr wohl dagegen laut geworden und eine eigentliche Anwendung als Kurmethode dürfte diese Art der Behandlung nur noch in Siegburg, der eigentlichen Wiege derselben, finden.

Hier hat auch der Verfasser während eines sechswöchentlichen practischen Cursus Gelegenheit gehabt, die Art und Weise der Anwendung, so wie ihre Wirkung in Augenschein zu nehmen und er schildert beides nach persönlicher Anschauung. Da hierbei übrigens die von *Jakobi* angegebene Methode im Wesentlichen auch heute noch befolgt wird, so kann ich deshalb auf den Originalaufsatz verweisen.

Verfasser hat seiner Arbeit 19 Krankheitsfälle, meist aus dem Jahre 1868, zu Grunde gelegt, bei welchen die Einreibung in Anwendung kam. Von diesen 19 genasen 4, 4 wurden als gebessert entlassen, 11 blieben unverändert, eine Verschlimmerung des psychischen Zustandes ergab sich nirgends, ebenso wenig irgend eine Gefährdung des körperlichen.

Von den 4 Genesenen sind 3 tobsüchtig, 1 melancholisch, von den 4 gebesserten 2 tobsüchtig, 2 melancholisch. Alle behandelten Fälle sind zur Zeit der Einreibung schon ziemlich alt, die kürzeste Krankheitsdauer betrug 4½ Monat, die längste 3 Jahre, die meisten standen zwischen dem 9. und 18. Monat der Krankheitsdauer. Wie wirken nun die Einreibungen? Es theilen sich hier die Ansichten in 3 Gruppen, die Einen sehen in den Einreibungen ein local kräftig einwirkendes Ableitungsmittel, die anderen suchen im Schmerz das wirksame Agens, während eine dritte Gruppe die im ganzen Organismus bewirkte Reaction, die Veränderung des Allgemeinbefindens für das wichtigste hält. *M.* geht diese verschiedenen Ansichten mit Sachkenntniss und in kritischer Weise durch, und macht besonders gegen die beiden ersten geltend, dass die dauernde Besserung nicht auf der Höhe der Entzündung und Anschwellung eintritt, wo doch Ableitung und Schmerz am

Digitized by Google

stärksten sind, sondern meist erst bedeutend später, in einzelnen unzweifelhaft durch die Einreibung in ihrer günstigen Wendung beeinflussten Fällen erst nach Wochen. Er entscheidet sich dagegen für die dritte Meinung und sieht mit *Amelung* in der Hervorbringung einer Revolution im Organismus das eigentlich Wirksame der Einreibungen.

Die nun folgende Schilderung scheint mir eine unveränderte Wiedergabe zu verdienen. „Mir erscheint der Zustand, den die Einreibungen hervorbringen, als eine wirkliche bedeutende acute „Krankheit," einem Erysipel, Intermittens, leichtem Typhus an Bedeutung zum Theil nahekommend, zum Theil übertreffend. Und so erscheinen mir auch die Erklärungen, die man (cf. *Nasse* Ztschr. f. Psych. 1864, über den Einfluss des Wechselfiebers auf das Irresein; *Schlager*, österr. Ztschr. f. prakt. Heilk. 1857) für die im Verlauf dieser Erkrankungen so häufig beobachteten Besserungen psychischer Leiden aufstellte, als gleichmässig geltend für die Besserungen, welche den Einreibungen folgten. Die Pockensalbenwunde erregt Fieber, ein Fieber, das, 5—6 Tage dauernd, zuweilen eine beträchtliche Höhe erreicht. Das bei Krankheiten dieser Art, selbst bei sonstigem Wohlbefinden meist träge und kraftlos sich contrahirende Herz wird zu stürmischen Schlägen angeregt. Das gesammte Gefässsystem kommt in Erregung, auch das des Gehirns. Stauungen in den verschiedensten Theilen des Körpers werden überwunden, die ganze resorbirende Thätigkeit des Gefässsystemes, die Acte der Endosmose und Exosmose von neuem angeregt. In raschem Strom kreist das Blut durch die Adern, aber auch die Qualität des Stromes ist verändert. Dem Organismus fremd gewordene, abgelagerte Oxydationsproducte hat er mit sich fortgerissen, die Abgabe derselben durch Harn und Schweiss ist vermehrt. Die Blutbahn selbst ist zu gleicher Zeit verändert. An der Stelle der Verwundung muss ein neues Capillarnetz zur Ernährung der Granulationen, die die Scharte ausfüllen sollen, aufgebaut werden. Eine Menge zu diesem Zwecke erweiterter Gefässe tritt als Stellvertreter in der Blutaufnahme für die Gefässe der Hirnrinde auf. Die Blutmenge an sich ist verringert, nicht so sehr durch die Abgabe der weissen Blutkörperchen als Eiter, als durch die destruirende Kraft des Fiebers selbst. Eine allgemeine bald grössere bald geringere Anämie ist entstanden, documentirt sich dem Beobachter durch das bleiche verfallene Aussehen des Patienten, durch die allgemeine oft bedeutende Gewichtsabnahme. Bevor dies Alles sich ausgeglichen, haben in günstigen Fällen die Gefässe der Hirnrinde Zeit gehabt, sich auf ihr normales Volumen zu reduciren. Unter günstigen äusseren Bedingungen ist Heilung eingetreten."

Zum Schluss versucht *M.*, bestimmte Indicationen für die Anwen-

Digitized by Google

dung der Pockensalbe aufzustellen. Im Allgemeinen werden hier nur chronische Fälle in Betracht kommen, wo keine acute Erregung mehr herrscht und uns keine körperliche Schwäche den zu grossen Eingriff des Fiebers fürchten lässt oder der Erethismus des Herzens vor neuen Reizen warnt. Es sind also nur: Formen langdauernder chronischer Tobsucht und Melancholie, bei denen man anhaltende venöse Congestionen nach dem Kopfe und deren Producte bekämpfen will, Fälle, „in denen das Allgemeinbefinden sich seit dem Ausbruch der Krankheit wieder gehoben, die Ernährung gut zu nennen ist, in denen so oft schon das beständig geröthete heisse Gesicht, die blutunterlaufenen Augen, das Hitzegefühl im Kopf die Diagnose einer Blutüberfüllung des Schädelinhaltes erleichtert," wo aber auch der psychische Verfall noch nicht so weit vorgeschritten ist, dass sich eine Genesung des Patienten als völlig aussichtslos darstellt.

Die Discussion über diese fleissige und interessante Arbeit des jungen Verfassers ergiebt zahlreiche Beiträge zur Casuistik. *Nasse* sah früher in 25 Fällen 4mal Heilung eintreten, in Siegburg allein dagegen in 40 Fällen 11mal völlige Genesung, und zwar 5mal bei stupider Melancholie, 6mal bei chronischer Manie.

Richarz führt aus seiner Praxis den Fall einer bis ins dritte Vierteljahr dauernden Manie an, in welchem alle physiologischen Bedingungen der Genesung hergestellt schienen, diese aber nicht erfolgte, sondern Andeutungen von psychischer Schwäche sich zeigten, durch die methodischen Einreibungen des Unguent. Stibio-Kali tart. jedoch Heilung erzielt ward. In wesentlicher Uebereinstimmung mit dem Verfasser der Dissertation erklärt er sich die Wirkung dieses heroischen Mittels als eine substitutive, ähnlich dem, was von den Franzosen Medication perturbatrice genannt wird. Der Organismus habe gleichsam, um bildlich zu sprechen, nicht Material genug, um zwei Krankheiten zu gleicher Zeit damit zu versehen, und indem man künstlich eine bestimmte, anderweite Allgemeinerkrankung hervorrufe, zwinge man ihn oft, das primäre Leiden gewissermaassen im Stiche zu lassen, in ähnlicher Weise, wie man spontan dies durch Typhus, Wechselfieber etc. nach dem Gesetze des Metaschematismus bewirkt werden sehe.

Hiermit war die Reihe der Vorträge erledigt; ein Antrag, dass es jedem Mitgliede fernerhin gestattet sei, einen Gast mit in die Versammlung zu bringen, wurde nach kurzer Verhandlung genehmigt, und nachdem der bisherige Vorstand aufs Neue wiedergewählt und der Termin der nächsten Versammlung auf den 6. November c. festgesetzt worden, wurde die Sitzung um 3 Uhr Nachmittags geschlossen.

Pelman, Secretär.

Digitized by Google

Bericht über die 7. ordentliche Versammlung des psychiatrischen Vereines zu Berlin, am 15. Juni 1869.

Die Herren Collegen *Böttger*, *Ideler*, *Kahlbaum*, *Laehr*, *Levinstein*, *Reimer*, *Schroeter* und *Ulrich* hatten sich zu dieser Sitzung, der Einladung des Vorstandes entsprechend, im Asyl Schweizerhof eingefunden.

Der Vorsitzende, welcher die anwesenden Collegen in seiner Anstalt herzlich willkommen hiess, eröffnete die Sitzung mit der Mittheilung, dass die Herren *Müller*, *Wendt*, *Jung*, *v. Gellhorn* an ihrem Kommen gehindert worden wären und ihre Nichttheilnahme an der heutigen Sitzung bedauerten, die als Jahressitzung von besonderer Bedeutung sei, und hob hervor, dass der Vorstand die diesmalige Versammlung in der Voraussetzung nach Schweizerhof berufen habe, es werde den Collegen die Besichtigung der in den beiden letzten Jahren erbauten 3 durch Parkanlagen von einander getrennten Krankenhäuser: „Haus Damerow", „Haus Flemming" und „Haus Roller" von Interesse sein; auch habe der Vorstand angenommen, es werde den Mitgliedern, mit Rücksicht auf die herrschende Jahreszeit, die Verlegung des Sitzungs - Locales aus der Stadt nach einem ländlichen Aufenthalt nicht unwillkommen erscheinen.

Sodann berichtete der Vorsitzende über die Ereignisse des verflossenen Vereinsjahres, gedachte des während desselben erfolgten Hintrittes der Collegen *Griesinger*, *Kern* und *Löwenhardt* und gab, während er den beiden Ersteren schon in früherer Sitzung einen Nachruf gewidmet hatte, von dem letztverstorbenen um die Psychiatrie so hochverdienten Collegen, eine gedrängte Schilderung seines Lebens und seiner irrenärztlichen Wirksamkeit und forderte die Versammlung auf, das Andenken des Hingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen zu ehren.

Nachdem schliesslich über die in einer Sitzung zu Eisenach gefassten Beschlüsse des Vorstandes des deutschen Vereins der Irrenärzte betreffs der Versammlung derselben in Innsbruck referirt und eine Uebersicht der Arbeiten des verflossenen Jahres gegeben war, auch der Secretair über den Fortgang des Vereins-Lesecirkels berichtet hatte, erfolgte nach §. 4. der Statuten die Neuwahl des Vorstandes für das nächste Jahr. Es wurde der bisherige Vorstand, Dr. *Laehr* als Vor-

Digitized by Google

sitzender und der Unterzeichnete als Secretair, auf's Neue gewählt und die Neuwahl von denselben angenommen.

Zu den angemeldeten Vorträgen übergehend, sprach

Dr. *Ulrich*, Ueber subnormale Körperwärme mit Zugrundelegung zweier Fälle.

In 2 Krankheitsfällen mit subnormaler Körperwärme erreichen zwar die Temperatursenkungen nicht die enorme Tiefe, wie in den von *Löwenhardt* publicirten Fällen, sie bieten aber insofern besonderes Interesse, als die äusseren Schädlichkeiten, die in den *Löwenhardt*'schen Fällen so wesentlich zur Verminderung der Körperwärme beitrugen, nämlich die in Folge der Unreinlichkeit der Kranken nothwendigen häufigen Bäder und die Neigung des Kranken, sich zu entblössen, hier nicht in Betracht kommen.

Der erste Fall betrifft einen Tagelöhner, *Christian L.*, 55 Jahre alt, am 4. Mai 1868 in unsere Anstalt aufgenommen, am 12. October ejusd. darin verstorben. Ueber etwaige Erblichkeit und frühere Krankheiten fehlen die Nachrichten. *L.* ist seit dem Jahre 1843 zum zweiten Male verheirathet und hat aus dieser Ehe 7 Kinder am Leben. Seit Jahren war er dem Branntweingenuss in hohem Maasse ergeben. „Abgesehen von zwei länger dauernden Krankheiten, der letzteren vor etwa 7 Jahren", welche rheumatisch gewesen zu sein scheinen, „erfreute er sich im Ganzen einer guten Gesundheit". Nach anderer Aussage soll er jedoch schon im Juli 1863 etwa 4 Wochen lang geisteskrank gewesen sein; er ging rastlos umher, redete viel und hatte etwa alle 3—4 Tage krampfhafte Zuckungen im Gesicht und in den Gliedern, unter denen er zu Boden fiel und anscheinend das Bewusstsein verlor. Seit dieser Zeit blieb er immer etwas erregt, sang viel bei der Arbeit, war sehr lustig. Anfangs Herbst 1867 wurde er heftiger und geschwätziger, und soll seinem 2—3jährigen Sohne soviel Schnaps zu trinken gegeben haben, dass dieser nach etwa 12 Stunden starb. Im Laufe des Winters schlief er oft viele Nächte nicht, lärmte, hatte Gesichtstäuschungen, misshandelte Frau und Kinder, ging aber Tags noch immer zur Arbeit. Kurz vor Weihnachten 1867 soll er wieder einen Krampfanfall gehabt haben. Seit Mitte April 1868 arbeitete er nicht mehr und hatte wiederholt vollständige Tobsuchtsanfälle, in denen er Alles zerschlug und zerriss. Schlaf fehlte fast ganz, der Appetit war sehr gut, Stuhl- und Urin-Auslerungen liess er meist unter sich.

Stat. praes.: Pat. ist von mittlerer Grösse, starkknochig, sehr abgemagert. Die Haare sind spärlich, im Ergrauen begriffen, die kleinen Gefässe der Gesichtshaut sind erweitert. Die Pupillen der grauen Augen sind etwas erweitert, reagiren gut. Der rechte Mundwinkel

Digitized by Google

steht höher, die Zunge wird etwas nach links, leicht zitternd, herausgetreckt. Kleiner Bruch in der *Linea alba* zwischen Nabel- und eshwertfortsatz; kleiner directer Leistenbruch rechts. Brust- und Unterleibsorgane sonst normal. Sprache etwas unsicher (es fehlen mehrere Zähne), geringes Zittern in den Händen. Spricht sehr viel vor sich hin, gesticulirt lebhaft, ist unstät, schreit zuweilen, läuft zeitweise stark auf und ab. „Das muss ich thun, das giebt mir der liebe Gott ein in meinem Herzen".

Blieb Mai und Juni hindurch andauernd mehrweniger erregt, macht allerlei sonderbare Bewegungen, singt laut, spricht verwirrt, hat Gesichts- und Gehörstäuschungen. Auch des Nachts meist laut, zerreisst die Kopfpolster, schmiert mit Koth, wirft damit die Fenster ein. Kopf nicht warm, Appetit stark, Stuhlgang regelmässig. Puls zuerst etwas frequent 80—84, seit Mitte Juni 56—64, klein. *Digitalis infus.* mit *Tinct. opii* (*infus. Fol. Digital* (2,0) 200,0 *Tinct. opii* 4,0 2stdl. 1 Essl.), Opiumtinctur in steigenden Gaben (seit 15. Juni) nützten nichts; auch nicht Morphium-Injectionen.

Auch im Juli dauerte die Erregung ziemlich gleichmässig fort, trotz *Tinct. opii gtt.* 70 2 Mal täglich, trotz Bädern von 24° 2 Mal täglich eine Stunde lang. Sagt, er sei Gott, er sei Gottes Sohn, glaubt, seinen Nachbar *Nibbe* zu sehen und zu hören. Auch des Nachts meist unruhig und laut, zerreisst einige Male sein Hemde, schmiert mit Koth etc. Appetit sehr stark, Stuhlgang normal; Kopf nicht warm, Puls 60—64.

Im August war die Frequenz im Ganzen mässiger; im Anfang des Monats entwickelte sich eine Entzündung der Sehnen und der Knochenhaut des rechten Zeigefingers, die sich auf die Hand weiter verbreitete und Brand der Weichtheile und der 3. Phalanx des Knochens zur Folge hatte. Der Pat. ass dabei sehr gut und sah wenig angegriffen aus.

Im Anfang September war er wieder öfters erregt und laut, oft auch des Nachts (trotz *gtt.* 30—37 *Tinct. opii*), so dass er Nachts isolirt werden musste; konnte jedoch auf der gemeinsamen Abtheilung, auf die er aus der Zellenstation seit Mitte August verlegt war, bleiben.

Am 16. September (Nachmittags 5 Uhr) Krampfanfall mit Bewusstlosigkeit von einigen Minuten Dauer, kommt aber bald wieder zu sich. Abends noch 2 Mal Krampfanfall.

Klagt 17. und 18. September wiederholt über Frösteln, leichte Röthung und Schwellung des rechten Kniegelenks, Puls 64, Temp. 37,2. Geht trotzdem viel umher, ist mässig erregt, sehr geschwätzig.

27. October. Klagt über fortwährenden Stuhldrang. *Prolapsus ani.*

30. October Abends. Das Kniegelenk rechts bedeutend geschwol-

Digitized by Google

len. Klagt, dass er seit gestern nicht Urin lassen könne, Blase sehr ausgedehnt, durch den Catheter etwa 1000,0 entleert. Puls 64. Zu Bett bleiben; Bäder seit 15. October ganz ausgesetzt.

1. October Morgens 9 Uhr: Puls 68, Temperatur 33° Celsius. Durch den Catheter viel Urin entleert. Behauptet, seit einigen Tagen „schieren Eiter" ausgepisst zu haben. Ist munter und geschwätzig, hält sich aber ruhig im Bett. — Abends 6 Uhr: Temperatur 35, Puls 72. Kniegelenk etwas dünner. Beim Einführen des Catheters die ersten Tropfen eitrig.

2. October. Temperatur 35, Puls 68. Beim Aufstehen und Versuch des Urinirens fliesst eitriger Schleim aus der Harnröhre, ist nicht im Stande, Urin zu lassen. Abends Temperatur 35,1, Puls 64. Morgens und Abends sehr viel Urin durch den Catheter entleert. Isst gut. Leinsamenthee.

3. October. Temperatur 35, Puls 64, klein, reichlicher Urin durch den Catheter entleert. Stuhtgang durch Clystier. Leib gegen Druck empfindlich, Breiumschläge. — Abends Temperatur 35,6, Puls 60. Kniegelenk besser.

4. October. Temperatur 34,8, Puls 56, gut geschlafen; beim Catheterisiren Anfangs Eiter und zum Schluss wieder. Isst gut. — Abends Temperatur 35,2.

5. October. Temperatur 35,1, Puls 64. — Abends Temperatur 35,2, Puls 64.

6. October. Temperatur 35,8, Puls 60. Der Catheter haftet wie gestern Abends an der Stelle des Blasenhalses, viel Eiter entleert. — Abends Temperatur 37,2, Puls 64. Catheterisation wie Morgens; Prostata erscheint nicht geschwollen bei der Untersuchung *per anum*.

7. October. Temperatur 34,8, Puls 76—80, Nachts gut geschlafen, isst gut. Catheterismus wie gestern. — Abends Temperatur 37,4, Puls 96. Hat um 6 Uhr ½ Flasche Urin selbst stehend gelassen.

8. October. Temperatur 32,8, Puls 66. Catheterismus wie gestern; sehr matt und schwach; tägl. 2 Glas Kornbranntwein. — Abends Temperatur 38, Puls 92, kann selbst Urin lassen.

9. October. Temperatur 35,6, Puls 68, lässt Morgens 2 Mal selbst Urin beim Aufstehen. Catheterismus wie gestern, ziemlich viel Eiter entleert. — Abends Temperatur 34,7, Puls 68.

10. October. Temperatur 33,8, Puls 64, kann bei Druck auf den Leib Urin lassen, Catheterismus wie gestern, ziemlich viel Eiter. — Abends Temperatur 36,5, Puls 72, kann allein Urin lassen; seit vorgestern so schwach, dass er sich nur mühsam auf den Beinen hält. Thut aber sonst ganz munter, parlamentirt um mehr Schnaps, isst gut.

Digitized by Google

11. October. Temperatur 34, Puls 56. Nachts etwas vor sich din gesprochen. Catheterismus wie gestern, Ausspritzung, viel Eiter. — Abends Temperatur 36,4, Puls 90.

12. October. Nachts sich viel hin- und hergeworfen, spricht nicht mehr, trinkt aber noch seinen Kaffee. Temperatur 33,4, Puls 52—56. sehr klein.

† um 12 Uhr Mittags.

Section 24 h. p. m.

Körper abgemagert, rechte Oberschenkel ödematös. An der Volarseite des rechten Zeigefingers eine vom ersten Phalangealgelenk bis zum folgenden sich erstreckende Geschwürsfläche, das folgende Fingerglied nackt und nekrotisch herausragend. Auf der Streckseite noch zum grössten Theil die Haut vorhanden. Die Endphalanx fehlt. Auf dem Rücken zahlreiche confluirende Todtenflecke. Rückenmak, Dura mater an der Innenfläche rosig gefärbt, im Lendentheile reticulirt und marmorirt. Weichere Häute nur spärlich getrübt, in den untern Partien mit reichlicheren Gefässen versehen. Rückenmarksubstanz mit Ausnahme des Lendentheils etwas weicher, etwas ödematös; in den unteren Partien blutreicher, so dass beim Durchchnitt deutliche Blutpunkte zum Vorschein kommen

Schädel rundlich, regelmässig configurirt, schwerer, dick, mit spärlicher Diploë. Diese für die hintere *Art. mening. media* in einen Canal verwandelt. Längs der Mittellinie weniger verwachsen.

Dura mater. Im *Sin. longitud.* ziemlich viel dunkelfarbiges, halbflüssiges Blut, auf der Innenfläche in der hinteren Schädelgrube ein sehr dünner, rostfarbener Anflug; längs der Mittellinie auf der Scheitelhöhe durch *Pacchioni*'sche Granulationen mit den weichen Häuten verwachsen. Die weichen Häute mit stark injicirten Gefässen versehen, längs derselben mässig getrübt, leicht trennbar, mit Ausnahme der Partie auf dem Scheitel. Im Subarachnoidealrande vermehrte Flüssigkeit. Gehirnsubstanz durchweg sehr blutreich, weich, ödematös, in den Ventrikeln etwas vermehrte Flüssigkeit

Thorax. In der linken Pleurahöhle etwa 90—120 Gramm ziemlich klare Flüssigkeit, die rechte Lunge an der Spitze lose verwachsen. Beide Lungen im unteren Lappen, vorzüglich am hinteren Umfange weniger lufthaltig, sehr blutreich, durchsetzt von vielfachen schwärzlichen Heerden, die übrigen Partien ödematös Herz gut contrahirt, der eine Mitralzipfel etwas verkürzt; in beiden Höhlen reichliche Mengen theerartigen Blutes; nur im linken Ventrikel ein kleines fibrinöses Gerinnsel. Herzfleisch graubraun. anscheinend fettig. Abdomen enthält keine freie Flüssigkeit. Leber etwa normal gross, Gewebe sehr blut-

Digitized by Google

reich, undeutlich acinös. In der rechten Ecke des hinteren Randes gut taubeneigrosser, dicht unter dem Ueberzuge liegender, mit fester Membran ausgekleideter, mit gelbem Eiter erfüllter Abscess, welcher mit einem am oberen Ende der rechten Niere befindlichen zusammenhängt. Die Milz etwas länger, sehr schlaff; rechte Niere fast über die Hälfte gröseer, mit ihrem oberen Ende an die Leber (siehe oben) angelöthet. An dieser Stelle ein fast wallnussgrosser Abscess. Auf dem Durchschnitt das Gewebe sehr blutreich, missfarbig, durchsetzt von zahlreichen, bis nadelkopfgrossen, graugelben Herden. Das Nierenbecken erweitert, in diesem wie im *Ureter* eine Menge eitriger Flüssigkeit. Linke Niere ähnlich der rechten, nur ohne grösseren Abscess. Harnblase erweitert, mit trübem Urin gefüllt. Schleimhaut trabeculär gewulstet. Die ganze Prostata sowie das die Urethra umgebende Zellgewebe in grösserer Ausdehnung vereitert. Die Urethra an der *Pars membranacea* an der Innenfläche missfarbig.

Mikroskopische Untersuchung des Rückenmarks (Dr. *Nötel*): Körnchenzellen nur spärlich in dem linken Seitenstrange, dann aber in allen Höfen. Ganz vereinzelte im unteren Rückentheile in dem linken Hinterstrange. — Gefässe ohne Anomalien. Viel Blutpigment-Schollen.

Der vorstehende Fall hat mit den von *Löwenhardt* publicirten viel Gemeinsames. Der Kranke ist Trinker und im höheren Alter, die geistige Störung hat den Charakter der Exaltation und steigert sich bis zur Tobsucht, die Stimmung ist überwiegend heiter, der Kranke hält sich für Gott, für Gottes Sohn. Auch die übergrosse Rastlosigkeit und körperliche Unruhe Tags und Nachts ist vorhanden und hat nur in den letzten 14 Tagen aufgehört. In Betreff der Dauer der niederen Temperatur ist die Beobachtung leider unvollständig, weil Pat. erst in den letzten 12 Lebenstagen regelmässig gemessen wurde; bemerkenswerth sind auch die bedeutenden Tagesschwankungen, die am 8ten fast 6° beträgt und über die obere Grenze der Normaltemperatur hinaus bis auf 38° steigt. In der durch die anhaltende Aufregung und durch die langdauernde Eiterung herbeigeführten Erschöpfung aller Kräfte ist wohl ein trauriger Grund für die geringe Eigenwärme zu finden, zumal dieselbe nach *Wunderlich* bei habituellen Säufern schon bei gleichen sonstigen Verhältnissen in der Regel niedriger, als bei anderen Menschen ist und Collapstemperaturen bei ihnen in den verschiedensten fieberhaften und nicht fieberhaften Krankheiten häufig und in besonderer Intensität vorkommen.

Ganz anderer Art ist der zweite Fall, dieser betrifft einen jüngeren Mann, bei dem die geistige Störung sich in der Form de Depression, der passiven Melancholie, zeigte.

Digitized by Google

Carl M., 31 Jahre alt, Lehrer, wurde am 18. September 1868 in unsere Anstalt aufgenommen und starb am 29. November desselben Jahres. Ueber Erblichkeit und etwaige frühere Krankheiten ist nichts bekannt. Beide Eltern sind todt, 1 Bruder und 3 Schwestern leben. Besuchte vom 15. bis 21. Jahre das Gymnasium zu Görlitz, erlernte dann 2 Jahre lang die Buchdruckerprofession, dann 1 Jahr die Buchhandlung, wurde dann Schullehrer-Präparand, dann Adjunct und war zuletzt 3 Jahre in Tempelhof interimistisch als 2. Lehrer; konnte das Lehrerexamen nicht machen. Sein College in Tempelhof will schon seit 2 Jahren eine Abnahme der geistigen Fähigkeiten bei ihm bemerkt haben; *M.* glaubte alle Mädchen in sich verliebt, wollte eine reiche Heirath machen, „mindestens 10,000 Thlr.", wurde von den Kindern zum Besten gehalten. Klagte im letzten Winter viel über Kopfschmerz, besonders in der linken Schläfengegend, und über Husten. Ging am 1. Juni 1868 nach Berlin und wurde am 27. ejusdem von der Polizei der städtischen Irrenverpflegungsanstalt übergeben. Bot hier das Bild einer tiefen Melancholie, war kaum zu einzelnen Aeusserungen über seine Verhältnisse zu bewegen; sass stieren Blickes auf einem Flecke, seufzte vor sich hin, rang die Hände und war in dumpfes Hinbrüten verloren.

Status praes. 20. September 1868: *M.* ist etwa 5 Fuss gross, von mässig starkem Knochenbau, sehr abgemagert. An der Kopfbildung fällt der sehr stark entwickelte Unterkiefer auf, ist Prognath. Die Haut ist trocken und schlaff, gelbbleich; Haare und Augen sind braun, die Pupillen reagiren gut, die rechte ist weiter als die linke. Der linke Mundwinkel steht etwas höher Die Wirbelsäule ist in ihrem Brusttheile nach rechts verbogen. Die physicalische Untersuchung der Brust- und Unterleibsorgane scheitert an dem hartnäckigen Widerstande des Patienten. Puls 80, klein, Kopf nicht warm.

Steht oder sitzt lange auf einem Flecke, spricht sehr selten und leise, fasst einfache Fragen richtig auf, weiss, dass er im Krankenhause ist. Isst wenig, widerstrebt beim Einnehmen, Baden etc.

Warmes Bad von ½ Stunde mit Brause; abendlich *gtt.* x—xx *Tinct. opii*, da er angiebt, wenig zu schlafen.

22. October. Hat in den letzten Wochen ziemlich gut gegessen und sogar sich im Strohsaal beschäftigt; sonst unverändertes Verhalten, ganz apathisch und deprimirt. Die Bäder sind wegen des starken Sträubens des Patienten seit über 14 Tagen unterlassen. Klagt heute über Frost, muss gefüttert werden, antwortet kaum. Puls 92, leer, Temperatur 38° *Celsius*, Kopf warm.

23. October. Morgens 9 Uhr Temperatur 37,4, Puls 72, Kopf warm. — Abends 6 Uhr Temperatur 36,8, Puls 72, Kopf nicht warm; isst Mittags selbst.

Digitized by Google

24. October. Temperatur 36,5, Puls 72; muss gefüttert werden. — Abends Temperatur 36,4, Puls 80.

25. October. Temperatur 36, Puls 72, sehr klein; muss gefüttert werden. — Abends Temperatur 36,1, Puls 80—84, grösser.

26. October. Temperatur 35,8, Puls 72. — Abends Temperatur 35,8, Puls 72. - Abends Temperatur 36, Puls 76; isst heute selbst.

27. October. Temperatur 36,4, Puls 72; Kopf etwas warm, kein Kopfschmerz. Reconvalescentenkost; isst nicht gut. — Abends 36,5, Puls 88; isst selbst.

28. October. Temperatur 36,5, Puls 76; Kopf warm. — Abends Temperatur 36,4.

29. October. Temperatur 36,8, Puls 72; isst selbst ziemlich gut. — Abends Temperatur 36, Puls 72.

30. October. Temperatur 36,2, Puls 72; isst selbst ziemlich. — Abends Temperatur 36,6, Puls 80, sehr klein. Zugänglicher; links veränderter Percussionston, geringes Athemgeräusch beiderseits.

31. October. Temperatur 36,8, Puls 72; isst selbst. — Abends Temperatur 36,4, Puls 72.

1. November. Temperatur 36,2, Puls 64; isst gut. — Abends Temperatur 36,2, Puls 68.

2. November. Temperatur 36,6, Puls 76. — Abends Temperatur 36,5, Puls 68; isst selbst.

3. November. Temperatur 36,4, Puls 72; klagt etwas Kopfschmerz, Kopf nicht warm. — Abends Temperatur 36,6, Puls 72; isst ziemlich.

13. November. Unverändertes Verhalten; muss gestern und heute wieder gefüttert werden; steht unthätig im Strohsaal umher, soll herausbleiben.

Die Temperatur schwankte in den Tagen vom 4. bis 23. November zwischen 36—36,8° *Celsius*, die Pulsfrequenz zwischen 72—80.

24. November. Nachmittags Schwindel. Abends Temperatur 36,4, Puls 68; klagt Reissen im linken Bein.

25. November. Temperatur 35,8, Puls 68; muss gefüttert werden. — Abends Temperatur 36, Puls 64.

26. November. Temperatur 30, Puls 68, sehr matt; isst ziemlich. 2stdl. 1 Essl. Kornbranntwein, warme Bedeckung. — Abends Temperatur 29,8, Puls 68, Respiration 15. Stündlich 1 Esslöffel Kornbranntwein. — Abends 9 Uhr Temperatur 29,8; Haut kalt.

27. November. Temperatur 28,6, Puls 52, kaum zu fühlen, Respiration 12—16, unregelmässig. Branntwein ½ stündl., Bouillon mit Ei. Isst ziemlich Mittag. — Abends Temperatur 29,5, Puls 56, Respiration 26; hustet, schluckt beschwerlich. Links Dämpfung, fast feh-

Digitized by Google

lendes Athemgeräusch. Meint, er sei so gross geworden. — Abends 9 Uhr Temperatur 29,8.

28. November. Temperatur 30,2, Puls 56, Respiration 20. Hat Nachts wenig geschlafen, hin und wieder Branntwein und auch Wasser getrunken, viel gestöhnt. Bouillon mit Fleischextract, *Liq. ammon. succin.* umschichtig stündl. — Abends Temperatur 30,8, Puls 52, Respiration 44, unregelmässig, schnüffelnd. — Abends 9 Uhr Temperatur 32,2, Puls 60—64, Respiration 52—56, Rasseln in den Bronchien, Flockenlesen. Nachts viel gestöhnt; nimmt etwas Bouillon.

Um 10 Uhr Morgens Temperatur 32,6; nimmt etwas Kaffee und Bouillon. — Um 12½ Uhr Mittags Temperatur 31,3; wirft sich viel hin und her, stöhnt viel. — Seit 3 Uhr ruhiger. — Abends 6 Uhr Temperatur 31,8, Respiration 48, tief, Puls unfühlbar. † um 6½ Uhr.

Section 18 h. p. m.

Körper klein, mager, mit starker Skoliose der Rückenwirbel mit der Convexität nach rechts; auf dem Rücken wie auf der Dorsalfläche der Extremitäten confluirende Todtenflecke.

Rückenmark ziemlich blutreich; *Dura mater* auf der Innenfläche etwas injicirt und reticulirt: weichen Häute ohne Abnormitäten. Rückenmarkssubstanz selbst etwas ödematös, sonst von guter Consistenz.

Schädel gut configurirt, etwas blutreich, auch etwas dicker und schwerer, Diploë reichlich vorhanden, Nähte verwachsen, Gefässfurchen vertieft: zu beiden Seiten der Mittellinie ziemlich dicht mit der *Dura mater* verwachsen. Im *Sinus longitud.* der *Dura mater* ziemlich reichliche Mengen mussigen Blutes.

Dura mater selbst stark blutreich, auf der Scheitelfläche durch *Pacchioni*'sche Granulationen mit den weichen Häuten verwachsen. Auf der Innenfläche mehrfache, besonders in den mittleren Schädelgruben deutliche, sehr zarte, rostfarbene Anflüge.

Weiche Häute stark injicirt. Auf der Scheitelhöhle stark getrübt, ohne Substanzverlust trennbar. Gehirnwindungen auf der Scheitelhöhe klaffend, *Sulci* vertieft. Gehirnsubstanz ödematös und weich, durchweg sehr blutreich; auf der *Corticalis*, besonders in den *Sulcis*, eine sehr bedeutende Gefässentwicklung. Das linke Unterhorn etwas erweitert, das *Ependym* beiderseits verklebt. Die *Plexus chorioidei* stark gefüllt. *Ependym* im 4. Ventrikel etwas granulirt.

Thorax in der linken Pleurahöhle etwa 120,0 seröse Flüssigkeit; in der rechten etwa 60,0 desgleichen. Linke Lunge nur am vorderen Rande verwachsen, im oberen Lappen blutreicher, ödematös; im unteren Lappen schlaff pneumonisch infiltrirt. Die rechte Lunge in

Digitized by Google

allen 3 Lappen stark blutreich, im unteren stellenweise etwas dichter; ödematös. Herzbeutel ohne vermehrte Flüssigkeit; in beiden Herzhöhlen reichliche fibrinhaltige Gerinnsel; Klappen durchweg zart, nur die venösen wenig verdickt. Herz selbst gut contrahirt. Abdomen ohne freie Flüsssigkeit; Leber blutreich, etwas kleiner im Längendurchmesser, etwas fettig. Milz klein und schlaff. Linke Niere lang und schmal, rechte etwas kleiner; beide in der Rinde stark gelblich gestreift, in der Marksubstanz blutreich. — Magen um die Hälfte weiter, mit ziemlich reichlichem, flüssigem Inhalte und mit dickem, zum Theil schwärzlich tingirtem, zähem Schleime bedeckt.

Darm und Blase ohne Abnormitäten.

Während in dem zuerst mitgetheilten Falle die Temperatursenkung immer noch in den auch früher schon beobachteten Grenzen blieb, geht sie in dem *Ubischki*'schen Falle weit unter dieselbe herab. *Wunderlich* in seinem im Jahre 1868 erschienenen Buche „das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten" sagt: Die niedrigste, übrigens nur unwahrscheinlich erreichte Grenze, der überhaupt beim lebenden Menschen, also auch bei Kranken beobachteten Temperaturen ist 32° *Celsius*. Hier sehen wir die Körperwärme, nachdem sie sich schon wochenlang vorher unter der unteren Grenze des Normalen gehalten hat, am 4. Tage vor dem Tode auf 30° *Celsius* herabgehen, und in den nächsten 24 Stunden fast noch um 1½°, auf 28,6 fallen; sie steigt dann in den folgenden 48 Stunden allmälig wieder bis auf 32,6 und fällt dann wiederum bis auf 31,3, um im neuen Ansteigen unmittelbar vor dem Tode sich auf 31,8 zu erheben. Schon die von *L.* publicirten Fälle haben gezeigt, dass *W.* die unteren Grenzen der beim lebenden Menschen möglichen Körpertemperaturen zu eng gesteckt hat; der *Mischke*'sche Fall bestätigt dies auf's Neue. Die anhaltend geringe Nahrungsaufnahme des Kranken, die dadurch herbeigeführte chronische Inanition ist wohl als von wesentlichem Einfluss auf die Temperaturerniedrigung anzusehen. Aber oft genug sehen wir unter anscheinend gleichen Umständen diese doch nicht eintreten und vor allen Dingen nicht diese Tiefe erreichen. Besondere äussere Schädlichkeiten, die wärmeentziehend wirkten, wie in den *Löwenhardt*'schen Fällen, waren auch in diesem Falle nicht vorhanden; Pat. war reinlich und wurde nur selten gebadet; er hatte keine Neigung, sich zu entblössen und lag in den letzten 6 Tagen still im Bette. Wir sind aber noch nicht im Stande, die Temperaturveränderungen des kranken Körpers in berechenbarer Weise auf ihre wahren Bedingungen zurückzuführen. „Wir sind nur im Stande, das Resultat, die Aenderung der Höhe der Eigenwärme zu bestimmen; die Factoren, aus welchen dieses Resultat hervorgeht, entziehen sich der directen Beobachtung und sind höchstens auf conjecturelem Wege

Digitized by Google

annähernd zu schätzen" (*Wunderlich*). Zu diesen Conjecturen gehört es auch, wenn man wie *Tscheschichier* annimmt, dass im Gehirn Centren existiren, die für die Erhaltung der Körperwärme regulirend wirken, und dass in Folge der Lähmung derselben die Temperatur sich steigere, und ebenso vielleicht bei einer Reizung sich erniedrige.

Dr. *Ideler* erstattete hierauf Bericht

Ueber die Krankenbewegung an der städtischen Irrenverpflegungsanstalt zu Berlin während des Jahres 1868.

Es befanden sich ult. December 1867 in der Anstalt 431 Personen (216 M., 215 W.), gingen im Jahre 1868 zu 488 (266 M., 222 W.), wurden im Ganzen verpflegt 919 (482 M., 437 W.), gingen während des Jahres 1858 ab 457 (247 M., 210 W.), blieb mithin ult. December Bestand 462 (235 M., 227 W.).

Bezüglich der einzelnen Fonmen geistiger Störung, welche die aufgenommenen Kranken darboten, wurden beobachtet: psychische Depressionszustände (Melancholie im Allgemeinen) bei 20 M., 29 W., Summa 49, Exaltationszustände (Manie, Tobsucht) bei 42 M., 54 W., Summa 96; Schwächezustände (Verrücktheit, Blödsinn) bei 119 M., 115 W., Summa 234, paralytischer Blödsinn bei 52 M., 4 W., Summa 56. — Als epileptisch mit mehr oder minder hervortretender psychischer Störung gingen der Anstalt 26 M., 20 W., Summa 46 zu, an *Delirium tremens* wurden 7 Männer behandelt. — Mit Rücksicht auf die Prognose der Geistesstörung, welche die recipirten Kranken darboten, erwiesen sich zwei Drittheil von vornherein als unheilbar. Besonders hervorgehoben wurde noch bezüglich des paralytischen Irreseins die im Verhältniss zum männlichen Geschlecht auffallend geringe Zahl der paralytischen Weiber.

Es schloss sich hieran eine kurze Mittheilung über den zeitig herrschenden Raummangel in der Anstalt, die mit Rücksicht auf die stätig in der Steigerung begriffenen Aufnahmen die Communal-Behörden nöthige anderweite Räumlichkeiten zur Unterbringung der Geisteskranken zu beschaffen. Es sei zu diesem Zweck das grosse Friedrichs-Waisenhaus in der Stralauerstrasse in Aussicht genommen, dessen Räume zur Unterbringung sämmtlicher männlichen Irren, sowie eines Theils der Frauen-Abtheilung, eingerichtet werden sollen.

Dr. *Schroeter*, Fall von allgem. fortschreit. Paralyse bei einer Frau nebst Sectionsbefund.

Frl. *Bertha*, 79 Jahre alt, wurde am 24. April d. J. in unser Asyl aufgenommen. Nach dem ärztlich beigefügten Zeugnisse litt sie seit Jahren an einer langsam aber stetig zunehmenden Entwickelung

Digitized by Google

allgem. Parese, zu der sich in letzterer Zeit häufig Zustände geistiger Erregtheit gesellten. Sie quälte ihre Umgebung auf unerträgliche Weise, während sie ihre 91 Jahre alte Mutter pflegen sollte. Von Jugend auf schwächlich, soll sie doch niemals an schwereren Krankheiten gelitten haben. Die Verwandten erwähnen noch einen vor längerer Zeit (!) bei ihr eingetretenen apoplectischen (?) Anfall. Lähmungserscheinungen sollen aber nicht zurückgeblieben sein. Früher soll Patientin heiter und wohlwollend gewesen sein, während bei weiterer Nachforschung schon vor mehr als Jahresfrist eine Umänderung ihres Wesens, ohne nachweisbare Ursache, eintrat. Erbliche Anlage zu Psychosen besteht in der Familie.

Stat. praes. Pat. ist gross, mager. Gleichmässig entwickeltes Knochengerüst, schlaffe Musculatur, gerunzelte, welke, spröde Haut. Schädel symmetrisch, mit grauem, geordneten Haar bedeckt. Gesicht lang und schmal, graugelbliche Farbe, Stirn hoch mit Querrunzeln, Nasolabialfalte beiderseits ausgeprägt, Oberlippe eingesunken (künstliches Gebiss), Kinn vorstehend. Etwas benommener Gesichtsausdruck, lebhafter Blick, glänzendes Auge. Verengerte, träge reagirende Pupillen, die rechte etwas weiter. Braune Regenbogenhaut. Greisenbogen. Nasen- und Ohrknorpel gesund. Langer, welker Hals. Carotidenpuls verstärkt. Puls an der *art. radial.* beiderseits gleich, mit hoher Welle, mit *Marey*'schen Sphygmograph tardo-dicrote Curven, 84 Schläge im Stehen. Temp. normal. Respiration etwas oberflächlich und häufiger. — Stimme heiser, gedämpft. Sprache schwerfällig, mangelhaft artikulirt. Zunge zitternd, nicht weit aber gerade herausgestreckt. Weiche Gaumen normal. — Schlaffe Haltung des Körpers mit etwas vornübergebeugtem Kopfe. Bewegungen der Extremitäten etwas ruckweise, unbeholfen. Gang unfrei, tappend und schwerfällig. — Alle Sinne in etwas trägerer Function. Sensibilität gleichmässig etwas abgestumpft. Richtige Localisation der Tastempfindung, aber ohne normale Deutlichkeit. Ebenso Temperatur- und Drucksinn schwächer, so letzterer besonders auch als Gegendruck. Für feinere Prüfung war die Kranke nicht geeignet.

Kraft uud Mannigfaltigkeit der Vorstellungen vermindert. Bei geringerer Aufmerksamkeit zeigt sich auch das Urtheilsvermögen beeinträchtigt. Das Gedächtniss erscheint auch für näher liegende Thatsachen lückenhaft und unzuverlässiger. Das Gemüthsleben ist gleichfalls beeinträchtigt, Pat. ist ungesellig und wenig rücksichtsvoll. Krankheitsgefühl ist rege. Präcordialangst wird geäussert, bei einem mittleren Grade psychischer Depression.

Pat. war bei der Aufnahme freundlich und gesprächig: sie habe in den letzten Nächten vor Freuden, hier aufgenommen werden zu

Digitized by Google

können, gar nicht geschlafen, denn sie wolle gern wieder gesund werden. Sie richtete sich bald in ihrem Zimmer ein. Aber auch bald zeigte sich in ihrem Wesen Unruhe und Angst, sie hielt es nicht lange an einem Orte aus, ging von ihrem Zimmer nach dem Corridor, legte sich dort auf ein Sopha, um nach einiger Zeit wieder zu wechseln. Daneben war sie sehr neugierig; sprach von weiten Spaziergängen, aber bei der motorischen Störung, vorwiegend der unteren Extremitäten, vermochte sie nur eine kleine Strecke weit zu gehen und musste dann, am Körper zitternd, schwankend und ermattet, längere Zeit ruhen. Darauf ging es mit neuem, rasch erlahmenden Eifer weiter, dem jede Kenntniss des körperlichen Leidens zu mangeln schien. — Manchmal wurde sie dann ärgerlich und heftig, wenn man regulirend in ihr unverständiges Wesen eingriff, und sie äusserte sich dann oft sehr unzufrieden über ihren hiesigen Aufenthalt, der ihr Beschränkungen auferlege, fing dann an, Alles zu tadeln, klagte darüber, dass sie noch nicht nach Hause dürfe und drängte fort. Selbst in Erfüllung ihrer vielfachen Wünsche konnte man mit ihr zusammengerathen, sofern zwischen Wunsch und Erfüllung nothwendig einige Zeit vergehen musste, z. B. beim Ausfahren. Sie wollte dann nichts mehr davon wissen und wurde sehr ärgerlich, wenn man ihr zuredete und fing sogar an zu weinen: man wolle ihr ihren Willen nicht lassen. Ergiessung ihrer schmerzlichen Gefühle in Thränen wurde noch ein Paar Mal bei ähnlicher Gelegenheit beobachtet. Meist nahm sie willig Belehrung an und schien hinlängliche Einsicht in ihren Krankheitszustand zu gewinnen, da sie sich im Allgemeinen krank fühlte und öfters über Präcordialangst klagte, auch wiederholt die Hoffnung aussprach, hier wieder gesund zu werden; aber das hielt immer nur für kurze Zeit vor. Der Mangel an richtigem Urtheil und die Schwäche der Intelligenz nahmen zu. Im Uebrigen bewegten sich ihre Vorstellungen nur im Kreise der täglichen und nächstliegenden Vorgänge und ihres Krankheitszustandes. Ihre Leistungen waren ganz unerheblich, bei auch in der ersten Zeit seltenen Versuchen zur Beschäftigung. Ein Paar ganz kurze Briefe, mit zitternder Hand geschrieben, sind noch leidlich abgefasst. Der Schlaf war nicht ruhig und erquickend. Von den körperlichen Verrichtungen zeigte sich die Verdauung bisweilen etwas träge. Der Appetit war wechselnd; das Kauen, wegen des oben erwähnten Uebelstandes und auch das Schlingen waren etwas behindert.

Beim Sprechen war ein leichtes Zucken der Mundmuskulatur deutlich. Die gestörte Artikulation und die Schwerfälligkeit der Sprache wurden immer auffälliger. Oft kam es auch vor, dass die Kranke bei anscheinend aufmerksamem und verständnissvollen Aussehen, einzelne Worte nicht zu finden vermochte, und dass inzwischen leichtbebende Be-

Digitized by Google

wegungen der Lippen auftraten, oder einzelne beliebige Silben wiederholt vorgestottert wurden, oder noch häufiger eine vollständige Pause eintrat, bis man ihr das richtige Wort vorsagte, was sie mit dem Ausdrucke lebhafter Freude, meist mit dem Ausrufe: Ja, Ja! aufnahm.

Am Anfange dieses Monats (Juni) haben die Lähmungserscheinungen schon einen hohen Grad erreicht. Electrische Reizbarkeit der Muskeln war nicht geprüft worden. Pat. kann nur sehr wenig, sehr mühsam und sehr unsicher gehen, die Füsse schleifen fasst den Fussboden. Die Bewegungen der Arme erfolgen mehr ruckweise, unsicher und zitternd. Die Sphincteren thun noch im Ganzen ihre Schuldigkeit. Sie liegt meist auf dem Sopha und unterstützt ihre Lage durch alle möglichen Bequemlichkeiten, meist muss sie bei ihrer grossen Unbeholfenheit von einem Orte zum andern getragen werden. Sie macht keinen Versuch mehr zu einer Beschäftigung. Zeitweise treten quälende Ructus und einzelne Hustenstösse auf. Die psychische Schwäche nimmt auch zu.

Am 11. Morgens ist Pat. mehr verfallen. Sie schläft fast den ganzen Tag über; es wird ihr von Zeit zu Zeit flüssige Nahrung eingeflösst, die sie schwer schluckt, meist aber bald wieder herauswölgert. Beim Erwachen ist sie meist verworren, bei sehr behinderter Sprache. Seltene Aeusserungen über Kopfschmerz. Zunge wenig und zitternd hervor, langsam zurück, weiche Gaumen unverändert. Falten auf der rechten Gesichtshälfte mehr verstrichen. Die Temperatur am rechten Arm und Fuss geringer. Puls 100 Schläge, hart, starkes und weites Erzittern des Thorax durch den Herzstoss. Respiration ruhig.

Am 12. Sopor. Morgens 10 Uhr 36° *C.*, 28 Resp., 122 Pulsfrequenz. Pulscurve niedrig, Ascensionslinie von der Richtungslinie stärker abgewichen, Gipfelwelle und erste secundäre Welle bilden einen Bogen.

Am 13. treten einzelne klarere Augenblicke zwischen dem schlafsüchtigen Zustande auf, in denen sie über Durst, Schmerzen im Kopfe oder vom Liegen klagt, auch den Arzt wieder erkennt. Aussehen einer Leiche. Pupillen weiter, aber ohne Reaction. Linkes Nasenloch enger, Temperatur nahe an das Mittel, Puls wie gestern. Hin und wieder Durchnässung des Bettes; gegen Abend *Secessus inscius.* Bei allmälig fortschreitender Lähmung entschlief Pat. sanft am 14. Vormittags.

Die Obduction wurde heute (den 15.) 24 Stunden p. m. bei 15° *C.* gemacht. Folgendes ist bemerkenswerth:

Schädeldach sehr dick, an der *Tab. vitr. int.* zahlreiche kleine Osteophyten. *Dura mater* leicht mit dem Schädeldach verwachsen. *Sinus* mit geringen Blutgerinnseln. *Jug. cerebr.* sehr scharf. *Proc. anonym.* links convex, rechts concav. *Pia mater* leicht ohne Substanz-

verluste von dem Gehirn abziehbar, mässig getrübt bei geringen Entzündungsproducten, mehr auf der Scheitelhöhe; daselbst auch kleine Granulationen; stärkere Trübung an den stark geschlängelten Gefässen verlaufend. Beiderseits an der 1. Stirnwindung kleine ödematöse Stellen der *Pia*. *Gyri* und *Sulci* stark ausgeprägt. Corticalsubstanz blass, wenig Blutpunkte beim Durchschnitt der Marksubstanz. Weiche Beschaffenheit des Gehirns, aber nirgends weiter bemerkenswerthe Einsenkungen. Seiten-Ventrikel in mässigem Grade erweitert, mehr der rechte und mit gelblichem Serum gefüllt. *Plex. choroid. lat.* mit kleinen ödematösen Anschwellungen. Oliven und *Pons* etwas vermehrte Consistenz.

Herz vergrössert, ausserdem an der rechten Hälfte mit Fett bedeckt. Wände des linken Ventrikels fettig entartet, leicht einreissbar. Im rechten Herzen starke Fibringerinnsel. Klappen gesund, *Arc. aortae* nicht erheblich mit atheromatösen Ablagerungen versehen, die hochgradig an der *Aorta abdom.*, besonders in der Gegend der Theilungsstelle, sowie in beiden *Artt. iliac.*

Linke Niere mit *Bright*-Entartung, die rechte weniger.

Uterus sehr klein, schlaff, im Fundus nach links hin ein Polyp sitzend. Beiderseits die End-Hydatiden erhalten, Fimbrien sehr zart und schön entwickelt.

Die mikroskopische Untersuchung einiger Stücke von Gehirn und Rückenmark ergab nach Herr Director Dr. *Koeppe* auffallend viele amyloide Körperchen.

Werfen wir noch einen Blick auf diesen Krankheitsfall zurück. Wir sehen bei dieser Kranken während des nur 7wöchentlichen Aufenthalts in der Anstalt einen sehr raschen Fortgang der Lähmungs-Erscheinungen zum endlichen Verfall, und zwar unvergleichlich rascher im motorischen als im psychischen Gebiete. Sofort bei der Aufnahme war die erhebliche Störung in der Articulation der Sprache auffällig, der sich als weiteres verdächtiges Moment die Ungleichheit der Pupillen hinzugesellte, während in der Unterhaltung ein mittlerer Grad von Melancholie bei einem mässigen Grade von Schwachsinn sich äusserte. Sieht man nun weiter den unbeholfenen Gang der Pat., so ist das Bild der *Paralys. univ. progr.* in den Hauptzügen vorgezeichnet. Freilich kann ich den Fall nur als eine besondere Form der Krankheitsgruppe der progressiven Paralyse zurechnen. Denn zunächst schreitet psychische und motorische Störung hier nicht gleichmässig fort. Erstere steigert sich nicht zum Blödsinn, während letztere schon in das letzte Stadium eintritt. Sodann fehlt Grössenwahn gänzlich. Auch der Umstand kann nicht als eine Andeutung desselben gelten, dass Pat. weit hinaus und grosse Spaziergänge machen wollte, während ihr die jedesmal an den Tag gelegte Hinfälligkeit ihres Körpers jede Belehrung für die Folge

Digitized by Google

zu versagen und ihr die stetig fortschreitende Lähmung ihres Körpers vollständig zu entgehen schien. Hierdurch spricht sich nur der Drang aus, sich von der inneren Angst und Unruhe zu befreien. Im Gegentheil, sie vermochte oft einen richtigen Blick in ihren Krankheitszustand zu thun, sie machte oft laute Aeusserungen über die Hoffnung bald wieder gesund zu werden, während sonst ein starkes Gedrücktsein des Gem eingefühls vorhanden war, das sich ein Paar Mal sogar bis zum We inen hinabneigte. — Als eine rein senile Form möchte ich den Fall nicht angesehen wissen, zumal da die Familie vorwiegend aus grossen und kräftigen Individuen besteht und die Mutter bei ihren 91 Jahren noch eine relativ rüstige Frau ist. Dem Alter darf hier nur ein gewisser Grad von Schwachsinn zur Last fallen. — Die makroskopischen Resultate der Obduction sind gering, mässige Meningitis, mässige Atrophie des Gehirns. Ganz unzuverlässig sind ferner die Angaben der Angehörigen, den Beginn der Krankheit betreffend. Gingen paretische Erscheinungen voraus, wie es wahrscheinlich, und folgten die psychischen nach? Seit wann wurde die centrale Sprachstörung bemerkt? Sie wurde draussen kaum wahrgenommen, und fiel den Angehörigen eigentlich erst auf, als man sie hier darauf aufmerksam machte. Die Störung in der Articulation der Sprache, Anarthrie, fiel aber hier sofort in die Augen und wuchs rasch zu einem hohen Grade an. Aber weiter ist zu beachten, dass gleichzeitig noch in geringerem Grade eine Störung im Centrum für die Wortbildung, Aphasie, bestand. Bei der Pat. fungirte das Centrum für die Bildung einzelner Worte nicht mehr, während der Wille und die Intelligenz, sie zu bilden, noch vorhanden waren, was man wohl unzweifelhaft aus dem dankbar freudigen Blicke und der raschen Zustimmung der Pat. schliessen darf, wenn man ihr das betreffende Wort vorsagte. Dass besonders auch die geistige Fähigkeit dazu, obgleich sie ja im Allgemeinen beschränkt war, noch bestand, müssen wir annehmen, da kurz vor dem Eintreten des soporösen Stadiums der Grad der Beeinträchtigung der Psyche nur erst als Schwachsinn bezeichnet werden konnte.

Der Sitzung schloss sich ein heiteres Festmahl an, während die späteren Stunden, denen sich das regnerische Wetter leider nicht günstig erwies, der Besichtigung der neuen Pavillons gewidmet wurden, deren bauliche und technische Krankenhaus - Einrichtungen, eingehend durch den Vorsitzenden erläutert, sich voller Anerkennung erfreuten.

Mit dem Abendzuge kehrten die Collegen in ihre Heimath zurück.

Dr. *Ideler*, Secretair.

Kleinere Mittheilungen.

Aus Langenhagen. — Seit October als Director eingetreten Dr. *Kind.* Aus öffentl. Kasse wurde gezahlt jährlich 4000 Thlr., aus Kirchencollecte 1868 2167 Thlr., aus Hauscollecte 1868 770 Thlr. Eine 2te Idiotenanstalt zu gründen, wird nothwendig. Seit Eröffnung sind von 437 Aufnahme-Gesuchen aufgenommen 240 (142 M., 98 W.). Davon gestorben 21, an phthisis 9, abgegangen 68, daher Ende 1868 Bestand 151. Ausgabe 1868: 17,482 Thlr. in 53,614 Verpflegungstagen von 171 Zöglingen, daher jeder Zögling 117 Thlr. 11 Sgr. 8 Pf. Personal: 5 Lehrer, 5 Werkführer und Wärter, 12 Wärterinnen, 1 Maschinist, 2 Verwalter und Knecht, 7 Köche und Hauspersonal, 1 Rendant und 1 ärztl. Director. Darunter 10 Familien mit 21 Kindern in eigenem Haushalt. (Dritter öffentl. Bericht über die bisherige Wirksamkeit des Comité zur Errichtung von Erziehungs- und Pflege-Anstalten für geistesschwache Kinder in der Provinz Hannover. Hannover 1869. 32 S.)

In der Irrenanstalt zu Frankfurt a. M. — bereitet sich eine Reorganisation der inneren Verwaltung vor. In die neue Anstalt ist noch die Einrichtung der alten hinübergenommen worden, dass ärztliche Leitung und Verwaltung coordinirt sind. Die Kostspieligkeit der Verwaltung hat den äusseren Anlass gegeben, dass der Oberbürgermeister diesen Anachronismus in einem gedruckten Berichte an den Magistrat darlegt und durch Statuten anderer Anstalten begründet.

Etat der Heil- und Pflege-Anstalt zu Brake für 1870. — Beiträge der Pfleglinge 10.383 Thlr. 1868 zahlten zur Kasse Inländer 5093 Thlr., Ausländer in der Anstalt 3835 Thlr., Ausl. in der Directorwohnung 2292 Thlr. Für letztere leistet die Anstalt: Beköstigung, Nahrung, Heizung, Erleuchtung und Wäsche, Mitbenutzung der Heilapparate, Arzneien, Wartung, während dhr Director die unmittelbare Fürsorge, ärztliche Behandlung, Möbeln, Betten übernimmt. Ausländer zahlen 480, Inländer 360, wovon 120 Thlr. dem Director zufallen. Der höchste Verpflegungsbeitrag ist 200 Thaler. Dadurch werden der Anstaltskasse Ueberschüsse gewährt, dadurch

Digitized by Google

haben in der inneren Einrichtung der Anstalt und in ihrer räumlichen Ausdehnung Verbesserungen hergestellt werden können, für welche es früher an Mitteln fehlte. Zumeist den Inländern sind sie zu Gute gekommen. Die Zahl der letzteren hat sich seit 1860 von 99 auf 135 vermehrt. Im Etat sind vorgesehen für Gehalt, Löhne une Gratification 2280 Thlr., Repar. der Gebäude uud Ergänzungsbauten 1285, Victualien 7300 Thlr., Heizung und Licht 1018, Arznei 172, Acker 456, Zinsen und Amortisation 988, Wäsche 245, Bekleidung 600 Thlr.

Aus Wien. — Am 4. Juni d. J. wurden die letzten Geisteskranken aus dem sog. „Narrenthurm" in die Irrenanstalt am Brünnlfeld transferirt. Die Anstalt, seiner Zeit ein Fortschritt, hatte sich nunmehr längst überlebt und war noch als trauriger Nothbehelf der immer mehr Opfer erfordernden Fürsorge für die Irren fortgeführt worden, bis es den grossen Anstrengungen Vieler gelang, sie hoffentlich für immer zu beseitigen.

In Frankreich — gab es 1866 50,726 Irre (133 auf 100,000 Seelen). Davon sind 32,130, also 63 von 100, in den Anstalten. Auf 91 Männer kommen 100 Frauen. — Idioten zählen 39,953, also 105 auf 100,000, und zwar 132 M. auf 1000 Fr., 9/10 davon sind in den Familien, 1500 in Asylen. In Summa sind 91,000 Irre und Blödsinnige, 1 auf 420 Bewohner. (Gaz. hebd. 1869. Sept.).

Aus Berlin. — Der frühere Besitzer des Alcazar, *S.*, hatte eine Extrapost bestellt, ohne dieselbe nachher zu benutzen. Bei der Unterhaltung mit dem Postillon stiess *S.* verschiedene Redensarten aus, welche seine Umgebung zu der Annahme veranlassten, dass der Sprechende plötzlich gemüthskrank geworden wäre. Als er nun endlich davon zu erzählen anfing, dass er grosse Bauten für 1½ Millionen Thaler gekauft habe und der grösste Mann seiner Zeit sei, da zog man einen Arzt zu Rathe, welcher den Transport nach dem städtischen Irrenhause veranlasste. Hier bildete sich der Wahnsinn weiter aus und verwandelte sich in der Nacht zum Dienstag in Tobsucht. Diese verlieh dem in einer Zelle befindlichen Kranken solche Kräfte, dass er mit den Händen eine äusserst starke Glasscheibe zertrümmerte, dann ein Brett losbrach, mehrere eiserne Traillen aus der Ummauerung riss und schliesslich in eine Nebenzelle drang, wo ein zweiter Kranker, der Schlossergeselle Lorenz sich befand. Hier ergriff er den schweren Deckel eines eisernen, für die Nothdurft des Kranken bestimmten Gefässes und zerschmet-

Digitized by Google

terte damit dem armen Gesellen mit einem Schlage den Hirnschädel, so dass der Tod augenblicklich erfolgte. (Voss. Ztg. Nr. 157.)

Aus England. — Die Jury erklärte neulich einen Greis von 72 Jahren, der einen anderen gleichalterigen erschossen hatte, für zurechnungsfähig und des Mordes schuldig. Als derselbe kurze Zeit nachher nachher die Gelegenheit wahrnahm, sich selbst zu erschiessen, erklärte sie die That für im Wahnsinn begangen und den Thäter für zurechnungsunfähig.

Aus Bamberg. — Ein Gärtner, der schon wiederholt in Wahnsinn verfallen und seit einem Anfall von Tobsucht, in welchem er vor Jahresfrist einem dasigen Wirth einen Finger abgebissen hatte, in der Irrenanstalt „St. Getreu“ untergebracht war, wurde neuerdings tobsüchtig. Aus dem Garten, welcher der Obhut des scheinbar Genesenden anvertraut war, stürzte er plötzlich in die Küche, ergriff ein grosses Messer, verfolgte mit demselben eine Wärterin, die ihm aber entschlüpfte, und versetzte, als ihm unglücklicherweise der Hausknecht der Anstalt in den Weg kam, diesem in kaum glaublicher Schnelligkeit 13 Stiche, so dass der Unglückliche augenblicklich zusammensank und nach wenigen Minuten verschied. Der Rasende schwang sich sodann über die hohe Gartenmauer und entsprang in einen benachbarten Hopfengarten. Der dort beschäftigte Eigenthümer, Waldaufseher Anmüller, trat ihm entgegen, wurde aber sofort durch einen wuchtigen Hieb zu Boden gestreckt, und als der Sohn des Genannten, ein kräftiger junger Mann von etwa 30 Jahren, herbeieilte, um seinen Vater aus den Händen des Wüthenden zu befreien, versetzte ihm dieser 3 schwere Wunden, deren eine vom Schulterblatt an fast den ganzen Rücken aufschlitzte. Der junge Anmüller musste sofort in das Spital gebracht werden und schwebt in Lebensgefahr. (Voss. Ztg. Nr. 239.)

Aus Schlesien. — In Lang-Heinersdorf wohnt bei dem Bauerngutsbesitzer G. dessen Bruder, welcher, seit Jahren schon schwachsinnig, aber meist gutmüthig, zu allerhand häuslichen und landwirthschaftlichen Arbeiten mit verwendet wird, dessen gestörter geistiger Zustand aber schon mehrfach zu allerhand Neckereien und Hänseleien Seitens seiner Mitarbeiter Veranlassung gegeben hat. In Folge einer solchen erschlug der auf diese Weise gereizte Schwachsinnige mit dem Dreschflegel einen Knecht mit einem einzigen Schlage auf den Kopf. (Sorauer Wchbl. Nr. 153.)

Benachrichtigung für die Mitglieder des Vereins Deutscher Irrenärzte.

Nachdem in Gemässheit eines in der Versammlung des Vereins Deutscher Irrenärzte zu Innsbruck am 20. September a. c. gefassten Beschlusses das Ergebniss der, über einige in die psychiatrische Wissenschaft einschlagende Bestimmungen des Entwurfs eines Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund, innerhalb des Vereins gepflogenen Berathungen zu Händen Sr. Excell. des Wirklichen Geh. Raths Herrn Dellbrück eingereicht worden ist, hat der Unterzeichnete das nachfolgende Schreiben erhalten, welches er den Mitgliedern des Vereins hierdurch zur Kenntniss zu bringen sich verpflichtet hält.

Dr. *Flemming.*

Berlin, den 4. December 1869.

„Die von Ew. etc. Namens des Vereins der Deutschen Irren-Aerzte mir eingereichten gutachtlichen Ausführungen zu einzelnen Bestimmungen des Norddeutschen Strafgesetz-Entwurfs habe ich gern zur Kenntniss der Mitglieder der Commission zur Berathung dieses Entwurfs gebracht.

„Namens derselben spreche ich dem Vereine Deutscher Irren-Aerzte für die bewiesene Theilnahme an dem Gesetzgebungswerk den verbindlichsten Dank aus.

Der Vorsitzende der Commission zur Berathung des Entwurfes eines Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund.

A. Leonhardt.

An
den Vorsitzenden des Vereins
deutscher Irren-Aerzte,
Herrn Geh.-Rath Dr. *Flemming*
zu Schwerin i/M.

Inhalt.

Seite

Beobachtungen über den Puls bei Geisteskranken. VI. Mit Holzschnitten. Von Dr. *O. J. B. Wolff* 629
Sitzung des deutschen Vereins der Irrenärzte zu Innsbruck 662
Norddeutscher Strafgesetz-Entwurf 662
Deutsche Lebensversicherungs-Institute 663
Internationale Irrenstatistik 664
Koster, Gutachten in gerichtlichen Fällen 665
Tigges, Vorlage zu *Lunier's* Vorschlägen für die Statistik 667
Neue Mitglieder des Vereins 706
Psychiatrische Section der Versammlung zu Innsbruck . . 707
Lombroso, Ueber Pellagra 709
Solbrig, Ueber Morb. Based. in psychischen Erkrankungen 713
Nasse, Ueber Typhus und Irresein 713
Meschede, Ueber Helmintheneier im Gehirn 715
Brosius, Ueber Sichentkleiden der Geisteskranken . . . 717
Kahlbaum, Klinische Mittheilung 719
Keesbacher, Zur Casuistik 719
Leidesdorf, Ueber Geisteskrankheiten *720*
Funke, Zur Nervenchemie 721
Golz, Ueber das Organ für Erhaltung des Gleichgewichts 721
Bernstein, Einfluss des Stromes auf das Herz 722
Hermann, Ueber Krämpfe durch nervöse Stauung . . . 723
Haidenhain, Ueber Körpertemperatur 723
Aubert, Einfluss der Athmung auf Pulsfrequenz 725
Ebert, Ueber *Chorea magna* 726
Virchow, Ueber Schädelmessungen 727
Seeligmann, Exostosen im Gehörgange 730
Vogt, Ueber einen Microcephalen 731
Leyden, Ueber Bulbär-Paralyse 732
Stolz, Statistik Hall's 734
Verhandlungen psychiatrischer Vereine.
4. Sitzung des psychiatrischen Vereins der Rheinprovinz 736
Herz, Ueber d. Prognose in psych. Krankheiten, 3. Theil 736
Meyer, Ueber die Irrenwartung im Hinblick auf d. s. vollziehenden Reformen des Irrenwesens überhaupt und des rheinischen im Besonderen 749
7. ordentl. Sitzung des psychiatrischen Vereins zu Berlin 760
Ulrich, Ueber subnormale Körperwärme 761
Ideler, Ueber die Krankenbewegung an der städtischen Irrenverpflegungsanstalt zu Berlin, im Jahre 1868 . 770
Schroeter, Fortschreitende Paralyse bei einer Frau nebst Sectionsbefund 770
Kleinere Mittheilungen.
Irrenanstalt zu Frankfurt a. M. — Aus Langenhagen. — Etat der Heil- und Pflege-Anstalt zu Brake für 1870. — Aus Wien. — In Frankreich. — Aus Berlin. — Aus England. — Aus Bamberg. — Aus Schlesien 776
Benachrichtigung für die Mitglieder des Vereins deutscher Irrenärzte 778

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google